



Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance

Résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2010

Recueil de tableaux statistiques

Mariana Astudillo, Luca Notari, Etienne Maffli



Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du monitoring act-info. Nous remercions également les collaborateurs et collaboratrices des services de consultation qui ont effectué les tâches de logistique et de saisie. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-info. Un grand merci également à Edith Bacher et Christiane Gmel pour la conception graphique et la mise en page de ce rapport ainsi qu'à Marina Delgrande Jordan pour sa précieuse collaboration dans le développement des syntaxes d'analyse.

Compléments d'information: Etienne Maffli, tél. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emaffli@addiction-info.ch

Réalisation: Mariana Astudillo, Luca Notari & Etienne Maffli,
Addiction Info Suisse

Diffusion: Recherche, Addiction Info Suisse, case postale 870,
1001 Lausanne, tél. 021/321 29 46, fax 021 321 29 40,
e-mail ebacher@addiction-info.ch

Prix: Fr. 10.–

Langue du texte original: allemand

Graphisme/mise en page: Addiction Info Suisse

Copyright: © Addiction Info Suisse, Lausanne 2011

Citation recommandée: Astudillo, M., Notari, L. & Maffli, E. (2011). Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance: résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2010 – Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Addiction Info Suisse.

Table des matières

act-info – addiction care and therapy information.....	7
act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD).....	7

ADMISSION

T1	Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2010)
T2	État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2010)
T3	Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2010)
T4	Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2010)
T5	Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2010)
T6	Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2010)
T7	Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2010)
T8	Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2010)
T9	Instance d'envoi principale et secondaire, selon le problème principal et chez les proches (2010)
T10	Type d'aide attendue à l'admission et statut légal de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2010)
T11	Traitements/prises en charge avant l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2010)
T12	Substitution et autre traitement/prise en charge à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2010)
T13a	Admission suite à une cure de sevrage, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2010)
T13b	Fréquence des sevrages sans aide professionnelle avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2010)
T14	Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2010)
T15.1a	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2010), hommes
T15.1b	Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2010), hommes

- T15.2a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2010), femmes
- T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2010), femmes
- T15.3a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2010), hommes & femmes
- T15.3b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2010), hommes & femmes
- T16.1a Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2010), hommes
- T16.1b Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2010), femmes
- T16.1c Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2010), hommes & femmes
- T16.2a Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2010), hommes
- T16.2b Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2010), femmes
- T16.2c Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2010), hommes & femmes
- T17 Mode d'administration de la principale substance posant problème au cours des 6 derniers mois avant l'admission (2010)
- T18 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 6 derniers mois avant l'admission des injections, échange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois avant l'admission et âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2010)
- T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2010), hommes
- T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2010), femmes
- T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2010), hommes & femmes
- T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2010), hommes
- T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2010), femmes
- T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2010), hommes & femmes
- T20 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2010)

- T21 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2010)
- T22a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2010), hommes
- T22b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2010), femmes
- T22c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2010), hommes & femmes
- T23a Problèmes psychiques au cours de la vie (2010), hommes
- T23b Problèmes psychiques au cours de la vie (2010), femmes
- T23c Problèmes psychiques au cours de la vie (2010), hommes & femmes
- T24 Proches: Lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2010)
- T25 Proches: problème principal et autres problèmes de la tierce personne (2010)
- T26 Proches: Propres problèmes des proches liés au problème de la tierce personne (2010)

SORTIE

- T27 Sexe et âge, selon le problème principal et chez les proches (2010)
- T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2010)
- T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2010)
- T30 Plus haute formation achevée, source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2010)
- T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2010)
- T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2010)
- T32b Destination des transferts, selon le problème principal et chez les proches (2010)
- T32c Cause de décès, selon le problème principal et chez les proches (2010)
- T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2010)
- T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2010)
- T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2010)
- T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2010)

- T37 Fréquence des rechutes, substance ou comportement impliqué et durée des rechutes pendant la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2010)
- T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2010)
- T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème (seulement patient-e-s) (2010)

Annexe

Données de base d'institutions ne participant pas au monitoring *act-info*

- A1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal (2010)
- A2 Problème principal à l'admission (2010)

act-info - addiction care and therapy information

Le Réseau de monitoring (act-info) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse:

- SAMBAD (Statistique du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance)
- Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Méthadone (Statistique nationale des traitements de substitution)

Ces cinq statistiques disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés. Les données communes sont intégrées dans une base de données centralisée, permettant ainsi de procéder à des analyses sur l'ensemble des secteurs. Avec l'adoption des standards européens (Treatment Demand Indicator), la comparabilité des données au plan international est également garantie.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à Addiction Info Suisse à Lausanne et à l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zürich (ISGF).

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)

Dès 2004, les instruments de monitoring act-info ont été introduits dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance et ont remplacé les anciens questionnaires en vigueur depuis 1994. Le monitoring dans ce secteur est confié à Addiction Suisse Info à Lausanne.

La statistique act-info SAMBAD offre un aperçu de la clientèle et des activités de l'aide ambulatoire en matière de dépendance en Suisse. Les données sont récoltées au début et à la fin de la prise en charge. Les informations rassemblées à l'admission renseignent en particulier sur les caractéristiques socio-démographiques des client-e-s, sur leurs expériences de traitement ainsi que sur leurs modes de consommation et problèmes psychosociaux avant la prise en charge. Les informations récoltées à la sortie rendent principalement compte des caractéristiques socio-démographiques des client-e-s à ce moment, des mesures prises par les intervenant-e-s durant la prise en charge et des circonstances de la fin de celle-ci.

En 2010, 80 des 206 institutions recensées dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance ont participé au monitoring act-info. Il s'agit de services de consultation spécialisés pour les problèmes liés à l'alcool et/ou aux drogues illégales ainsi que de divers types de services polyvalents offrant également une aide pour les problèmes addictifs.

Explications concernant les tableaux

La présente statistique descriptive des données de l'enquête act-*info* auprès des client-e-s du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance repose sur deux types de tableaux:

- lorsque la question a des catégories de réponses prédéfinies ou recodées en tranches distinctes (par exemple "état civil" ou "âge"), le tableau indique les pourcentages des différentes catégories de réponses
- lorsque la question n'a pas de catégories prédéfinies, mais requiert une valeur numérique (par exemple "âge au début de la consommation problématique"), le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1er quartile, 3e quartile)

La plupart des tableaux présentent les résultats de façon distincte pour les sous-groupes de patients et patientes ayant mentionné l'**alcool**, un **opiacé** (héroïne notamment), la **cocaïne** (et dérivés) ou le **cannabis** comme problème principal au moment de leur admission. Les **proches** venant consulter pour les problèmes d'un tiers font également l'objet d'analyses séparées pour les aspects socio-démographiques. A l'exception des thèmes directement liés aux modes de consommation ou aux formes de comportements addictifs non liés aux substances, les résultats ne sont en revanche pas présentés séparément pour les client-e-s (peu nombreux) ayant mentionné d'autres substances (par exemple un stimulant ou les substances volatiles) ou un problème addictif non lié à une substance (par exemple jeu pathologique) comme problème principal. Ces personnes sont cependant incluses dans les analyses portant sur l'ensemble des prises en charge figurant dans les blocs à droite des tableaux respectifs. Toutes les analyses sont effectuées séparément pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour les deux sexes confondus (colonnes "Total" comprenant le cas échéant également les quelques personnes dont le sexe n'est pas connu).

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Le nombre de réponses valides **N** représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages ou autres paramètres. Il est indiqué pour chaque groupe ou sous-groupe considéré. Au dessous, le nombre correspondant de données manquantes figure également. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés particulièrement prudemment.

Des notes en bas de tableau renseignent sur les éventuelles particularités des groupes de référence ainsi que sur le type de question. Lorsque plusieurs réponses sont possibles (par exemple aux tableaux du thème T19, "autres problèmes addictifs") les pourcentages obtenus ne sont pas additifs.

Les institutions ne participant pas au monitoring act-*info* ont été invitées à fournir des données de base (âge, sexe et problème principal à l'admission). Parmi ces institutions, 17 ont répondu et les données de 12 d'entre elles se sont révélées compatibles avec la définition du problème principal. Les données de ces 12 institutions ont été analysées séparément et les résultats sont présentés en annexe.

T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2010)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sexe*																			
hommes			70.7			75.6			77.8			85.4			20.9			65.5	4'853
femmes			29.3			24.4			22.2			14.6			79.0			34.5	2'552
sexe pas connu			0.0			0.0			0.0			0.0			0.1			0.0	1
N**	2'772	1'148	3'920	476	154	630	224	64	288	879	150	1'029	209	788	998	4'853	2'552	7'406	7'406
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.3	9.0	10.0	9.1	2.4	1.3	1.5	2.3	1.5	2.0	149
15-19	3.2	2.3	2.9	2.5	9.1	4.1	4.5	14.1	6.6	58.4	50.0	57.1	11.0	4.3	5.7	14.4	7.9	12.2	898
20-24	5.2	3.7	4.8	8.4	21.4	11.6	13.4	37.5	18.8	13.4	14.7	13.6	4.8	4.7	4.7	7.7	7.2	7.5	554
25-29	8.2	5.5	7.4	20.4	16.2	19.4	25.0	25.0	25.0	8.8	9.3	8.8	5.7	6.9	6.6	10.6	7.8	9.6	711
30-34	10.2	7.4	9.4	18.1	11.0	16.4	21.4	7.8	18.4	4.4	4.7	4.5	8.6	9.4	9.3	10.3	8.1	9.6	706
35-39	11.5	9.9	11.0	20.2	12.3	18.3	14.7	3.1	12.2	2.8	1.3	2.6	7.2	9.9	9.4	10.8	9.4	10.3	759
40-44	14.3	16.4	14.9	16.4	18.2	16.9	13.8	3.1	11.5	1.1	5.3	1.7	11.5	13.8	13.3	11.7	14.1	12.5	924
45-49	13.8	16.0	14.4	7.8	7.8	7.8	4.9	4.7	4.9	1.4	2.0	1.5	10.0	19.6	17.6	10.0	14.9	11.7	863
50-54	12.6	16.8	13.8	4.8	2.6	4.3	2.2	1.6	2.1	0.6	1.3	0.7	13.4	12.5	12.7	8.7	12.5	10.0	740
55-59	9.9	9.7	9.9	1.1	0.6	1.0	0.0	1.6	0.3	0.1	1.3	0.3	11.0	9.1	9.5	6.5	7.8	6.9	513
60-64	5.4	5.3	5.3	0.2	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.6	4.5	3.4	4.2	3.7	270
65-69	3.0	4.9	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	1.8	2.3	2.0	3.0	2.3	171
70-74	1.7	1.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.5	1.8	1.2	1.3	1.2	89
75 et plus	0.8	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.5	1.0	0.6	0.4	0.5	39
N**	2'763	1'144	3'907	475	154	629	224	64	288	879	150	1'029	209	784	993	4'843	2'543	7'386	7'386
données manquantes	9	4	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	5	10	9	20	20
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	43.7	45.8	44.3	35.3	32.7	34.6	32.4	26.8	31.2	20.5	22.4	20.8	43.1	43.2	43.2	37.5	41.5	38.8	
écart-type	13.3	12.4	13.1	8.8	10.1	9.2	8.1	8.7	8.5	7.3	9.7	7.7	16.6	13.0	13.9	14.9	14.3	14.8	
1er quartile	33.8	38.2	35.1	28.3	24.1	27.4	26.9	21.2	24.9	16.1	16.4	16.1	31.1	34.0	33.3	25.3	30.4	26.9	
valeur médiane	43.9	46.4	44.8	35.0	31.4	34.5	31.2	24.8	29.6	17.5	18.0	17.5	44.5	44.9	44.9	37.2	43.0	39.4	
3e quartile	53.1	53.8	53.3	41.7	41.5	41.6	38.41	28.8	37.2	22.6	25.0	22.9	55.1	51.7	52.3	48.5	51.5	49.8	
N**	2'763	1'144	3'907	475	154	629	224	64	288	879	150	1'029	209	784	993	4'843	2'543	7'386	
données manquantes	9	4	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	5	10	9	20	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2010)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Etat civil*																			
célibataire	42.1	31.6	39.0	70.4	66.4	69.5	67.3	82.0	70.5	93.1	86.2	92.1	36.5	26.9	28.9	56.1	38.8	50.1	3'496
marié-e	32.3	30.5	31.8	17.1	11.0	15.6	19.4	8.2	16.9	4.7	4.3	4.6	49.0	51.2	50.7	25.5	33.0	28.1	1'961
séparé-e	5.7	6.3	5.9	2.9	6.2	3.7	4.6	4.9	4.7	0.5	2.9	0.8	4.7	4.6	4.6	4.3	5.3	4.6	322
divorcé-e	17.6	27.2	20.4	8.7	12.3	9.6	8.3	4.9	7.6	1.7	5.8	2.3	8.9	13.0	12.2	12.6	18.9	14.8	1'032
veuf/veuve	1.6	4.0	2.3	0.0	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.5	3.5	2.9	1.0	3.4	1.8	126
partenariat enregistré	0.6	0.5	0.6	0.9	2.1	1.2	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.7	0.5	0.6	0.5	38
N**	2'618	1'100	3'718	450	146	596	217	61	278	815	138	953	192	744	937	4'559	2'415	6'975	6'975
données manquantes	154	48	202	26	8	34	7	3	10	64	12	76	17	44	61	294	137	431	431
Nationalité*																			
CH	80.3	84.9	81.7	70.4	83.5	73.7	63.5	86.5	68.4	85.5	91.7	86.4	85.7	89.0	88.3	79.5	86.5	81.9	5'394
EU	13.3	10.6	12.5	20.8	14.2	19.2	19.8	9.6	17.6	6.8	4.5	6.5	10.1	6.5	7.2	13.1	8.9	11.6	767
autre	6.4	4.5	5.9	8.7	2.4	7.1	16.7	3.8	13.9	7.6	3.8	7.1	4.2	4.5	4.4	7.4	4.6	6.4	424
N**	2'505	1'033	3'538	379	127	506	192	52	244	774	133	907	189	712	901	4'305	2'280	6'585	6'585
données manquantes	267	115	382	97	27	124	32	12	44	105	17	122	20	76	97	548	272	821	821

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2010)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	6.3	9.5	7.3	5.1	0.7	4.0	2.3	4.8	2.9	0.7	0.7	0.7	6.5	8.4	8.0	4.6	7.1	5.5	391
périphérie des grands centres	16.3	16.3	16.3	5.5	9.5	6.5	12.5	12.7	12.5	7.4	6.0	7.2	16.6	12.6	13.4	12.9	13.0	12.9	919
villes de moyenne importance	15.3	14.5	15.1	22.7	25.7	23.5	20.8	22.2	21.1	25.6	30.7	26.3	18.1	17.4	17.5	18.9	18.4	18.7	1'331
petites villes	33.1	31.5	32.6	40.6	40.5	40.6	42.1	47.6	43.4	34.1	31.3	33.7	33.2	35.5	35.0	35.1	34.5	34.9	2'483
campagne	28.9	28.2	28.7	26.0	23.6	25.5	22.2	12.7	20.1	32.2	31.3	32.1	25.6	26.2	26.1	28.6	27.1	28.1	1'998
N**	2'653	1'096	3'749	453	148	601	216	63	279	864	150	1'014	199	753	952	4'670	2'452	7'122	7'122
données manquantes	119	52	171	23	6	29	8	1	9	15	0	15	10	35	46	183	100	284	284
Type de ménage (30 derniers jours)*																			
seul-e en ménage	37.9	35.0	37.0	36.7	34.1	36.0	28.0	28.3	28.0	10.1	12.9	10.5	15.4	12.4	12.9	30.2	25.5	28.6	1'646
avec un ou les parents	8.1	3.5	6.7	13.2	18.6	14.5	19.9	32.1	22.6	67.2	47.1	64.1	16.9	7.3	9.1	22.5	11.5	18.7	1'077
avec enfant(s), sans partenaire	1.8	12.2	4.9	2.1	8.5	3.7	1.1	1.9	1.3	0.4	5.7	1.2	6.2	14.5	12.9	1.6	11.4	5.0	288
avec partenaire, sans enfant	24.7	26.1	25.1	13.2	20.9	15.1	16.1	11.3	15.1	5.5	10.0	6.2	21.5	23.4	23.0	18.6	23.1	20.1	1'157
avec partenaire et enfant(s)	18.5	16.4	17.8	11.6	3.9	9.7	16.1	0.0	12.6	3.9	5.7	4.2	32.3	40.4	38.8	15.1	21.0	17.1	984
avec d'autres proches	1.4	1.1	1.3	3.4	0.0	2.5	2.7	1.9	2.5	2.6	0.0	2.1	2.3	0.9	1.2	1.9	1.0	1.6	91
avec des amis (colocation)	2.4	1.5	2.1	3.6	3.9	3.7	5.4	9.4	6.3	2.8	5.0	3.2	0.0	0.5	0.4	2.7	2.0	2.5	142
autre	5.3	4.2	5.0	16.3	10.1	14.7	10.8	15.1	11.7	7.5	13.6	8.5	5.4	0.7	1.6	7.4	4.5	6.4	370
N**	2'097	895	2'992	387	129	516	186	53	239	745	140	885	130	565	695	3'773	1'982	5'755	5'755
données manquantes	675	253	928	89	25	114	38	11	49	134	10	144	79	223	303	1'080	570	1'651	1'651
Situation de domicile (30 dernier jours)*																			
domicile fixe	93.1	93.2	93.1	83.4	87.2	84.3	89.0	90.5	89.3	91.6	96.0	92.3	93.1	95.6	95.1	91.5	93.9	92.4	4'926
sans domicile fixe	4.7	4.7	4.7	13.2	10.1	12.4	5.5	9.5	6.3	5.4	3.2	5.1	6.2	4.4	4.8	5.8	4.8	5.5	291
institution	2.2	2.2	2.2	3.4	2.8	3.3	5.5	0.0	4.4	3.0	0.8	2.7	0.8	0.0	0.1	2.6	1.4	2.2	117
N**	1'996	834	2'830	319	109	428	163	42	205	667	125	792	130	543	673	3'488	1'846	5'334	5'334
données manquantes	776	314	1090	157	45	202	61	22	83	212	25	237	79	245	325	1365	706	2072	2'072

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2010)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	32.0	31.3	31.8	42.7	37.2	41.3	34.3	41.7	35.8	67.4	51.0	64.6	23.8	15.7	17.2	39.2	29.7	35.8	1'565
relations temporaires	4.1	5.5	4.5	6.7	9.6	7.5	10.5	22.2	12.8	8.1	8.3	8.1	1.9	1.3	1.4	5.5	4.8	5.3	230
parten. fixe, vivant séparé	12.7	15.1	13.4	16.5	25.5	18.8	18.9	22.2	19.6	12.1	22.9	13.9	11.4	11.7	11.6	13.3	14.6	13.8	603
parten. fixe, mén. commun	51.3	48.1	50.3	34.1	27.7	32.4	36.4	13.9	31.8	12.5	17.7	13.3	62.9	71.3	69.8	41.9	50.9	45.2	1'976
N**	1'649	715	2'364	267	94	361	143	36	179	481	96	577	105	471	576	2'801	1'573	4'374	4'374
données manquantes	1'123	433	1'556	209	60	269	81	28	109	398	54	452	104	317	422	2'052	979	3'032	3'032
Nombre d'enfants propres*																			
aucun	41.3	35.4	39.5	61.3	50.9	58.7	64.4	66.0	64.8	90.2	81.0	88.8	37.8	22.9	25.6	54.3	38.0	48.4	2'654
1 enfant	18.7	23.3	20.1	24.0	26.7	24.7	17.8	22.0	18.8	5.4	8.3	5.9	14.8	19.0	18.2	16.4	20.7	18.0	985
2 enfants	26.9	28.7	27.5	9.5	18.1	11.7	11.0	6.0	9.9	2.5	6.6	3.1	32.6	36.8	36.1	19.6	27.4	22.5	1'232
3 enfants ou plus	13.1	12.6	13.0	5.2	4.3	5.0	6.7	6.0	6.6	1.9	4.1	2.2	14.8	21.3	20.1	9.7	13.9	11.2	616
N**	2'001	902	2'903	346	116	462	163	50	213	646	121	767	135	611	746	3'493	1'994	5'487	5'487
données manquantes	771	246	1'017	130	38	168	61	14	75	233	29	262	74	177	252	1'360	558	1'919	1'919
Nombre d'enfants dans le ménage*																			
aucun	71.8	61.9	68.8	77.6	72.0	76.3	73.3	86.1	76.0	60.4	65.1	61.1	51.3	35.5	38.2	69.1	54.9	63.9	3'005
1 enfant	10.5	18.8	13.1	13.6	15.1	14.0	13.0	13.9	13.2	10.5	11.3	10.6	17.9	22.9	22.0	11.3	18.9	14.1	662
2 enfants	12.4	15.2	13.2	6.6	9.7	7.4	11.5	0.0	9.0	19.2	17.0	18.9	23.9	29.6	28.6	13.5	19.1	15.5	731
3 enfants ou plus	5.3	4.0	4.9	2.1	3.2	2.4	2.3	0.0	1.8	9.9	6.6	9.4	6.8	12.0	11.1	6.1	7.1	6.4	303
N**	1'683	749	2'432	286	93	379	131	36	167	593	106	699	117	550	667	2'992	1'709	4'701	4'701
données manquantes	1'089	399	1'488	190	61	251	93	28	121	286	44	330	92	238	331	1'861	843	2'705	2'705

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2010)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Plus haute formation achevée*																			
aucune form. achevée	5.0	5.1	5.0	14.4	15.6	14.7	7.6	2.5	6.6	21.8	24.0	22.1	7.6	4.8	5.4	9.5	7.8	9.0	482
scolarité obligatoire	12.2	14.6	12.9	26.3	40.6	29.8	19.8	47.5	25.0	48.7	47.0	48.5	16.0	13.8	14.2	21.4	20.1	21.0	1'129
scolarité complémentaire	3.3	6.1	4.1	2.3	3.9	2.7	1.7	0.0	1.4	3.2	4.0	3.3	0.8	4.6	3.8	3.0	5.3	3.7	201
apprentissage/école prof.	59.6	52.9	57.7	50.1	33.6	46.1	57.6	42.5	54.7	22.4	20.0	22.1	42.9	53.6	51.4	50.6	47.7	49.7	2'673
maturité/diplôme	3.7	4.4	3.9	2.5	3.9	2.9	3.5	5.0	3.8	2.4	3.0	2.5	5.0	5.7	5.6	3.4	4.9	3.9	209
école normale, pédagog.	0.9	2.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.8	3.9	3.3	0.6	2.6	1.2	66
form. profession. supérieure	6.7	7.5	6.9	1.8	1.6	1.7	5.2	2.5	4.7	1.1	0.0	1.0	17.6	5.7	8.2	5.4	5.7	5.5	297
école profession. supérieure	1.9	1.1	1.7	1.0	0.8	1.0	3.5	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	1.2	1.4	1.0	1.3	69
haute école spécialisée	1.9	1.2	1.7	0.3	0.0	0.2	0.6	0.0	0.5	0.2	2.0	0.4	1.7	1.1	1.2	1.3	1.0	1.2	65
université, haute école	4.8	4.2	4.6	1.3	0.0	1.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	6.7	5.5	5.7	3.4	3.9	3.5	191
N**	2'090	848	2'938	395	128	523	172	40	212	620	100	720	119	457	576	3'624	1'758	5'382	5'382
données manquantes	682	300	982	81	26	107	52	24	76	259	50	309	90	331	422	1'229	794	2'024	2'024
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	29.8	44.9	34.2	52.1	60.0	54.1	26.4	50.0	29.0	25.5	37.0	26.7	38.1	28.0	29.8	31.3	40.2	34.1	872
apprenti-e, stagiaire	2.7	0.2	2.0	2.3	4.0	2.8	1.8	0.0	1.6	29.3	22.2	28.6	4.8	1.6	2.1	6.5	2.5	5.2	134
manœuvre, aide	3.3	4.2	3.6	4.7	6.7	5.2	6.4	0.0	5.6	3.8	0.0	3.4	0.0	5.2	4.3	3.8	4.3	4.0	102
ouvrier/ère formé-e sur le tas	4.9	6.3	5.3	9.8	5.3	8.6	6.4	0.0	5.6	0.8	0.0	0.8	4.8	4.7	4.7	5.2	5.2	5.2	133
ouvrier/ère formé-e (CFC)	16.1	7.0	13.4	14.0	5.3	11.7	20.9	0.0	18.5	7.9	7.4	7.9	0.0	9.8	8.1	14.8	7.9	12.6	323
contremaître-sse	3.0	0.2	2.2	2.3	0.0	1.7	3.6	0.0	3.2	0.4	0.0	0.4	4.8	0.5	1.3	2.6	0.4	1.9	49
employé-e non qualifié-e	14.3	21.4	16.4	4.7	13.3	6.9	13.6	35.7	16.1	3.3	3.7	3.4	4.8	27.5	23.4	11.2	20.7	14.2	363
empl. qualifié-e, cadre moyen	9.5	6.3	8.6	3.3	1.3	2.8	10.0	0.0	8.9	2.1	0.0	1.9	19.0	10.9	12.3	7.7	6.5	7.3	187
employé-e, cadre supérieur	3.0	1.4	2.6	0.9	1.3	1.0	2.7	0.0	2.4	0.4	0.0	0.4	7.1	4.1	4.7	2.4	2.0	2.3	58
indépendant-e	10.5	5.8	9.1	3.7	1.3	3.1	4.5	0.0	4.0	2.1	0.0	1.9	14.3	5.2	6.8	8.0	4.8	7.0	178
écolier/ère, étudiant-e	1.7	1.4	1.6	1.9	0.0	1.4	1.8	14.3	3.2	23.8	29.6	24.4	2.4	1.6	1.7	5.4	4.4	5.1	131
autre statut	1.1	0.9	1.1	0.5	1.3	0.7	1.8	0.0	1.6	0.4	0.0	0.4	0.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	25
N**	1'050	430	1'480	215	75	290	110	14	124	239	27	266	42	193	235	1'745	810	2'555	2'555
données manquantes	1'722	718	2'440	261	79	340	114	50	164	640	123	763	167	595	763	3'108	1'742	4'851	4'851

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2010)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Source de revenu principale (au cours des 30 derniers jours)*																			
salaire	55.5	38.5	50.4	32.5	19.5	29.3	59.5	28.3	52.9	25.4	25.9	25.5	66.7	60.8	62.0	47.6	42.3	45.8	3'021
économies, épargne	1.4	1.8	1.5	1.3	0.0	1.0	1.4	3.3	1.8	1.0	0.0	0.8	0.6	0.5	0.5	1.3	1.1	1.2	79
rente (AVS, AI ou autre)	14.0	20.8	16.0	15.8	20.8	17.1	4.5	11.7	6.1	2.1	4.9	2.5	10.5	9.1	9.4	11.1	15.7	12.7	837
aide sociale	14.1	13.2	13.8	34.5	38.9	35.6	15.9	31.7	19.3	9.4	11.2	9.6	4.9	2.5	3.0	14.7	11.7	13.7	903
assurance-chômage	9.2	6.7	8.5	8.7	6.7	8.2	9.1	8.3	8.9	2.7	2.8	2.7	4.3	1.7	2.3	7.6	4.7	6.6	436
soutien du/de la partenaire	1.5	14.0	5.2	1.6	4.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.7	3.5	1.1	1.2	20.6	16.7	1.3	13.9	5.5	366
soutien parents/proches/amis	3.3	2.8	3.2	3.3	6.0	4.0	6.4	15.0	8.2	57.7	49.7	56.5	11.1	4.1	5.5	15.1	9.0	13.0	859
deal, combines	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	0.9	0.0	0.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	9
autres revenus illégaux	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	7
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autre	1.0	2.2	1.3	0.9	3.4	1.5	2.3	1.7	2.1	0.7	1.4	0.8	0.6	0.5	0.5	1.0	1.6	1.2	81
N**	2'434	1'019	3'453	449	149	598	220	60	280	823	143	966	162	636	798	4'357	2'241	6'598	6'598
<i>données manquantes</i>	338	129	467	27	5	32	4	4	8	56	7	63	47	152	200	496	311	808	808
Taux d'activité principal (au cours des 30 derniers jours)*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	50.6	26.6	43.5	28.2	13.0	24.4	53.0	21.3	46.0	19.0	13.5	18.2	62.6	37.3	42.6	42.4	27.0	37.3	2'371
activité à temps partiel	4.6	17.6	8.4	3.6	8.2	4.7	6.5	6.6	6.5	1.5	7.1	2.3	2.0	29.4	23.7	3.8	18.6	8.8	557
plusieurs activités occas.	0.9	1.2	1.0	2.3	0.7	1.9	0.9	0.0	0.7	1.0	0.0	0.8	0.0	1.8	1.4	1.1	1.1	1.1	69
en formation	3.6	1.9	3.1	2.7	4.1	3.1	3.7	9.8	5.0	57.0	50.4	56.0	10.2	4.6	5.8	14.9	8.9	12.9	821
sans activité prof.	17.3	31.6	21.5	26.4	36.3	28.8	12.9	14.8	13.3	4.7	11.3	5.7	10.9	21.8	19.5	15.1	26.9	19.0	1'211
sans trav., en quête d'emploi	15.3	14.4	15.0	21.6	19.2	21.0	16.6	26.2	18.7	10.6	6.4	9.9	9.5	3.4	4.6	14.7	10.8	13.4	852
sans trav., futur empl. garanti	0.4	0.6	0.5	0.5	1.4	0.7	0.9	0.0	0.7	0.6	2.1	0.8	0.7	0.0	0.1	0.5	0.6	0.5	32
autre	7.3	6.1	7.0	14.9	17.1	15.4	5.5	21.3	9.0	5.7	9.2	6.2	4.1	1.8	2.2	7.5	6.1	7.0	445
N**	2'347	982	3'329	444	146	590	217	61	278	814	141	955	147	565	712	4'231	2'127	6'358	6'358
<i>données manquantes</i>	425	166	591	32	8	40	7	3	10	65	9	74	62	223	286	622	425	1'048	1'048

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2010)

	Patient-e-s: problème principale									Proches			Toutes prises en charge						
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Revenu mensuel net (6 derniers mois)*																			
aucun revenu	24.8	36.4	27.9	27.3	30.0	27.9	12.1	37.5	14.9	48.9	56.3	50.0	44.4	20.2	24.5	29.3	33.9	30.6	484
moins de 1000 fr.	4.3	5.0	4.5	9.7	14.0	10.7	12.1	0.0	10.8	24.7	25.0	24.8	5.6	7.1	6.9	9.0	8.1	8.7	138
de 1001 à 2000 fr.	6.7	10.9	7.8	21.8	32.0	24.2	9.1	12.5	9.5	5.3	6.3	5.4	0.0	11.9	9.8	8.3	12.6	9.5	151
de 2001 à 3000 fr.	9.6	17.6	11.8	14.5	20.0	15.8	12.1	25.0	13.5	4.7	6.3	5.0	5.6	16.7	14.7	9.8	17.1	11.9	188
de 3001 à 4000 fr.	12.4	10.9	12.0	10.3	4.0	8.8	22.7	12.5	21.6	8.4	0.0	7.2	5.6	13.1	11.8	12.0	10.1	11.5	182
de 4001 à 5000 fr.	17.5	6.7	14.6	8.5	0.0	6.5	16.7	12.5	16.2	5.3	0.0	4.5	22.2	6.0	8.8	14.0	4.9	11.4	181
de 5001 à 6000 fr.	11.3	7.9	10.4	4.8	0.0	3.7	10.6	0.0	9.5	1.6	6.3	2.3	5.6	14.3	12.7	8.4	8.1	8.3	132
de 6001 à 8000 fr.	9.3	3.8	7.8	1.2	0.0	0.9	3.0	0.0	2.7	1.1	0.0	0.9	11.1	9.5	9.8	6.2	4.0	5.6	89
de 8001 à 10 000 fr.	2.0	0.4	1.6	1.2	0.0	0.9	1.5	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	1.6	0.7	1.3	21
de 10 001 à 15 000 fr.	1.4	0.4	1.1	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.7	11
plus de 15 000 fr.	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.4	6
N**	646	239	885	165	50	215	66	8	74	190	32	222	18	84	102	1'138	445	1'583	1'583
données manquantes	2'126	909	3'035	311	104	415	158	56	214	689	118	807	191	704	896	3'715	2'107	5'823	5'823
Dettes*																			
aucune dette	64.0	81.8	69.1	34.9	50.0	38.7	49.6	51.4	50.0	85.2	84.3	85.1	79.2	90.4	88.3	65.5	79.6	69.7	2'082
jusqu'à 5000 fr.	5.3	2.7	4.6	11.1	8.8	10.5	7.0	14.3	8.5	4.9	5.6	5.0	0.0	1.4	1.2	6.0	3.8	5.4	160
de 5001 à 10 000 fr.	6.2	4.0	5.6	10.2	15.0	11.4	13.2	8.6	12.2	2.8	4.5	3.1	6.3	3.8	4.3	6.2	5.3	5.9	177
de 10 001 à 25 000 fr.	8.6	5.5	7.7	20.0	11.3	17.8	15.5	11.4	14.6	3.2	3.4	3.2	6.3	1.9	2.7	8.8	5.1	7.7	230
de 25 001 à 50 000 fr.	6.4	3.0	5.4	11.5	10.0	11.1	8.5	11.4	9.1	2.7	1.1	2.4	4.2	1.0	1.6	6.0	3.5	5.3	157
de 50 001 à 100 000 fr.	4.3	1.2	3.4	6.8	5.0	6.3	4.7	2.9	4.3	0.9	1.1	1.0	4.2	0.5	1.2	3.9	1.6	3.2	95
plus de 100 000 fr.	5.2	1.7	4.2	5.5	0.0	4.1	1.6	0.0	1.2	0.2	0.0	0.2	0.0	1.0	0.8	3.5	1.2	2.8	85
N**	1'020	402	1'422	235	80	315	129	35	164	527	89	616	48	209	257	2'091	895	2'986	2'986
données manquantes	1'752	746	2'498	241	74	315	95	29	124	352	61	413	161	579	741	2'762	1'657	4'420	4'420

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2010)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			N	
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total					
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Emprisonnement ou détention préventive*																	
aucun-e	86.3	97.2	89.5	48.2	72.7	54.3	53.9	100.0	59.3	87.8	90.5	88.1	80.0	94.4	83.8	1'538	
emprisonnement	6.4	1.4	5.0	23.2	16.4	21.5	19.7	0.0	17.4	5.3	9.5	5.7	9.0	3.3	7.5	138	
détention préventive	4.8	0.8	3.7	12.2	9.1	11.4	15.8	0.0	14.0	3.2	0.0	2.9	6.0	1.7	4.9	90	
emprisonnement et détention préventive	2.4	0.6	1.9	16.5	1.8	12.8	10.5	0.0	9.3	3.7	0.0	3.3	4.9	0.6	3.8	70	
N**	869	355	1'224	164	55	219	76	10	86	189	21	210	1'358	478	1'836	1'836	
données manquantes	1'903	793	2'696	312	99	411	148	54	202	690	129	819	3'286	1'286	4'572	4'572	
Durée totale de détention***																	
jusqu'à 1 mois	25.9	25.0	25.8	29.0	33.3	29.6	16.0	.	16.0	50.0	50.0	50.0	28.1	31.8	28.4	62	
> 1 à 2 mois	18.5	25.0	19.1	8.7	16.7	9.9	4.0	.	4.0	6.3	50.0	11.1	11.7	22.7	12.8	28	
> 2 à 6 mois	33.3	12.5	31.5	26.1	25.0	25.9	28.0	.	28.0	25.0	0.0	22.2	29.1	18.2	28.0	60	
> 6 à 12 mois	7.4	12.5	7.9	10.1	16.7	11.1	16.0	.	16.0	6.3	0.0	5.6	9.2	13.6	9.6	21	
plus de 1 an	14.8	25.0	15.7	26.1	8.3	23.5	36.0	.	36.0	12.5	0.0	11.1	21.9	13.6	21.1	46	
N**	80	8	88	69	12	81	25	0	25	16	2	18	195	22	217	217	
données manquantes	39	2	41	16	3	19	10	0	10	7	0	7	76	5	81	81	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de détention. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T9 Instance d'envoi principale et secondaire, selon le problème principal et chez les proches (2010)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Instance d'envoi principale*																			
initiative personnelle	31.5	39.2	33.8	45.0	44.3	44.8	36.2	34.9	35.9	18.3	28.7	19.8	62.4	73.6	71.3	32.5	49.8	38.5	2'685
conjoint-e/partenaire	4.7	2.8	4.1	3.4	3.4	3.4	2.7	1.6	2.5	1.8	1.4	1.7	4.3	2.1	2.5	4.0	2.5	3.5	245
famille	3.7	4.3	3.9	2.4	5.4	3.1	8.1	14.3	9.5	10.0	7.7	9.7	9.1	4.0	5.1	5.6	5.2	5.5	381
ami-e-s, collègues, conaiss.	1.5	3.0	1.9	1.7	5.4	2.6	5.4	7.9	6.0	0.8	1.4	0.9	1.1	5.1	4.3	1.5	3.8	2.3	163
instit. ambulatoire spécialisée	1.5	3.3	2.1	4.1	4.7	4.2	0.9	4.8	1.8	0.8	2.1	1.0	4.3	1.7	2.2	1.7	2.6	2.0	142
instit. résidentielle spécialisée	5.7	5.6	5.6	6.2	2.7	5.4	4.1	4.8	4.2	0.7	2.1	0.9	1.1	0.3	0.4	4.3	3.1	3.9	271
cabinet médical	8.5	11.2	9.3	9.4	10.1	9.6	3.6	6.3	4.2	2.1	2.8	2.2	1.6	4.4	3.9	6.6	8.0	7.1	494
hôpital, clinique	13.3	15.2	13.9	3.9	8.1	4.9	6.3	6.3	6.3	1.9	4.2	2.2	0.0	1.4	1.1	8.8	9.0	8.9	618
service sociaux	5.9	5.5	5.8	6.4	6.7	6.5	3.2	6.3	3.9	4.0	3.5	3.9	6.5	4.0	4.5	5.4	5.0	5.3	368
mes. pénale/administrative	16.0	4.3	12.5	13.3	6.0	11.5	22.2	3.2	18.0	50.4	32.9	47.9	2.7	0.7	1.1	21.3	4.9	15.7	1'096
employeur/se	4.3	2.0	3.7	1.5	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	2.1	3.2	0.6	1.1	3.2	1.4	2.6	181
enseignant-e	0.0	0.2	0.1	0.4	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	2.1	4.9	2.5	0.5	0.6	0.6	0.7	1.2	0.9	62
autre	3.4	3.6	3.5	2.4	2.0	2.3	7.2	9.5	7.7	4.9	6.3	5.1	3.2	1.7	2.0	4.1	3.4	3.9	272
N**	2'575	1'081	3'656	467	149	616	221	63	284	851	143	994	186	723	909	4'582	2'396	6'978	6'978
données manquantes	197	67	264	9	5	14	3	1	4	28	7	35	23	65	89	271	156	428	428
Instance d'envoi secondaire***																			
initiative personnelle	25.4	23.3	24.9	21.3	18.3	20.6	26.8	26.1	26.7	13.4	24.4	14.9	6.5	10.9	10.0	22.3	19.6	21.5	658
conjoint-e/partenaire	10.6	5.6	9.2	7.4	5.6	7.0	6.3	0.0	5.2	4.7	4.4	4.7	11.3	3.4	4.9	8.9	4.8	7.6	234
famille	3.9	8.0	5.0	6.6	11.3	7.6	8.9	8.7	8.9	8.3	8.9	8.4	11.3	4.1	5.5	5.5	7.1	6.0	183
ami-e-s, collègues, conaiss.	1.9	1.8	1.8	2.9	4.2	3.2	2.7	13.0	4.4	0.4	6.7	1.2	3.2	4.9	4.6	1.8	3.3	2.3	70
instit. ambulatoire spécialisée	1.5	1.6	1.5	2.9	4.2	3.2	1.8	0.0	1.5	0.4	0.0	0.3	1.6	1.1	1.2	1.4	1.6	1.5	46
instit. résidentielle spécialisée	1.9	3.0	2.2	2.5	7.0	3.5	0.0	4.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.3	1.7	52
cabinet médical	4.1	5.2	4.4	9.8	9.9	9.8	8.0	4.3	7.4	1.8	4.4	2.2	6.5	1.5	2.4	4.7	4.5	4.6	142
hôpital, clinique	3.6	6.4	4.4	3.3	1.4	2.9	3.6	4.3	3.7	1.1	0.0	0.9	3.2	0.4	0.9	3.2	3.8	3.4	104
service sociaux	2.3	2.0	2.2	2.9	2.8	2.9	3.6	0.0	3.0	2.2	0.0	1.9	1.6	1.1	1.2	2.5	1.8	2.3	70
mes. pénale/administrative	3.6	1.8	3.1	3.3	1.4	2.9	6.3	4.3	5.9	1.4	0.0	1.2	1.6	0.4	0.6	3.2	1.2	2.6	79
employeur/se	2.8	1.2	2.4	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.4	0.3	1.8	0.8	1.5	46
enseignant-e	0.2	0.2	0.2	0.4	0.0	0.3	0.0	4.3	0.7	0.7	0.0	0.6	1.6	1.1	1.2	0.3	0.7	0.5	14
autre	2.4	2.6	2.5	4.1	4.2	4.1	2.7	0.0	2.2	5.4	4.4	5.3	4.8	1.5	2.1	3.3	2.7	3.1	94
aucune	43.7	44.3	43.8	41.4	36.6	40.3	45.5	34.8	43.7	63.5	48.9	61.5	51.6	70.8	67.2	47.0	50.9	48.3	1'478
N**	1'289	497	1'786	244	71	315	112	23	135	277	45	322	62	267	329	2'090	973	3'063	3'063
données manquantes	1'483	651	2'134	232	83	315	112	41	153	602	105	707	147	521	669	2'763	1'579	4'343	4'343

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T10 Type d'aide attendue à l'admission et statut légal de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2010)

Type d'aide attendue*	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
problèmes addictifs	83.4	88.8	84.9	92.3	82.1	89.9	85.4	85.0	85.3	69.9	67.4	69.6	58.0	57.3	57.5	81.0	77.6	79.9	2'635
problèmes somatiques	2.3	3.9	2.7	3.9	5.1	4.2	0.8	5.0	1.4	1.4	0.0	1.2	0.0	1.0	0.8	2.1	3.0	2.4	78
problèmes psychiques	12.3	25.1	16.1	12.0	21.8	14.2	14.6	25.0	16.1	6.1	17.4	7.6	10.1	16.1	14.9	11.5	21.4	14.7	485
problèmes relationnels	11.3	20.0	13.8	7.7	15.4	9.5	15.4	10.0	14.7	6.4	10.9	7.0	24.6	39.2	36.3	10.8	23.1	14.8	487
problèmes familiaux	7.2	11.2	8.4	7.7	12.8	8.9	8.1	15.0	9.1	11.5	15.2	12.0	47.8	47.9	47.9	9.2	21.3	13.1	433
problèmes financiers	5.8	6.4	6.0	14.7	25.6	17.2	11.4	5.0	10.5	6.4	4.3	6.1	8.7	6.3	6.8	7.8	8.1	7.9	259
problèmes professionnels, de formatio	12.5	14.6	13.1	15.1	16.7	15.4	7.3	10.0	7.7	11.1	13.0	11.4	2.9	7.0	6.2	11.8	11.7	11.8	389
problèmes de logement	3.4	4.1	3.6	7.7	14.1	9.2	5.7	10.0	6.3	3.4	4.3	3.5	8.7	3.8	4.8	4.2	4.9	4.4	145
problèmes de violence	1.2	1.6	1.3	0.4	2.6	0.9	1.6	0.0	1.4	0.7	4.3	1.2	2.9	3.5	3.4	1.2	2.2	1.5	50
problèmes juridiques	9.7	3.7	8.0	10.8	9.0	10.4	10.6	15.0	11.2	12.8	6.5	12.0	8.7	2.8	3.9	10.0	3.9	8.0	265
autre(s)	2.0	1.1	1.8	1.9	1.3	1.8	1.6	0.0	1.4	1.0	0.0	0.9	0.0	1.4	1.1	2.4	1.7	2.2	71
aucune attente	9.3	6.4	8.4	1.9	6.4	3.0	8.9	5.0	8.4	21.3	19.6	21.1	1.4	0.7	0.8	9.8	5.5	8.4	278
N**	1'370	561	1'931	259	78	337	123	20	143	296	46	342	69	286	355	2'231	1'068	3'299	3'299
données manquantes	1'402	587	1'989	217	76	293	101	44	145	583	104	687	140	502	643	2'622	1'484	4'107	4'107
Statut légal du traitement/de la prise en charge*																			
suspension de la procédure, renoncement à infliger une peine, réprimande (art 19a ch. 2 Lstup)	0.6	0.0	0.4	1.4	0.0	1.0	1.9	0.0	1.6	6.0	5.0	5.8	0.0	0.0	0.0	1.4	0.2	1.0	30
abandon poursuite pénale si soumis à des mesures de protection contrôlées par un médecin (art 19a ch. 3 Lstup)	0.2	0.0	0.1	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	3
mesures concernant les délinquants anormaux (art 43 CPS)	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
traitement des alcooliques et des toxicomanes (art 44 CPS)	2.3	0.6	1.8	1.4	1.5	1.4	3.8	0.0	3.3	1.6	0.0	1.4	1.8	0.0	0.4	2.0	0.4	1.5	44
irresponsabilité (art 10 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
responsabilité restreinte (art 11 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
exécution de mesures pr toxicomanes dans une maison d'éducation au travail (art 2a ord. 3 rel. au CPS RS 311.03)	0.4	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	6.7	2.5	6.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.1	0.8	24
autre	13.0	5.7	10.9	6.3	1.5	5.2	19.2	0.0	16.3	21.8	15.0	20.9	0.0	0.0	0.0	13.2	4.3	10.4	298
aucune mesure (traitement volontaire)	83.5	93.5	86.4	90.0	97.0	91.7	74.0	100.0	78.0	63.9	77.5	65.8	98.2	100.0	99.6	81.9	94.8	86.0	2'457
N**	1'214	489	1'703	221	67	288	104	19	123	252	40	292	57	228	285	1'955	903	2'858	2'858
données manquantes	1'558	659	2'217	255	87	342	120	45	165	627	110	737	152	560	713	2'898	1'649	4'548	4'548

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T11 Traitements/prises en charge avant l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2010)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge				N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Prises en charge antérieures*																				
non	46.5	38.5	44.1	16.1	19.8	17.0	51.8	55.7	52.8	78.6	71.2	77.5	69.9	67.3	67.8	51.7	50.4	51.3	3'147	
oui	53.5	61.5	55.9	83.9	80.2	83.0	48.2	44.3	47.2	21.4	28.8	22.5	30.1	32.7	32.2	48.3	49.6	48.7	2'992	
N**	2'275	957	3'232	403	131	534	193	61	254	758	139	897	156	620	776	4'032	2'107	6'139	6'139	
<i>données manquantes</i>	497	191	688	73	23	96	31	3	34	121	11	132	53	168	222	821	445	1'267	1'267	
Type de prise en charge***																				
traitement avec prescript. d'héroïne	0.9	1.7	1.2	4.8	7.4	5.5	1.8	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.8	1.6	36	
substitution (méthadone, subutex)	3.7	4.6	4.0	69.1	79.0	71.7	17.5	0.0	14.9	3.1	4.3	3.3	6.3	0.9	2.0	14.7	11.7	13.7	309	
autre tt médicam. des dépendances	10.6	9.1	10.2	7.4	17.3	10.0	7.0	10.0	7.5	3.1	8.7	4.1	0.0	0.9	0.7	9.1	8.6	8.9	201	
prise en charge ambulatoire	68.4	70.1	68.9	62.6	64.2	63.0	66.7	60.0	65.7	84.7	78.3	83.5	78.1	84.5	83.1	68.9	72.4	70.1	1'583	
traitement résidentiel	51.7	57.6	53.6	39.6	50.6	42.4	40.4	70.0	44.8	18.4	30.4	20.7	31.3	10.3	14.9	45.6	47.2	46.2	1'043	
sevrage	45.0	50.5	46.8	54.8	54.3	54.7	40.4	60.0	43.3	10.2	17.4	11.6	12.5	4.3	6.1	41.8	40.2	41.3	932	
groupe d'entraide ou d'auto-support	5.9	9.4	7.0	4.8	4.9	4.8	1.8	0.0	1.5	1.0	4.3	1.7	3.1	4.3	4.1	5.2	7.7	6.1	137	
autre(s)	2.5	2.1	2.4	2.2	6.2	3.2	5.3	0.0	4.5	3.1	4.3	3.3	0.0	4.3	3.4	2.6	3.3	2.9	65	
N**	996	481	1'477	230	81	311	57	10	67	98	23	121	32	116	148	1'480	779	2'259	2'259	
<i>données manquantes</i>	220	106	326	89	22	111	21	11	32	47	6	53	15	85	100	411	241	652	652	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de prise en charge antérieure. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T12 Substitution et autre traitement/prise en charge à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2010)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution ou prescription d'héroïne*																
non	98.6	97.8	98.4	56.9	50.5	55.3	93.1	95.3	93.6	99.5	99.2	99.5	94.2	93.8	94.1	4'180
oui	1.4	2.2	1.6	43.1	49.5	44.7	6.9	4.7	6.4	0.5	0.8	0.5	5.8	6.2	5.9	263
N**	1'866	789	2'655	318	105	423	159	43	202	664	124	788	3'209	1'234	4'443	4'443
<i>données manquantes</i>	906	359	1'265	158	49	207	65	21	86	215	26	241	1'435	530	1'965	1'965
Type de substitution***																
héroïne	8.0	0.0	4.8	3.0	7.7	4.3	9.1	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	3.8	5.3	4.2	11
méthadone	72.0	82.4	76.2	91.1	86.5	89.8	54.5	100.0	61.5	100.0	100.0	100.0	86.3	85.5	86.1	223
autres opiacés	16.0	11.8	14.3	5.9	5.8	5.9	18.2	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	8.2	6.6	7.7	20
autres substances	4.0	5.9	4.8	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	1.6	2.6	1.9	5
N**	25	17	42	135	52	187	11	2	13	3	1	4	183	76	259	259
<i>données manquantes</i>	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
Autre prise en charge parallèle*																
non	90.3	84.0	88.5	80.2	76.5	79.3	82.9	68.4	80.8	94.8	95.1	94.8	89.3	83.9	87.9	2'351
oui	9.7	16.0	11.5	19.8	23.5	20.7	17.1	31.6	19.2	5.2	4.9	5.2	10.7	16.1	12.1	325
N**	1'267	514	1'781	222	68	290	111	19	130	268	41	309	1'975	701	2'676	2'676
<i>données manquantes</i>	1'505	634	2'139	254	86	340	113	45	158	611	109	720	2'669	1'063	3'732	3'732
Type de la prise en charge parallèle****																
prise en charge ambulatoire	61.3	69.6	64.6	77.3	68.8	75.0	41.2	40.0	40.9	71.4	50.0	68.8	64.4	67.9	65.6	206
traitement résidentiel	5.9	5.1	5.6	15.9	18.8	16.7	23.5	40.0	27.3	0.0	0.0	0.0	9.3	9.2	9.2	29
groupe d'entraide ou d'auto-support	5.0	6.3	5.6	2.3	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	4.6	3.8	12
autre(s)	28.6	22.8	26.3	11.4	12.5	11.7	35.3	20.0	31.8	28.6	50.0	31.3	24.9	21.1	23.6	74
N**	119	79	198	44	16	60	17	5	22	14	2	16	205	109	314	314
<i>données manquantes</i>	4	3	7	0	0	0	2	1	3	0	0	0	7	4	11	11

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de substitution. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pris-e-s en charge parallèlement. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T13a Admission suite à une cure de sevrage, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2010)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Admission suite à une cure de sevrage*																
non	79.3	72.5	77.3	87.1	83.6	86.3	90.5	90.0	90.4	97.3	97.5	97.3	84.2	77.3	82.4	2'100
sevrage dans la même institution	1.2	1.6	1.3	0.4	1.5	0.7	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.9	1.3	1.0	25
sevrage dans une autre institution	19.5	25.9	21.4	12.5	14.9	13.1	8.6	10.0	8.8	2.7	2.5	2.7	15.0	21.4	16.7	425
N**	1'191	495	1'686	224	67	291	105	20	125	257	40	297	1'871	679	2'550	2'550
données manquantes	1'581	653	2'234	252	87	339	119	44	163	622	110	732	2'773	1'085	3'858	3'858

T13b Fréquence des sevrages sans aide professionnelle avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2010)

Fréq. sevrages sans accompagnement*	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
jamais	63.6	52.0	60.3	19.4	18.4	19.1	57.1	62.5	57.7	72.3	80.0	72.9	59.1	49.4	56.6	785
une fois	8.0	6.7	7.6	10.5	12.2	11.0	7.1	25.0	9.0	12.9	6.7	12.4	9.0	8.7	8.9	124
deux ou trois fois	9.3	14.7	10.8	16.9	20.4	17.9	11.4	0.0	10.3	5.2	0.0	4.7	9.8	14.0	10.9	151
plus de trois fois	19.2	26.6	21.3	53.2	49.0	52.0	24.3	12.5	23.1	9.7	13.3	10.0	22.1	27.8	23.6	327
N**	637	252	889	124	49	173	70	8	78	155	15	170	1'031	356	1'387	1'387
données manquantes	2'135	896	3'031	352	105	457	154	56	210	724	135	859	3'613	1'408	5'021	5'021

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T14 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2010)

Tous patients et patientes									
Problème principal*	Hommes	Femmes	Total	N		Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%			%	%	%	
alcool	59.7	65.1	61.2	3'920	alcool	59.7	65.1	61.2	3'920
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.3	0.3	0.3	19	cocktails	0.3	0.3	0.3	19
héroïne	8.5	6.6	8.0	512	opiacés	10.0	8.4	9.5	611
méthadone	1.1	1.1	1.1	70					
autres opiacés	0.4	0.6	0.5	29					
cocaïne	4.7	3.6	4.4	283	cocaïne et dérivés	4.8	3.6	4.5	288
crack, freebase	0.1	0.0	0.1	5					
amphétamines	0.4	0.5	0.4	26	stimulants	0.5	1.1	0.7	43
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.1	0.5	0.2	15					
autres stimulants	0.0	0.1	0.0	2					
barbituriques	0.0	0.1	0.0	2	médicaments	0.5	1.9	0.9	58
benzodiazépines	0.5	1.4	0.7	47					
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.4	0.1	9					
LSD	0.0	0.1	0.0	3	hallucinogènes	0.1	0.1	0.1	6
autres hallucinogènes	0.1	0.0	0.0	3					
cannabis	18.9	8.5	16.1	1'029	cannabis	18.9	8.5	16.1	1'029
tabac	1.4	3.5	2.0	125	tabac	1.4	3.5	2.0	125
substances volatiles	0.0	0.1	0.0	2	autres substances	0.5	0.9	0.6	40
autre substance	0.5	0.8	0.6	38					
jeu pathologique	1.9	1.6	1.8	118	troubles assimilables à une addiction	3.3	6.6	4.2	268
troubles alimentaires	0.1	3.3	1.0	64					
autres troubles assimilables à une addiction	1.2	1.7	1.3	86					
N**	4'644	1'763	6'407	6'407		4'644	1'763	6'407	6'407
<i>données manquantes</i>	0	1	1	1		0	1	1	1

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2010), hommes

Patients: principale substance posant problème										
Hommes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	28.1	37.5	30.3	40.1	37.5	6.7	.	29.7	9.1	0.0
1 jour par semaine ou moins	8.4	12.5	8.5	20.4	6.3	6.7	.	18.9	1.8	25.0
2 à 3 jours par semaine	14.0	12.5	11.1	17.4	31.3	13.3	.	16.3	5.5	0.0
4 à 6 jours par semaine	10.2	12.5	6.7	10.8	18.8	6.7	.	9.0	7.3	25.0
une fois par jour	12.0	0.0	26.8	3.6	0.0	20.0	.	9.4	1.8	50.0
plusieurs fois par jour	27.3	25.0	16.6	7.8	6.3	46.7	.	16.7	74.5	0.0
N**	1'891	8	343	167	16	15	0	700	55	4
<i>données manquantes</i>	881	5	120	57	8	10	5	179	8	21
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	7.9	0.0	14.9	21.5	12.5	7.1	.	7.3	1.8	0.0
1 jour par semaine ou moins	8.2	12.5	11.6	29.7	31.3	7.1	.	27.6	3.6	22.2
2 à 3 jours par semaine	16.8	12.5	9.5	20.3	18.8	7.1	.	18.9	7.3	0.0
4 à 6 jours par semaine	12.9	25.0	8.5	11.0	18.8	0.0	.	10.1	7.3	22.2
une fois par jour	13.9	0.0	30.2	5.2	6.3	21.4	.	11.6	1.8	33.3
plusieurs fois par jour	40.3	50.0	25.3	12.2	12.5	57.1	.	24.4	78.2	22.2
N**	1'877	8	328	172	16	14	0	671	55	9
<i>données manquantes</i>	895	5	135	52	8	11	5	208	8	16

T15.1b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2010), hommes

Patients: problème principal			
Hommes	Jeux pathologiques	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	44.6	0.0	20.0
1 jour par semaine ou moins	23.2	0.0	15.0
2 à 3 jours par semaine	5.4	0.0	12.5
4 à 6 jours par semaine	7.1	0.0	7.5
1 fois par jour	5.4	0.0	12.5
plusieurs fois par jour	14.3	100.0	32.5
N**	56	3	40
<i>données manquantes</i>	34	2	16
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	12.2	0.0	5.6
1 jour par semaine ou moins	36.6	0.0	5.6
2 à 3 jours par semaine	14.6	0.0	16.7
4 à 6 jours par semaine	9.8	0.0	13.9
1 fois par jour	7.3	0.0	11.1
plusieurs fois par jour	19.5	100.0	47.2
N**	41	3	36
<i>données manquantes</i>	49	2	20

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.2a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2010), femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	21.2	33.3	20.5	26.1	45.5	26.9	.	21.7	8.9	0.0
1 jour par semaine ou moins	11.5	33.3	14.3	21.7	27.3	7.7	.	19.4	0.0	40.0
2 à 3 jours par semaine	14.8	33.3	8.0	13.0	18.2	0.0	.	15.5	3.6	0.0
4 à 6 jours par semaine	11.4	0.0	5.4	13.0	9.1	3.8	.	7.8	1.8	0.0
une fois par jour	10.5	0.0	29.5	10.9	0.0	30.8	.	11.6	1.8	20.0
plusieurs fois par jour	30.7	0.0	22.3	15.2	0.0	30.8	.	24.0	83.9	40.0
N**	784	3	112	46	11	26	0	129	56	5
données manquantes	364	3	36	18	8	7	1	21	6	10
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	6.6	0.0	15.0	8.7	9.1	12.5	.	3.1	1.8	0.0
1 jour par semaine ou moins	9.1	66.7	15.0	23.9	45.5	8.3	.	22.0	0.0	14.3
2 à 3 jours par semaine	16.7	0.0	10.3	23.9	18.2	4.2	.	15.7	0.0	0.0
4 à 6 jours par semaine	12.7	0.0	8.4	13.0	0.0	0.0	.	7.9	5.5	0.0
une fois par jour	13.5	0.0	27.1	10.9	9.1	29.2	.	15.7	1.8	14.3
plusieurs fois par jour	41.4	33.3	24.3	19.6	18.2	45.8	.	35.4	90.9	71.4
N**	778	3	107	46	11	24	0	127	55	7
données manquantes	370	3	41	18	8	9	1	23	7	8

T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2010), femmes

Patients: problème principal			
Femmes	Jeux pathologiques	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	85.7	6.7	5.3
1 jour par semaine ou moins	0.0	3.3	26.3
2 à 3 jours par semaine	7.1	10.0	15.8
4 à 6 jours par semaine	0.0	6.7	10.5
1 fois par jour	7.1	10.0	5.3
plusieurs fois par jour	0.0	63.3	36.8
N**	14	30	19
données manquantes	14	29	11
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	66.7	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	11.1	6.9	31.6
2 à 3 jours par semaine	11.1	13.8	15.8
4 à 6 jours par semaine	11.1	3.4	5.3
1 fois par jour	0.0	6.9	10.5
plusieurs fois par jour	0.0	69.0	36.8
N**	9	29	19
données manquantes	19	30	11

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.3a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2010), hommes & femmes

Patientes: principale substance posant problème										
<i>Hommes & femmes</i>	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	26.1	36.4	27.9	37.1	40.7	19.5	.	28.5	9.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	9.3	18.2	9.9	20.7	14.8	7.3	.	18.9	0.9	33.3
2 à 3 jours par semaine	14.2	18.2	10.3	16.4	25.9	4.9	.	16.2	4.5	0.0
4 à 6 jours par semaine	10.5	9.1	6.4	11.3	14.8	4.9	.	8.8	4.5	11.1
une fois par jour	11.5	0.0	27.5	5.2	0.0	26.8	.	9.8	1.8	33.3
plusieurs fois par jour	28.3	18.2	18.0	9.4	3.7	36.6	.	17.9	79.3	22.2
N**	2'675	11	455	213	27	41	0	829	111	9
<i>données manquantes</i>	1'245	8	156	75	16	17	6	200	14	31
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	7.5	0.0	14.9	18.8	11.1	10.5	.	6.6	1.8	0.0
1 jour par semaine ou moins	8.4	27.3	12.4	28.4	37.0	7.9	.	26.7	1.8	18.8
2 à 3 jours par semaine	16.8	9.1	9.7	21.1	18.5	5.3	.	18.4	3.6	0.0
4 à 6 jours par semaine	12.9	18.2	8.5	11.5	11.1	0.0	.	9.8	6.4	12.5
une fois par jour	13.7	0.0	29.4	6.4	7.4	26.3	.	12.3	1.8	25.0
plusieurs fois par jour	40.6	45.5	25.1	13.8	14.8	50.0	.	26.2	84.5	43.8
N**	2'655	11	435	218	27	38	0	798	110	16
<i>données manquantes</i>	1'265	8	176	70	16	20	6	231	15	24

T15.3b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2010), hommes & femmes

Patients: problème principal			
<i>Hommes & femmes</i>	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	52.9	6.1	15.3
1 jour par semaine ou moins	18.6	3.0	18.6
2 à 3 jours par semaine	5.7	9.1	13.6
4 à 6 jours par semaine	5.7	6.1	8.5
1 fois par jour	5.7	9.1	10.2
plusieurs fois par jour	11.4	66.7	33.9
N**	70	33	59
<i>données manquantes</i>	48	31	27
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	22.0	0.0	3.6
1 jour par semaine ou moins	32.0	6.3	14.5
2 à 3 jours par semaine	14.0	12.5	16.4
4 à 6 jours par semaine	10.0	3.1	10.9
1 fois par jour	6.0	6.3	10.9
plusieurs fois par jour	16.0	71.9	43.6
N**	50	32	55
<i>données manquantes</i>	68	32	31

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T16.1a Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2010), hommes

Patients: principale substance posant problème										
Hommes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	16.2	18.9	21.5	22.2	19.7	26.7	.	14.8	15.7	14.0
écart-type	4.0	5.3	6.3	7.0	4.3	8.1	.	2.5	7.7	0.0
1er quartile	14.0	15.0	17.0	17.0	16.0	20.0	.	14.0	13.0	14.0
valeur médiane	16.0	16.0	20.0	20.0	17.0	26.0	.	15.0	15.0	14.0
3e quartile	17.0	25.0	25.0	25.0	25.0	28.0	.	16.0	17.0	14.0
N*	1'216	7	307	151	15	9	0	654	34	4
données manquantes	1'556	6	156	73	9	16	5	225	29	21
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	21.9	20.1	22.9	24.7	20.9	25.1	.	15.9	15.8	.
écart-type	7.7	7.4	6.5	7.7	3.9	5.4	.	3.0	3.3	.
1er quartile	17.0	15.0	18.0	19.0	18.0	19.0	.	14.0	14.0	.
valeur médiane	20.0	16.0	21.0	23.0	20.0	26.0	.	15.0	15.0	.
3e quartile	24.0	27.0	27.0	29.5	25.0	30.0	.	16.0	17.0	.
N*	1'114	7	236	124	15	7	0	514	32	0
données manquantes	1'658	6	227	100	9	18	5	365	31	25
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	31.0	21.1	24.4	26.3	21.1	28.8	.	16.6	18.1	15.5
écart-type	12.3	8.3	7.6	7.7	4.4	9.5	.	3.9	7.6	2.1
1er quartile	21.0	16.0	19.0	20.0	18.5	20.0	.	15.0	15.0	14.0
valeur médiane	29.0	17.5	23.0	25.0	19.5	28.0	.	16.0	15.5	15.5
3e quartile	40.0	27.0	28.0	31.0	24.5	33.0	.	17.0	18.0	17.0
N*	1'076	8	249	136	12	11	0	481	30	2
données manquantes	1'696	5	214	88	12	14	5	398	33	23
Période de latence (en années)**										
moyenne	24.0	.	7.2	8.6	5.7	5.9	.	4.6	10.6	7.0
écart-type	13.8	.	7.2	6.1	4.2	2.9	.	5.8	12.0	7.9
1er quartile	13.0	.	2.3	3.5	2.8	3.8	.	1.3	1.3	2.1
valeur médiane	22.9	.	4.6	7.6	4.0	5.9	.	2.2	4.0	4.6
3e quartile	33.9	.	10.0	11.6	9.0	7.9	.	5.5	21.2	11.9
N*	560	0	51	76	8	2	0	507	25	4
données manquantes	498	0	14	24	3	2	1	89	20	7

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1b Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2010), femmes

Patientes: principale substance posant problème

Femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	18.2	16.5	20.7	19.5	20.6	28.5	.	14.6	16.2	23.0
écart-type	6.0	0.7	6.2	6.2	11.6	11.3	.	2.5	4.0	8.3
1er quartile	15.0	16.0	16.0	16.0	14.0	18.0	.	13.0	14.0	17.0
valeur médiane	17.0	16.5	19.0	18.0	16.0	30.0	.	14.0	15.0	24.0
3e quartile	20.0	17.0	23.0	20.0	26.0	38.0	.	16.0	17.0	27.0
N*	459	2	93	41	11	12	0	120	31	5
données manquantes	689	4	55	23	8	21	1	30	31	10
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	27.7	17.5	22.4	20.8	24.4	32.3	.	16.0	18.1	24.3
écart-type	11.5	0.7	6.9	5.4	13.4	12.1	.	4.3	5.1	10.6
1er quartile	19.0	17.0	18.0	17.0	17.0	19.0	.	14.0	15.0	13.0
valeur médiane	25.0	17.5	21.0	19.0	17.0	38.5	.	16.0	17.0	26.0
3e quartile	35.0	18.0	25.0	22.0	26.0	41.0	.	16.0	20.0	34.0
N*	440	2	71	33	7	10	0	91	38	3
données manquantes	708	4	77	31	12	23	1	59	24	12
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	35.0	17.0	22.7	21.5	21.4	30.5	.	17.1	19.9	28.5
écart-type	12.4	.	7.0	6.9	11.3	13.7	.	5.1	8.1	4.4
1er quartile	25.0	17.0	18.0	18.0	16.0	17.0	.	14.0	15.0	25.0
valeur médiane	34.0	17.0	21.0	20.0	17.0	30.0	.	16.0	17.0	28.0
3e quartile	43.0	17.0	26.0	24.0	26.0	41.0	.	18.0	20.0	32.0
N*	481	1	81	40	11	13	0	95	34	4
données manquantes	667	5	67	24	8	20	1	55	28	11
Période de latence (en années)**										
moyenne	25.2	6.0	5.8	5.1	2.2	27.1	.	6.7	17.3	5.0
écart-type	12.0	.	7.2	5.3	1.3	37.2	.	9.3	14.1	5.6
1er quartile	15.7	6.0	1.6	1.6	0.9	0.8	.	1.1	2.1	1.0
valeur médiane	26.3	6.0	3.6	2.9	2.1	27.1	.	2.7	18.8	5.0
3e quartile	33.4	6.0	6.1	6.8	2.9	53.4	.	7.7	28.7	8.9
N*	181	1	23	25	8	2	0	86	24	2
données manquantes	187	1	1	9	4	7	0	13	16	1

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1c Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2010), hommes & femmes

Patient-e-s: principale substance posant problème										
<i>Hommes & femmes</i>	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	16.7	18.3	21.4	21.6	20.1	27.7	.	14.7	15.9	19.0
écart-type	4.7	4.7	6.3	6.9	8.0	9.9	.	2.5	6.2	7.5
1er quartile	15.0	16.0	17.0	17.0	16.0	19.0	.	14.0	13.0	14.0
valeur médiane	16.0	16.0	20.0	20.0	17.0	28.0	.	15.0	15.0	14.0
3e quartile	18.0	20.0	24.0	24.5	25.0	35.0	.	16.0	17.0	24.0
N*	1'675	9	400	192	26	21	0	774	65	9
<i>données manquantes</i>	2'245	10	211	96	17	37	6	255	60	31
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	23.5	19.6	22.8	23.9	22.0	29.4	.	15.9	17.0	24.3
écart-type	9.3	6.5	6.6	7.4	8.0	10.3	.	3.2	4.5	10.6
1er quartile	18.0	16.0	18.0	19.0	17.0	19.0	.	14.0	14.0	13.0
valeur médiane	20.0	17.0	21.0	21.0	19.5	30.0	.	15.0	16.0	26.0
3e quartile	26.0	21.0	26.0	28.0	26.0	39.0	.	16.0	18.0	34.0
N*	1'554	9	307	157	22	17	0	605	70	3
<i>données manquantes</i>	2'366	10	304	131	21	41	6	424	55	37
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	32.3	20.7	24.0	25.2	21.2	29.7	.	16.6	19.0	24.2
écart-type	12.5	7.9	7.5	7.8	8.3	11.7	.	4.1	7.9	7.6
1er quartile	22.0	16.0	18.0	19.0	17.0	19.0	.	15.0	15.0	17.0
valeur médiane	30.0	17.0	22.0	24.0	19.0	28.0	.	16.0	16.5	25.0
3e quartile	40.0	21.0	28.0	30.0	25.0	40.5	.	17.0	20.0	30.0
N*	1'557	9	330	176	23	24	0	576	64	6
<i>données manquantes</i>	2'363	10	281	112	20	34	6	453	61	34
Période de latence (en années)**										
moyenne	24.3	6.0	6.8	7.7	4.0	16.5	.	4.9	13.8	6.3
écart-type	13.4	.	7.2	6.1	3.5	24.8	.	6.5	13.4	6.7
1er quartile	13.7	6.0	2.1	2.8	1.7	2.3	.	1.3	1.4	1.0
valeur médiane	24.2	6.0	3.8	6.4	2.8	5.9	.	2.3	7.0	4.6
3e quartile	33.8	6.0	8.7	10.7	4.7	30.7	.	5.8	26.1	8.9
N*	741	1	74	101	16	4	0	593	49	6
<i>données manquantes</i>	685	1	15	33	7	9	1	102	36	8

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2a Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2010), hommes

Patients: problème principal			
Hommes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	22.3	14.0	15.4
écart-type	12.6	5.7	5.3
1er quartile	16.0	10.0	14.0
valeur médiane	20.0	14.0	14.0
3e quartile	25.0	18.0	16.0
N*	23	2	17
<i>données manquantes</i>	67	3	39
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	25.7	19.0	19.5
écart-type	12.5	1.4	10.1
1er quartile	20.0	18.0	15.0
valeur médiane	22.0	19.0	17.0
3e quartile	27.0	20.0	18.0
N*	25	2	22
<i>données manquantes</i>	65	3	34
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	29.8	33.3	22.2
écart-type	12.4	17.2	10.7
1er quartile	21.0	18.0	17.0
valeur médiane	26.0	30.0	18.0
3e quartile	36.0	52.0	24.0
N*	31	3	21
<i>données manquantes</i>	59	2	35
Période de latence (en années)**			
moyenne	15.0	23.6	12.0
écart-type	12.2	32.1	8.8
1er quartile	4.0	0.9	5.0
valeur médiane	13.3	23.6	10.3
3e quartile	24.4	46.2	15.4
N*	23	2	17
<i>données manquantes</i>	67	3	39

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2b Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2010), femmes

Patientes: problème principal			
Femmes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	42.0	17.3	19.0
écart-type	21.3	5.7	9.1
1er quartile	23.0	14.0	15.0
valeur médiane	38.0	16.0	18.0
3e quartile	65.0	19.0	20.0
N*	3	25	11
<i>données manquantes</i>	25	34	19
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	42.4	18.6	25.6
écart-type	15.5	6.4	13.9
1er quartile	38.0	15.0	17.0
valeur médiane	40.0	17.0	19.5
3e quartile	45.0	21.0	37.5
N*	5	26	12
<i>données manquantes</i>	23	33	18
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	42.3	20.3	30.0
écart-type	16.3	9.2	14.9
1er quartile	30.0	15.0	19.0
valeur médiane	40.0	17.0	24.0
3e quartile	55.0	21.0	45.0
N*	6	27	15
<i>données manquantes</i>	22	32	15
Période de latence (en années)**			
moyenne	13.0	7.5	11.6
écart-type	15.0	8.5	10.7
1er quartile	2.4	1.8	2.7
valeur médiane	6.5	3.9	8.1
3e quartile	30.1	11.3	22.5
N*	3	25	11
<i>données manquantes</i>	25	34	19

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2c Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2010), hommes & femmes

Patients: problème principal			
Hommes & femmes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	24.5	17.0	16.8
écart-type	14.8	5.6	7.1
1er quartile	16.0	14.0	14.0
valeur médiane	20.0	16.0	16.0
3e quartile	25.0	19.0	18.0
N*	26	27	28
<i>données manquantes</i>	92	37	58
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	28.5	18.6	21.6
écart-type	14.3	6.2	11.8
1er quartile	20.0	15.0	16.0
valeur médiane	23.5	17.0	18.0
3e quartile	38.0	20.5	24.0
N*	30	28	34
<i>données manquantes</i>	88	36	52
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	31.9	21.6	25.4
écart-type	13.6	10.6	13.0
1er quartile	23.0	15.0	17.0
valeur médiane	28.0	17.5	20.0
3e quartile	38.0	22.0	30.0
N*	37	30	36
<i>données manquantes</i>	81	34	50
Période de latence (en années)**			
moyenne	14.8	8.7	11.8
écart-type	12.2	11.2	9.4
1er quartile	4.0	1.6	4.7
valeur médiane	13.0	3.9	8.4
3e quartile	24.4	12.7	17.5
N*	26	27	28
<i>données manquantes</i>	92	37	58

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T17 Mode d'administration de la principale substance posant problème au cours des 6 derniers mois avant l'admission (2010)

Patient-e-s: principale substance posant problème															
	Héroïne			Cocaïne			Amphétamines			Cannabis			Benzodiazépines		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Mode d'administration*															
injection	23.5	23.3	23.5	5.6	3.4	5.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	9.1	0.0	4.0
fumée/inhalation	47.5	43.3	46.5	16.7	17.2	16.8	16.7	0.0	12.5	98.8	100.0	98.9	0.0	0.0	0.0
ingestion (manger/boire)	0.5	0.0	0.4	1.9	0.0	1.5	50.0	0.0	37.5	0.7	0.0	0.6	72.7	92.9	84.0
sniff	27.9	33.3	29.2	75.9	79.3	76.6	33.3	100.0	50.0	0.2	0.0	0.2	18.2	7.1	12.0
autre	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	183	60	243	108	29	137	6	2	8	561	101	662	11	14	25
<i>données manquantes</i>	212	57	269	111	35	146	11	7	18	318	49	367	11	11	22

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T18 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 6 derniers mois avant l'admission des injections, échange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois avant l'admission et âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2010)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Injections au cours de la vie*																
oui	4.2	5.5	4.6	56.3	69.1	59.5	13.1	12.2	12.9	4.4	7.9	4.9	10.5	11.7	10.8	455
non	95.8	94.5	95.4	43.7	30.9	40.5	86.9	87.8	87.1	95.6	92.1	95.1	89.5	88.3	89.2	3'740
N**	1'711	721	2'432	334	110	444	145	41	186	688	127	815	3'046	1'149	4'195	4'195
<i>données manquantes</i>	1'061	427	1'488	142	44	186	79	23	102	191	23	214	1'598	615	2'213	2'213
Injections au cours des 6 derniers mois*																
oui	0.3	0.8	0.5	35.9	38.7	36.5	7.5	7.3	7.5	2.8	1.6	2.6	5.0	4.3	4.8	199
non	99.7	99.2	99.5	64.1	61.3	63.5	92.5	92.7	92.5	97.2	98.4	97.4	95.0	95.7	95.2	3'957
N**	1'713	730	2'443	301	93	394	146	41	187	687	127	814	3'014	1'142	4'156	4'156
<i>données manquantes</i>	1'059	418	1'477	175	61	236	78	23	101	192	23	215	1'630	622	2'252	2'252
Injections au cours des 30 derniers jours*																
oui	0.1	0.1	0.1	27.5	29.2	27.9	6.3	7.3	6.5	0.0	0.0	0.0	3.0	2.5	2.8	123
non	99.9	99.9	99.9	72.5	70.8	72.1	93.8	92.7	93.5	100.0	100.0	100.0	97.0	97.5	97.2	4'203
N**	1'821	771	2'592	287	89	376	144	41	185	692	125	817	3'131	1'195	4'326	4'326
<i>données manquantes</i>	951	377	1'328	189	65	254	80	23	103	187	25	212	1'513	569	2'082	2'082
Echange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois***																
oui	0.0	0.0	0.0	10.2	12.5	10.7	14.3	100.0	25.0	0.0	0.0	0.0	8.3	13.0	9.3	10
non	100.0	100.0	100.0	89.8	87.5	89.3	85.7	0.0	75.0	100.0	100.0	100.0	91.7	87.0	90.7	97
N**	1	3	4	59	16	75	7	1	8	16	1	17	84	23	107	107
<i>données manquantes</i>	4	3	7	42	19	61	2	2	4	3	1	4	56	25	81	81
Age lors de la première injection****																
jusqu'à 14 ans	3.4	5.6	4.3	2.9	9.8	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	6.9	4.0	9
de 15 à 16 ans	10.3	22.2	14.9	6.9	2.4	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	12.5	6.5	12.5	8.4	19
de 17 à 18 ans	10.3	27.8	17.0	21.6	22.0	21.7	50.0	0.0	40.0	0.0	42.9	18.8	20.6	23.6	21.6	49
de 19 à 20 ans	24.1	11.1	19.1	23.5	19.5	22.4	16.7	0.0	13.3	33.3	14.3	25.0	23.9	15.3	21.1	48
de 21 à 25 ans	41.4	11.1	29.8	23.5	26.8	24.5	16.7	33.3	20.0	11.1	0.0	6.3	25.8	19.4	23.8	54
de 26 à 30 ans	3.4	16.7	8.5	12.7	14.6	13.3	0.0	0.0	0.0	33.3	14.3	25.0	11.0	13.9	11.9	27
de 31 à 39 ans	3.4	5.6	4.3	7.8	2.4	6.3	8.3	66.7	20.0	22.2	0.0	12.5	7.7	6.9	7.5	17
dès 40 ans	3.4	0.0	2.1	1.0	2.4	1.4	8.3	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	1.9	1.4	1.8	4
N**	29	18	47	102	41	143	12	3	15	9	7	16	155	72	227	227
<i>données manquantes</i>	43	22	65	86	35	121	7	2	9	21	3	24	165	63	228	228

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 6 derniers mois. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2010), hommes

Hommes

	Patients: principale substance posant problème									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool		62.5	29.9	38.0	38.5	50.0	.	20.0	5.3	31.3
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.3		6.3	1.3	0.0	7.1	.	0.4	0.0	0.0
héroïne	2.1	12.5	6.0	12.0	0.0	42.9	.	1.6	0.0	25.0
méthadone	0.9	37.5	23.3	1.3	0.0	21.4	.	0.5	0.0	12.5
autres opiacés	0.5	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	.	0.4	0.0	0.0
cocaïne	6.1	12.5	29.3	0.7	38.5	35.7	.	7.2	0.0	31.3
crack, freebase	0.0	0.0	2.1	2.0	0.0	0.0	.	0.2	0.0	0.0
amphétamines	1.0	0.0	6.3	8.7	0.0	0.0	.	2.3	0.0	12.5
MDMA et substances similaires (ecstasy)	1.1	12.5	6.3	11.3	15.4	0.0	.	2.5	0.0	0.0
autres stimulants	0.2	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	.	0.2	0.0	0.0
barbituriques	0.2	12.5	0.9	0.0	7.7	0.0	.	0.2	0.0	0.0
benzodiazépines	2.8	37.5	21.8	4.7	7.7	0.0	.	0.7	2.6	12.5
autres somnifères et tranquillisants	0.5	25.0	1.5	0.0	0.0	0.0	.	0.2	0.0	6.3
LSD	0.4	25.0	5.4	6.7	23.1	0.0	.	1.4	0.0	6.3
autres hallucinogènes	0.1	0.0	3.0	2.0	7.7	0.0	.	0.9	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
cannabis	10.3	37.5	39.0	31.3	46.2	28.6	.		13.2	25.0
tabac	30.3	37.5	39.6	34.0	30.8	35.7	.	28.1		25.0
autres substances	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.7	0.0	
jeu pathologique	0.2	0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	.	0.9	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.7	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	57.9	0.0	21.8	31.3	15.4	7.1	.	56.7	78.9	43.8
N**	1'751	8	331	150	13	14	0	570	38	16
données manquantes	1'016	4	106	53	9	9	5	205	24	9

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2010), femmes

Femmes

	Patientes: principale substance posant problème									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool		0.0	28.3	34.2	33.3	36.4	.	21.2	7.8	14.3
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.3		5.7	0.0	0.0	4.5	.	0.0	0.0	0.0
héroïne	2.8	33.3	4.7	15.8	0.0	4.5	.	3.0	0.0	0.0
méthadone	2.1	0.0	26.4	5.3	0.0	0.0	.	0.0	2.0	0.0
autres opiacés	0.6	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	.	1.0	0.0	0.0
cocaïne	5.4	33.3	38.7	0.0	33.3	4.5	.	10.1	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.9	2.6	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.7	0.0	5.7	21.1	8.3	0.0	.	4.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.8	33.3	5.7	23.7	25.0	0.0	.	3.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.3	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	5.1	0.0	32.1	10.5	8.3	0.0	.	1.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	1.4	0.0	2.8	2.6	0.0	4.5	.	3.0	2.0	14.3
LSD	0.7	0.0	2.8	5.3	8.3	0.0	.	4.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.1	0.0	1.9	5.3	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
cannabis	8.6	33.3	35.8	52.6	58.3	18.2	.		9.8	0.0
tabac	28.9	66.7	37.7	34.2	25.0	31.8	.	32.3		42.9
autres substances	0.7	0.0	0.9	0.0	0.0	4.5	.	0.0	0.0	
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
troubles alimentaires	4.1	0.0	0.9	2.6	0.0	0.0	.	1.0	7.8	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	.	0.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	57.5	0.0	21.7	26.3	33.3	31.8	.	48.5	72.5	42.9
N**	724	3	106	38	12	22	0	99	51	7
<i>données manquantes</i>	421	3	35	16	6	11	1	24	11	8

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2010), hommes & femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool		45.5	29.5	37.2	36.0	41.7	.	20.2	6.7	26.1
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.3		6.2	1.1	0.0	5.6	.	0.3	0.0	0.0
héroïne	2.3	18.2	5.7	12.8	0.0	19.4	.	1.8	0.0	17.4
méthadone	1.3	27.3	24.0	2.1	0.0	8.3	.	0.4	1.1	8.7
autres opiacés	0.5	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	.	0.4	0.0	0.0
cocaïne	5.9	18.2	31.6	0.5	36.0	16.7	.	7.6	0.0	21.7
crack, freebase	0.0	0.0	1.8	2.1	0.0	0.0	.	0.1	0.0	0.0
amphétamines	0.9	0.0	6.2	11.2	4.0	0.0	.	2.5	0.0	8.7
MDMA et substances similaires (ecstasy)	1.0	18.2	6.2	13.8	20.0	0.0	.	2.5	0.0	0.0
autres stimulants	0.2	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	.	0.1	0.0	0.0
barbituriques	0.2	9.1	1.1	0.0	4.0	0.0	.	0.1	0.0	0.0
benzodiazépines	3.5	27.3	24.3	5.9	8.0	0.0	.	0.7	1.1	8.7
autres somnifères et tranquillisants	0.7	18.2	1.8	0.5	0.0	2.8	.	0.6	1.1	8.7
LSD	0.5	18.2	4.8	6.4	16.0	0.0	.	1.8	0.0	4.3
autres hallucinogènes	0.1	0.0	2.7	2.7	4.0	0.0	.	0.7	0.0	0.0
substances volatiles	0.1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
cannabis	9.8	36.4	38.2	35.6	52.0	22.2	.		11.2	17.4
tabac	29.9	45.5	39.1	34.0	28.0	33.3	.	28.7		30.4
autres substances	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	2.8	.	0.6	0.0	
jeu pathologique	0.1	0.0	0.2	2.1	0.0	0.0	.	0.7	0.0	0.0
troubles alimentaires	1.5	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	.	0.1	4.5	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	.	0.6	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	57.8	0.0	21.7	30.3	24.0	22.2	.	55.5	75.3	43.5
N**	2'475	11	437	188	25	36	0	669	89	23
données manquantes	1'437	7	141	69	15	20	6	229	35	17

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2010), hommes

Hommes

Patients: problème principal			
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	3.6	0.0	2.8
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	0.0	0.0	2.8
tabac	7.3	0.0	16.7
autres substances	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique		0.0	0.0
troubles alimentaires	1.8		2.8
autres troubles assimilables à une addiction	1.8	0.0	
aucun autre problème addictif	87.3	100.0	75.0
N**	55	3	36
<i>données manquantes</i>	35	2	19

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2010), femmes

Femmes

	Patientes: problème principal		
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	0.0	2.9	5.6
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	0.0	0.0	5.6
tabac	20.0	8.8	16.7
autres substances	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique		0.0	5.6
troubles alimentaires	0.0		5.6
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	5.9	
aucun autre problème addictif	80.0	85.3	77.8
N**	15	34	18
<i>données manquantes</i>	13	25	12

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2010), hommes & femmes
Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal		
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	2.9	2.7	3.7
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	0.0	0.0	3.7
tabac	10.0	8.1	16.7
autres substances	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique		0.0	1.9
troubles alimentaires	1.4		3.7
autres troubles assimilables à une addiction	1.4	5.4	
aucun autre problème addictif	85.7	86.5	75.9
N**	70	37	54
<i>données manquantes</i>	48	27	31

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T20 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2010)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Fréquence de la consommation d'alcool*																
jamais	12.0	10.0	11.4	16.5	18.5	16.9	7.9	12.5	8.9	14.9	15.4	14.9	13.5	13.4	13.5	505
1 fois par mois ou moins	3.1	4.5	3.5	12.2	20.0	13.9	13.5	18.8	14.6	27.0	36.3	28.3	10.0	10.3	10.1	378
2 à 4 fois par mois	8.2	7.4	8.0	22.2	21.5	22.0	30.2	31.3	30.4	38.4	33.0	37.6	17.0	12.9	15.9	596
2 à 3 fois par semaine	17.7	16.6	17.4	23.0	24.6	23.4	27.0	21.9	25.9	13.4	11.0	13.1	17.5	16.3	17.2	644
4 fois ou plus par semaine	59.0	61.6	59.8	26.1	15.4	23.7	21.4	15.6	20.3	6.3	4.4	6.1	42.1	47.1	43.4	1'629
N**	1'730	719	2'449	230	65	295	126	32	158	552	91	643	2'752	1'000	3'752	3'752
<i>données manquantes</i>	1'042	429	1'471	246	89	335	98	32	130	327	59	386	1'892	764	2'656	2'656
Nbre de boissons standards par jour***																
1 ou 2	8.2	8.3	8.2	44.6	50.9	46.1	48.2	50.0	48.5	55.2	65.7	56.7	23.8	21.1	23.1	711
3 ou 4	20.2	16.5	19.1	29.9	30.2	30.0	33.6	26.9	32.4	29.5	21.4	28.3	23.7	18.3	22.2	686
5 ou 6	24.7	24.5	24.7	11.3	3.8	9.6	6.4	11.5	7.4	9.3	5.7	8.8	19.2	19.9	19.4	598
7 à 9	19.6	26.9	21.8	6.2	3.8	5.7	5.5	0.0	4.4	2.6	2.9	2.6	14.0	21.3	16.0	492
10 ou plus	27.3	23.8	26.2	7.9	11.3	8.7	6.4	11.5	7.4	3.5	4.3	3.6	19.3	19.4	19.4	597
N**	1'460	625	2'085	177	53	230	110	26	136	431	70	501	2'254	830	3'084	3'084
<i>données manquantes</i>	1'312	523	1'835	299	101	400	114	38	152	448	80	528	2'390	934	3'324	3'324
Fréquence de fortes consom. d'alcool***																
jamais	14.2	15.1	14.5	39.5	43.6	40.4	34.7	43.3	36.5	55.6	58.2	55.9	27.5	27.3	27.5	924
moins d'une fois par mois	10.8	12.2	11.2	25.6	34.5	27.6	28.0	23.3	27.0	25.4	29.1	25.9	16.0	15.2	15.8	531
1 fois par mois	11.2	12.0	11.5	10.3	5.5	9.2	16.9	6.7	14.9	8.9	7.6	8.7	10.7	10.5	10.7	359
1 fois par semaine	27.4	22.2	25.9	10.3	5.5	9.2	13.6	20.0	14.9	7.5	5.1	7.2	20.5	17.9	19.8	667
presque chaque jour	36.4	38.4	37.0	14.4	10.9	13.6	6.8	6.7	6.8	2.6	0.0	2.3	25.2	29.1	26.2	883
N**	1'568	648	2'216	195	55	250	118	30	148	493	79	572	2'470	894	3'364	3'364
<i>données manquantes</i>	1'204	500	1'704	281	99	380	106	34	140	386	71	457	2'174	870	3'044	3'044

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation d'alcool. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T21 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2010)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	32.3	38.0	34.0	4.4	7.9	5.3	9.7	23.1	12.2	22.2	14.3	21.0	25.8	30.2	27.0	771
1 jour par semaine ou moins	1.0	0.6	0.9	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.4	4.2	6.6	4.6	1.8	1.4	1.7	48
2 à 3 jours par semaine	0.8	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	5.0	3.3	4.8	1.9	1.0	1.6	47
4 à 6 jours par semaine	0.6	1.1	0.8	0.5	2.6	1.1	0.9	3.8	1.4	1.3	2.2	1.5	0.9	1.4	1.0	30
1 fois par jour	1.9	1.7	1.8	1.0	1.3	1.1	0.9	0.0	0.7	2.9	2.2	2.8	2.1	1.7	2.0	56
plusieurs fois par jour	63.4	58.0	61.8	94.1	88.2	92.5	85.8	73.1	83.5	64.4	71.4	65.4	67.6	64.3	66.7	1'906
N**	1'112	476	1'588	205	76	281	113	26	139	519	91	610	2'082	776	2'858	2'858
<i>données manquantes</i>	1'660	672	2'332	271	78	349	111	38	149	360	59	419	2'562	988	3'550	3'550
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10	16.0	19.8	17.1	11.0	15.0	12.0	17.2	20.0	17.7	54.6	54.1	54.5	26.2	25.9	26.2	486
11 à 20	40.7	46.4	42.3	57.2	48.3	54.9	57.0	55.0	56.6	37.1	36.5	37.0	43.0	44.4	43.4	806
21 à 30	29.8	27.0	29.0	20.8	25.0	21.9	20.4	15.0	19.5	6.9	6.8	6.9	21.6	22.8	21.9	407
31 ou plus	13.5	6.7	11.6	11.0	11.7	11.2	5.4	10.0	6.2	1.4	2.7	1.6	9.1	6.9	8.6	159
N**	668	252	920	173	60	233	93	20	113	361	74	435	1'380	478	1'858	1'858
<i>données manquantes</i>	85	43	128	23	10	33	9	0	9	43	4	47	165	64	229	229

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T22a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2010), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème										
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Objectif de consommation*										
abstinence définitive	33.4	75.0	77.9	85.1	91.7	50.0	.	54.7	46.2	33.3
abstinence limitée dans le temps	25.0	0.0	1.0	4.0	0.0	0.0	.	8.4	0.0	0.0
consommation contrôlée	27.4	0.0	10.8	2.0	8.3	25.0	.	20.6	23.1	0.0
aucune limitation envisagée	1.3	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	.	2.3	7.7	66.7
pas déterminé pour l'instant	12.4	25.0	7.8	6.9	0.0	25.0	.	13.6	23.1	0.0
autre	0.4	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	.	0.5	0.0	0.0
N**	1'123	4	204	101	12	4	0	214	13	3
<i>données manquantes</i>	1'649	9	259	123	12	21	5	665	50	22

T22b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2010), femmes

Objectif de consommation*										
abstinence définitive	36.3	100.0	69.5	64.7	75.0	30.0	.	50.0	77.8	80.0
abstinence limitée dans le temps	16.1	0.0	1.7	5.9	0.0	0.0	.	3.6	11.1	0.0
consommation contrôlée	28.5	0.0	11.9	11.8	25.0	10.0	.	25.0	11.1	0.0
aucune limitation envisagée	2.5	0.0	1.7	0.0	0.0	10.0	.	0.0	0.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	16.4	0.0	10.2	17.6	0.0	50.0	.	21.4	0.0	20.0
autre	0.2	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
N**	446	3	59	17	4	10	0	28	9	5
<i>données manquantes</i>	702	3	89	47	15	23	1	122	53	10

T22c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2010), hommes & femmes

Objectif de consommation*										
abstinence définitive	34.2	85.7	76.0	82.2	87.5	35.7	.	54.1	59.1	62.5
abstinence limitée dans le temps	22.5	0.0	1.1	4.2	0.0	0.0	.	7.9	4.5	0.0
consommation contrôlée	27.7	0.0	11.0	3.4	12.5	14.3	.	21.1	18.2	0.0
aucune limitation envisagée	1.7	0.0	1.9	1.7	0.0	7.1	.	2.1	4.5	25.0
pas déterminé pour l'instant	13.5	14.3	8.4	8.5	0.0	42.9	.	14.5	13.6	12.5
autres	0.4	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	.	0.4	0.0	0.0
N**	1'569	7	263	118	16	14	0	242	22	8
<i>données manquantes</i>	2'351	12	348	170	27	44	6	787	103	32

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23a Problèmes psychiques au cours de la vie (2010), hommes

Hommes

	Patients: problème principal									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*										
dépansions sévères	30.4	100.0	36.0	23.1	44.4	33.3	.	20.5	20.0	33.3
états anxieux/tension nerv. importants	23.2	0.0	35.4	33.3	11.1	66.7	.	24.6	0.0	50.0
diffic. compréhension/mémoire/concentr.	11.8	0.0	16.5	17.9	44.4	0.0	.	22.1	20.0	50.0
hallucinations	2.8	0.0	4.9	7.7	22.2	0.0	.	5.6	0.0	16.7
diffic. à contrôler comportement violent	11.8	0.0	15.2	14.1	11.1	0.0	.	20.5	0.0	66.7
problèmes psychiques traités avec médic.	11.1	50.0	23.8	16.7	0.0	33.3	.	8.7	20.0	0.0
pensées suicidaires sérieuses	12.7	50.0	18.3	16.7	11.1	33.3	.	12.3	0.0	33.3
tentatives de suicide	6.4	50.0	11.6	6.4	0.0	33.3	.	4.1	0.0	16.7
autre(s) problème(s) psychique(s)	3.4	0.0	2.4	3.8	11.1	0.0	.	4.1	0.0	0.0
aucun	43.7	0.0	34.8	41.0	22.2	0.0	.	46.7	60.0	16.7
N**	865	2	164	78	9	3	0	195	5	6
<i>données manquantes</i>	1'907	11	299	146	15	22	5	684	58	19

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23b Problèmes psychiques au cours de la vie (2010), femmes

Femmes

	Patientes: problème principal									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*										
dépansions sévères	46.0	33.3	45.8	53.3	16.7	55.6	.	20.7	28.6	75.0
états anxieux/tension nerv. importants	39.0	0.0	43.8	26.7	0.0	77.8	.	34.5	0.0	50.0
diffic. compréhension/mémoire/concentr.	11.7	66.7	22.9	13.3	0.0	22.2	.	13.8	0.0	50.0
hallucinations	2.7	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	.	3.4	0.0	25.0
diffic. à contrôler comportement violent	7.4	0.0	12.5	13.3	0.0	0.0	.	31.0	0.0	25.0
problèmes psychiques traités avec médic.	26.2	33.3	33.3	20.0	50.0	33.3	.	17.2	14.3	0.0
pensées suicidaires sérieuses	20.4	33.3	29.2	33.3	16.7	44.4	.	41.4	0.0	75.0
tentatives de suicide	12.3	0.0	22.9	26.7	0.0	44.4	.	24.1	0.0	25.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	7.6	0.0	2.1	0.0	16.7	0.0	.	0.0	0.0	0.0
aucun	21.3	0.0	22.9	33.3	16.7	0.0	.	24.1	57.1	0.0
N**	367	3	48	15	6	9	0	29	7	4
données manquantes	781	3	100	49	13	24	1	121	55	11

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23c Problèmes psychiques au cours de la vie (2010), hommes & femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*										
dépansions sévères	35.1	60.0	38.2	28.0	33.3	50.0	.	20.5	25.0	50.0
états anxieux/tension nerv. importants	27.9	0.0	37.3	32.3	6.7	75.0	.	25.9	0.0	50.0
diffic. compréhension/mémoire/concentr.	11.8	40.0	17.9	17.2	26.7	16.7	.	21.0	8.3	50.0
hallucinations	2.8	0.0	3.8	7.5	13.3	0.0	.	5.4	0.0	20.0
diffic. à contrôler comportement violent	10.5	0.0	14.6	14.0	6.7	0.0	.	21.9	0.0	50.0
problèmes psychiques traités avec médic.	15.6	40.0	25.9	17.2	20.0	33.3	.	9.8	16.7	0.0
pensées suicidaires sérieuses	15.0	40.0	20.8	19.4	13.3	41.7	.	16.1	0.0	50.0
tentatives de suicide	8.1	20.0	14.2	9.7	0.0	41.7	.	6.7	0.0	20.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	4.6	0.0	2.4	3.2	13.3	0.0	.	3.6	0.0	0.0
aucun	37.0	0.0	32.1	39.8	20.0	0.0	.	43.8	58.3	10.0
N**	1'232	5	212	93	15	12	0	224	12	10
<i>données manquantes</i>	<i>2'688</i>	<i>14</i>	<i>399</i>	<i>195</i>	<i>28</i>	<i>46</i>	<i>6</i>	<i>805</i>	<i>113</i>	<i>30</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24 Proches: Lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2010)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	
lien avec la tierce personne*				
mère/père	26.4	30.9	29.9	284
filles/fils	21.8	13.7	15.4	146
sœur/frère	3.6	4.0	3.9	37
conjoint-e/partenaire	27.4	45.6	41.8	397
autre proche/parent-e	1.0	0.8	0.8	8
collègue/ami-e	4.1	2.0	2.5	24
employeur/se, enseignant-e	5.6	0.8	1.8	17
tuteur/trice, curateur/trice	0.0	0.0	0.0	0
autre	10.2	2.3	3.9	37
N**	197	752	950	950
<i>données manquantes</i>	12	36	48	48

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T25 Proches: problème principal et autres problèmes de la tierce personne (2010)

Proches					
Total			Total		
	%	N		%	N
Problème principal de la tierce personne*			Autres problèmes de la tierce personne***		
alcool	66.6	641	alcool	27.6	98
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.6	6	cocktails (héroïne et cocaïne)	1.1	4
héroïne	4.1	39	héroïne	3.7	13
méthadone	0.6	6	méthadone	3.4	12
autres opiacés (morphine, codéine, etc)	0.3	3	autres opiacés (morphine, codéine, etc)	0.3	1
cocaïne	3.6	35	cocaïne	7.0	25
crack, feebase	0.1	1	crack, feebase	0.0	0
amphétamines	0.3	3	amphétamines	0.6	2
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.1	1	MDMA et substances similaires (ecstasy)	1.4	5
autres stimulants (khat, etc)	0.0	0	autres stimulants (khat, etc)	0.0	0
barbituriques	1.1	11	barbituriques	0.8	3
benzodiazépines	0.4	4	benzodiazépines	3.1	11
autres somnifères et tranquillisants	0.1	1	autres somnifères et tranquillisants	2.5	9
LSD	0.1	1	LSD	0.0	0
autres hallucinogènes	0.8	8	autres hallucinogènes	0.0	0
substances volatiles (solvants, etc)	0.0	0	substances volatiles (solvants, etc)	0.0	0
cannabis	11.7	113	cannabis	18.3	65
tabac	1.1	11	tabac	20.0	71
autre substance	0.6	6	autre substance	0.0	0
jeu pathologique	1.6	15	jeu pathologique	3.9	14
troubles alimentaires	1.8	17	troubles alimentaires	2.5	9
autre comportement de type addictif	4.2	40	autre comportement de type addictif	6.8	24
			aucun	26.8	95
N**	962	962	N**	355	355
<i>données manquantes</i>	36	36	<i>données manquantes</i>	638	638

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

*** Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T26 Proches: Propres problèmes des proches liés au problème de la tierce personne (2010)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	
propres problèmes*				
propres probl. de consom. de substances	8.8	8.1	8.3	27
propres comportements de type addictif	1.8	1.1	1.2	4
propres problèmes somatiques	0.0	7.8	6.4	21
propres problèmes psychiques	22.8	34.1	32.1	105
problèmes de couple	33.3	44.1	42.2	138
problèmes familiaux	56.1	59.6	59.0	193
problèmes financiers	8.8	9.6	9.5	31
problèmes liés à la profession/formation	8.8	4.4	5.2	17
problèmes de logement	7.0	4.4	4.9	16
problèmes de violence (victime)	10.5	10.0	10.1	33
problèmes à contrôler sa propre violence	0.0	0.7	0.6	2
problèmes juridiques	8.8	4.1	4.9	16
autre	1.8	0.7	0.9	3
aucun	15.8	13.0	13.5	44
N**	57	270	327	327
<i>données manquantes</i>	152	517	670	670

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T27 Sexe et âge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2010)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sexe*																			
hommes	70.3			72.8			75.2			81.0			20.5			63.5		4'268	
femmes	28.3			23.3			22.0			16.9			79.5			34.7		2'333	
sexe pas connu	1.4			3.8			2.8			2.1			0.0			1.7		116	
N**	2'479	997	3'527	418	134	574	212	62	282	703	147	868	196	762	958	4'268	2'333	6'717	6'717
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	4.8	6.1	5.1	2.1	0.8	1.0	1.2	1.1	1.2	76
15-19	2.7	1.7	2.4	1.9	8.2	3.4	3.3	8.1	4.4	62.2	52.4	60.5	6.2	3.4	4.0	13.5	7.4	11.4	748
20-24	4.5	3.4	4.2	9.4	26.1	13.4	12.7	19.4	14.2	13.1	12.2	12.9	3.6	4.0	3.9	6.9	6.7	6.8	450
25-29	7.8	4.3	6.8	14.9	24.6	17.2	25.5	22.6	24.8	9.0	11.6	9.4	4.1	7.1	6.5	9.7	7.9	9.1	598
30-34	8.8	9.2	8.9	19.7	9.7	17.2	19.3	25.8	20.8	6.4	7.5	6.6	8.2	8.7	8.6	10.2	9.5	10.0	656
35-39	10.9	8.4	10.2	22.1	6.0	18.1	17.5	6.5	15.0	2.4	2.0	2.4	9.2	9.9	9.8	11.0	8.5	10.1	665
40-44	13.4	14.3	13.6	18.7	16.4	18.1	13.7	11.3	13.1	1.3	4.8	1.9	12.8	14.6	14.3	11.7	13.5	12.3	812
45-49	14.5	16.3	15.0	9.4	6.0	8.5	4.2	6.5	4.7	0.7	1.4	0.8	11.8	18.3	17.0	10.7	14.3	12.0	788
50-54	13.7	16.1	14.3	2.9	1.5	2.5	2.8	0.0	2.2	0.0	2.0	0.4	13.8	14.8	14.6	9.3	12.7	10.5	693
55-59	10.0	11.1	10.3	1.0	1.5	1.1	0.5	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	12.8	7.3	8.4	6.8	7.7	7.1	468
60-64	7.8	7.4	7.7	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	5.1	4.8	4.9	5.3	5.1	333
65-69	3.3	5.1	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2.6	3.1	2.3	3.3	2.6	172
70-74	1.8	1.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.4	2.6	1.2	1.7	1.4	91
75 et plus	0.8	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.9	1.4	0.6	0.6	0.6	40
N**	2'475	996	3'471	417	134	551	212	62	274	703	147	850	195	758	953	4'262	2'328	6'590	6'590
données manquantes	4	1	56	1	0	23	0	0	8	0	0	18	1	4	5	6	5	127	127
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	45.0	46.9	45.5	35.8	31.2	34.7	32.9	30.7	32.4	20.7	22.9	21.0	45.7	44.4	44.6	38.9	42.2	40.0	
écart-type	13.3	12.5	13.1	8.4	9.7	8.9	8.2	7.8	8.2	6.5	9.0	7.0	15.7	13.1	13.7	15.0	14.4	14.9	
1er quartile	35.5	38.6	36.4	29.7	23.3	27.6	27.2	24.5	26.5	16.6	16.9	16.7	35.6	35.7	35.7	26.8	31.0	28.2	
valeur médiane	45.6	47.3	46.1	36.3	28.9	34.4	31.9	30.0	31.2	18.0	18.5	18.1	47.6	45.4	45.6	38.9	43.4	40.6	
3e quartile	54.4	55.6	54.7	41.7	40.3	41.2	39.1	34.8	38.9	22.6	26.6	23.7	56.1	52.3	52.9	50.0	52.2	51.0	
N**	2'475	996	3'471	417	134	551	212	62	274	703	147	850	195	758	953	4'262	2'328	6'590	
données manquantes	4	1	56	1	0	23	0	0	8	0	0	18	1	4	5	6	5	127	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2010)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Etat civil*																			
célibataire	42.3	32.3	39.4	68.3	71.7	69.2	73.5	75.4	74.0	95.0	90.0	94.2	29.4	22.8	24.1	55.4	38.3	49.3	2'938
marié-e	31.7	28.5	30.8	16.0	11.7	14.9	15.3	7.0	13.4	3.3	3.1	3.2	58.8	54.7	55.5	25.7	33.5	28.4	1'696
séparé-e	5.4	5.1	5.4	2.2	2.5	2.3	2.1	3.5	2.4	0.3	3.1	0.8	4.1	4.2	4.2	4.0	4.4	4.1	246
divorcé-e	18.1	28.3	21.0	11.5	10.0	11.1	8.5	10.5	8.9	1.1	3.1	1.4	6.5	14.4	12.9	13.1	19.5	15.4	916
veuf/veuve	2.0	5.3	2.9	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.7	2.4	1.3	3.4	2.1	123
partenariat enregistré	0.5	0.4	0.5	1.7	3.3	2.1	0.5	3.5	1.2	0.3	0.8	0.4	0.0	1.1	0.9	0.6	0.9	0.7	43
N**	2'241	898	3'139	357	120	477	189	57	246	641	130	771	170	707	877	3'837	2'125	5'962	5'962
données manquantes	238	99	388	61	14	97	23	5	36	62	17	97	26	55	81	431	208	755	755
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	7.6	10.7	8.4	3.1	0.0	2.4	1.5	0.0	1.1	0.4	1.4	0.6	9.9	8.3	8.7	5.3	7.4	6.0	388
périphérie des grands centres	16.1	15.9	16.9	2.6	1.6	4.8	7.4	5.1	8.5	5.6	4.9	7.4	15.1	13.6	13.9	11.9	12.4	13.1	849
villes de moyenne importance	14.4	13.4	13.9	26.8	30.6	26.8	24.5	20.3	22.9	28.9	33.1	29.0	19.8	17.9	18.3	19.4	18.9	18.9	1'223
petites villes	34.3	33.1	33.6	43.4	34.7	40.0	41.7	54.2	43.2	35.8	31.7	34.5	33.9	33.5	33.5	36.2	34.2	35.0	2'263
campagne	27.7	26.9	27.2	24.2	33.1	26.0	25.0	20.3	24.4	29.2	28.9	28.5	21.4	26.7	25.6	27.3	27.1	27.0	1'747
N**	2'378	943	3'371	392	124	538	204	59	271	695	142	855	192	744	936	4'118	2'237	6'470	6'470
données manquantes	101	54	156	26	10	36	8	3	11	8	5	13	4	18	22	150	96	247	247

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2010)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de ménage*																			
seul-e en ménage	42.6	41.5	42.3	42.5	28.6	39.3	41.1	38.5	40.6	12.2	10.0	11.9	17.5	15.8	16.1	35.0	29.3	33.0	1'402
avec un ou les parents	6.8	2.0	5.5	12.3	12.9	12.4	9.9	17.9	11.7	70.9	49.0	67.4	9.3	5.6	6.2	20.8	9.3	16.7	712
avec enfant(s), sans partenaire	1.8	11.3	4.5	0.0	11.4	2.7	1.4	10.3	3.3	0.2	6.0	1.1	3.1	16.6	14.4	1.3	12.3	5.2	220
avec partenaire, sans enfant	24.3	25.1	24.5	14.9	20.0	16.1	14.2	25.6	16.7	3.6	11.0	4.8	29.9	23.5	24.6	18.9	23.3	20.4	869
avec partenaire et enfant(s)	17.2	12.5	15.9	13.2	8.6	12.1	16.3	0.0	12.8	2.9	3.0	2.9	37.1	35.6	35.8	15.0	18.6	16.3	692
avec d'autres proches	1.1	1.6	1.3	1.8	1.4	1.7	1.4	2.6	1.7	1.9	1.0	1.8	1.0	1.0	1.0	1.3	1.4	1.3	57
avec des amis (colocation)	1.8	1.6	1.7	2.6	2.9	2.7	7.8	2.6	6.7	1.9	3.0	2.1	0.0	1.0	0.9	2.2	1.6	2.0	84
autre	4.3	4.4	4.3	12.7	14.3	13.1	7.8	2.6	6.7	6.3	17.0	8.0	2.1	0.8	1.0	5.6	4.2	5.1	218
N**	1'582	638	2'220	228	70	298	141	39	180	523	100	623	97	481	578	2'757	1'497	4'254	4'254
données manquantes	897	359	1'307	190	64	276	71	23	102	180	47	245	99	281	380	1'511	836	2'463	2'463
Situation de domicile*																			
domicile fixe	92.9	92.7	92.8	78.2	79.7	79.5	89.7	85.7	89.2	92.9	90.0	92.0	98.3	97.0	97.2	91.8	93.6	92.4	4'341
sans domicile fixe	4.5	5.8	4.8	13.5	16.5	13.4	8.2	11.9	8.7	4.0	6.4	4.6	1.7	2.8	2.6	5.1	5.2	5.1	239
institution	2.7	1.6	2.4	8.3	3.8	7.1	2.1	2.4	2.1	3.1	3.6	3.4	0.0	0.2	0.2	3.1	1.3	2.5	118
N**	1'707	695	2'448	252	79	351	146	42	195	552	110	679	115	530	645	2'965	1'630	4'698	4'698
données manquantes	772	302	1'079	166	55	223	66	20	87	151	37	189	81	232	313	1'303	703	2'019	2'019
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	32.2	37.3	33.7	41.0	21.1	36.1	34.9	37.5	35.4	68.6	45.6	64.5	17.4	21.6	20.9	38.9	31.3	36.2	1'217
relations temporaires	6.0	4.4	5.5	6.9	7.0	7.0	4.8	12.5	6.3	8.0	11.4	8.6	1.2	1.7	1.6	5.9	4.1	5.2	176
partenaire fixe, vivant séparé	10.4	12.8	11.1	11.6	33.3	17.0	22.2	18.8	21.5	12.9	25.3	15.2	8.1	8.7	8.6	11.4	13.7	12.2	411
partenaire fixe, ménage commun	51.4	45.5	49.7	40.5	38.6	40.0	38.1	31.3	36.7	10.5	17.7	11.8	73.3	68.0	68.9	43.8	50.9	46.4	1'562
N**	1'264	523	1'787	173	57	230	126	32	158	363	79	442	86	416	502	2'139	1'227	3'366	3'366
données manquantes	1'215	474	1'740	245	77	344	86	30	124	340	68	426	110	346	456	2'129	1'106	3'351	3'351

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T30 Plus haute formation achevée, source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2010)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Plus haute formation achevée*																			
aucune form. achevée	7.0	6.5	6.9	6.8	9.9	7.6	6.1	7.1	6.3	23.3	23.8	23.4	15.5	3.2	5.5	11.0	8.1	10.0	403
scolarité obligatoire	14.4	17.6	15.3	33.2	40.7	35.0	19.0	35.7	22.8	50.4	56.2	51.3	10.3	15.4	14.4	24.4	22.4	23.7	952
scolarité complémentaire	3.4	6.3	4.2	4.0	7.4	4.8	2.7	4.8	3.2	3.9	2.9	3.7	0.0	4.6	3.8	3.4	5.7	4.2	168
apprentissage/école prof.	54.9	52.9	54.3	50.0	33.3	45.9	58.5	45.2	55.6	18.7	15.2	18.1	40.2	48.9	47.2	45.8	45.3	45.6	1'832
maturité/diplôme	4.2	4.5	4.3	1.2	6.2	2.4	2.0	2.4	2.1	2.4	0.0	2.0	1.0	6.1	5.1	3.4	5.0	3.9	158
école normale, pédagog.	1.2	2.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.3	1.0	3.9	3.4	0.8	2.5	1.4	55
form. profession. supérieure	6.4	4.7	6.0	2.0	2.5	2.1	7.5	2.4	6.3	0.7	0.0	0.6	9.3	7.8	8.1	5.0	5.0	5.0	199
école profession. supérieure	2.0	1.6	1.9	0.4	0.0	0.3	0.0	2.4	0.5	0.0	0.0	0.0	4.1	2.2	2.6	1.3	1.7	1.5	59
haute école spécialisée	2.0	1.1	1.8	1.2	0.0	0.9	1.4	0.0	1.1	0.2	1.0	0.3	4.1	1.7	2.2	1.6	1.1	1.4	56
université, haute école	4.4	2.4	3.9	1.2	0.0	0.9	2.7	0.0	2.1	0.2	0.0	0.2	14.4	6.1	7.7	3.4	3.3	3.4	135
N**	1'491	552	2'043	250	81	331	147	42	189	540	105	645	97	409	506	2'685	1'332	4'017	4'017
données manquantes	988	445	1'484	168	53	243	65	20	93	163	42	223	99	353	452	1'583	1'001	2'700	2'700
Source de revenu principale*																			
salaires	56.7	39.5	51.8	29.8	22.1	27.7	62.3	38.3	56.5	26.0	25.6	25.9	68.2	64.1	64.9	49.6	45.9	48.2	2'392
économies, épargne	0.6	1.5	0.8	0.4	0.0	0.3	0.0	2.1	0.5	0.5	0.0	0.4	0.8	0.4	0.4	0.5	0.9	0.6	31
rente (AVS, AI ou autre)	17.8	25.2	20.0	13.6	16.3	14.8	6.3	14.9	7.9	1.9	4.3	2.6	13.6	10.5	11.1	13.6	17.5	15.0	747
aide sociale	11.6	13.2	12.0	37.9	48.8	39.8	18.9	21.3	20.1	6.0	16.2	7.8	2.3	2.4	2.4	12.4	11.2	12.0	598
assurance-chômage	6.7	4.8	6.1	8.1	3.5	6.9	6.3	10.6	7.0	3.0	1.7	2.7	3.0	2.0	2.2	5.9	3.4	5.0	248
soutien du/de la partenaire	1.3	11.3	4.2	1.8	2.3	2.1	0.0	2.1	0.5	0.2	3.4	0.7	0.8	13.8	11.3	1.0	10.7	4.4	219
soutien parents/proches/amis	3.0	2.9	3.0	2.2	3.5	2.6	4.4	10.6	6.1	60.7	43.6	57.5	9.8	4.6	5.6	14.5	8.4	12.3	612
deal, combines	0.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.6	0.0	0.5	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	5
autres revenus illégaux	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autre	2.1	1.5	2.0	5.1	3.5	5.0	1.3	0.0	0.9	1.6	4.3	2.0	1.5	2.2	2.1	2.2	2.1	2.2	108
N**	1'818	726	2'591	272	86	379	159	47	214	570	117	702	132	543	675	3'151	1'707	4'964	4'964
données manquantes	661	271	936	146	48	195	53	15	68	133	30	166	64	219	283	1'117	626	1'753	1'753
Taux d'activité principal*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	53.7	27.2	46.2	29.3	11.0	24.9	55.2	33.3	50.3	19.5	14.7	18.7	54.9	40.7	43.3	45.1	30.5	40.0	1'705
activité à temps partiel	4.1	20.6	8.8	3.0	15.1	5.9	6.3	9.5	7.0	1.3	9.2	2.6	6.9	29.3	25.2	3.7	20.9	9.6	410
plusieurs activités occas.	1.6	1.3	1.5	4.3	1.4	3.6	0.7	0.0	0.5	0.9	0.9	0.9	0.0	1.5	1.3	1.5	1.3	1.4	61
en formation	2.8	2.2	2.7	1.3	4.1	2.0	2.1	7.1	3.2	62.5	58.7	61.8	13.7	4.4	6.1	15.5	9.7	13.5	574
sans activité prof.	20.9	33.9	24.5	22.8	26.0	23.6	15.4	19.0	16.2	3.2	4.6	3.4	14.7	17.0	16.5	16.7	24.5	19.4	826
sans travail, en quête d'emploi	9.5	8.2	9.1	20.7	19.2	20.3	10.5	16.7	11.9	4.7	3.7	4.5	2.9	3.1	3.1	9.1	6.4	8.2	349
sans travail, futur emploi garanti	0.3	0.8	0.5	0.0	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	0.6	2.0	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4	18
autre	7.2	5.8	6.8	18.5	21.9	19.3	9.8	14.3	10.8	7.3	7.3	7.3	4.9	3.7	4.0	8.0	6.2	7.4	315
N**	1'587	625	2'212	232	73	305	143	42	185	533	109	642	102	454	556	2'784	1'474	4'258	4'258
données manquantes	892	372	1'315	186	61	269	69	20	97	170	38	226	94	308	402	1'484	859	2'459	2'459

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2010)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	30.4	39.9	33.1	58.3	65.8	60.3	23.1	58.8	29.5	11.7	15.4	12.2	18.6	23.1	22.3	28.6	34.8	30.7	542
apprenti-e, stagiaire	1.3	1.0	1.2	1.0	5.3	2.1	2.6	0.0	2.1	36.8	38.5	37.0	7.0	1.5	2.5	6.7	3.5	5.6	99
manœuvre, aide	3.8	6.9	4.7	7.8	10.5	8.5	7.7	0.0	6.3	1.2	3.8	1.6	2.3	3.6	3.4	4.1	5.6	4.6	82
ouvrier/ère formé-e sur le tas	5.5	7.2	6.0	5.8	2.6	5.0	7.7	0.0	6.3	3.7	3.8	3.7	0.0	4.6	3.8	5.7	5.6	5.7	100
ouvrier/ère formé-e (CFC)	12.0	2.7	9.4	13.6	2.6	10.6	16.7	11.8	15.8	8.6	3.8	7.9	7.0	9.2	8.8	11.6	5.1	9.4	166
contremaître-sse	2.1	0.0	1.5	1.0	0.0	0.7	6.4	5.9	6.3	2.5	0.0	2.1	0.0	2.1	1.7	2.2	0.8	1.7	30
employé-e non qualifié-e	19.7	24.4	21.1	7.8	10.5	8.5	17.9	17.6	17.9	1.8	11.5	3.2	23.3	27.2	26.5	15.9	23.1	18.4	324
empl. qualifié-e, cadre moyen	11.2	8.9	10.5	1.9	0.0	1.4	10.3	0.0	8.4	3.1	7.7	3.7	9.3	14.9	13.9	9.4	9.6	9.5	167
employé-e, cadre supérieur	3.1	1.0	2.5	1.0	2.6	1.4	2.6	0.0	2.1	1.8	0.0	1.6	9.3	2.1	3.4	2.8	1.5	2.4	42
indépendant-e	9.1	6.5	8.4	1.9	0.0	1.4	2.6	0.0	2.1	1.2	0.0	1.1	9.3	8.7	8.8	6.5	6.3	6.5	114
écolier/ère, étudiant-e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.9	2.1	26.4	15.4	24.9	11.6	2.6	4.2	5.6	3.5	4.9	86
autre statut	0.8	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	1.2	0.0	1.1	2.3	0.5	0.8	0.9	0.5	0.7	13
N**	714	291	1'005	103	38	141	78	17	95	163	26	189	43	195	238	1'162	603	1'765	1'765
données manquantes	1'765	706	2'522	315	96	433	134	45	187	540	121	679	153	567	720	3'106	1'730	4'952	4'952
Revenu mensuel net*																			
aucun revenu	26.0	34.6	28.1	28.6	26.7	28.1	17.5	27.3	19.6	48.8	27.3	45.7	41.2	21.1	25.0	30.4	30.5	30.4	340
moins de 1000 fr.	6.2	6.5	6.3	16.7	16.7	16.7	2.5	0.0	2.0	28.7	36.4	29.8	5.9	9.9	9.1	10.9	10.1	10.6	119
de 1001 à 2000 fr.	4.9	11.1	6.4	19.0	30.0	21.9	17.5	18.2	17.6	8.5	13.6	9.3	0.0	8.5	6.8	7.3	12.9	8.9	99
de 2001 à 3000 fr.	10.2	15.7	11.6	13.1	23.3	15.8	10.0	27.3	13.7	0.8	4.5	1.3	0.0	15.5	12.5	8.4	16.4	10.6	119
de 3001 à 4000 fr.	13.4	11.1	12.9	10.7	3.3	8.8	15.0	9.1	13.7	2.3	13.6	4.0	11.8	11.3	11.4	11.5	10.1	11.1	124
de 4001 à 5000 fr.	16.0	12.4	15.1	8.3	0.0	6.1	20.0	18.2	19.6	7.8	0.0	6.6	17.6	14.1	14.8	14.1	10.1	13.0	145
de 5001 à 6000 fr.	11.3	5.9	10.0	2.4	0.0	1.8	15.0	0.0	11.8	1.6	4.5	2.0	0.0	5.6	4.5	9.1	4.7	7.9	88
de 6001 à 8000 fr.	7.9	2.0	6.4	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	23.5	11.3	13.6	5.5	3.8	5.0	56
de 8001 à 10 000 fr.	2.1	0.7	1.8	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.0	0.8	0.0	0.7	0.0	2.8	2.3	1.8	1.3	1.6	18
de 10 001 à 15 000 fr.	1.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	5
plus de 15 000 fr.	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.4	5
N**	469	153	622	84	30	114	40	11	51	129	22	151	17	71	88	800	318	1'118	1'118
données manquantes	2'010	844	2'905	334	104	460	172	51	231	574	125	717	179	691	870	3'468	2'015	5'599	5'599

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2010)

Raison principale*	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
fin régulière sans transfert	49.4	47.7	48.8	21.4	22.1	21.5	34.4	25.8	32.6	65.8	62.7	64.7	65.3	67.0	66.7	50.1	53.7	51.1	3'410
fin régulière avec transfert	5.4	7.8	6.1	14.8	14.5	15.4	5.7	25.8	10.3	3.0	4.2	3.6	2.0	2.6	2.5	5.8	6.9	6.4	424
changement de domicile	2.9	3.3	3.0	4.9	9.9	6.7	8.0	3.2	6.7	1.9	2.8	2.0	0.0	0.9	0.7	2.9	2.6	2.9	192
hospitalisation	0.6	1.0	0.8	0.5	0.8	0.5	1.9	1.6	1.8	0.3	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	38
détention	0.1	0.1	0.1	2.2	0.8	1.8	1.4	1.6	1.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	20
perte de contact	26.8	24.9	26.3	35.5	32.1	33.9	32.1	27.4	31.6	17.2	18.3	17.9	20.9	19.9	20.1	25.7	22.3	24.6	1'641
rupture explicite	10.1	11.1	10.6	15.3	15.3	15.1	10.8	11.3	10.6	7.9	9.9	8.1	6.1	5.1	5.3	10.0	9.5	9.9	661
décès	1.9	1.5	1.8	1.9	0.8	1.8	3.3	0.0	2.5	0.4	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	1.5	0.9	1.3	88
autre raison	2.7	2.6	2.6	3.4	3.8	3.4	2.4	3.2	2.5	3.0	2.1	2.8	5.6	4.1	4.4	2.9	3.3	3.0	200
N**	2'469	992	3'512	411	131	564	212	62	282	696	142	856	196	758	954	4'243	2'315	6'674	6'674
données manquantes	10	5	15	7	3	10	0	0	0	7	5	12	0	4	4	25	18	43	43

T32b Destination des transferts, selon le problème principal¹ et chez les proches (2010)

Destination des transferts***	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
traitement résidentiel	34.2	42.0	36.5	25.6	43.8	27.3	28.6	23.1	28.6	27.3	0.0	21.1	0.0	15.4	13.3	28.8	35.1	30.3	83
prise en charge ambulatoire	42.5	42.0	42.1	41.9	43.8	40.9	42.9	76.9	61.9	45.5	100.0	52.6	50.0	69.2	66.7	44.5	54.1	47.4	130
appartement protégé	2.7	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.1	3
autre institution spécialisée	20.5	16.0	19.8	32.6	12.5	31.8	28.6	0.0	9.5	18.2	0.0	21.1	50.0	15.4	20.0	24.7	10.8	21.2	58
N**	73	50	126	43	16	66	7	13	21	11	4	19	2	13	15	146	111	274	274
données manquantes	61	27	88	18	3	21	5	3	8	10	2	12	2	7	9	102	48	150	150

T32c Cause de décès, selon le problème principal¹ et chez les proches (2010)

Cause de décès****	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
suicide	12.5	42.9	20.0	20.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	100.0	.	100.0	0.0	0.0	0.0	14.0	27.3	17.5	10
accident	15.6	14.3	15.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	9.1	12.3	7
maladie	50.0	14.3	42.5	20.0	100.0	42.9	20.0	0.0	20.0	0.0	.	0.0	0.0	100.0	100.0	41.9	45.5	43.9	25
surdose ou intoxication aiguë	9.4	14.3	10.0	60.0	0.0	42.9	40.0	0.0	40.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	9.1	15.8	9
autre cause de décès	12.5	14.3	12.5	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	9.1	10.5	6
N**	32	7	40	5	1	7	5	0	5	1	0	1	0	1	1	43	11	57	57
données manquantes	15	8	23	3	0	3	2	0	2	2	0	2	0	0	0	22	9	31	31

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s transféré-e-s. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s décédé-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2010)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
Durée de la prise en charge* (%)																			
1 semaine ou moins	4.5	4.1	4.3	3.8	2.2	3.3	1.9	1.6	1.8	4.7	6.1	4.8	12.2	8.1	9.0	4.8	5.3	4.9	326
> 1 semaine à 1 mois	3.4	2.8	3.2	3.4	3.0	3.1	1.9	4.8	2.5	8.3	7.5	8.0	4.6	4.6	4.6	4.2	3.8	4.0	268
> 1 à 2 mois	3.8	4.5	4.0	3.8	3.0	3.5	2.4	0.0	1.8	9.8	9.5	9.6	3.6	2.9	3.0	4.8	4.0	4.5	300
>2 à 3 mois	4.1	4.4	4.3	2.9	0.0	2.1	3.8	9.7	5.0	6.8	6.1	6.6	5.1	3.9	4.2	4.6	4.3	4.5	298
>3 à 6 mois	12.2	10.8	11.6	10.3	13.4	10.7	7.5	4.8	6.7	16.4	16.3	16.0	15.8	16.3	16.2	12.8	13.5	12.8	858
>6 mois à 1 an	28.0	28.3	27.8	30.8	29.9	29.4	34.0	25.8	31.2	33.5	29.9	32.2	31.6	37.0	35.9	30.2	31.7	30.3	2'028
>1 à 2 ans	23.0	24.5	23.8	22.8	23.9	22.6	25.5	25.8	24.8	15.1	17.7	15.7	19.9	16.8	17.4	21.6	21.6	21.7	1'453
>2 à 3 ans	9.1	9.3	9.3	9.4	11.2	9.4	11.3	9.7	12.4	3.6	5.4	4.4	4.6	5.8	5.5	7.8	7.8	8.0	539
>3 à 5 ans	8.1	7.4	7.8	9.1	9.7	9.8	8.0	12.9	9.2	1.6	0.7	1.8	2.6	4.2	3.9	6.5	5.8	6.4	426
>5 à 10 ans	3.4	3.3	3.3	3.4	2.2	4.7	2.8	4.8	3.9	0.3	0.7	0.6	0.0	0.4	0.3	2.5	1.9	2.5	168
plus de 10 ans	0.4	0.5	0.4	0.2	1.5	1.4	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.5	32
N**	2'466	992	3'509	416	134	572	212	62	282	702	147	867	196	762	958	4'252	2'328	6'696	6'696
<i>données manquantes</i>	13	5	18	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	16	5	21	21
Durée (en semaines)																			
moyenne	71.5	71.8	71.8	75.4	82.3	89.3	78.5	88.9	84.2	35.3	38.7	40.4	39.4	46.0	44.6	63.1	60.1	64.8	
écart-type	83.7	83.4	83.9	89.0	105.0	118.1	90.0	88.1	92.8	39.0	44.8	58.0	38.9	48.7	46.9	76.9	71.5	82.3	
1er quartile	20.9	22.5	21.4	24.7	26.1	26.1	28.5	26.7	28.1	9.0	9.1	9.4	11.6	15.0	14.6	18.0	18.4	18.4	
valeur médiane	44.2	46.7	45.9	46.9	50.1	49.1	50.7	55.5	53.1	26.7	26.4	27.6	29.9	31.9	31.4	39.0	38.6	39.7	
3e quartile	90.9	88.9	90.9	94.1	104.0	106.3	90.3	130.4	107.7	46.0	51.4	49.0	53.5	54.9	54.7	77.8	73.0	78.3	
N**	2'466	992	3'509	416	134	572	212	62	282	702	147	867	196	762	958	4'252	2'328	6'696	
<i>données manquantes</i>	13	5	18	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	16	5	21	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2010)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Substitution pendant la prise en charge*																
non	97.3	98.3	97.6	35.7	36.2	34.4	90.9	81.8	89.4	99.1	99.1	99.2	91.4	92.6	91.2	3'931
oui	2.7	1.7	2.4	64.3	63.8	65.6	9.1	18.2	10.6	0.9	0.9	0.8	8.6	7.4	8.8	377
N**	1'802	710	2'563	294	94	410	165	44	217	580	111	709	3'044	1'148	4'308	4'308
données manquantes	677	286	963	124	40	164	47	18	65	123	36	159	1'028	422	1'450	1'450
Type de substitution***																
héroïne	2.3	0.0	1.9	1.9	1.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.3	1.6	5
méthadone	58.1	27.3	51.9	86.2	92.9	87.9	84.6	75.0	81.0	60.0	100.0	66.7	80.0	81.3	80.3	244
autres opiacés	0.0	0.0	0.0	8.8	3.6	7.4	15.4	12.5	14.3	20.0	0.0	16.7	8.0	3.8	6.9	21
autres substances	39.5	72.7	46.3	3.1	1.8	2.8	0.0	12.5	4.8	20.0	0.0	16.7	10.2	13.8	11.1	34
N**	43	11	54	159	56	215	13	8	21	5	1	6	225	79	304	304
données manquantes	6	1	7	30	4	54	2	0	2	0	0	0	38	6	73	73
Substitution après la prise en charge*																
non	99.0	99.5	99.2	61.3	62.2	61.5	94.6	87.2	93.0	99.6	99.0	99.5	95.7	96.3	95.8	3'623
oui	1.0	0.5	0.8	38.7	37.8	38.5	5.4	12.8	7.0	0.4	1.0	0.5	4.3	3.7	4.2	157
N**	1'641	645	2'286	225	74	299	148	39	187	535	105	640	2'739	1'041	3'780	3'780
données manquantes	838	351	1'240	193	60	275	64	23	95	168	42	228	1'333	529	1'978	1'978
Type de substitution***																
prescription d'héroïne	12.5	0.0	10.5	8.0	10.7	8.7	0.0	20.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.6	10.3	8.3	13
traitement de substitution	87.5	100.0	89.5	92.0	89.3	91.3	100.0	80.0	92.3	100.0	100.0	100.0	92.4	89.7	91.7	144
N**	16	3	19	87	28	115	8	5	13	2	1	3	118	39	157	157
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s substitué-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2010)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Postcure prévue et mise en place*																
non	86.9	82.3	85.6	76.9	60.0	72.6	89.9	61.9	84.5	96.2	82.9	94.2	87.4	79.1	85.2	1'877
oui	13.1	17.7	14.4	23.1	40.0	27.4	10.1	38.1	15.5	3.8	17.1	5.8	12.6	20.9	14.8	325
N**	1'045	401	1'446	160	55	215	89	21	110	234	41	275	1'623	579	2'202	2'202
<i>données manquantes</i>	1'434	595	2'080	258	79	359	123	41	172	469	106	593	2'449	991	3'556	3'556
Type de la postcure prévue***																
appartement protégé de l'institution	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	1
service de postcure de l'institution	4.0	1.8	3.3	18.9	14.3	17.2	0.0	28.6	13.3	0.0	0.0	0.0	6.3	6.7	6.4	19
appartement protégé extérieur	4.0	1.8	3.3	2.7	4.8	3.4	12.5	0.0	6.7	11.1	0.0	6.3	4.2	1.9	3.4	10
service de postcure extérieur	8.0	12.5	9.4	5.4	9.5	6.9	25.0	14.3	20.0	11.1	14.3	12.5	8.4	12.5	9.8	29
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	18.4	26.8	21.0	10.8	4.8	8.6	12.5	0.0	6.7	22.2	28.6	25.0	16.2	17.3	16.6	49
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	2.4	1.8	2.2	8.1	23.8	13.8	37.5	14.3	26.7	0.0	0.0	0.0	5.2	7.7	6.1	18
autre centre de consultation	12.0	16.1	13.3	21.6	14.3	19.0	12.5	42.9	26.7	22.2	28.6	25.0	16.2	18.3	16.9	50
groupe d'entraide	7.2	7.1	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	4.8	5.1	15
groupe d'ancien-ne-s client-e-s de l'institution	1.6	7.1	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.8	2.0	6
autre	46.4	32.1	42.0	37.8	28.6	34.5	0.0	14.3	6.7	33.3	28.6	31.3	40.8	32.7	38.0	112
N**	125	56	181	37	21	58	8	7	15	9	7	16	191	104	295	295
<i>données manquantes</i>	12	15	27	0	1	1	1	1	2	0	0	0	13	17	30	30

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pour lesquels une postcure est prévue. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2010)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Problèmes addictifs*																
alcool	55.2	63.1	57.5	25.9	13.0	22.6	27.4	26.3	27.2	9.2	17.8	10.7	38.8	43.8	40.2	1'360
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.3	0.2	0.2	4.5	5.8	4.8	3.0	0.0	2.3	0.2	0.0	0.2	0.8	0.5	0.7	24
héroïne	0.8	0.9	0.8	61.7	52.2	59.3	9.6	5.3	8.7	0.4	0.0	0.3	6.4	4.5	5.9	198
méthadone	0.9	0.5	0.8	25.4	26.1	25.6	3.0	7.9	4.0	0.2	0.0	0.2	2.9	2.6	2.8	96
autres opiacés	0.2	0.0	0.1	4.0	5.8	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.4	15
cocaïne	1.9	1.5	1.8	10.0	11.6	10.4	40.7	47.4	42.2	1.5	6.9	2.4	4.7	4.5	4.6	157
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
amphétamines	0.1	0.2	0.1	0.5	1.4	0.7	0.0	5.3	1.2	0.8	2.0	1.0	0.4	0.9	0.5	18
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.1	0.0	0.1	0.0	1.4	0.4	1.5	7.9	2.9	0.0	3.0	0.5	0.2	0.7	0.4	13
autres stimulants	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	2
barbituriques	0.1	0.2	0.1	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
benzodizépines	0.8	2.2	1.2	19.9	17.4	19.3	3.0	7.9	4.0	0.0	0.0	0.0	2.6	3.5	2.8	96
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.3	0.2	1.0	1.4	1.1	0.0	2.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.4	13
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	0.0	0.3	0.1	4
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
cannabis	3.6	2.1	3.1	12.4	10.1	11.9	9.6	10.5	9.8	48.5	57.4	50.1	13.4	9.1	12.2	413
tabac	12.7	10.6	12.1	16.9	24.6	18.9	17.8	13.2	16.8	16.8	22.8	17.9	15.6	15.5	15.6	526
autres substances	0.5	0.0	0.3	1.5	0.0	1.1	0.7	0.0	0.6	0.2	0.0	0.2	0.5	0.2	0.4	15
jeu pathologique	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	1.4	0.7	1.2	42
troubles alimentaires	0.1	0.7	0.3	0.5	2.9	1.1	0.0	2.6	0.6	0.0	1.0	0.2	0.2	5.7	1.8	60
autres troubles assimilable à une addiction	0.1	0.2	0.1	0.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.6	19
aucun	39.2	34.2	37.8	17.9	26.1	20.0	35.6	34.2	35.3	43.9	34.7	42.3	37.9	32.5	36.3	1'229
N**	1'452	585	2'037	201	69	270	135	38	173	476	101	577	2'430	952	3'382	3'382
<i>données manquantes</i>	<i>1'027</i>	<i>411</i>	<i>1'489</i>	<i>216</i>	<i>65</i>	<i>303</i>	<i>77</i>	<i>24</i>	<i>109</i>	<i>227</i>	<i>46</i>	<i>291</i>	<i>1'641</i>	<i>617</i>	<i>2'374</i>	<i>2'374</i>

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T37 Fréquence des rechutes, substance ou comportement impliqué et durée des rechutes pendant la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2010)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence des rechutes*																
aucune	53.8	41.6	50.4	22.7	28.1	24.3	53.1	42.1	50.6	76.6	60.0	74.1	55.0	43.2	51.9	741
une fois	10.8	10.4	10.7	6.7	12.5	8.4	10.9	21.1	13.3	5.5	12.0	6.5	9.6	10.7	9.9	141
deux fois	6.4	10.0	7.4	8.0	6.3	7.5	9.4	5.3	8.4	6.2	0.0	5.3	6.5	8.6	7.1	101
trois ou quatre fois	14.0	16.5	14.7	25.3	21.9	24.3	7.8	15.8	9.6	5.5	20.0	7.6	13.5	17.2	14.5	207
cinq fois ou plus	15.0	21.5	16.9	37.3	31.3	35.5	18.8	15.8	18.1	6.2	8.0	6.5	15.4	20.3	16.7	239
N**	706	279	985	75	32	107	64	19	83	145	25	170	1'045	384	1'429	1'429
données manquantes	1'773	717	2'541	343	102	467	148	43	199	558	122	698	3'027	1'186	4'329	4'329
Substance/comportement addictif lors des rechutes***																
alcool	97.7	97.5	97.6	29.3	9.5	24.1	37.9	20.0	33.3	12.5	33.3	17.1	75.4	78.8	76.5	502
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.6	0.0	0.4	1.7	4.8	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	0.8	5
opiacés	4.2	0.6	3.0	81.0	95.2	84.8	27.6	30.0	28.2	6.3	0.0	4.9	15.8	12.0	14.6	96
cocaïne et dérivés	4.9	2.5	4.1	24.1	23.8	24.1	75.9	90.0	79.5	9.4	0.0	7.3	12.3	8.7	11.1	73
stimulants	1.0	0.0	0.6	1.7	0.0	1.3	3.4	0.0	2.6	3.1	0.0	2.4	1.3	0.0	0.9	6
médicaments	1.9	2.5	2.1	31.0	33.3	31.6	3.4	30.0	10.3	0.0	0.0	0.0	6.0	8.2	6.7	44
hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
cannabis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	1
tabac	5.2	1.3	3.9	22.4	19.0	21.5	13.8	10.0	12.8	81.3	77.8	80.5	14.1	6.7	11.7	77
substances volatiles	2.3	0.6	1.7	5.2	9.5	6.3	3.4	10.0	5.1	9.4	0.0	7.3	4.0	2.4	3.5	23
autres substances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	1
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.7	11
troubles alimentaires	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9	0.8	5
autres troubles assimilables à une addiction	0.3	0.0	0.2	0.0	4.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	0.8	5
N**	308	159	467	58	21	79	29	10	39	32	9	41	448	208	656	656
données manquantes	18	4	22	0	2	2	1	1	2	2	1	3	22	10	32	32
Durée des rechutes****																
1 à 2 jours	30.2	21.2	27.3	7.7	22.2	13.6	35.3	71.4	45.8	45.0	50.0	45.5	31.3	25.3	29.5	84
3 à 6 jours	23.7	30.3	25.9	23.1	22.2	22.7	17.6	0.0	12.5	20.0	50.0	22.7	21.7	28.7	23.9	68
7 à 10 jours	10.1	6.1	8.8	15.4	11.1	13.6	17.6	0.0	12.5	15.0	0.0	13.6	12.1	5.7	10.2	29
>10 jours à 2 semaines	0.7	6.1	2.4	7.7	0.0	4.5	5.9	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	1.5	4.6	2.5	7
>2 à 4 semaines	12.9	9.1	11.7	7.7	11.1	9.1	0.0	14.3	4.2	10.0	0.0	9.1	11.6	10.3	11.2	32
>4 à 6 semaines	5.8	16.7	9.3	0.0	11.1	4.5	11.8	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	5.6	13.8	8.1	23
>6 à 8 semaines	4.3	1.5	3.4	7.7	0.0	4.5	5.9	0.0	4.2	5.0	0.0	4.5	4.5	1.1	3.5	10
>2 mois	12.2	9.1	11.2	30.8	22.2	27.3	5.9	14.3	8.3	5.0	0.0	4.5	11.6	10.3	11.2	32
N**	139	66	205	13	9	22	17	7	24	20	2	22	198	87	285	285
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Pourcentages par colonne, une seule catégorie possible

T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal¹ (selement patient-e-s) (2010)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	34.9	41.7	37.0	6.1	9.4	7.0	9.8	35.7	14.7	17.5	18.2	17.6	28.4	37.6	31.0	390
1 jour par semaine ou moins	1.0	2.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	4.2	1.5	1.4	1.5	19
2 à 3 jours par semaine	0.3	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	4.2	0.0	3.5	0.9	0.9	0.9	11
4 à 6 jours par semaine	0.7	1.6	0.9	1.2	0.0	0.9	1.6	0.0	1.3	0.8	4.5	1.4	1.0	1.4	1.1	14
une fois par jour	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.5	2.8	1.0	0.3	0.8	10
plusieurs fois par jour	62.2	53.9	59.8	92.7	90.6	92.1	86.9	64.3	82.7	70.0	72.7	70.4	67.2	58.3	64.8	816
N**	601	254	855	82	32	114	61	14	75	120	22	142	912	348	1'260	1'260
<i>données manquantes</i>	1'878	742	2'671	336	102	460	151	48	207	583	125	726	3'160	1'222	4'498	4'498
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10 cigarettes par jour	20.2	24.3	21.3	6.7	14.3	9.1	15.0	14.3	14.9	55.7	38.5	53.0	24.2	23.8	24.1	145
11 à 20 cigarettes par jour	41.1	44.7	42.1	57.8	33.3	50.0	40.0	57.1	42.6	27.1	46.2	30.1	40.7	42.9	41.3	248
21 à 30 cigarettes par jour	28.4	21.4	26.5	31.1	47.6	36.4	35.0	28.6	34.0	15.7	15.4	15.7	26.4	25.9	26.3	158
31 cigarettes par jour ou plus	10.3	9.7	10.1	4.4	4.8	4.5	10.0	0.0	8.5	1.4	0.0	1.2	8.6	7.5	8.3	50
N**	282	103	385	45	21	66	40	7	47	70	13	83	454	147	601	601
<i>données manquantes</i>	109	45	154	32	8	40	15	2	17	29	5	34	199	70	269	269

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème¹ (seulement patient-e-s) (2010)

	Patient-e-s: principale substance posant problème ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Objectif de consommation*																
abstinence définitive	36.4	39.1	37.2	57.5	65.0	59.4	67.5	71.4	68.4	47.4	47.1	47.3	41.4	44.2	42.1	773
abstinence limitée dans le temps	15.7	11.7	14.6	4.2	2.5	3.8	6.5	0.0	5.1	10.5	2.9	9.4	12.6	9.2	11.7	214
consommation contrôlée	33.3	32.6	33.1	14.2	12.5	13.8	11.7	14.3	12.2	16.8	32.4	19.2	29.1	29.3	29.2	535
aucune limitation envisagée	4.5	2.9	4.0	5.0	7.5	5.6	2.6	0.0	2.0	7.4	0.0	6.3	4.9	2.9	4.4	80
pas déterminé pour l'instant	9.4	13.4	10.5	16.7	10.0	15.0	9.1	9.5	9.2	17.9	17.6	17.9	11.1	13.4	11.7	215
autre	0.7	0.3	0.6	2.5	2.5	2.5	2.6	4.8	3.1	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	0.9	17
N**	873	350	1'223	120	40	160	77	21	98	190	34	224	1'343	491	1'834	1'834
<i>données manquantes</i>	<i>1'606</i>	<i>646</i>	<i>2'303</i>	<i>298</i>	<i>94</i>	<i>414</i>	<i>135</i>	<i>41</i>	<i>184</i>	<i>513</i>	<i>113</i>	<i>644</i>	<i>2'729</i>	<i>1'079</i>	<i>3'924</i>	<i>3'924</i>
Pronostic*																
très bon pronostic	13.2	14.2	13.5	7.9	7.8	7.9	11.8	8.7	11.1	20.1	21.9	20.4	13.4	14.3	13.6	259
bon pronostic	48.1	40.2	45.9	17.3	41.2	23.7	44.7	65.2	49.5	54.0	56.3	54.3	46.3	42.8	45.3	861
plutôt mauvais pronostic	29.1	36.6	31.2	51.1	25.5	44.2	26.3	21.7	25.3	21.7	18.8	21.3	29.8	32.6	30.6	581
mauvais pronostic	9.6	8.9	9.4	23.7	25.5	24.2	17.1	4.3	14.1	4.2	3.1	4.1	10.5	10.4	10.5	199
N**	912	358	1'270	139	51	190	76	23	99	189	32	221	1'388	512	1'900	1'900
<i>données manquantes</i>	<i>1'567</i>	<i>638</i>	<i>2'205</i>	<i>279</i>	<i>83</i>	<i>362</i>	<i>136</i>	<i>39</i>	<i>175</i>	<i>514</i>	<i>115</i>	<i>629</i>	<i>2'684</i>	<i>1'058</i>	<i>3'742</i>	<i>3'742</i>

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

ANNEXE

A1 Données de base d'institutions non participantes: Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal (2010)

	Patient-e-s: problème principal												Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Sexe*																
hommes			66.1			68.6			82.1			72.9			68.1	1'419
femmes			33.9			31.4			17.9			27.1			31.9	664
sexe pas connu			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	676	346	1'022	205	94	299	78	17	95	218	81	299	1'419	664	2'083	2'083
Age (en années)*																
jusqu'à 14	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.9	3.3	0.5	0.8	0.6	12
15-19	1.9	2.3	2.1	3.4	3.3	3.4	2.6	0.0	2.1	40.4	46.9	42.1	8.9	9.0	8.9	185
20-24	3.7	5.5	4.3	14.7	27.2	18.6	15.6	23.5	17.0	14.2	14.8	14.4	8.8	10.5	9.4	194
25-29	8.6	5.0	7.4	10.8	13.0	11.5	20.8	35.3	23.4	13.8	11.1	13.0	11.0	8.8	10.3	213
30-34	10.5	8.7	9.9	18.6	19.6	18.9	24.7	17.6	23.4	14.2	2.5	11.0	13.0	10.0	12.1	250
35-39	11.9	11.4	11.7	21.1	19.6	20.6	13.0	5.9	11.7	6.9	6.2	6.7	12.0	11.2	11.7	243
40-44	15.6	15.2	15.4	18.6	7.6	15.2	14.3	17.6	14.9	4.6	3.7	4.3	14.1	13.1	13.7	285
45-49	14.1	10.8	13.0	9.3	8.7	9.1	9.1	0.0	7.4	0.9	4.9	2.0	10.6	10.5	10.6	219
50-54	11.3	13.1	11.9	3.4	1.1	2.7	0.0	0.0	0.0	1.8	4.9	2.7	7.9	9.6	8.4	174
55-59	11.9	9.6	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	5.9	6.6	136
60-64	5.6	7.3	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	3.3	4.4	3.7	76
65-69	2.4	6.1	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.6	2.2	46
70-74	1.8	2.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.4	1.2	24
75 et plus	0.7	2.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	0.8	16
N**	674	343	1'017	204	92	296	77	17	94	218	81	299	1'414	659	2'073	2'073
données manquantes	2	3	5	1	2	3	1	0	1	0	0	0	5	5	10	10
Age (valeurs centrales)																
moyenne	44.3	46.1	44.9	34.9	31.8	33.9	32.8	30.7	32.4	25.0	24.6	24.9	38.6	40.0	39.0	
écart-type	12.5	14.1	13.1	8.6	8.9	8.8	7.9	7.3	7.8	9.3	10.9	9.8	13.6	15.0	14.1	
1er quartile	35.0	36.7	35.2	27.8	23.9	26.4	26.7	26.0	26.0	17.4	17.0	17.2	28.1	27.3	28.0	
valeur médiane	44.0	45.7	44.4	35.4	31.2	34.3	31.0	28.0	30.8	22.0	19.6	21.0	38.0	39.9	38.5	
3e quartile	53.6	56.0	54.1	41.4	38.3	40.6	38.94	34.5	38.9	30.9	28.6	30.7	48.0	50.2	48.9	
N**	674	343	1'017	204	92	296	77	17	94	218	81	299	1'414	659	2'073	
données manquantes	2	3	5	1	2	3	1	0	1	0	0	0	5	5	10	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

A2 Données de base d'institutions non participantes: Problème principal à l'admission (patient-e-s) (2010)

Tous patients et patientes				
	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	
Problème principal*				
alcool	56.0	58.9	56.9	1'186
opiacés	16.6	17.0	16.8	349
cocaïne	6.1	3.3	5.2	109
stimulants	0.5	0.5	0.5	10
hypnotiques/sedatives	0.9	4.1	1.9	40
hallucinogènes	0.0	0.2	0.0	1
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0
cannabis	13.7	13.1	13.5	282
tabac	0.3	0.2	0.2	5
autre substance	4.3	2.0	3.6	74
non lié à une substance	1.5	0.9	1.3	27
N**	1'419	664	2'083	2'083
<i>données manquantes</i>	0	0	0	0

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu