

act-info - SAMBAD
Prise en charge ambulatoire
des problèmes de dépendance
Résultats du monitoring de la clientèle 2020



Etienne Maffli

Lausanne, décembre 2021

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du monitoring *act-info*. Nous remercions également les collaborateurs et collaboratrices des services de consultation qui ont effectué les tâches de logistique et de saisie. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau *act-info*. Un grand merci également à Edith Bacher et Diane Jaccard pour la conception graphique de ce rapport.

Compléments d'information: Etienne Maffli, tél. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emaffli@addictionsuisse.ch

Réalisation: Etienne Maffli
Addiction Suisse

Diffusion: Recherche, Addiction Suisse, Av. Louis-Ruchonnet 14,
1003 Lausanne, tél. 021/321 29 46, fax 021 321 29 40,
e-mail cgmell@addictionsuisse.ch

Langue du texte original: allemand

Graphisme/mise en page: Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse, Lausanne 2021

Citation recommandée: Maffli, E. (2021). Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance: résultats du monitoring de la clientèle 2020. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act- <i>info</i> – addiction care and therapy <i>information</i>	5
act- <i>info</i> dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD). 6	6
Explications concernant les graphiques et tableaux.....	7

TRENDS

G1	Problème principal à l'admission alcool: évolution 2013-2020
G2	Problème principal à l'admission opioïdes: évolution 2013-2020
G3	Problème principal à l'admission cocaïne ou dérivés: évolution 2013-2020
G4	Problème principal à l'admission autres stimulants: évolution 2013-2020
G5	Problème principal à l'admission cannabis: évolution 2013-2020
G6	Problème principal à l'admission hypnotiques/sédatifs: évolution 2013-2020
G7	Problème principal à l'admission jeu de hasard: évolution 2013-2020

ADMISSION

T1	Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2020)
T2	État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2020)
T3	Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2020)
T4	Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2020)
T5	Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2020)
T6	Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2020)
T7	Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2020)
T8	Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)
T9	Instance d'envoi principale, selon le problème principal et chez les proches (2020)
T10	Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire et type de mesure, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)
T11	Traitements/prises en charge avant l'admission et type de prises en charge antérieures, selon le problème principal et chez les proches (2020)
T12	Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)
T13	Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2020)
T14	Usage de substances multiples et combinaisons de substances (2020)
T15.1a	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2020), hommes

T15.1b	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2020), femmes
T15.1c	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2020), hommes
T15.2a	Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2020), hommes
T15.2b	Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2020), femmes
T15.2c	Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2020), hommes et femmes
T16.1a	Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2020), hommes
T16.1b	Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2020), femmes
T16.1c	Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2020), hommes et femmes
T16.2a	Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2020), hommes
T16.2b	Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2020), femmes
T16.2c	Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2020), hommes et femmes
T17	Mode d'administration prédominant de la principale substance posant problème avant l'admission (2020)
T18.1	Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 12 derniers mois avant l'admission des injections et échange de matériel d'injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)
T18.2	Âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)
T19.1a	Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2020), hommes
T19.1b	Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2020), femmes
T19.1c	Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2020), hommes et femmes
T19.2a	Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2020), hommes
T19.2b	Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2020), femmes
T19.2c	Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2020), hommes et femmes
T20.1a	Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)
T20.1b	Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)
T21	Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)

T22	Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)
T23a	Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2020), hommes
T23b	Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2020), femmes
T23c	Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2020), hommes et femmes
T24a	Problèmes psychiques au cours de la vie (2020), hommes
T24a	Problèmes psychiques au cours de la vie (2020), femmes
T24a	Problèmes psychiques au cours de la vie (2020), hommes et femmes
T25	Proches: lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2020)
T26	Proches: problème principal de la tierce personne (2020)

SORTIE

T27	Sexe et âge, selon le problème principal et chez les proches (2020)
T28	État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2020)
T29	Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2020)
T30	Source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2020)
T31	Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2020)
T32a	Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2020)
T32b	Destination des transferts, selon le problème principal et chez les proches (2020)
T32c	Cause de décès, selon le problème principal et chez les proches (2020)
T33	Durée de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2020)
T34	Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)
T35	Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)
T36	Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)
T37	Fréquence des rechutes et substance ou comportement impliqué pendant la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)
T38	Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)
T39	Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème (seulement patient-e-s) (2020)

act-info - addiction care and therapy information

Le Réseau de monitoring (act-info) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse:

- SAMBAD (Statistique du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance)
- Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Substitution (Statistique nationale des traitements par agonistes opioïdes de substitution)

Ces cinq statistiques disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés. Les données communes sont intégrées dans une base de données centralisée, permettant ainsi de procéder à des analyses sur l'ensemble des secteurs. Avec l'adoption des standards européens (Treatment Demand Indicator), la comparabilité des données au plan international est également garantie.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La réalisation des relevés dans l'ensemble des domaines de traitement est effectuée dès 2018 par Addiction Suisse.

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)

Les instruments de monitoring act-info ont été introduits en 2004 dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance et ont remplacé les anciens questionnaires en vigueur depuis 1994. Après plusieurs années d'utilisation, une révision de ces instruments a eu lieu et les nouveaux questionnaires ont été introduits en 2013. Ce processus a été harmonisé avec la révision des normes européennes. Toutes les institutions n'ont cependant pas pu implémenter les questionnaires révisés. En outre, une version raccourcie est également disponible dans le domaine ambulatoire de façon à répondre aux différents besoins. Ces particularités expliquent en partie pourquoi il y a un nombre relativement élevé de valeurs manquantes pour certaines questions.

La statistique act-info SAMBAD offre un aperçu de la clientèle de l'aide ambulatoire en matière de dépendance en Suisse. Les données sont récoltées au début et à la fin de la prise en charge. Les informations rassemblées à l'admission renseignent en particulier sur les caractéristiques sociodémographiques des client-e-s, sur leurs expériences de traitement ainsi que sur leurs modes de consommation et problèmes psychosociaux avant la prise en charge. Les informations récoltées à la sortie rendent principalement compte des circonstances de la fin de la prise en charge et des caractéristiques sociodémographiques des client-e-s à ce moment.

En 2020, 54 institutions du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance ont participé au monitoring act-info. Il s'agit de services de consultation spécialisés pour les problèmes liés à l'alcool et/ou aux drogues illégales ainsi que de divers types de services polyvalents offrant également une aide pour les problèmes addictifs. Les Institutions qui ne participent pas au monitoring act-info ont été interrogées dans le cadre d'une vaste enquête ayant pour objectif une estimation de l'ensemble de la demande en matière de traitement. Les résultats de cette enquête figurent dans le rapport global act-info (rapport annuel 2020) publié également fin 2021.

Explications concernant les graphiques et tableaux

La première partie présente les tendances de base du monitoring act-*info* dans le domaine de l'aide psychosociale ambulatoire en matière de dépendance sous forme de graphiques (2013-2020). Les thèmes retenus comprennent la demande en matière de traitement, la répartition des sexes et la structure des âges en fonction du problème principal (alcool, opioïdes, cocaïne ou dérivés, autres stimulants, cannabis, hypnotiques/sédatifs et jeux de hasard).

La deuxième partie présente des résultats détaillés concernant les admissions de l'année de référence 2020 (couleur de fond verte) et la troisième partie les résultats concernant les sorties (couleur de fond bleue). Ces statistiques descriptives prennent en compte toutes les questions des instruments de l'enquête. Il convient de distinguer deux types de tableaux:


- lorsque la question a des catégories de réponses prédéfinies ou recodées en tranches distinctes (par exemple "état civil" ou "âge"), le tableau indique les pourcentages des différentes catégories de réponses
- lorsque la question n'a pas de catégories prédéfinies, mais requiert une valeur numérique (par exemple "âge au début de la consommation problématique"), le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1er quartile, 3e quartile)

La plupart des tableaux présentent les résultats de façon distincte pour les sous-groupes de patients et patientes ayant mentionné l'**alcool**, un **opioïde** (héroïne notamment), la **cocaïne** (et dérivés) ou le **cannabis** comme problème principal au moment de leur admission. Les **proches** venant consulter pour les problèmes d'un tiers font également l'objet d'analyses séparées pour les aspects sociodémographiques. A l'exception des thèmes directement liés aux modes de consommation ou aux formes de comportements addictifs non liés aux substances, les résultats ne sont en revanche pas présentés séparément pour les client-e-s (peu nombreux) ayant mentionné d'autres substances (par exemple un stimulant ou les substances volatiles) ou un problème addictif non lié à une substance (par exemple jeu pathologique) comme problème principal. Ces personnes sont cependant incluses dans les analyses portant sur l'ensemble des prises en charge figurant dans les blocs à droite des tableaux respectifs. Toutes les analyses sont effectuées séparément pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour les deux sexes confondus (colonnes "Total" comprenant le cas échéant également les quelques personnes dont le sexe n'est pas connu).




Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes sont exclues des analyses. Le nombre de réponses valides **N** représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages ou autres paramètres. Celui-ci est indiqué pour chaque groupe ou sous-groupe considéré. Au-dessous, le nombre correspondant de données manquantes figure également. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés particulièrement prudemment.

Des notes en bas de tableau renseignent sur les éventuelles particularités des groupes de référence ainsi que sur le type de question. Lorsque plusieurs réponses sont possibles (par exemple aux tableaux du thème T19, "autres problèmes addictifs") les pourcentages obtenus ne sont pas additifs.


G1 Problème principal à l'admission alcool: évolution 2013-2020






Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante




G2 Problème principal à l'admission opioïdes: évolution 2013-2020






Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante




G3 Problème principal à l'admission cocaïne ou dérivés: évolution 2013-2020






Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante




G4 Problème principal à l'admission autres stimulants: évolution 2013-2020






Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante







G5 Problème principal à l'admission cannabis: évolution 2013-2020




Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante






G6 Problème principal à l'admission hypnotiques/sédatifs: évolution 2013-2020



G7 Problème principal à l'admission jeu de hasard: évolution 2013-2020



Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante



T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2020)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sexe*																			
hommes	68,1			69,9			83,8			79,4			22,3			63,1			3 845
femmes	31,9			30,1			16,2			20,6			77,7			36,9			2 247
sexe pas connu	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0
N**	1 701	795	2 496	107	46	153	367	71	438	931	242	1 173	241	839	1 080	3 845	2 247	6 092	6 092
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	7,0	5,0	3,0	1,2	1,6	2,3	1,8	2,1	128
15-19	2,3	2,6	2,4	2,8	4,3	3,3	5,4	4,2	5,3	56,9	52,1	55,9	6,8	1,6	2,7	18,4	10,1	15,4	933
20-24	4,1	2,6	3,6	7,5	6,5	7,2	13,4	7,0	12,3	11,7	15,3	12,4	4,2	4,1	4,1	8,0	5,6	7,1	431
25-29	7,4	5,3	6,7	6,6	10,9	7,9	21,3	36,6	23,7	10,2	9,9	10,1	4,7	6,1	5,8	9,4	7,9	8,9	539
30-34	10,8	9,2	10,3	15,1	15,2	15,1	21,8	26,8	22,6	5,2	4,5	5,0	5,5	10,2	9,2	10,9	9,9	10,5	640
35-39	12,4	14,4	13,0	18,9	8,7	15,8	19,3	8,5	17,6	5,9	2,9	5,3	4,2	9,6	8,4	10,6	10,5	10,6	642
40-44	11,8	11,6	11,7	17,0	15,2	16,4	7,9	11,3	8,4	2,4	4,1	2,7	9,7	10,8	10,6	8,7	10,0	9,2	556
45-49	12,3	11,6	12,1	7,5	17,4	10,5	5,7	1,4	5,0	1,7	0,8	1,5	14,0	16,1	15,7	8,2	11,4	9,3	568
50-54	13,8	13,5	13,7	14,2	13,0	13,8	3,5	2,8	3,4	1,0	1,7	1,1	11,9	14,6	14,0	8,5	11,4	9,6	583
55-59	11,0	13,1	11,7	6,6	4,3	5,9	1,6	0,0	1,4	0,2	1,7	0,5	14,8	12,8	13,2	6,7	10,3	8,0	488
60-64	6,9	7,9	7,3	0,9	2,2	1,3	0,0	1,4	0,2	0,1	0,0	0,1	7,6	6,0	6,4	3,8	5,4	4,4	266
65-69	3,6	4,0	3,8	0,9	2,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	7,6	3,6	4,5	2,4	3,0	2,7	161
70-74	2,4	2,8	2,5	1,9	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	1,9	2,4	1,4	1,8	1,5	94
75 et plus	1,0	1,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,3	1,4	0,6	1,0	0,8	46
N**	1 701	794	2 495	106	46	152	367	71	438	931	242	1 173	236	831	1 067	3 838	2 237	6 075	6 075
données manquantes	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	8	13	7	10	17	17
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	45,3	46,5	45,7	40,6	40,2	40,5	32,9	31,9	32,8	22,3	22,6	22,4	46,3	45,7	45,8	36,8	41,5	38,5	
écart-type	13,6	13,4	13,5	11,7	11,8	11,7	8,8	8,1	8,7	8,9	9,4	9,0	17,2	13,5	14,4	15,8	15,4	15,9	
1er quartile	35,1	37,2	35,5	33,8	32,2	33,3	26,5	27,3	26,9	16,6	16,5	16,6	34,9	36,1	36,0	22,7	29,8	25,2	
valeur médiane	45,7	46,4	45,9	39,7	40,9	40,3	32,2	30,2	31,6	17,8	18,3	17,9	49,2	46,7	47,5	35,4	42,0	37,7	
3e quartile	55,0	56,4	55,5	49,9	47,6	49,3	38,10	35,0	37,9	25,7	25,1	25,6	58,1	55,1	55,7	49,1	53,2	51,0	
N**	1 701	794	2 495	106	46	152	367	71	438	931	242	1 173	241	833	1 074	3 843	2 240	6 083	
données manquantes	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	2	7	9	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2020)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Etat civil*																			
célibataire	44,7	39,3	42,9	66,0	63,4	65,2	75,2	71,4	74,6	92,4	86,2	91,1	29,2	26,0	26,7	61,5	44,6	55,3	3 137
marié-e	33,2	26,2	31,0	17,0	14,6	16,3	17,1	8,6	15,7	3,6	8,0	4,5	50,5	51,4	51,2	23,4	31,2	26,3	1 492
séparé-e	4,7	3,9	4,5	2,1	2,4	2,2	3,1	0,0	2,6	0,6	0,0	0,5	3,3	3,4	3,4	3,0	2,8	2,9	167
divorcé-e	15,5	25,0	18,6	12,8	19,5	14,8	3,7	12,9	5,2	1,7	4,0	2,2	14,6	15,5	15,3	9,8	17,3	12,6	714
veuf/veuve	0,9	4,8	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	1,2	0,9	2,7	2,3	1,0	3,0	1,7	99
partenariat enregistré	1,0	0,8	0,9	2,1	0,0	1,5	0,9	7,1	1,9	0,6	0,4	0,6	1,4	1,0	1,1	1,2	1,1	1,2	66
N**	1 608	751	2 359	94	41	135	351	70	421	863	225	1 088	212	769	981	3 581	2 094	5 675	5 675
données manquantes	93	44	137	13	5	18	16	1	17	68	17	85	29	70	99	264	153	417	417
Nationalité*																			
Suisse/FL	72,7	80,6	75,2	64,8	69,6	66,2	71,1	77,5	72,1	80,8	79,8	80,6	80,8	78,5	79,1	75,0	79,7	76,7	4 646
UE	15,0	11,2	13,8	18,1	15,2	17,2	16,0	5,6	14,3	9,2	6,7	8,7	7,5	9,6	9,1	12,9	9,7	11,7	707
autre	12,3	8,2	11,0	17,1	15,2	16,6	12,9	16,9	13,6	10,0	13,4	10,7	11,7	11,9	11,8	12,2	10,6	11,6	702
N**	1 688	793	2 481	105	46	151	363	71	434	927	238	1 165	240	834	1 074	3 819	2 236	6 055	6 055
données manquantes	13	2	15	2	0	2	4	0	4	4	4	8	1	5	6	26	11	37	37

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2020)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	9,2	8,4	9,0	0,9	0,0	0,7	7,8	15,7	9,0	3,0	4,7	3,4	10,9	11,6	11,4	6,7	8,6	7,4	442
périphérie des grands centres	19,8	22,4	20,6	15,0	9,3	13,3	20,8	14,3	19,7	9,2	11,0	9,6	23,6	18,7	19,7	16,4	17,5	16,8	1 003
villes de moyenne importance	11,1	12,3	11,5	5,6	14,0	8,0	14,7	14,3	14,6	23,2	24,2	23,4	17,9	13,9	14,8	15,9	15,6	15,8	944
petites villes	31,4	30,2	31,0	38,3	44,2	40,0	37,4	32,9	36,7	34,8	33,5	34,5	24,9	29,6	28,6	33,3	31,1	32,5	1 938
campagne	28,4	26,7	27,8	40,2	32,6	38,0	19,4	22,9	20,0	29,8	26,7	29,2	22,7	26,2	25,5	27,7	27,1	27,5	1 641
N**	1 679	782	2 461	107	43	150	361	70	431	923	236	1 159	229	804	1 033	3 783	2 185	5 968	5 968
données manquantes	22	13	35	0	3	3	6	1	7	8	6	14	12	35	47	62	62	124	124
Type de ménage (30 derniers jours)*																			
seul-e en ménage	35,2	33,8	34,8	44,3	28,9	39,3	33,9	31,0	33,4	14,1	14,8	14,3	11,0	12,9	12,5	27,8	25,0	26,9	1 288
avec famille d'origine	6,9	5,5	6,5	15,2	18,4	16,2	23,4	12,1	21,7	66,1	53,2	63,4	14,3	6,5	8,1	26,9	16,2	23,4	1 120
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	46,8	52,3	48,5	25,3	42,1	30,8	32,0	39,7	33,2	9,2	16,2	10,6	70,3	78,8	77,0	34,1	49,6	39,2	1 880
avec des amis ou d'autres personnes	3,6	3,3	3,5	1,3	2,6	1,7	4,4	6,9	4,8	3,8	5,6	4,2	2,2	1,5	1,6	3,6	4,0	3,8	180
en prison	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	1,9	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	14
institution/foyer	3,4	1,6	2,8	10,1	5,3	8,5	2,2	5,2	2,7	2,7	1,4	2,4	0,0	0,0	0,0	3,2	1,6	2,7	127
hôpital/clinique	1,6	1,8	1,7	1,3	0,0	0,9	0,9	1,7	1,1	0,2	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	1,0	46
autre	2,2	1,7	2,1	2,5	2,6	2,6	0,9	3,4	1,3	3,6	8,3	4,6	2,2	0,3	0,7	2,9	2,6	2,8	135
N**	1 482	704	2 186	79	38	117	316	58	374	808	216	1 024	91	340	431	3 206	1 584	4 790	4 790
données manquantes	219	91	310	28	8	36	51	13	64	123	26	149	150	499	649	639	663	1 302	1 302
Situation de domicile (30 dernier jours)*																			
logement stable	92,8	95,2	93,6	87,0	83,3	85,8	90,1	86,2	89,4	93,6	90,3	92,9	96,2	98,4	98,0	92,7	94,8	93,4	4 661
logement instable/SDF	2,8	2,2	2,6	1,3	13,9	5,3	5,6	7,7	5,9	2,4	4,8	2,9	1,9	1,6	1,6	2,9	2,9	2,9	145
en prison	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,6	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	13
institution/foyer/hôpital/autre	4,1	2,6	3,6	11,7	2,8	8,8	2,5	6,2	3,1	3,8	4,8	4,0	1,9	0,0	0,4	3,9	2,3	3,4	170
N**	1 519	724	2 243	77	36	113	322	65	387	844	227	1 071	106	386	492	3 319	1 670	4 989	4 989
données manquantes	182	71	253	30	10	40	45	6	51	87	15	102	135	453	588	526	577	1 103	1 103

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2020)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	41,5	45,0	42,6	68,6	60,0	66,0	41,3	46,2	42,0	74,9	63,6	72,4	28,9	25,6	26,2	51,7	42,8	48,5	1 492
relations temporaires	2,2	3,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,0	3,8	2,3	3,0	3,5	3,1	0,0	0,3	0,3	2,2	2,3	2,2	69
partenaire fixe, vivant séparé	9,3	12,0	10,2	8,6	13,3	10,0	16,0	23,1	17,0	15,4	17,5	15,8	3,9	12,8	11,0	11,4	14,3	12,4	381
partenaire fixe, ménage commun	47,0	40,0	44,8	22,9	26,7	24,0	40,7	26,9	38,6	6,8	15,4	8,7	67,1	61,3	62,5	34,7	40,7	36,8	1 132
N**	943	440	1 383	35	15	50	150	26	176	501	143	644	76	305	381	1 987	1 087	3 074	3 074
données manquantes	758	355	1 113	72	31	103	217	45	262	430	99	529	165	534	699	1 858	1 160	3 018	3 018
Nombre d'enfants propres*																			
aucun	41,0	41,2	41,0	48,8	66,7	53,4	63,1	58,3	62,3	92,8	89,3	92,0	35,7	30,1	31,3	61,7	49,8	57,3	1 906
1 enfant	17,5	21,6	18,9	27,9	13,3	24,1	20,2	27,8	21,6	3,5	3,9	3,6	13,3	17,4	16,5	12,5	16,4	13,9	463
2 enfants	28,2	28,4	28,3	20,9	20,0	20,7	10,1	11,1	10,3	2,5	6,2	3,4	36,7	34,5	35,0	17,7	23,8	19,9	663
3 enfants ou plus	13,3	8,8	11,8	2,3	0,0	1,7	6,5	2,8	5,9	1,2	0,6	1,0	14,3	18,0	17,2	8,1	10,1	8,8	293
N**	901	464	1 365	43	15	58	168	36	204	598	178	776	98	362	460	2 102	1 223	3 325	3 325
données manquantes	800	331	1 131	64	31	95	199	35	234	333	64	397	143	477	620	1 743	1 024	2 767	2 767
Nombre d'enfants dans le ménage*																			
aucun	68,9	66,3	68,0	88,5	72,7	83,8	76,0	82,1	77,1	77,1	87,7	79,5	47,8	45,4	45,9	71,5	64,4	68,8	1 946
1 enfant	12,2	16,6	13,6	7,7	18,2	10,8	10,9	14,3	11,5	5,9	4,8	5,6	28,3	22,6	23,8	10,7	15,8	12,6	357
2 enfants	14,5	15,5	14,9	3,8	0,0	2,7	7,8	3,6	7,0	11,7	6,8	10,7	17,4	24,3	22,8	12,9	15,6	13,9	393
3 enfants ou plus	4,4	1,6	3,5	0,0	9,1	2,7	5,4	0,0	4,5	5,3	0,7	4,3	6,5	7,7	7,5	4,9	4,2	4,7	132
N**	765	386	1 151	26	11	37	129	28	157	511	146	657	92	337	429	1 769	1 059	2 828	2 828
données manquantes	936	409	1 345	81	35	116	238	43	281	420	96	516	149	502	651	2 076	1 188	3 264	3 264

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2020)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Plus haute formation achevée*																			
aucune formation achevée	3,4	3,4	3,4	3,9	10,7	5,8	3,9	5,7	4,2	14,1	16,5	14,6	4,5	1,2	1,9	7,8	5,4	6,9	324
école obligatoire	11,0	9,5	10,6	15,8	32,1	20,2	13,5	24,5	15,1	54,3	51,0	53,6	12,8	7,5	8,6	24,1	16,7	21,5	1 006
formation de transition	2,1	3,6	2,6	1,3	7,1	2,9	1,0	1,9	1,1	3,2	2,0	3,0	1,5	1,6	1,6	2,3	2,8	2,5	117
formation générale sans maturité	0,7	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,3	5,7	1,1	0,4	0,5	0,4	1,5	0,8	0,9	0,6	0,8	0,6	30
formation prof. de base et apprentissage	56,4	59,1	57,2	65,8	46,4	60,6	63,2	54,7	61,9	22,7	22,0	22,6	33,8	46,0	43,5	45,8	47,3	46,3	2 162
maturité ou école normale	4,6	5,9	5,0	3,9	0,0	2,9	3,3	0,0	2,8	2,6	3,5	2,8	2,3	9,4	7,9	3,7	6,5	4,7	219
formation prof. supérieure	9,4	7,4	8,8	6,6	0,0	4,8	8,9	1,9	7,8	1,5	1,5	1,5	19,5	13,9	15,1	7,3	8,4	7,7	360
haute école spécialisée et université	11,8	9,9	11,2	2,6	3,6	2,9	5,9	5,7	5,9	1,2	3,0	1,5	22,6	19,4	20,1	8,1	11,8	9,4	437
doctorat ou habilitation	0,5	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,2	0,5	0,4	0,2	0,3	14
N**	1 369	609	1 978	76	28	104	304	53	357	779	200	979	133	509	642	3 070	1 599	4 669	4 669
<i>données manquantes</i>	332	186	518	31	18	49	63	18	81	152	42	194	108	330	438	775	648	1 423	1 423
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	18,0	25,1	20,1	31,0	60,7	39,4	16,6	26,8	18,0	20,8	29,4	22,7	0,0	21,2	18,4	18,4	27,4	20,9	581
apprenti-e, stagiaire	1,9	1,1	1,6	4,2	0,0	3,0	5,1	7,3	5,4	26,3	22,5	25,5	0,0	0,0	0,0	7,8	4,8	7,0	194
manœuvre, aide	3,5	3,7	3,5	4,2	3,6	4,0	3,2	2,4	3,1	2,7	2,0	2,6	0,0	0,0	0,0	3,3	2,7	3,1	87
ouvrier/ère formé-e sur le tas	6,5	5,1	6,1	1,4	7,1	3,0	3,6	2,4	3,4	1,9	2,0	1,9	0,0	0,0	0,0	5,0	4,2	4,8	132
ouvrier/ère formé-e (CFC)	12,5	10,3	11,9	18,3	7,1	15,2	19,8	7,3	18,0	10,4	2,9	8,8	0,0	0,0	0,0	13,3	8,1	11,8	329
contremaître-sse	2,0	0,2	1,4	1,4	0,0	1,0	2,8	0,0	2,4	0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	1,8	0,1	1,3	37
employé-e non qualifié-e	22,3	33,2	25,5	21,1	14,3	19,2	31,2	46,3	33,3	15,6	17,6	16,1	40,0	37,9	38,2	21,9	30,4	24,2	673
empl. qualifié-e, cadre moyen	14,8	12,1	14,0	8,5	3,6	7,1	9,5	2,4	8,5	3,8	2,9	3,6	10,0	24,2	22,4	11,5	10,5	11,2	312
employé-e, cadre supérieur	5,9	2,6	4,9	2,8	3,6	3,0	2,4	0,0	2,0	0,5	1,0	0,6	10,0	4,5	5,3	4,0	2,3	3,6	99
indépendant-e	10,4	5,7	9,0	2,8	0,0	2,0	5,9	0,0	5,1	3,0	1,0	2,6	20,0	7,6	9,2	7,5	4,7	6,7	187
écolier/ère, étudiant-e	1,1	0,2	0,9	2,8	0,0	2,0	0,0	2,4	0,3	13,2	17,6	14,1	20,0	4,5	6,6	4,4	3,9	4,3	119
autre statut	1,2	0,7	1,0	1,4	0,0	1,0	0,0	2,4	0,3	1,1	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	0,8	1,0	28
N**	1 072	455	1 527	71	28	99	253	41	294	365	102	467	10	66	76	2 009	769	2 778	2 778
<i>données manquantes</i>	629	340	969	36	18	54	114	30	144	566	140	706	231	773	1 004	1 836	1 478	3 314	3 314

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2020)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Source de revenu principale (au cours des 30 derniers jours)*																			
salaire	56,2	45,4	52,8	22,6	17,9	21,2	60,2	41,2	57,0	26,3	19,8	25,0	60,0	68,7	66,7	47,2	45,3	46,6	2 372
économies, épargne	2,4	2,2	2,3	1,1	0,0	0,8	1,5	0,0	1,2	0,9	1,8	1,1	1,0	1,1	1,1	1,7	1,5	1,6	82
rente (AVS, AI ou autre)	14,5	20,0	16,2	23,7	30,8	25,8	5,8	13,2	7,0	3,9	5,9	4,3	15,2	9,5	10,8	10,5	15,0	12,0	609
aide sociale	14,0	11,9	13,4	36,6	35,9	36,4	11,0	32,4	14,6	9,4	15,8	10,7	1,9	1,4	1,5	12,5	11,3	12,1	616
assurance-chômage	6,3	4,0	5,6	5,4	2,6	4,5	8,1	4,4	7,5	2,4	3,6	2,7	1,9	0,8	1,1	5,0	3,2	4,4	225
soutien du/de la partenaire	1,1	8,6	3,5	2,2	2,6	2,3	0,9	0,0	0,7	1,5	3,2	1,8	1,9	12,6	10,2	1,4	7,7	3,4	175
soutien parents/proches/amis	2,8	4,1	3,2	4,3	10,3	6,1	7,0	4,4	6,6	54,2	48,6	53,1	17,1	4,7	7,6	19,2	13,4	17,3	882
deal, petit trafic	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,8	0,6	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	6
autres revenus illégaux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
prostitution	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	2
assurance d'indemnités journalières	1,4	1,6	1,5	2,2	0,0	1,5	2,0	2,9	2,2	0,3	0,5	0,4	0,0	0,3	0,2	1,1	1,0	1,1	55
autre	1,3	2,1	1,5	1,1	0,0	0,8	2,9	1,5	2,7	0,6	0,9	0,6	1,0	0,8	0,9	1,2	1,5	1,3	66
N**	1 575	729	2 304	93	39	132	344	68	412	871	222	1 093	105	358	463	3 441	1 649	5 090	5 090
données manquantes	126	66	192	14	7	21	23	3	26	60	20	80	136	481	617	404	598	1 002	1 002
Taux d'activité principal (au cours des 30 derniers jours)*																			
activité à plein temps (dès 70%)	51,7	30,4	45,1	20,4	12,8	18,2	55,2	30,0	51,4	17,6	10,6	16,2	50,0	42,4	44,2	41,3	29,2	37,5	1 836
activité à temps partiel	5,6	20,3	10,2	5,4	10,3	6,8	3,2	10,0	4,3	2,8	8,3	3,9	12,2	33,6	28,7	4,7	19,7	9,4	460
jobs occasionnels	1,2	0,9	1,1	6,5	0,0	4,5	1,8	3,3	2,0	0,7	0,5	0,7	0,0	1,3	1,0	1,2	1,0	1,1	55
en formation	2,9	3,5	3,1	4,3	0,0	3,0	6,8	6,7	6,8	58,6	53,5	57,6	12,2	6,9	8,1	20,7	15,1	19,0	929
sans travail, en quête d'emploi	12,3	10,3	11,7	15,1	7,7	12,9	15,9	15,0	15,8	7,9	7,8	7,9	4,4	1,0	1,8	10,7	7,5	9,7	473
sans travail, sans recherche d'emploi	7,8	6,9	7,5	32,3	20,5	28,8	8,0	16,7	9,3	3,7	6,9	4,4	0,0	1,6	1,3	6,8	6,5	6,7	327
rentier/rentière	7,4	10,9	8,5	1,1	10,3	3,8	1,2	3,3	1,5	0,7	0,5	0,7	11,1	7,6	8,4	4,4	7,6	5,4	263
incapacité de travail	5,7	8,2	6,5	9,7	17,9	12,1	3,5	5,0	3,8	2,1	3,7	2,4	4,4	1,3	2,0	4,5	5,8	4,9	238
femme/homme au foyer	0,2	4,2	1,4	0,0	2,6	0,8	0,0	5,0	0,8	0,0	0,5	0,1	1,1	3,0	2,5	0,1	3,2	1,1	53
autre	5,1	4,5	4,9	5,4	17,9	9,1	4,4	5,0	4,5	5,7	7,8	6,2	4,4	1,3	2,0	5,7	4,4	5,3	258
N**	1 535	691	2 226	93	39	132	339	60	399	856	217	1 073	90	304	394	3 366	1 526	4 892	4 892
données manquantes	166	104	270	14	7	21	28	11	39	75	25	100	151	535	686	479	721	1 200	1 200

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2020)

	Patient-e-s: problème principale												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Revenu mensuel net (6 derniers mois)*																			
aucun revenu	46,2	57,5	49,5	85,3	70,0	81,8	54,1	28,6	51,5	60,5	83,3	66,2	96,9	88,3	90,2	56,9	71,6	61,7	673
moins de 1000 fr.	0,8	4,6	1,9	5,9	0,0	4,5	4,9	0,0	4,4	16,3	8,3	14,4	0,0	0,0	0,0	5,7	3,1	4,9	53
de 1001 à 2000 fr.	5,2	7,2	5,8	0,0	0,0	0,0	1,6	14,3	2,9	4,1	0,0	3,1	0,0	1,8	1,4	3,7	3,9	3,8	41
de 2001 à 3000 fr.	4,6	5,9	5,0	0,0	30,0	6,8	3,3	14,3	4,4	2,7	4,2	3,1	0,0	1,8	1,4	3,5	5,1	4,0	44
de 3001 à 4000 fr.	8,2	11,8	9,2	0,0	0,0	0,0	3,3	14,3	4,4	6,8	2,1	5,6	0,0	1,8	1,4	6,0	7,0	6,3	69
de 4001 à 5000 fr.	12,0	4,6	9,8	5,9	0,0	4,5	13,1	14,3	13,2	6,8	2,1	5,6	0,0	2,7	2,1	9,0	3,9	7,3	80
de 5001 à 6000 fr.	10,6	4,6	8,8	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	8,8	1,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	6,8	2,2	5,3	58
de 6001 à 8000 fr.	6,5	2,0	5,2	2,9	0,0	2,3	4,9	14,3	5,9	0,7	0,0	0,5	0,0	2,7	2,1	4,5	2,0	3,7	40
de 8001 à 10 000 fr.	3,3	2,0	2,9	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,5	0,7	0,0	0,5	0,0	0,9	0,7	2,0	1,1	1,7	19
de 10 001 à 15 000 fr.	1,6	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,7	1,2	0,0	0,8	9
plus de 15 000 fr.	1,1	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,4	4
N**	368	153	521	34	10	44	61	7	68	147	48	195	32	111	143	734	356	1 090	1 090
données manquantes	1 333	642	1 975	73	36	109	306	64	370	784	194	978	209	728	937	3 111	1 891	5 002	5 002
Dettes*																			
aucune dette	58,9	71,7	63,0	28,9	26,7	28,3	48,3	77,8	51,6	78,0	70,3	76,4	93,5	95,6	95,2	63,4	74,5	66,8	1 604
jusqu'à 5000 fr.	4,7	1,6	3,7	8,9	0,0	6,7	5,6	5,6	5,6	4,8	6,5	5,2	0,0	2,2	1,8	5,2	3,5	4,7	112
de 5001 à 10 000 fr.	4,7	1,9	3,8	6,7	0,0	5,0	7,0	5,6	6,8	3,3	2,9	3,2	0,0	0,7	0,6	4,0	2,2	3,5	83
de 10 001 à 25 000 fr.	3,5	1,6	2,9	0,0	20,0	5,0	10,5	0,0	9,3	2,1	5,1	2,7	3,2	0,7	1,2	3,8	2,6	3,5	83
de 25 001 à 50 000 fr.	3,2	3,5	3,3	4,4	0,0	3,3	11,2	0,0	9,9	1,0	0,0	0,8	0,0	0,7	0,6	3,2	2,2	2,9	70
de 50 001 à 100 000 fr.	19,2	17,5	18,6	48,9	46,7	48,3	12,6	0,0	11,2	9,6	13,8	10,5	0,0	0,0	0,0	16,3	13,2	15,3	368
plus de 100 000 fr.	3,2	0,6	2,4	2,2	6,7	3,3	3,5	0,0	3,1	0,4	1,4	0,6	3,2	0,0	0,6	2,5	0,9	2,0	48
montant inconnu	2,4	1,6	2,1	0,0	0,0	0,0	1,4	11,1	2,5	1,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,6	0,9	1,4	33
N**	677	315	992	45	15	60	143	18	161	522	138	660	31	137	168	1 664	737	2 401	2 401
données manquantes	1 024	480	1 504	62	31	93	224	53	277	409	104	513	210	702	912	2 181	1 510	3 691	3 691

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			N	
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total					
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Emprisonnement ou détention préventive*																	
aucun-e	89,6	97,6	91,9	57,1	0,0	44,4	70,8	93,8	75,3	91,2	100,0	92,8	87,6	96,1	89,7	821	
emprisonnement	5,9	1,2	4,6	21,4	50,0	27,8	9,2	6,3	8,6	3,2	0,0	2,6	5,8	2,2	4,9	45	
détention préventive	2,8	0,6	2,2	14,3	0,0	11,1	10,8	0,0	8,6	4,8	0,0	3,9	4,4	0,4	3,4	31	
emprisonnement et détention préventive	1,7	0,6	1,4	7,1	50,0	16,7	9,2	0,0	7,4	0,8	0,0	0,7	2,2	1,3	2,0	18	
N**	423	166	589	14	4	18	65	16	81	125	28	153	684	231	915	915	
<i>données manquantes</i>	1 278	629	1 907	93	42	135	302	55	357	806	214	1 020	2 920	1 177	4 097	4 097	
Durée totale de détention***																	
jusqu'à 1 mois	21,4	33,3	22,6	50,0	0,0	20,0	42,9	0,0	40,0	33,3	-	33,3	30,8	14,3	28,8	17	
> 1 à 2 mois	21,4	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	13,3	0,0	-	0,0	15,4	0,0	13,6	8	
> 2 à 6 mois	28,6	0,0	25,8	50,0	33,3	40,0	14,3	0,0	13,3	50,0	-	50,0	26,9	14,3	25,4	15	
> 6 à 12 mois	14,3	33,3	16,1	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	13,3	0,0	-	0,0	13,5	14,3	13,6	8	
plus de 1 an	14,3	33,3	16,1	0,0	66,7	40,0	14,3	100,0	20,0	16,7	-	16,7	13,5	57,1	18,6	11	
N**	28	3	31	2	3	5	14	1	15	6	0	6	52	7	59	59	
<i>données manquantes</i>	16	1	17	4	1	5	5	0	5	5	0	5	33	2	35	35	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de détention. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T9 Instance d'envoi principale, selon le problème principal et chez les proches (2020)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Instance d'envoi principale*																			
condamnation/mesure/justice/police	15,4	6,5	12,5	6,9	5,1	6,3	12,0	3,1	10,6	55,3	39,6	52,1	1,9	0,4	0,7	22,8	7,4	17,2	960
cabinet médical	9,6	10,6	9,9	16,1	23,1	18,3	3,6	1,5	3,3	2,4	3,6	2,6	4,7	3,8	4,0	6,4	7,0	6,6	371
institution spécialisée dans les addictions	5,3	5,4	5,3	13,8	7,7	11,9	4,5	6,2	4,8	1,4	2,3	1,6	4,2	2,7	3,1	4,0	3,8	3,9	220
autre service médical/social/de santé	16,0	16,5	16,2	12,6	20,5	15,1	9,0	20,0	10,8	7,6	17,6	9,6	6,1	5,9	5,9	12,0	12,8	12,3	686
institution formatrice/éducative	0,3	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	2,3	3,2	2,5	0,9	1,2	1,2	1,4	1,8	1,5	85
employeur/employeuse	3,6	1,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,1	1,3	1,1	0,9	1,1	0,5	0,3	0,3	2,2	1,2	1,8	103
initiative personnelle/famille/amis	48,2	56,2	50,8	50,6	41,0	47,6	67,6	64,6	67,1	28,5	31,5	29,1	80,3	84,6	83,7	48,4	64,0	54,1	3 021
autre	1,7	2,0	1,8	0,0	2,6	0,8	2,1	1,5	2,0	1,5	1,4	1,5	1,4	1,0	1,1	2,7	2,1	2,5	137
N**	1 569	744	2 313	87	39	126	333	65	398	874	222	1 096	213	729	942	3 545	2 038	5 583	5 583
données manquantes	132	51	183	20	7	27	34	6	40	57	20	77	28	110	138	300	209	509	509

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T10 Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire et type de mesure, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)

	Patient-e-s: problème principal												Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire*																
non, pas de mesure	93,9	97,1	94,8	91,7	93,3	92,2	96,0	97,8	96,3	80,5	82,0	80,8	91,8	95,1	92,6	2 427
suspension/ renonciation/ réprimande (art 19a ch2 LStup)	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,4	3,2	2,2	3,0	0,6	0,4	0,6	15
oui, consécutive à une mesure	6,0	2,9	5,1	8,3	6,7	7,8	4,0	0,0	3,3	16,2	15,7	16,1	7,6	4,5	6,8	178
N**	1 059	444	1 503	72	30	102	224	45	269	339	89	428	1 931	689	2 620	2 620
<i>données manquantes</i>	642	351	993	35	16	51	143	26	169	592	153	745	1 673	719	2 392	2 392
Type de mesure judiciaire***																
mes. protect. méd. (art 19a ch3 LStup)	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
mes. thérapeutiques institutionnelles (art 59 CP)	14,3	0,0	11,5	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	3,4	0,0	2,5	6,2	0,0	4,9	4
traitement résidentiel (art 60 CP)	0,0	20,0	3,8	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	1,2	1
prise en charge ambulatoire	61,9	80,0	65,4	50,0	-	50,0	100,0	-	100,0	48,3	72,7	55,0	55,4	76,5	59,8	49
placement dans institution pour jeunes adultes	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
en attente d'un jugement	9,5	0,0	7,7	50,0	-	50,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	4,9	4
autre	14,3	0,0	11,5	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	51,7	45,5	50,0	33,8	29,4	32,9	27
N**	21	5	26	2	0	2	4	0	4	29	11	40	65	17	82	82
<i>données manquantes</i>	44	8	52	4	2	6	5	1	6	37	5	42	94	17	111	111

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s dont le traitement est consécutif à une mesure judiciaire. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); Pourcentages par colonne

T11 Traitements/prises en charge avant l'admission et type de prises en charge antérieures, selon le problème principal et chez les proches (2020)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Prises en charge antérieures*																			
non	47,1	41,8	45,4	13,2	18,9	15,0	58,0	40,0	55,2	78,5	72,3	77,2	73,8	73,6	73,6	58,8	53,0	57,0	2 473
oui	52,9	58,2	54,6	86,8	81,1	85,0	42,0	60,0	44,8	21,5	27,7	22,8	26,2	26,4	26,4	41,2	47,0	43,0	1 869
N**	1 389	653	2 042	76	37	113	276	50	326	739	195	934	61	227	288	2 965	1 377	4 342	4 342
données manquantes	312	142	454	31	9	40	91	21	112	192	47	239	180	612	792	880	870	1 750	1 750
Type de prise en charge***																			
traitement avec prescription d'héroïne	0,6	0,4	0,5	0,0	8,3	2,4	0,0	6,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	0,6	7
substitution (méthadone, subutex)	2,3	1,6	2,0	66,7	50,0	61,9	8,2	6,3	7,7	0,8	2,6	1,3	0,0	1,8	1,4	4,9	3,6	4,4	54
autre traitement médicamenteux	6,5	3,1	5,3	6,7	8,3	7,1	6,1	6,3	6,2	0,0	2,6	0,6	0,0	0,0	0,0	5,1	2,9	4,3	53
prise en charge ambulatoire	75,3	72,9	74,5	70,0	83,3	73,8	71,4	62,5	69,2	90,8	69,2	85,4	100,0	80,0	84,1	77,1	75,4	76,5	940
structure/clinique de jour	1,5	1,6	1,5	6,7	8,3	7,1	2,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	16
traitement résidentiel	47,7	54,7	50,1	16,7	50,0	26,2	44,9	68,8	50,8	15,1	23,1	17,1	14,3	18,2	17,4	39,1	45,1	41,3	507
sevrage	38,7	43,0	40,2	43,3	41,7	42,9	38,8	37,5	38,5	4,2	10,3	5,7	7,1	7,3	7,2	30,2	31,7	30,8	378
groupe d'entraide ou d'auto-support	6,1	9,3	7,2	3,3	0,0	2,4	2,0	6,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,4	4,2	6,0	4,9	60
autre(s)	1,7	1,6	1,6	0,0	8,3	2,4	2,0	0,0	1,5	1,7	7,7	3,2	0,0	3,6	2,9	2,0	2,2	2,1	26
N**	478	258	736	30	12	42	49	16	65	119	39	158	14	55	69	781	448	1 229	1 229
données manquantes	261	124	385	36	19	55	67	14	81	42	18	60	2	7	9	451	207	658	658

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de prise en charge antérieure. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T12 Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission*																
non	98,2	99,3	98,6	52,6	50,0	51,9	95,1	96,6	95,3	99,2	99,4	99,2	97,4	98,1	97,6	2 715
oui	1,8	0,7	1,4	47,4	50,0	48,1	4,9	3,4	4,7	0,8	0,6	0,8	2,6	1,9	2,4	67
N**	902	431	1 333	38	14	52	143	29	172	603	163	766	1 977	805	2 782	2 782
données manquantes	799	364	1 163	69	32	101	224	42	266	328	79	407	1 627	603	2 230	2 230
Type de substitution/prescription***																
héroïne	9,1	0,0	8,3	70,6	66,7	69,6	25,0	0,0	20,0	-	0,0	0,0	38,9	41,7	39,6	19
méthadone	54,5	100,0	58,3	17,6	16,7	17,4	50,0	100,0	60,0	-	100,0	100,0	36,1	41,7	37,5	18
autres opiacés	27,3	0,0	25,0	11,8	16,7	13,0	25,0	0,0	20,0	-	0,0	0,0	19,4	16,7	18,8	9
autres substances	9,1	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	5,6	0,0	4,2	2
N**	11	1	12	17	6	23	4	1	5	0	1	1	36	12	48	48
données manquantes	5	2	7	1	1	2	3	0	3	5	0	5	16	3	19	19
Traitement de substitution dans la vie?*																
non	97,5	97,7	97,6	30,2	48,5	36,5	94,2	92,9	94,0	98,9	99,0	98,9	95,2	95,5	95,3	2 610
oui	2,5	2,3	2,4	69,8	51,5	63,5	5,8	7,1	6,0	1,1	1,0	1,1	4,8	4,5	4,7	128
N**	1 077	483	1 560	63	33	96	190	42	232	362	102	464	1 956	782	2 738	2 738
données manquantes	624	312	936	44	13	57	177	29	206	569	140	709	1 648	626	2 274	2 274
Age lors du premier traitement de substitution****																
Moyenne	32,4	30,4	31,7	31,5	25,1	29,6	31,3	23,0	29,3	25,0	-	25,0	31,6	27,0	30,3	
Ecart-type	16,5	9,9	14,3	8,7	4,1	8,1	12,1	-	10,7	-	-	-	11,5	7,0	10,5	
25 centile	22,0	24,0	22,0	25,0	22,0	24,0	20,0	-	21,5	-	-	-	24,0	23,0	24,0	
Médiane	28,5	26,0	26,0	30,0	26,0	28,0	30,0	23,0	26,5	25,0	-	25,0	30,0	26,0	27,0	
75 centile	35,0	41,0	41,0	36,0	30,0	35,0	44,0	-	37,0	-	-	-	35,0	30,0	35,0	
N**	10	5	15	16	7	23	3	1	4	1	0	1	31	13	44	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant signalé un traitement de substitution ou de prescription d'héroïne à l'admission. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant eu une expérience de substitution au cours de leur vie

T13 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2020)

Tous patients et patientes									
Problème principal*	Hommes	Femmes	Total			Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	N		%	%	%	N
alcool	47,2	56,5	49,8	2 496	alcool	47,2	56,5	49,8	2 496
héroïne	2,4	2,4	2,4	120					
méthadone	0,2	0,1	0,2	8					
buprénorphine	0,1	0,0	0,0	2	opioïdes	3,0	3,3	3,1	153
fentanyl	0,0	0,0	0,0	1					
autres opioïdes	0,3	0,8	0,4	22					
cocaïne en poudre	9,7	4,7	8,3	417					
crack	0,4	0,4	0,4	20	cocaïne ou dérivés	10,2	5,0	8,7	438
autre forme de cocaïne	0,0	0,0	0,0	1					
amphétamines	0,8	1,5	1,0	51					
méthamphétamines	0,1	0,2	0,1	7					
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0,2	0,4	0,3	15	autres stimulants	1,3	2,1	1,5	76
cathinones synthétiques	0,0	0,0	0,0	0					
autres stimulants	0,1	0,0	0,1	3					
barbituriques	0,0	0,0	0,0	1					
benzodiazépines	1,2	1,8	1,4	70	hypnotiques/sédatifs	1,3	1,9	1,5	74
GHB/GBL	0,0	0,0	0,0	1					
autres somnifères et tranquillisants	0,0	0,1	0,0	2					
LSD	0,0	0,0	0,0	0					
kétamine	0,1	0,1	0,1	3	hallucinogènes	0,1	0,1	0,1	3
autres hallucinogènes	0,0	0,0	0,0	0					
cannabis	25,9	17,2	23,4	1 173	cannabis	25,9	17,2	23,4	1 173
tabac	1,9	3,3	2,3	114	tabac	1,9	3,3	2,3	114
substances volatiles	0,0	0,0	0,0	1					
autre substance	0,2	0,4	0,2	12	autres substances	0,2	0,4	0,3	13
jeu pathologique	3,6	1,5	3,0	151					
dépendances aux ordinateurs/Internet	1,5	0,5	1,2	62	comportement de type addictif	9,0	10,2	9,4	469
troubles alimentaires	0,2	5,8	1,8	90					
autre comportement de type addictif	3,7	2,4	3,3	166					
N**	3 601	1 408	5 009	5 009		3 601	1 408	5 009	5 009
données manquantes	3	0	3	3		3	0	3	3

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T14 Usage de substances multiples et combinaisons de substances (2020)

Tous patients et patientes			
	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%
Trouble lié à l'usage de substances multiples selon la CIM 10*			
oui	7,4	5,5	6,9
non	92,6	94,5	93,1
N**	1 740	635	2 375
<i>données manquantes</i>	1 864	773	2 637
Combinaisons de substances les plus fréquentes***			
coc/alc	14,1	11,5	13,6
tab/alc	15,2	7,7	13,6
can/alc	6,5	19,2	9,3
can/coc	7,6	0,0	5,9
can/coc/alc	6,5	3,8	5,9
tab/can/alc	6,5	3,8	5,9
op/alc	3,3	11,5	5,1
tab/can/coc	3,3	0,0	2,5
tab/can/coc/alc	2,2	3,8	2,5
méd/alc	2,2	0,0	1,7
méd/coc/alc	2,2	0,0	1,7
can/stim/coc/op/alc	2,2	0,0	1,7
tab/méd/op/alc	1,1	3,8	1,7
tab/méd/coc/op	1,1	3,8	1,7
tab/can/stim/coc	0,0	7,7	1,7
tab/can/méd/coc/op	1,1	3,8	1,7
autres combinaisons	25,0	19,2	23,7
N**	91	26	117
<i>données manquantes</i>	38	9	47

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant un trouble lié à l'usage de substances multiples. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2020), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	42,0	33,9	19,2	25,7	60,0	0,0	32,4	81,5	0,0
4 à 6 jours par semaine	11,5	10,7	9,8	8,6	8,6	0,0	9,0	1,9	0,0
2 à 3 jours par semaine	13,4	7,1	23,9	5,7	8,6	0,0	15,3	7,4	50,0
1 jour par semaine ou moins	9,5	8,9	25,7	14,3	11,4	100,0	18,4	5,6	50,0
aucune consommation	23,7	39,3	21,4	45,7	11,4	0,0	24,9	3,7	0,0
N**	1 391	56	276	35	35	2	778	54	2
<i>données manquantes</i>	310	51	91	11	12	0	153	13	6

T15.1b Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2020), femmes

Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	42,8	43,5	23,4	13,0	77,8	0,0	43,3	84,1	0,0
4 à 6 jours par semaine	13,4	0,0	14,9	17,4	5,6	0,0	9,0	4,5	0,0
2 à 3 jours par semaine	14,2	4,3	17,0	8,7	0,0	0,0	13,9	4,5	0,0
1 jour par semaine ou moins	9,8	8,7	14,9	26,1	0,0	0,0	15,4	2,3	100,0
aucune consommation	19,9	43,5	29,8	34,8	16,7	100,0	18,4	4,5	0,0
N**	643	23	47	23	18	1	201	44	1
<i>données manquantes</i>	152	23	24	7	9	0	41	3	4

T15.1c Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2020), hommes et femmes

Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	42,2	36,7	19,8	20,7	66,0	0,0	34,6	82,7	0,0
4 à 6 jours par semaine	12,1	7,6	10,5	12,1	7,5	0,0	9,0	3,1	0,0
2 à 3 jours par semaine	13,6	6,3	22,9	6,9	5,7	0,0	15,0	6,1	33,3
1 jour par semaine ou moins	9,6	8,9	24,1	19,0	7,5	66,7	17,8	4,1	66,7
aucune consommation	22,5	40,5	22,6	41,4	13,2	33,3	23,6	4,1	0,0
N**	2 034	79	323	58	53	3	979	98	3
<i>données manquantes</i>	462	74	115	18	21	0	194	16	10

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.2a Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2020), hommes

	Patient-e-s: problème principal			
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	10,7	69,2	75,0	65,7
4 à 6 jours par semaine	12,0	7,7	12,5	9,5
2 à 3 jours par semaine	18,7	7,7	12,5	11,4
1 jour par semaine ou moins	18,7	2,6	0,0	6,7
aucune manifestation	40,0	12,8	0,0	6,7
N**	75	39	8	105
<i>données manquantes</i>	55	16	0	27

T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2020), femmes

Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	7,7	100,0	60,9	73,9
4 à 6 jours par semaine	38,5	0,0	8,7	4,3
2 à 3 jours par semaine	15,4	0,0	14,5	4,3
1 jour par semaine ou moins	7,7	0,0	10,1	13,0
aucune manifestation	30,8	0,0	5,8	4,3
N**	13	5	69	23
<i>données manquantes</i>	8	2	13	11

T15.2c Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2020), hommes et femmes

Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	10,2	72,7	62,3	67,2
4 à 6 jours par semaine	15,9	6,8	9,1	8,6
2 à 3 jours par semaine	18,2	6,8	14,3	10,2
1 jour par semaine ou moins	17,0	2,3	9,1	7,8
aucune manifestation	38,6	11,4	5,2	6,3
N**	88	44	77	128
<i>données manquantes</i>	63	18	13	38

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T16.1a Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2020), hommes

Patients: principale substance posant problème									
Hommes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation									
moyenne	16,2	22,6	21,7	19,8	20,1	35,0	15,1	16,7	21,2
écart-type	4,0	6,8	6,7	7,4	7,8	-	2,2	5,9	8,0
1er quartile	14,0	17,0	18,0	16,0	15,0	-	14,0	14,0	16,0
valeur médiane	16,0	20,0	20,0	17,5	18,5	35,0	15,0	16,0	19,0
3e quartile	17,0	28,0	24,0	18,0	22,0	-	16,0	18,0	28,0
N*	886	41	216	24	26	1	642	39	5
données manquantes	815	66	151	22	21	1	289	28	3
Age lors du début de la consommation régulière									
moyenne	22,9	26,7	25,7	19,4	23,4	37,0	16,1	18,7	20,0
écart-type	8,3	7,1	8,1	5,4	9,7	-	2,3	7,2	7,5
1er quartile	18,0	20,0	20,0	17,0	16,0	-	15,0	15,0	13,0
valeur médiane	20,0	27,0	24,0	18,0	22,0	37,0	16,0	17,0	19,0
3e quartile	25,0	33,0	30,0	18,5	25,0	-	17,0	20,0	28,0
N*	587	19	108	16	11	1	431	39	3
données manquantes	1 114	88	259	30	36	1	500	28	5
Age lors du début de la consommation problématique									
moyenne	32,0	25,8	26,5	22,8	22,0	34,5	17,4	23,3	22,8
écart-type	12,6	7,0	7,7	7,5	7,0	3,5	4,5	11,6	8,3
1er quartile	21,0	20,0	20,0	18,0	17,0	32,0	15,0	15,0	16,0
valeur médiane	30,0	25,0	25,0	20,0	20,0	34,5	16,0	18,0	23,5
3e quartile	40,0	30,5	30,5	24,0	25,0	37,0	17,0	30,0	29,5
N*	967	44	224	22	27	2	589	41	4
données manquantes	734	63	143	24	20	0	342	26	4
Période de latence (en années)**									
moyenne	25,9	13,0	9,7	8,0	8,1	-	5,0	12,7	1,4
écart-type	13,2	3,6	7,3	11,7	9,3	-	6,9	12,4	0,4
1er quartile	16,2	10,5	4,2	1,8	2,3	-	1,3	2,0	0,9
valeur médiane	24,8	13,9	8,3	4,9	3,6	-	2,1	6,6	1,5
3e quartile	35,5	15,5	13,1	9,5	9,7	-	4,6	24,1	1,7
N*	371	4	111	11	7	0	433	22	3
données manquantes	282	6	49	12	3	1	146	16	2

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1b Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2020), femmes

Patientes: principale substance posant problème									
Femmes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation									
moyenne	17,5	21,1	22,7	21,2	33,5	30,0	14,8	15,8	29,0
écart-type	5,9	8,0	7,1	5,1	15,7	-	1,8	2,4	14,1
1er quartile	15,0	16,0	18,0	18,0	20,0	-	14,0	14,0	19,0
valeur médiane	16,0	18,0	20,0	20,0	31,5	30,0	15,0	15,5	29,0
3e quartile	18,0	28,0	26,0	22,5	45,0	-	16,0	18,0	39,0
N*	374	17	38	20	10	1	158	38	2
données manquantes	421	29	33	10	17	0	84	9	3
Age lors du début de la consommation régulière									
moyenne	26,3	20,0	25,3	22,1	32,0	31,0	16,1	19,0	29,0
écart-type	11,0	4,6	7,7	6,1	25,4	-	3,2	5,7	14,1
1er quartile	18,0	16,0	19,0	18,0	14,0	-	14,0	15,0	19,0
valeur médiane	23,0	19,0	25,0	21,0	21,0	31,0	15,0	18,0	29,0
3e quartile	35,0	25,0	28,0	24,0	61,0	-	17,0	20,0	39,0
N*	284	6	17	10	3	1	118	33	2
données manquantes	511	40	54	20	24	0	124	14	3
Age lors du début de la consommation problématique									
moyenne	34,0	24,4	24,4	23,5	36,9	31,0	17,6	23,2	31,0
écart-type	13,0	7,5	6,7	6,2	15,6	-	6,0	10,4	11,3
1er quartile	24,0	17,5	20,0	18,0	23,0	-	15,0	16,0	23,0
valeur médiane	33,0	23,5	24,0	23,0	35,0	31,0	16,0	18,0	31,0
3e quartile	43,0	30,0	28,0	28,0	52,0	-	18,0	30,0	39,0
N*	484	20	41	21	12	1	153	35	2
données manquantes	311	26	30	9	15	0	89	12	3
Période de latence (en années)**									
moyenne	25,2	9,9	4,3	4,5	1,2	-	4,6	16,2	7,9
écart-type	13,2	11,0	5,8	4,5	-	-	6,1	15,0	3,8
1er quartile	16,7	2,1	1,1	0,8	-	-	1,3	2,0	5,2
valeur médiane	24,3	9,9	2,0	3,0	1,2	-	2,4	11,3	7,9
3e quartile	35,0	17,6	4,5	9,9	-	-	6,0	27,7	10,6
N*	132	2	14	7	1	0	94	21	2
données manquantes	139	5	6	4	3	0	47	4	1

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1c Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2020), hommes et femmes

Patient-e-s: principale substance posant problème									
<i>Hommes & femmes</i>	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation									
moyenne	16,6	22,2	21,9	20,4	23,8	32,5	15,0	16,2	23,4
écart-type	4,7	7,1	6,7	6,4	12,0	3,5	2,1	4,5	9,5
1er quartile	15,0	17,0	18,0	16,0	16,0	30,0	14,0	14,0	16,0
valeur médiane	16,0	20,0	20,0	18,0	20,0	32,5	15,0	16,0	19,0
3e quartile	18,0	28,0	25,0	21,5	25,0	35,0	16,0	18,0	31,0
N*	1 260	58	254	44	36	2	800	77	7
<i>données manquantes</i>	1 236	95	184	32	38	1	373	37	6
Age lors du début de la consommation régulière									
moyenne	24,0	25,1	25,6	20,5	25,2	34,0	16,1	18,8	23,6
écart-type	9,4	7,1	8,0	5,7	13,6	4,2	2,5	6,5	10,1
1er quartile	18,0	18,0	20,0	18,0	16,0	31,0	15,0	15,0	19,0
valeur médiane	20,0	25,0	24,0	18,0	21,5	34,0	16,0	17,5	19,0
3e quartile	30,0	30,0	30,0	22,0	25,0	37,0	17,0	20,0	28,0
N*	871	25	125	26	14	2	549	72	5
<i>données manquantes</i>	1 625	128	313	50	60	1	624	42	8
Age lors du début de la consommation problématique									
moyenne	32,7	25,3	26,2	23,2	26,6	33,3	17,4	23,3	25,5
écart-type	12,8	7,1	7,6	6,9	12,3	3,2	4,8	11,0	9,2
1er quartile	22,0	20,0	20,0	18,0	18,0	31,0	15,0	15,0	19,0
valeur médiane	30,0	25,0	25,0	21,0	22,0	32,0	16,0	18,0	25,5
3e quartile	40,0	30,0	30,0	28,0	30,0	37,0	18,0	30,0	31,0
N*	1 451	64	265	43	39	3	742	76	6
<i>données manquantes</i>	1 045	89	173	33	35	0	431	38	7
Période de latence (en années)**									
moyenne	25,7	12,0	9,1	6,6	7,3	-	4,9	14,4	4,0
écart-type	13,2	5,9	7,3	9,5	9,0	-	6,7	13,7	4,1
1er quartile	16,3	8,0	3,3	1,8	1,8	-	1,3	2,0	1,5
valeur médiane	24,5	13,9	7,9	3,8	3,2	-	2,2	9,7	1,7
3e quartile	35,4	16,1	12,8	9,5	9,6	-	4,7	25,5	5,2
N*	503	6	125	18	8	0	527	43	5
<i>données manquantes</i>	421	11	55	16	6	1	193	20	3

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2a Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2020), hommes

Patients: problème principal				
Hommes	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Age lors de la première apparition				
moyenne	22,5	13,9	15,7	15,9
écart-type	8,1	3,3	2,1	8,6
1er quartile	18,0	12,0	14,0	12,0
valeur médiane	20,0	14,0	15,0	14,0
3e quartile	25,0	15,0	18,0	18,0
N*	49	14	3	62
<i>données manquantes</i>	81	41	5	70
Age lors du début de l'apparition régulière				
moyenne	23,4	13,2	26,4	16,5
écart-type	7,1	1,6	20,0	9,1
1er quartile	18,0	12,0	16,0	12,5
valeur médiane	20,0	12,0	19,0	14,0
3e quartile	26,0	15,0	20,0	16,5
N*	31	5	5	52
<i>données manquantes</i>	99	50	3	80
Age lors du début de l'apparition problématique				
moyenne	28,0	16,2	28,3	20,0
écart-type	9,7	5,2	22,5	10,5
1er quartile	20,5	13,0	16,0	14,0
valeur médiane	26,5	14,5	17,5	16,0
3e quartile	31,0	20,0	40,5	23,0
N*	60	18	4	66
<i>données manquantes</i>	70	37	4	66
Période de latence (en années)**				
moyenne	11,2	5,7	3,0	10,7
écart-type	10,2	4,4	-	12,3
1er quartile	2,8	3,0	-	2,2
valeur médiane	7,9	4,6	3,0	5,3
3e quartile	17,5	7,6	-	17,2
N*	36	13	1	46
<i>données manquantes</i>	47	28	2	43

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2b Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2020), femmes

Patientes: problème principal					
Femmes	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif	
Age lors de la première apparition					
moyenne	25,4	12,8	15,8	16,0	
écart-type	10,5	4,0	4,5	7,8	
1er quartile	18,0	10,0	13,0	12,0	
valeur médiane	21,0	14,0	15,0	13,0	
3e quartile	30,0	15,5	17,0	16,0	
N*	9	4	49	15	
<i>données manquantes</i>	12	3	33	19	
Age lors du début de l'apparition régulière					
moyenne	23,3	18,0	16,1	17,6	
écart-type	4,6	-	5,1	9,3	
1er quartile	19,5	-	14,0	13,0	
valeur médiane	22,5	18,0	15,0	14,5	
3e quartile	27,0	-	18,0	17,0	
N*	4	1	45	16	
<i>données manquantes</i>	17	6	37	18	
Age lors du début de l'apparition problématique					
moyenne	37,6	16,8	19,1	21,2	
écart-type	15,5	8,8	9,8	11,7	
1er quartile	25,0	14,0	14,0	15,0	
valeur médiane	32,0	15,0	16,0	16,0	
3e quartile	50,0	17,0	19,0	23,0	
N*	14	5	57	18	
<i>données manquantes</i>	7	2	25	16	
Période de latence (en années)**					
moyenne	8,8	4,5	7,5	5,8	
écart-type	12,0	4,7	8,2	6,7	
1er quartile	1,6	1,4	1,2	2,6	
valeur médiane	4,3	2,3	5,2	3,9	
3e quartile	16,1	10,0	9,5	6,5	
N*	4	3	25	11	
<i>données manquantes</i>	9	0	18	9	

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2c Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2020), hommes et femmes

Patient-e-s: problème principal					
<i>Hommes et femmes</i>	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif	
Age lors de la première apparition					
moyenne	23,0	13,6	15,8	15,9	
écart-type	8,5	3,4	4,4	8,4	
1er quartile	18,0	12,0	13,0	12,0	
valeur médiane	20,0	14,0	15,0	14,0	
3e quartile	27,0	15,0	17,0	18,0	
N*	58	18	52	77	
<i>données manquantes</i>	93	44	38	89	
Age lors du début de l'apparition régulière					
moyenne	23,3	14,0	17,1	16,7	
écart-type	6,8	2,4	8,1	9,1	
1er quartile	18,0	12,0	14,0	13,0	
valeur médiane	20,0	13,5	15,0	14,0	
3e quartile	26,0	15,0	18,0	16,5	
N*	35	6	50	68	
<i>données manquantes</i>	116	56	40	98	
Age lors du début de l'apparition problématique					
moyenne	29,8	16,3	19,7	20,3	
écart-type	11,5	5,9	11,0	10,7	
1er quartile	22,0	13,0	14,0	14,0	
valeur médiane	27,0	15,0	16,0	16,0	
3e quartile	33,0	20,0	19,0	23,0	
N*	74	23	61	84	
<i>données manquantes</i>	77	39	29	82	
Période de latence (en années)**					
moyenne	10,9	5,4	7,3	9,7	
écart-type	10,3	4,4	8,1	11,5	
1er quartile	2,6	1,8	1,2	2,3	
valeur médiane	7,4	4,3	4,7	4,1	
3e quartile	17,5	8,8	9,5	16,5	
N*	40	16	26	57	
<i>données manquantes</i>	56	28	20	52	

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T17 Mode d'administration prédominant de la principale substance posant problème avant l'admission (2020)

Patient-e-s: principale substance posant problème															
Mode d'administration*	Héroïne			Cocaïne			Amphétamines			Cannabis			Benzodiazépines		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
injection	25,0	37,5	28,6	1,2	0,0	1,0	5,3	10,0	6,9	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
fumée/inhalation	47,5	50,0	48,2	11,9	11,8	11,9	15,8	0,0	10,3	95,9	97,4	96,2	0,0	0,0	0,0
ingestion (manger/boire)	7,5	6,3	7,1	8,1	19,6	10,0	42,1	30,0	37,9	3,8	2,6	3,6	96,9	95,2	96,2
sniff	15,0	6,3	12,5	76,2	68,6	74,9	31,6	60,0	41,4	0,1	0,0	0,1	3,1	0,0	1,9
autre	5,0	0,0	3,6	2,7	0,0	2,3	5,3	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	1,9
N**	40	16	56	260	51	311	19	10	29	730	194	924	32	21	53
données manquantes	46	18	64	91	15	106	11	11	22	201	48	249	12	5	17

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T18.1 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 12 derniers mois avant l'admission des injections et échange de matériel d'injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Injections au cours de la vie*																
oui	3,6	3,1	3,4	38,8	58,6	44,8	3,1	4,0	3,3	0,7	1,0	0,7	3,6	4,3	3,8	140
non	93,1	93,5	93,2	41,8	34,5	39,6	93,4	96,0	93,8	94,1	92,2	93,8	91,8	91,7	91,7	3 424
ne veut pas répondre	3,4	3,4	3,4	19,4	6,9	15,6	3,5	0,0	2,9	5,2	6,7	5,5	4,7	4,1	4,5	168
N**	1 239	582	1 821	67	29	96	226	50	276	751	193	944	2 675	1 057	3 732	3 732
<i>données manquantes</i>	462	213	675	40	17	57	141	21	162	180	49	229	929	351	1 280	1 280
Injections au cours des 12 derniers mois*																
oui	0,3	0,4	0,3	10,0	15,8	11,9	1,4	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	22
non	99,7	99,6	99,7	90,0	84,2	88,1	98,6	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0	99,4	99,4	99,4	3 463
N**	1 168	551	1 719	40	19	59	215	49	264	709	179	888	2 496	989	3 485	3 485
<i>données manquantes</i>	533	244	777	67	27	94	152	22	174	222	63	285	1 108	419	1 527	1 527
Injections au cours des 30 derniers jours*																
oui	0,1	0,0	0,1	2,4	13,6	6,3	1,4	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	13
non	99,9	100,0	99,9	97,6	86,4	93,8	98,6	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0	99,6	99,6	99,6	3 509
N**	1 183	557	1 740	42	22	64	216	50	266	711	180	891	2 519	1 003	3 522	3 522
<i>données manquantes</i>	518	238	756	65	24	89	151	21	172	220	62	282	1 085	405	1 490	1 490
Echange de matériel d'injection au cours de la vie***																
oui	50,0	66,7	57,1	0,0	0,0	0,0	100,0	-	100,0	0,0	0,0	0,0	30,8	28,6	30,0	6
non	50,0	33,3	42,9	100,0	50,0	83,3	0,0	-	0,0	100,0	100,0	100,0	69,2	57,1	65,0	13
ne veut pas répondre	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	16,7	0,0	-	0,0	0	0,0	0,0	0,0	14,3	5,0	1
N**	4	3	7	4	2	6	1	0	1	1	1	2	13	7	20	20
<i>données manquantes</i>	40	15	55	22	15	37	6	2	8	4	1	5	82	38	120	120
Echange de matériel d'injection au cours des 12 derniers mois****																
oui	0,0	100,0	100,0	-	-	-	0,0	-	0,0	-	-	-	0,0	100,0	25,0	1
non	0,0	0,0	0,0	-	-	-	100,0	-	100,0	-	-	-	100,0	0,0	75,0	3
N**	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	1	4	4
<i>données manquantes</i>	4	1	5	4	3	7	1	0	1	0	0	0	13	5	18	18
Echange de matériel d'injection au cours des 30 derniers jours*****																
oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
non	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>données manquantes</i>	1	0	1	1	3	4	3	0	3	0	0	0	9	4	13	13

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 12 derniers mois. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

***** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 30 derniers jours. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T18.2 Âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Age lors de la première injection*																
jusqu'à 14 ans	0,0	10,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	1,4	1
de 15 à 16 ans	27,3	10,0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	4,8	9,6	7
de 17 à 18 ans	22,7	30,0	25,0	30,8	25,0	28,6	20,0	0,0	20,0	50,0	0,0	50,0	28,8	23,8	27,4	20
de 19 à 20 ans	9,1	10,0	9,4	23,1	12,5	19,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	13,5	9,5	12,3	9
de 21 à 25 ans	31,8	20,0	28,1	23,1	25,0	23,8	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	26,9	33,3	28,8	21
de 26 à 30 ans	0,0	10,0	3,1	7,7	12,5	9,5	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	5,8	9,5	6,8	5
de 31 à 39 ans	4,5	10,0	6,3	15,4	25,0	19,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	7,7	14,3	9,6	7
dès 40 ans	4,5	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	4,1	3
N**	22	10	32	13	8	21	5	0	5	4	0	4	52	21	73	73
<i>données manquantes</i>	22	8	30	13	9	22	2	2	4	1	2	3	43	24	67	67

* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2020), hommes

Hommes

	Patients: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	31,6	37,2	32,6	40,0	0,0	17,4	25,8	28,6
héroïne	1,0	2,0	3,9	0,0	6,7	0,0	0,2	0,0	0,0
méthadone	0,0	8,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
buprénorphine	0,1	3,1	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
fentanyl	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	14,3
autres opioïdes	0,2	8,2	0,6	4,3	15,6	0,0	1,3	0,0	0,0
cocaïne en poudre	8,7	27,6	1,7	19,6	22,2	0,0	8,2	6,1	14,3
crack	0,2	1,0	1,4	2,2	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
autre forme de cocaïne	0,0	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
amphétamines	1,4	5,1	5,3	0,0	11,1	0,0	3,4	0,0	14,3
méthamphétamines	0,2	1,0	1,4	4,3	2,2	0,0	0,3	0,0	0,0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1,8	5,1	5,0	15,2	13,3	0,0	6,3	0,0	28,6
cathinones synthétiques	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
autres stimulants	0,1	0,0	0,3	0,0	2,2	0,0	0,3	0,0	0,0
barbituriques	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
benzodiazépines	1,4	17,3	2,2	0,0	0,0	0,0	2,9	3,0	14,3
GHB/GBL	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
autres somnifères et tranquillisants	0,2	1,0	0,0	2,2	4,4	0,0	0,2	0,0	0,0
LSD	0,7	4,1	2,8	6,5	6,7	0,0	1,8	0,0	0,0
kétamine	0,0	1,0	0,3	0,0	2,2	0,0	0,3	0,0	14,3
autres hallucinogènes	0,1	2,0	0,6	2,2	6,7	0,0	1,1	0,0	0,0
substances volatiles	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
cannabis	11,4	33,7	31,0	39,1	44,4	100,0	-	21,2	28,6
tabac	21,1	23,5	18,4	17,4	17,8	0,0	23,0	-	14,3
autre substance	0,2	5,1	0,3	2,2	2,2	0,0	0,3	0,0	0,0
jeu pathologique	0,5	0,0	1,1	0,0	2,2	0,0	0,8	1,5	0,0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0,5	2,0	0,3	2,2	0,0	0,0	1,3	1,5	0,0
troubles alimentaires	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,2	0,0	0,0
autre comportement de type addictif	0,7	0,0	0,8	0,0	2,2	0,0	1,0	1,5	0,0
aucun autre problème addictif	66,1	29,6	39,7	28,3	26,7	0,0	61,2	56,1	42,9
N**	1 638	98	358	46	45	2	901	66	7
<i>données manquantes</i>	63	9	9	0	2	0	30	1	1

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2020), femmes

Femmes

Patientes: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	26,2	29,9	20,7	16,0	100,0	18,3	21,3	20,0
héroïne	0,5	2,4	4,5	3,4	4,0	0,0	1,3	2,1	0,0
méthadone	0,4	2,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,4	2,1	0,0
buprénorphine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fentanyl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
autres opioïdes	0,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
cocaïne en poudre	4,6	26,2	4,5	31,0	4,0	0,0	10,0	0,0	0,0
crack	0,0	0,0	1,5	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
autre forme de cocaïne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
amphétamines	1,3	0,0	7,5	6,9	0,0	0,0	7,0	2,1	0,0
méthamphétamines	0,7	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1,2	0,0	6,0	6,9	0,0	100,0	11,8	0,0	0,0
cathinones synthétiques	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
autres stimulants	0,3	7,1	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
barbituriques	0,0	2,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
benzodiazépines	3,1	21,4	3,0	10,3	4,0	0,0	3,1	2,1	0,0
GHB/GBL	0,0	2,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
autres somnifères et tranquillisants	0,5	2,4	0,0	0,0	24,0	0,0	0,9	0,0	0,0
LSD	0,3	2,4	4,5	6,9	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0
kétamine	0,3	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
autres hallucinogènes	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
substances volatiles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
cannabis	8,3	19,0	20,9	44,8	20,0	100,0	-	12,8	20,0
tabac	19,0	14,3	16,4	20,7	28,0	0,0	28,4	-	20,0
autre substance	0,3	2,4	3,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
jeu pathologique	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
troubles alimentaires	3,1	2,4	4,5	6,9	4,0	0,0	3,9	12,8	40,0
autre comportement de type addictif	0,7	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,9	2,1	0,0
aucun autre problème addictif	69,4	40,5	44,8	24,1	44,0	0,0	56,3	57,4	60,0
N**	769	42	67	29	25	1	229	47	5
données manquantes	26	4	4	1	2	0	13	0	0

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2020), hommes et femmes

Hommes et femmes

	Patient-e-s: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	30,0	36,0	28,0	31,4	33,3	17,6	23,9	25,0
héroïne	0,9	2,1	4,0	1,3	5,7	0,0	0,4	0,9	0,0
méthadone	0,1	6,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	0,0
buprénorphine	0,0	2,1	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
fentanyl	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	8,3
autres opioïdes	0,2	7,9	0,5	2,7	10,0	0,0	1,4	0,0	0,0
cocaïne en poudre	7,4	27,1	2,1	24,0	15,7	0,0	8,6	3,5	8,3
crack	0,2	0,7	1,4	2,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
autre forme de cocaïne	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
amphétamines	1,4	3,6	5,6	2,7	7,1	0,0	4,2	0,9	8,3
méthamphétamines	0,4	0,7	1,2	5,3	1,4	0,0	0,3	0,9	0,0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1,6	3,6	5,2	12,0	8,6	33,3	7,4	0,0	16,7
cathinones synthétiques	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
autres stimulants	0,2	2,1	0,2	2,7	1,4	0,0	0,3	0,0	0,0
barbituriques	0,0	1,4	0,0	1,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
benzodiazépines	2,0	18,6	2,4	4,0	1,4	0,0	2,9	2,7	8,3
GHB/GBL	0,0	0,7	0,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
autres somnifères et tranquillisants	0,3	1,4	0,0	1,3	11,4	0,0	0,4	0,0	0,0
LSD	0,5	3,6	3,1	6,7	4,3	0,0	1,9	0,0	0,0
kétamine	0,1	0,7	0,5	0,0	1,4	0,0	0,3	0,0	8,3
autres hallucinogènes	0,1	1,4	0,5	1,3	4,3	0,0	1,2	0,0	0,0
substances volatiles	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
cannabis	10,4	29,3	29,4	41,3	35,7	100,0	-	17,7	25,0
tabac	20,4	20,7	18,1	18,7	21,4	0,0	24,1	-	16,7
autre substance	0,2	4,3	0,7	2,7	1,4	0,0	0,3	0,0	0,0
jeu pathologique	0,4	0,0	1,2	0,0	1,4	0,0	0,6	0,9	0,0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0,5	1,4	0,2	1,3	0,0	0,0	1,1	0,9	0,0
troubles alimentaires	1,3	1,4	0,7	2,7	1,4	33,3	1,0	5,3	16,7
autre comportement de type addictif	0,7	0,0	0,7	1,3	1,4	0,0	1,0	1,8	0,0
aucun autre problème addictif	67,2	32,9	40,5	26,7	32,9	0,0	60,2	56,6	50,0
N**	2 407	140	425	75	70	3	1 130	113	12
<i>données manquantes</i>	89	13	13	1	4	0	43	1	1

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2020), hommes

Hommes

Patients: problème principal				
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	3,4	5,9	0,0	4,8
héroïne	0,0	0,0	0,0	0,0
méthadone	0,0	0,0	0,0	0,0
buprénorphine	0,0	0,0	0,0	0,0
fentanyl	0,0	0,0	0,0	0,0
autres opioïdes	0,0	0,0	0,0	0,8
cocaïne en poudre	0,9	0,0	0,0	0,8
crack	0,0	0,0	0,0	0,0
autre forme de cocaïne	0,0	0,0	0,0	0,0
amphétamines	0,0	0,0	0,0	0,0
méthamphétamines	0,0	0,0	0,0	0,0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0,0	0,0	0,0	0,0
cathinones synthétiques	0,0	0,0	0,0	0,0
autres stimulants	0,0	0,0	0,0	0,0
barbituriques	0,0	0,0	0,0	0,0
benzodiazépines	0,0	0,0	0,0	0,0
GHB/GBL	0,0	0,0	0,0	0,0
autres somnifères et tranquillisants	0,0	0,0	0,0	0,0
LSD	0,0	0,0	0,0	0,0
kétamine	0,0	0,0	0,0	0,0
autres hallucinogènes	0,0	0,0	0,0	0,0
substances volatiles	0,0	0,0	0,0	0,0
cannabis	2,6	2,0	12,5	4,0
tabac	10,3	0,0	12,5	4,8
autre substance	0,0	3,9	0,0	0,0
jeu pathologique	-	2,0	0,0	0,8
dépendances aux ordinateurs/Internet	5,2	-	0,0	5,6
troubles alimentaires	0,0	0,0	-	2,4
autre comportement de type addictif	2,6	2,0	12,5	-
aucun autre problème addictif	80,2	88,2	75,0	81,5
N**	116	51	8	124
données manquantes	14	4	0	8

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2020), femmes

Femmes

Patientes: problème principal				
	Jeux pathologiques	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	0,0	16,7	5,1	3,3
héroïne	0,0	0,0	0,0	0,0
méthadone	0,0	0,0	0,0	0,0
buprénorphine	0,0	0,0	0,0	0,0
fentanyl	0,0	0,0	0,0	0,0
autres opioïdes	0,0	0,0	0,0	0,0
cocaïne en poudre	0,0	0,0	0,0	0,0
crack	0,0	0,0	0,0	0,0
autre forme de cocaïne	0,0	0,0	0,0	0,0
amphétamines	0,0	0,0	0,0	0,0
méthamphétamines	0,0	0,0	0,0	0,0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0,0	0,0	0,0	0,0
cathinones synthétiques	0,0	0,0	0,0	0,0
autres stimulants	0,0	0,0	1,3	0,0
barbituriques	0,0	0,0	0,0	0,0
benzodiazépines	5,6	16,7	0,0	0,0
GHB/GBL	0,0	0,0	0,0	0,0
autres somnifères et tranquillisants	0,0	0,0	0,0	0,0
LSD	0,0	0,0	0,0	0,0
kétamine	0,0	0,0	0,0	0,0
autres hallucinogènes	0,0	0,0	0,0	0,0
substances volatiles	0,0	0,0	0,0	0,0
cannabis	0,0	0,0	2,5	0,0
tabac	5,6	0,0	5,1	0,0
autre substance	0,0	0,0	0,0	0,0
jeu pathologique	-	16,7	0,0	0,0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0,0	-	0,0	0,0
troubles alimentaires	0,0	0,0	-	3,3
autre comportement de type addictif	0,0	0,0	0,0	-
aucun autre problème addictif	88,9	83,3	91,1	93,3
N**	18	6	79	30
<i>données manquantes</i>	3	1	3	4

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2020), hommes et femmes

Hommes et femmes

	Patient-e-s: problème principal			
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	3,0	7,0	4,6	4,5
héroïne	0,0	0,0	0,0	0,0
méthadone	0,0	0,0	0,0	0,0
buprénorphine	0,0	0,0	0,0	0,0
fentanyl	0,0	0,0	0,0	0,0
autres opioïdes	0,0	0,0	0,0	0,6
cocaïne en poudre	0,7	0,0	0,0	0,6
crack	0,0	0,0	0,0	0,0
autre forme de cocaïne	0,0	0,0	0,0	0,0
amphétamines	0,0	0,0	0,0	0,0
méthamphétamines	0,0	0,0	0,0	0,0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0,0	0,0	0,0	0,0
cathinones synthétiques	0,0	0,0	0,0	0,0
autres stimulants	0,0	0,0	1,1	0,0
barbituriques	0,0	0,0	0,0	0,0
benzodiazépines	0,7	1,8	0,0	0,0
GHB/GBL	0,0	0,0	0,0	0,0
autres somnifères et tranquillisants	0,0	0,0	0,0	0,0
LSD	0,0	0,0	0,0	0,0
kétamine	0,0	0,0	0,0	0,0
autres hallucinogènes	0,0	0,0	0,0	0,0
substances volatiles	0,0	0,0	0,0	0,0
cannabis	2,2	1,8	3,4	3,2
tabac	9,7	0,0	5,7	3,9
autre substance	0,0	3,5	0,0	0,0
jeu pathologique	-	3,5	0,0	0,6
dépendances aux ordinateurs/Internet	4,5	-	0,0	4,5
troubles alimentaires	0,0	0,0	-	2,6
autre comportement de type addictif	2,2	1,8	1,1	-
aucun autre problème addictif	81,3	87,7	89,7	83,8
N**	134	57	87	154
données manquantes	17	5	3	12

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T20a Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)

	Patient-e-s: problème principal												Tous problèmes principaux						
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N			
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Alcool*	Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	42,9	0,0	30,0	19,0	33,3	20,3	11,9	15,8	12,8	9,1	0,0	8,3	44,4	100,0	50,0	19,2	22,5	19,8	44
4 à 6 jours par semaine	21,4	16,7	20,0	9,5	0,0	8,7	16,4	5,3	14,0	18,2	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	12,6	5,0	11,3	25
2 à 3 jours par semaine	7,1	16,7	10,0	33,3	33,3	33,3	31,3	26,3	30,2	27,3	100,0	33,3	22,2	0,0	20,0	29,1	25,0	28,4	63
1 jour par semaine ou moins	14,3	16,7	15,0	28,6	0,0	26,1	20,9	21,1	20,9	36,4	0,0	33,3	33,3	0,0	30,0	24,2	17,5	23,0	51
aucune consomm.	14,3	50,0	25,0	9,5	33,3	11,6	19,4	31,6	22,1	9,1	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	14,8	30,0	17,6	39
N**	14	6	20	63	6	69	67	19	86	11	1	12	9	1	10	182	40	222	222
données manquantes	93	40	133	304	65	369	864	223	1 087	36	26	62	316	143	459	3 663	2 207	5 870	5 870
Opioides*	Alcool			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	16,7	0,0	13,3	11,1	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	12,5	11,1	12,1	4
4 à 6 jours par semaine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0
2 à 3 jours par semaine	8,3	33,3	13,3	11,1	0,0	9,1	50,0	0,0	20,0	0,0	-	0,0	-	-	-	12,5	11,1	12,1	4
1 jour par semaine ou moins	0,0	0,0	0,0	22,2	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	8,3	0,0	6,1	2
aucune consomm.	75,0	66,7	73,3	55,6	100,0	63,6	50,0	100,0	80,0	100,0	-	100,0	-	-	-	66,7	77,8	69,7	23
N**	12	3	15	9	2	11	2	3	5	1	0	1	0	0	0	24	9	33	33
données manquantes	1 689	792	2 481	358	69	427	929	239	1 168	46	27	73	325	144	469	3 821	2 238	6 059	6 059
Cocaïne et dérivés*	Alcool			Opioides			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	3,8	0,0	3,0	8,3	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	16,7	-	16,7	0,0	-	0,0	3,5	0,0	2,8	5
4 à 6 jours par semaine	5,1	4,5	5,0	8,3	0,0	5,9	2,6	0,0	2,2	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	4,2	5,4	4,5	8
2 à 3 jours par semaine	12,7	13,6	12,9	8,3	40,0	17,6	5,1	14,3	6,5	33,3	-	33,3	100,0	-	100,0	11,3	16,2	12,3	22
1 jour par semaine ou moins	26,6	22,7	25,7	33,3	0,0	23,5	23,1	28,6	23,9	33,3	-	33,3	0,0	-	0,0	26,1	21,6	25,1	45
aucune consomm.	51,9	59,1	53,5	41,7	60,0	47,1	69,2	57,1	67,4	16,7	-	16,7	0,0	-	0,0	54,9	56,8	55,3	99
N**	79	22	101	12	5	17	39	7	46	6	0	6	1	0	1	142	37	179	179
données manquantes	1 622	773	2 395	95	41	136	892	235	1 127	41	27	68	324	144	468	3 703	2 210	5 913	5 913
Cannabis*	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	28,4	21,6	26,8	50,0	60,0	52,0	36,5	50,0	37,5	63,6	100,0	66,7	16,7	100,0	28,6	34,9	32,2	34,3	103
4 à 6 jours par semaine	6,0	10,8	7,2	5,0	20,0	8,0	10,8	0,0	10,0	18,2	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	7,5	10,2	8,0	24
2 à 3 jours par semaine	14,7	2,7	11,8	10,0	20,0	12,0	10,8	0,0	10,0	18,2	0,0	16,7	16,7	0,0	14,3	12,9	3,4	11,0	33
1 jour par semaine ou moins	12,1	16,2	13,1	15,0	0,0	12,0	12,2	16,7	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	15,3	12,7	38
aucune consomm.	38,8	48,6	41,2	20,0	0,0	16,0	29,7	33,3	30,0	0,0	0,0	0,0	66,7	0,0	57,1	32,8	39,0	34,0	102
N**	116	37	153	20	5	25	74	6	80	11	1	12	6	1	7	241	59	300	300
données manquantes	1 585	758	2 343	87	41	128	293	65	358	36	26	62	319	143	462	3 604	2 188	5 792	5 792

* En tant que problème secondaire; pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T20b Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)

	Patient-e-s: problème principal															Tous problèmes principaux			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			comportement de type addictif			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Autres stimulants*																			
chaque jour	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	33,3	8,3	5,3	0,0	4,0	-	-	-	2,1	5,3	3,0	6
4 à 6 jours par semaine	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0	2
2 à 3 jours par semaine	7,7	11,1	9,1	66,7	-	66,7	11,1	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	-	-	-	8,5	5,3	7,6	8
1 jour par semaine ou moins	15,4	11,1	13,6	33,3	-	33,3	11,1	0,0	8,3	10,5	33,3	16,0	-	-	-	14,9	15,8	15,2	19
aucune consomm.	76,9	77,8	77,3	0,0	-	0,0	77,8	66,7	75,0	84,2	66,7	80,0	-	-	-	74,5	73,7	74,2	58
N**	13	9	22	3	0	3	9	3	12	19	6	25	0	0	0	47	19	66	93
données manquantes	1 688	786	2 474	104	46	150	358	68	426	912	236	1 148	325	144	469	3 798	2 228	6 026	6 359
Hypnotiques/sédatifs*																			
chaque jour	100,0	-	100,0	0,0	-	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0	-	-	-	33,3	-	33,3	1
4 à 6 jours par semaine	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0	0
2 à 3 jours par semaine	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0	0
1 jour par semaine ou moins	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0	0
aucune consomm.	0,0	-	0,0	100,0	-	100,0	-	-	-	100,0	-	100,0	-	-	-	66,7	-	66,7	2
N**	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	3	3
données manquantes	1 700	795	2 495	106	46	152	367	71	438	930	242	1 172	325	144	469	3 842	2 247	6 089	6 089
Hallucinogènes*																			
chaque jour	14,3	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	3,2	0,0	2,5	1
4 à 6 jours par semaine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0
2 à 3 jours par semaine	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	3,2	0,0	2,5	1
1 jour par semaine ou moins	0,0	0,0	0,0	66,7	0,0	50,0	25,0	0,0	20,0	16,7	33,3	20,0	-	-	-	19,4	11,1	17,5	7
aucune consomm.	85,7	100,0	88,9	0,0	100,0	25,0	75,0	100,0	80,0	83,3	66,7	80,0	-	-	-	74,2	88,9	77,5	31
N**	7	2	9	3	1	4	8	2	10	12	3	15	0	0	0	31	9	40	40
données manquantes	1 694	793	2 487	104	45	149	359	69	428	919	239	1 158	325	144	469	3 814	2 238	6 052	6 052
Autres substances*																			
chaque jour	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	50,0	-	50,0	-	-	-	40,0	-	40,0	2
4 à 6 jours par semaine	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0	0
2 à 3 jours par semaine	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0	0
1 jour par semaine ou moins	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	-	-	20,0	-	20,0	1
aucune consomm.	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	50,0	-	50,0	-	-	-	40,0	-	40,0	2
N**	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	5	0	5	5
données manquantes	1 699	795	2 494	107	46	153	367	71	438	929	242	1 171	325	144	469	3 840	2 247	6 087	6 087

* En tant que problème secondaire; pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T21 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation d'alcool*																
jamais	9,9	8,7	9,5	12,5	40,0	20,6	5,8	8,0	6,2	15,3	22,1	16,6	13,9	17,0	14,8	358
1 fois par mois ou moins	3,6	5,4	4,2	29,2	0,0	20,6	18,2	24,0	19,2	30,6	32,7	31,0	13,8	12,7	13,5	326
2 à 4 fois par mois	7,8	6,8	7,5	8,3	0,0	5,9	24,8	20,0	24,0	34,0	33,6	34,0	18,0	13,4	16,7	404
2 à 3 fois par semaine	16,4	15,5	16,1	25,0	40,0	29,4	31,4	32,0	31,5	14,9	8,0	13,6	17,0	14,9	16,4	396
4 fois ou plus par semaine	62,3	63,7	62,8	25,0	20,0	23,5	19,8	16,0	19,2	5,1	3,5	4,8	37,4	41,9	38,7	937
N**	913	427	1 340	24	10	34	121	25	146	470	113	583	1 722	699	2 421	2 421
<i>données manquantes</i>	788	368	1 156	83	36	119	246	46	292	461	129	590	1 882	709	2 591	2 591
Nbre de boissons standards par jour***																
1 ou 2	6,5	7,4	6,8	45,5	71,4	51,7	30,5	28,6	30,2	53,4	56,6	54,0	25,5	22,5	24,7	485
3 ou 4	17,2	18,0	17,5	40,9	0,0	31,0	32,4	47,6	34,9	31,0	32,5	31,2	23,7	23,4	23,6	464
5 ou 6	20,8	26,8	22,7	4,5	0,0	3,4	16,2	14,3	15,9	9,5	7,2	9,1	15,7	20,1	16,9	333
7 à 9	21,8	25,2	22,9	4,5	0,0	3,4	6,7	9,5	7,1	4,0	1,2	3,5	14,1	17,8	15,1	298
10 ou plus	33,8	22,5	30,2	4,5	28,6	10,3	14,3	0,0	11,9	2,1	2,4	2,2	21,0	16,2	19,7	387
N**	790	377	1 167	22	7	29	105	21	126	378	83	461	1 411	556	1 967	1 967
<i>données manquantes</i>	911	418	1 329	85	39	124	262	50	312	553	159	712	2 193	852	3 045	3 045
Fréquence de fortes consom. d'alcool***																
jamais	11,6	15,1	12,7	42,1	50,0	44,0	29,0	36,4	30,3	50,2	59,6	52,1	29,7	34,5	31,1	669
moins d'une fois par mois	9,7	10,2	9,9	42,1	33,3	40,0	19,0	18,2	18,9	31,0	28,8	30,5	18,0	14,9	17,1	368
1 fois par mois	12,8	10,2	12,0	5,3	0,0	4,0	16,0	18,2	16,4	12,1	5,8	10,9	11,9	8,6	11,0	236
1 fois par semaine	26,3	26,6	26,4	5,3	16,7	8,0	26,0	22,7	25,4	5,7	4,8	5,5	17,7	18,8	18,0	388
presque chaque jour	39,6	37,9	39,1	5,3	0,0	4,0	10,0	4,5	9,0	1,0	1,0	1,0	22,7	23,2	22,8	491
N**	821	372	1 193	19	6	25	100	22	122	420	104	524	1 535	617	2 152	2 152
<i>données manquantes</i>	880	423	1 303	88	40	128	267	49	316	511	138	649	2 069	791	2 860	2 860

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation d'alcool. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T22 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2020)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	38,0	44,5	40,1	27,3	0,0	17,6	24,3	12,5	22,8	28,8	25,4	28,1	35,9	40,5	37,2	796
1 jour par semaine ou moins	1,8	0,6	1,4	4,5	0,0	2,9	1,9	0,0	1,6	4,3	4,5	4,4	2,5	1,6	2,2	47
2 à 3 jours par semaine	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,4	7,8	3,0	6,8	3,4	1,4	2,9	61
4 à 6 jours par semaine	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,8	3,5	2,2	3,2	1,4	1,0	1,3	27
1 fois par jour	1,5	0,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,8	1,9	1,5	1,8	1,5	0,8	1,3	27
plusieurs fois par jour	57,5	52,8	55,9	68,2	100,0	79,4	69,2	87,5	71,5	53,7	63,4	55,8	55,4	54,7	55,2	1 179
N**	684	326	1 010	22	12	34	107	16	123	486	134	620	1 510	627	2 137	2 137
<i>données manquantes</i>	<i>1 017</i>	<i>469</i>	<i>1 486</i>	<i>85</i>	<i>34</i>	<i>119</i>	<i>260</i>	<i>55</i>	<i>315</i>	<i>445</i>	<i>108</i>	<i>553</i>	<i>2 094</i>	<i>781</i>	<i>2 875</i>	<i>2 875</i>
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10	24,1	25,3	24,4	46,7	18,2	34,6	34,7	42,9	36,0	58,8	61,1	59,3	38,9	36,4	38,2	466
11 à 20	45,3	54,4	48,0	46,7	45,5	46,2	47,2	42,9	46,5	35,0	33,3	34,6	41,4	46,1	42,7	520
21 à 30	20,2	13,9	18,4	0,0	18,2	7,7	13,9	14,3	14,0	5,0	2,2	4,4	13,3	11,7	12,9	157
31 ou plus	10,4	6,3	9,2	6,7	18,2	11,5	4,2	0,0	3,5	1,3	3,3	1,7	6,4	5,7	6,2	76
N**	386	158	544	15	11	26	72	14	86	320	90	410	887	332	1 219	1 219
<i>données manquantes</i>	<i>38</i>	<i>23</i>	<i>61</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>26</i>	<i>10</i>	<i>36</i>	<i>81</i>	<i>41</i>	<i>122</i>	<i>122</i>

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T23a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2020), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Objectif de consommation*									
abstinence définitive	31,8	66,7	78,3	77,8	80,0	0,0	39,3	38,9	100,0
abstinence limitée dans le temps	20,5	7,4	1,2	11,1	0,0	0,0	8,9	16,7	0,0
consommation contrôlée	31,7	11,1	6,0	0,0	20,0	100,0	29,5	33,3	0,0
aucune limitation envisagée	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
pas déterminé pour l'instant	14,0	3,7	10,8	11,1	0,0	0,0	17,0	11,1	0,0
autre	0,4	11,1	3,6	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
N**	537	27	83	9	5	2	112	18	2
données manquantes	1 164	80	284	37	42	0	819	49	6

T23b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2020), femmes

Objectif de consommation*									
abstinence définitive	41,2	71,4	69,2	50,0	0,0	100,0	36,6	60,0	50,0
abstinence limitée dans le temps	14,8	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	9,8	0,0	0,0
consommation contrôlée	28,7	28,6	7,7	0,0	50,0	0,0	24,4	0,0	0,0
aucune limitation envisagée	1,4	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	7,3	0,0	0,0
pas déterminé pour l'instant	13,4	0,0	23,1	25,0	0,0	0,0	19,5	40,0	50,0
autre	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
N**	216	7	13	4	4	1	41	5	2
données manquantes	579	39	58	26	23	0	201	42	3

T23c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2020), hommes et femmes

Objectif de consommation*									
abstinence définitive	34,5	67,6	77,1	69,2	44,4	33,3	38,6	43,5	75,0
abstinence limitée dans le temps	18,9	5,9	1,0	15,4	11,1	0,0	9,2	13,0	0,0
consommation contrôlée	30,8	14,7	6,3	0,0	33,3	66,7	28,1	26,1	0,0
aucune limitation envisagée	1,6	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	5,2	0,0	0,0
pas déterminé pour l'instant	13,8	2,9	12,5	15,4	0,0	0,0	17,6	17,4	25,0
autres	0,4	8,8	3,1	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
N**	753	34	96	13	9	3	153	23	4
données manquantes	1 743	119	342	63	65	0	1 020	91	9

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2020), hommes

Hommes

	Patients: problème principal								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	29,4	34,4	37,7	33,3	100,0	50,0	16,5	46,7	33,3
états anxieux/tension nerv. importants	25,4	28,1	31,1	33,3	80,0	100,0	12,8	40,0	33,3
diffic. compréhension/mémoire	13,2	15,6	19,7	16,7	40,0	50,0	9,2	13,3	33,3
altération de l'attention ou hyperactivité	14,2	12,5	29,5	33,3	40,0	50,0	16,5	13,3	33,3
pensées obsessionnelles/actions compulsives	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
réaction aiguë au stress sévère/troubles adaptation	6,7	0,0	9,8	0,0	20,0	0,0	3,7	0,0	0,0
hallucinations	1,7	3,1	6,6	0,0	20,0	0,0	2,8	6,7	0,0
diffic. à contrôler comportement violent	9,2	0,0	14,8	0,0	20,0	50,0	6,4	13,3	0,0
problèmes psychiques traités avec médic.	22,4	18,8	18,0	0,0	80,0	0,0	17,4	26,7	0,0
pensées suicidaires sérieuses	10,0	9,4	11,5	33,3	40,0	0,0	8,3	20,0	0,0
tentatives de suicide	3,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	2,8	13,3	0,0
autre(s) problème(s) psychique(s)	3,7	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	1,8	6,7	0,0
aucun	43,5	50,0	37,7	50,0	0,0	0,0	66,1	33,3	66,7
N**	402	32	61	6	5	2	109	15	3
<i>données manquantes</i>	<i>1 299</i>	<i>75</i>	<i>306</i>	<i>40</i>	<i>42</i>	<i>0</i>	<i>822</i>	<i>52</i>	<i>5</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24b Problèmes psychiques au cours de la vie (2020), femmes

Femmes

Patientes: problème principal									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	46,5	60,0	40,0	33,3	50,0	100,0	31,6	16,7	66,7
états anxieux/tension nerv. importants	38,2	30,0	40,0	0,0	50,0	100,0	26,3	50,0	66,7
diffic. compréhension/mémoire	17,6	10,0	40,0	0,0	25,0	100,0	10,5	0,0	0,0
altération de l'attention ou hyperactivité	17,6	20,0	40,0	0,0	25,0	100,0	10,5	0,0	0,0
pensées obsessionnelles/actions compulsives	1,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0
hallucinations	1,8	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0
diffic. à contrôler comportement violent	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	15,8	16,7	0,0
problèmes psychiques traités avec médic.	35,9	30,0	60,0	0,0	75,0	0,0	23,7	16,7	33,3
pensées suicidaires sérieuses	10,0	10,0	0,0	0,0	50,0	0,0	10,5	16,7	0,0
tentatives de suicide	4,7	10,0	0,0	0,0	25,0	0,0	5,3	16,7	0,0
autre(s) problème(s) psychique(s)	2,9	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0
aucun	27,1	40,0	20,0	33,3	25,0	0,0	39,5	50,0	33,3
N**	170	10	5	3	4	1	38	6	3
<i>données manquantes</i>	<i>625</i>	<i>36</i>	<i>66</i>	<i>27</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>204</i>	<i>41</i>	<i>2</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24c Problèmes psychiques au cours de la vie (2020), hommes et femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	34,4	40,5	37,9	33,3	77,8	66,7	20,4	38,1	50,0
états anxieux/tension nerv. importants	29,2	28,6	31,8	22,2	66,7	100,0	16,3	42,9	50,0
diffic. compréhension/mémoire	14,5	14,3	21,2	11,1	33,3	66,7	9,5	9,5	16,7
altération de l'attention ou hyperactivité	15,2	14,3	30,3	22,2	33,3	66,7	15,0	9,5	16,7
pensées obsessionnelles/actions compulsives	1,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	6,6	0,0	9,1	0,0	11,1	0,0	4,1	0,0	0,0
hallucinations	1,7	2,4	7,6	0,0	11,1	0,0	2,7	4,8	0,0
diffic. à contrôler comportement violent	10,0	0,0	13,6	0,0	11,1	66,7	8,8	14,3	0,0
problèmes psychiques traités avec médic.	26,4	21,4	21,2	0,0	77,8	0,0	19,0	23,8	16,7
pensées suicidaires sérieuses	10,0	9,5	10,6	22,2	44,4	0,0	8,8	19,0	0,0
tentatives de suicide	3,5	2,4	1,5	0,0	11,1	0,0	3,4	14,3	0,0
autre(s) problème(s) psychique(s)	3,5	0,0	7,6	11,1	0,0	0,0	2,0	4,8	0,0
aucun	38,6	47,6	36,4	44,4	11,1	0,0	59,2	38,1	50,0
N**	572	42	66	9	9	3	147	21	6
<i>données manquantes</i>	<i>1 924</i>	<i>111</i>	<i>372</i>	<i>67</i>	<i>65</i>	<i>0</i>	<i>1 026</i>	<i>93</i>	<i>7</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T25 Proches: lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2020)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	N
Lien avec la tierce personne*				
mère/père	38,9	36,4	37,0	398
filles/fils	18,8	12,3	13,8	148
sœur/frère	1,7	4,1	3,5	38
conjoint-e/partenaire	29,7	40,1	37,8	407
autre proche/parent-e	3,3	2,3	2,5	27
collègue/ami-e	4,2	3,1	3,3	36
employeur/se, enseignant-e	0,4	0,0	0,1	1
tuteur/trice, curateur/trice	0,4	0,0	0,1	1
autre	2,5	1,7	1,9	20
N**	239	837	1 076	1 076
<i>données manquantes</i>	2	2	4	4

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T26 Proches: problème principal de la tierce personne (2020)

Proches		
	Total	
	%	N
Problème principal de la tierce personne*		
alcool	55,2	384
héroïne	1,9	13
méthadone	0,0	0
buprénorphine	0,0	0
fentanyl	0,0	0
autres opioïdes	0,6	4
cocaïne en poudre	9,8	68
crack	0,3	2
autre forme de cocaïne	0,0	0
amphétamines	0,3	2
méthamphétamines	0,4	3
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0,7	5
cathinones synthétiques	0,0	0
autres stimulants	0,0	0
barbituriques	0,0	0
benzodiazépines	1,1	8
GHB/GBL	0,0	0
autres somnifères et tranquillisants	0,0	0
LSD	0,0	0
kétamine	0,0	0
autres hallucinogènes	0,0	0
substances volatiles	0,0	0
cannabis	18,7	130
tabac	0,9	6
autre substance	0,6	4
jeu pathologique	2,3	16
dépendances aux ordinateurs/Internet	5,6	39
troubles alimentaires	0,3	2
autre comportement de type addictif	1,4	10
N**	696	696
<i>données manquantes</i>	384	384

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T27 Sexe et âge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2020)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N	
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sexe*																				
hommes																			63,0	3 808
femmes																			37,0	2 233
sexe pas connu																			0,0	0
N**	1 741	766	2 507	137	67	204	332	60	392	869	236	1 105	253	839	1 092	3 808	2 233	6 041	6 041	
Age (en années)*																				
jusqu'à 14	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	4,7	3,2	4,7	1,9	2,6	1,5	1,8	1,6	97	
15-19	1,7	2,0	1,8	2,9	1,5	2,5	3,3	1,7	3,1	58,1	53,8	57,2	6,7	1,3	2,6	17,5	9,1	14,4	869	
20-24	2,8	2,5	2,7	5,1	1,5	3,9	12,0	13,3	12,2	12,0	15,7	12,8	5,1	4,2	4,4	7,0	5,8	6,5	394	
25-29	6,5	3,8	5,7	7,3	11,9	8,8	20,8	26,7	21,7	10,8	9,7	10,6	2,8	5,5	4,9	9,1	6,9	8,3	500	
30-34	9,6	7,7	9,1	8,8	16,4	11,3	20,5	30,0	21,9	5,8	5,1	5,6	4,3	9,3	8,2	9,8	9,0	9,5	575	
35-39	12,2	11,2	11,9	15,3	13,4	14,7	20,2	15,0	19,4	5,3	5,1	5,2	5,5	9,9	8,9	10,6	9,7	10,3	622	
40-44	11,8	13,5	12,3	13,9	16,4	14,7	9,6	5,0	8,9	2,6	2,1	2,5	7,1	10,8	9,9	8,9	10,0	9,3	561	
45-49	12,6	12,8	12,6	13,9	17,9	15,2	7,2	1,7	6,4	2,2	1,7	2,1	13,4	14,4	14,2	8,9	11,5	9,9	595	
50-54	15,5	14,1	15,0	20,4	16,4	19,1	4,8	1,7	4,3	0,2	1,7	0,5	15,0	15,0	15,0	10,1	12,3	10,9	659	
55-59	10,7	12,9	11,4	7,3	3,0	5,9	1,2	3,3	1,5	0,1	0,4	0,2	11,5	11,4	11,4	6,6	9,6	7,7	466	
60-64	7,5	8,2	7,7	2,9	0,0	2,0	0,3	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	8,7	7,3	7,6	4,4	6,2	5,1	306	
65-69	4,3	5,2	4,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	5,5	5,5	5,5	2,7	4,4	3,3	200	
70-74	2,8	3,1	2,9	0,7	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	1,6	2,2	1,7	1,8	1,7	105	
75 et plus	1,8	2,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	1,9	2,7	1,2	1,8	1,4	87	
N**	1 741	765	2 506	137	67	204	332	60	392	869	236	1 105	253	835	1 088	3 808	2 228	6 036	6 036	
données manquantes	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	5	5	5	
Age (valeurs centrales)																				
moyenne	46,9	48,4	47,3	43,0	40,9	42,3	34,2	32,5	33,9	22,4	22,5	22,4	47,4	46,4	46,6	38,4	42,9	40,0		
écart-type	13,5	13,6	13,5	11,6	9,7	11,1	9,0	8,7	8,9	8,4	8,7	8,4	17,9	14,2	15,1	16,2	15,9	16,2		
1er quartile	36,7	38,8	37,4	35,1	33,0	34,5	27,6	27,7	27,7	17,0	16,8	17,0	36,3	36,7	36,7	24,4	30,8	26,6		
valeur médiane	47,4	48,6	47,8	43,6	43,5	43,5	33,1	30,9	32,4	18,2	18,4	18,3	50,0	47,5	48,1	37,5	43,8	39,6		
3e quartile	56,1	57,8	56,6	51,9	47,3	51,1	39,5	35,7	38,9	25,7	25,4	25,6	59,1	56,1	56,5	50,9	54,5	52,3		
N**	1 741	765	2 506	137	67	204	332	60	392	869	236	1 105	253	835	1 088	3 808	2 228	6 036		
données manquantes	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	5	5		

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2020)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N	
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Etat civil*																				
célibataire	43,9	31,8	40,0	73,5	61,9	70,0	72,6	90,9	75,6	92,9	91,0	92,5	32,9	28,3	29,2	62,5	45,9	56,6	1 747	
marié-e	32,0	31,2	31,7	10,2	23,8	14,3	21,2	4,5	18,5	3,7	5,8	4,2	49,4	50,0	49,9	22,4	29,9	25,1	775	
séparé-e	4,8	5,6	5,1	2,0	0,0	1,4	2,7	0,0	2,2	0,4	0,0	0,3	6,3	3,0	3,7	3,1	3,5	3,3	101	
divorcé-e	18,0	24,6	20,1	12,2	14,3	12,9	2,7	4,5	3,0	1,5	1,3	1,4	10,1	17,1	15,7	10,6	16,6	12,8	394	
veuf/veuve	1,2	6,8	2,9	2,0	0,0	1,4	0,9	0,0	0,7	1,5	1,9	1,6	1,3	1,3	1,3	1,2	4,0	2,2	68	
partenariat enregistré	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	4	
N**	953	443	1 396	49	21	70	113	22	135	535	156	691	79	304	383	1 982	1 107	3 089	3 089	
<i>données manquantes</i>	788	323	1 111	88	46	134	219	38	257	334	80	414	174	535	709	1 826	1 126	2 952	2 952	
Degré d'urbanisation*																				
grands centres urbains	14,1	12,1	13,4	1,6	0,0	1,1	14,5	25,0	16,3	2,6	4,5	3,1	19,3	20,5	20,2	9,6	12,1	10,5	383	
périphérie des grands centres	16,4	15,4	16,1	11,3	0,0	8,0	18,1	7,1	16,3	4,6	1,7	4,0	0,0	2,5	2,0	11,2	7,5	9,9	359	
villes de moyenne importance	13,3	16,0	14,1	1,6	12,0	4,6	17,4	17,9	17,5	29,4	23,9	28,2	23,9	24,6	24,4	19,3	20,3	19,7	717	
petites villes	29,2	28,7	29,1	41,9	68,0	49,4	33,3	28,6	32,5	31,3	33,5	31,8	28,4	24,8	25,6	31,0	30,0	30,6	1 116	
campagne	27,1	27,7	27,3	43,5	20,0	36,8	16,7	21,4	17,5	32,1	36,4	33,0	28,4	27,6	27,8	28,9	30,0	29,3	1 067	
N**	1 109	505	1 614	62	25	87	138	28	166	608	176	784	109	395	504	2 325	1 317	3 642	3 642	
<i>données manquantes</i>	632	261	893	75	42	117	194	32	226	261	60	321	144	444	588	1 483	916	2 399	2 399	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2020)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de ménage*																			
seul-e en ménage	42,0	34,4	39,7	54,9	47,4	52,5	33,2	31,4	32,9	9,4	16,0	10,8	13,6	12,5	12,7	31,3	26,2	29,6	1 140
avec famille d'origine	5,9	5,2	5,7	11,0	5,3	9,2	17,3	8,6	16,1	70,3	52,1	66,5	12,3	9,5	10,1	25,4	15,8	22,2	855
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	43,7	55,5	47,3	22,0	39,5	27,5	36,9	51,4	39,0	8,9	12,9	9,7	64,2	74,7	72,4	33,4	51,0	39,2	1 511
avec des amis ou d'autres personnes	2,6	2,3	2,5	4,9	0,0	3,3	3,3	2,9	3,2	2,4	3,1	2,6	3,7	2,4	2,7	2,7	2,4	2,6	101
en prison	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,4	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	2
institution/foyer	3,3	0,9	2,5	4,9	2,6	4,2	5,1	0,0	4,4	3,6	6,7	4,2	1,2	0,7	0,8	3,3	1,7	2,8	108
hôpital/clinique	0,4	0,5	0,4	0,0	2,6	0,8	0,5	2,9	0,8	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,4	16
autre	2,1	1,1	1,8	2,4	2,6	2,5	3,3	2,9	3,2	5,0	9,2	5,9	4,9	0,3	1,3	3,5	2,3	3,1	119
N**	1 258	555	1 813	82	38	120	214	35	249	617	163	780	81	296	377	2 576	1 276	3 852	3 852
données manquantes	483	211	694	55	29	84	118	25	143	252	73	325	172	543	715	1 232	957	2 189	2 189
Situation de domicile*																			
logement stable	95,2	96,0	95,5	90,5	83,3	88,3	92,7	97,4	93,4	92,7	91,2	92,4	94,8	97,5	97,0	94,2	95,5	94,6	3 833
logement instable/SDF	2,5	2,1	2,4	7,1	8,3	7,5	2,3	0,0	1,9	2,8	3,5	3,0	4,2	1,9	2,4	2,7	2,3	2,6	105
en prison	0,1	0,0	0,1	0,0	2,8	0,8	1,4	0,0	1,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	9
institution/foyer/hôpital/autre	2,1	1,9	2,1	2,4	5,6	3,3	3,7	2,6	3,5	4,3	5,3	4,5	1,0	0,5	0,6	2,8	2,1	2,5	103
N**	1 305	570	1 875	84	36	120	219	39	258	632	170	802	96	366	462	2 673	1 377	4 050	4 050
données manquantes	436	196	632	53	31	84	113	21	134	237	66	303	157	473	630	1 135	856	1 991	1 991
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	39,8	39,9	39,9	69,2	42,9	60,0	38,4	41,2	38,8	73,3	56,5	69,7	26,5	25,9	26,0	49,9	38,7	45,9	1 184
relations temporaires	3,0	3,6	3,2	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,6	4,0	3,7	4,0	4,4	1,2	1,9	3,1	3,1	3,1	80
partenaire fixe, vivant séparé	10,2	7,8	9,4	5,1	4,8	5,0	16,1	11,8	15,5	12,8	21,3	14,7	7,4	11,4	10,5	10,6	10,8	10,7	275
partenaire fixe, ménage commun	47,0	48,7	47,5	25,6	52,4	35,0	43,8	47,1	44,2	9,8	18,5	11,7	61,8	61,6	61,6	36,4	47,5	40,3	1 039
N**	856	386	1 242	39	21	60	112	17	129	397	108	505	68	255	323	1 668	910	2 578	2 578
données manquantes	885	380	1 265	98	46	144	220	43	263	472	128	600	185	584	769	2 140	1 323	3 463	3 463

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T30 Source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2020)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Source de revenu principale*																			
salaire	57,7	45,7	54,0	31,9	25,0	29,9	66,1	70,8	66,9	23,9	21,9	23,5	59,1	66,8	65,2	46,9	49,2	47,7	1 505
économies, épargne	1,1	0,5	0,9	4,3	5,0	4,5	0,8	0,0	0,7	0,4	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	0,7	21
rente (AVS, AI ou autre)	17,8	23,9	19,7	27,7	25,0	26,9	3,2	8,3	4,1	2,0	4,0	2,4	19,4	11,3	12,9	12,1	16,2	13,6	430
aide sociale	13,7	9,4	12,4	23,4	35,0	26,9	8,9	16,7	10,1	7,4	11,3	8,2	3,2	1,4	1,8	11,1	7,3	9,7	307
assurance-chômage	4,8	3,7	4,5	2,1	0,0	1,5	6,5	0,0	5,4	0,9	2,0	1,2	1,1	1,7	1,6	3,3	2,2	2,9	92
soutien du/de la partenaire	1,5	10,8	4,4	2,1	0,0	1,5	3,2	4,2	3,4	2,4	1,3	2,2	1,1	10,4	8,5	1,8	8,5	4,2	133
soutien parents/proches/amis	1,7	3,9	2,4	6,4	5,0	6,0	4,8	0,0	4,1	61,9	56,3	60,7	15,1	7,9	9,4	22,1	14,8	19,4	612
deal, petit trafic	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
autres revenus illégaux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
prostitution	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	4
assurance indemnités journalières	0,6	0,7	0,7	0,0	5,0	1,5	1,6	0,0	1,4	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,5	16
autre	0,9	1,1	1,0	2,1	0,0	1,5	4,8	0,0	4,1	0,6	2,0	0,9	1,1	0,6	0,7	1,1	0,9	1,0	32
N**	949	435	1 384	47	20	67	124	24	148	544	151	695	93	355	448	2 009	1 145	3 154	3 154
<i>données manquantes</i>	792	331	1 123	90	47	137	208	36	244	325	85	410	160	484	644	1 799	1 088	2 887	2 887
Taux d'activité principal*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	54,1	30,6	46,8	18,6	16,7	18,0	55,3	58,8	55,8	12,6	12,4	12,6	51,3	45,0	46,3	39,4	32,5	37,0	1 027
activité à temps partiel	5,8	23,3	11,2	11,6	5,6	9,8	3,9	17,6	5,8	2,9	7,3	3,8	6,4	30,2	25,0	4,8	20,9	10,4	288
jobs occasionnels	2,0	0,0	1,4	2,3	5,6	3,3	1,9	0,0	1,7	0,6	0,7	0,6	0,0	0,4	0,3	1,3	0,4	1,0	27,0
en formation	2,8	4,6	3,3	2,3	5,6	3,3	5,8	11,8	6,7	70,7	62,8	69,0	15,4	10,4	11,5	26,9	18,9	24,2	670
sans travail, en quête d'emploi	8,3	8,3	8,3	9,3	5,6	8,2	13,6	5,9	12,5	3,3	4,4	3,5	3,8	1,4	2,0	6,3	4,8	5,8	160
sans travail, sans recherche d'emploi	6,0	5,9	6,0	14,0	22,2	16,4	6,8	0,0	5,8	2,7	4,4	3,0	0,0	0,4	0,3	4,9	3,8	4,5	125
rentier/rentière	10,5	13,9	11,5	4,7	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	7,6	9,3	6,0	8,5	6,9	191
incapacité de travail	6,0	5,4	5,8	20,9	22,2	21,3	7,8	0,0	6,7	1,3	2,9	1,7	3,8	1,1	1,7	4,9	4,3	4,7	131
femme/homme au foyer	0,1	3,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,7	0,1	2,0	0,7	20,0
autre	4,4	4,8	4,6	16,3	16,7	16,4	4,9	5,9	5,0	5,9	5,1	5,8	3,8	1,4	2,0	5,4	3,8	4,9	135
N**	832	373	1 205	43	18	61	103	17	120	522	137	659	78	278	356	1 808	966	2 774	2 774
<i>données manquantes</i>	909	393	1 302	94	49	143	229	43	272	347	99	446	175	561	736	2 000	1 267	3 267	3 267

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2020)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	28,6	36,7	31,2	35,7	75,0	44,4	23,4	10,0	21,6	17,6	13,0	16,5	25,0	26,7	26,3	25,5	32,3	27,5	309
apprenti-e, stagiaire	1,5	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	4,7	20,0	6,8	31,8	15,2	27,8	0,0	0,0	0,0	8,5	4,6	7,4	83
manœuvre, aide	3,0	2,7	2,9	3,6	0,0	2,8	6,3	0,0	5,4	2,7	2,2	2,6	0,0	0,0	0,0	3,0	2,1	2,8	31
ouvrier/ère formé-e sur le tas	4,5	1,8	3,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,4	0,7	0,0	0,5	0,0	6,7	5,3	3,4	1,5	2,8	32
ouvrier/ère formé-e (CFC)	11,5	10,0	11,0	17,9	12,5	16,7	23,4	10,0	21,6	8,8	8,7	8,8	0,0	0,0	0,0	12,8	9,5	11,8	133
contremaître-sse	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	5,4	2,0	2,2	2,1	0,0	0,0	0,0	1,9	0,3	1,4	16
employé-e non qualifié-e	17,7	26,7	20,6	21,4	12,5	19,4	14,1	50,0	18,9	11,5	15,2	12,4	25,0	33,3	31,6	15,8	25,6	18,7	210
empl. qualifié-e, cadre moyen	14,5	12,7	13,9	10,7	0,0	8,3	7,8	10,0	8,1	4,7	2,2	4,1	25,0	26,7	26,3	11,5	11,0	11,4	128
employé-e, cadre supérieur	5,8	1,4	4,3	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,4	0,0	2,2	0,5	0,0	0,0	0,0	3,6	1,2	2,9	33
indépendant-e	9,2	4,5	7,7	7,1	0,0	5,6	9,4	0,0	8,1	1,4	2,2	1,5	25,0	0,0	5,3	7,3	4,3	6,4	72
écolier/ère, étudiant-e	0,9	0,5	0,7	3,6	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	18,2	30,4	21,1	0,0	6,7	5,3	5,4	4,9	5,2	59
autre statut	1,5	1,8	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,4	0,7	6,5	2,1	0,0	0,0	0,0	1,3	2,7	1,7	19
N**	469	221	690	28	8	36	64	10	74	148	46	194	4	15	19	797	328	1 125	1 125
données manquantes	1 272	545	1 817	109	59	168	268	50	318	721	190	911	249	824	1 073	3 011	1 905	4 916	4 916

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2020)

Raison principale*	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
fin régulière sans transfert	48,3	50,8	49,1	26,3	22,4	25,0	41,3	40,7	41,2	62,4	56,8	61,2	65,2	74,3	72,2	52,2	60,2	55,1	3 322
fin régulière avec transfert	6,7	7,3	6,9	16,1	6,0	12,7	5,7	10,2	6,4	4,6	6,8	5,1	4,0	2,7	3,0	6,3	5,8	6,1	369
changement de domicile	2,5	2,5	2,5	2,9	9,0	4,9	3,6	5,1	3,8	1,0	0,0	0,8	0,8	0,6	0,6	2,0	1,5	1,8	111
hospitalisation	0,9	0,9	0,9	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,5	31
détention	0,1	0,0	0,1	1,5	0,0	1,0	0,6	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	9
perte de contact	31,6	28,8	30,7	29,2	41,8	33,3	38,0	33,9	37,3	21,7	25,0	22,4	19,0	16,1	16,8	28,5	23,1	26,5	1 598
rupture explicite	6,2	6,6	6,3	14,6	9,0	12,7	8,4	6,8	8,2	6,4	8,1	6,8	4,0	3,1	3,3	6,5	5,5	6,1	370
décès	2,2	2,0	2,1	5,1	7,5	5,9	0,6	0,0	0,5	0,1	0,0	0,1	0,4	0,1	0,2	1,4	1,0	1,3	78
autre raison	1,5	1,2	1,4	2,9	4,5	3,4	1,8	3,4	2,0	3,5	2,5	3,3	6,7	3,0	3,8	2,3	2,3	2,3	139
N**	1 737	758	2 495	137	67	204	332	59	391	869	236	1 105	253	838	1 091	3 804	2 223	6 027	6 027
données manquantes	4	8	12	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	4	10	14	14

T32b Destination des transferts, selon le problème principal¹ et chez les proches (2020)

Destination des transferts***	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties			N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
traitement résidentiel	43,9	33,3	40,5	25,0	0,0	21,1	50,0	100,0	54,5	29,2	12,5	25,0	0,0	25,0	20,0	37,4	29,7	34,9	80
structure/clinique de jour	1,2	5,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,7	1,7	4
prise en charge ambulatoire	43,9	48,7	45,5	56,3	100,0	63,2	40,0	0,0	36,4	50,0	50,0	50,0	100,0	37,5	50,0	46,5	48,6	47,2	108
appartement protégé	1,2	2,6	1,7	6,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,7	1,7	4
autre institution spécialisée	9,8	10,3	9,9	12,5	0,0	10,5	10,0	0,0	9,1	20,8	37,5	25,0	0,0	37,5	30,0	13,5	16,2	14,4	33
N**	82	39	121	16	3	19	10	1	11	24	8	32	2	8	10	155	74	229	229
données manquantes	35	16	51	6	1	7	9	5	14	16	8	24	8	15	23	86	54	140	140

T32c Cause de décès, selon le problème principal¹ et chez les proches (2020)

Cause de décès****	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties			N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
suicide	9,1	50,0	17,9	25,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	50,0	16,1	30,0	19,5	8
accident	4,5	0,0	3,6	25,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	4,9	2
maladie	72,7	50,0	67,9	50,0	100,0	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0	61,3	70,0	63,4	26
surdose ou intoxication aiguë	4,5	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	4,9	2
autre cause de décès	9,1	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	7,3	3
N**	22	6	28	4	3	7	2	0	2	0	0	0	1	1	2	31	10	41	41
données manquantes	16	9	25	3	2	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	24	13	37	37

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s transféré-e-s. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s décédé-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2020)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
Durée de la prise en charge* (%)																			
1 semaine ou moins	3,9	4,4	4,1	2,9	1,5	2,5	4,5	8,3	5,1	4,3	5,5	4,5	10,7	9,7	9,9	4,4	6,2	5,1	308
> 1 semaine à 1 mois	3,3	2,3	3,0	3,6	3,0	3,4	1,8	0,0	1,5	9,9	9,3	9,8	5,9	5,0	5,2	4,9	4,2	4,6	278
> 1 à 2 mois	4,6	3,7	4,3	3,6	0,0	2,5	4,2	3,3	4,1	9,1	12,3	9,8	2,8	6,4	5,6	5,5	5,5	5,5	330
>2 à 3 mois	4,7	3,7	4,4	8,0	1,5	5,9	4,8	6,7	5,1	9,4	6,4	8,8	6,7	5,1	5,5	6,0	4,5	5,4	328
>3 à 6 mois	12,2	12,7	12,3	8,0	11,9	9,3	13,9	16,7	14,3	15,2	15,7	15,3	18,2	15,7	16,3	13,2	14,2	13,5	817
>6 mois à 1 an	29,5	29,9	29,6	16,8	19,4	17,6	34,3	30,0	33,7	30,6	28,4	30,1	34,0	30,6	31,4	30,8	30,5	30,7	1 853
>1 à 2 ans	21,6	22,3	21,8	16,1	20,9	17,6	22,0	21,7	21,9	14,7	16,9	15,2	17,8	18,6	18,4	19,8	20,8	20,2	1 217
>2 à 3 ans	8,8	8,4	8,7	13,1	7,5	11,3	6,6	10,0	7,1	3,2	3,0	3,2	2,0	3,9	3,5	6,8	5,8	6,4	387
>3 à 5 ans	5,8	6,9	6,1	11,7	14,9	12,7	5,1	1,7	4,6	2,8	1,3	2,4	1,6	3,2	2,8	4,9	4,8	4,8	292
>5 à 10 ans	4,0	4,8	4,3	10,2	13,4	11,3	1,8	1,7	1,8	0,7	1,3	0,8	0,4	1,0	0,8	2,8	2,8	2,8	168
plus de 10 ans	1,6	0,9	1,4	5,8	6,0	5,9	0,9	0,0	0,8	0,1	0,0	0,1	0,0	0,7	0,5	1,1	0,8	1,0	58
N**	1 741	766	2 507	137	67	204	332	60	392	869	236	1 105	253	839	1 092	3 804	2 232	6 036	6 036
<i>données manquantes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	5
Durée (en semaines)																			
moyenne	77,1	77,4	77,2	140,2	162,5	147,5	63,1	51,7	61,3	38,6	35,3	37,9	36,5	48,2	45,5	64,4	62,0	63,5	
écart-type	110,3	99,4	107,1	195,6	178,8	190,1	80,8	51,5	77,1	51,8	45,1	50,5	38,6	82,9	75,2	96,3	91,5	94,5	
1er quartile	20,7	21,6	20,9	20,1	29,9	25,4	20,9	15,9	20,0	8,4	7,7	8,3	11,1	11,1	11,1	15,4	15,3	15,4	
valeur médiane	43,9	44,5	44,0	65,9	84,3	72,1	41,8	33,8	40,4	25,9	24,6	25,6	26,9	28,9	28,2	37,4	35,9	37,0	
3e quartile	87,3	88,7	88,1	169,7	229,4	226,0	72,5	72,4	72,4	47,6	49,9	48,6	47,1	55,1	53,5	70,6	71,0	70,9	
N**	1 741	766	2 507	137	67	204	332	60	392	869	236	1 105	253	839	1 092	3 804	2 232	6 036	
<i>données manquantes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2020)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution pendant la prise en charge*																
non	99,4	99,5	99,5	83,6	90,9	85,7	99,1	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0	99,1	99,3	99,2	2 579
oui	0,6	0,5	0,5	16,4	9,1	14,3	0,9	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,7	0,8	21
N**	883	398	1 281	55	22	77	106	19	125	553	146	699	1 849	751	2 600	2 600
données manquantes	858	368	1 226	82	45	127	226	41	267	316	90	406	1 706	643	2 349	2 349
Type de substitution***																
héroïne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0
méthadone	40,0	100,0	57,1	77,8	100,0	81,8	100,0	-	100,0	-	-	-	66,7	100,0	73,7	14
autres opioïdes	20,0	0,0	14,3	22,2	0,0	18,2	0,0	-	0,0	-	-	-	20,0	0,0	15,8	3
autres substances	40,0	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	13,3	0,0	10,5	2
N**	5	2	7	9	2	11	1	0	1	0	0	0	15	4	19	19
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
Substitution après la prise en charge*																
non	99,8	99,2	99,6	71,8	82,4	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	99,1	99,2	2 343
oui	0,2	0,8	0,4	28,2	17,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	0,8	19
N**	815	369	1 184	39	17	56	89	18	107	507	130	637	1 680	682	2 362	2 362
données manquantes	926	397	1 323	98	50	148	243	42	285	362	106	468	1 875	712	2 587	2 587
Type de substitution***																
prescription d'héroïne	0,0	33,3	20,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	16,7	5,3	1
traitement de substitution	100,0	66,7	80,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	83,3	94,7	18
N**	2	3	5	11	3	14	0	0	0	0	0	0	13	6	19	19
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s substitué-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2020)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Postcure prévue et mise en place*																
non	90,4	85,8	89,0	91,5	85,7	90,2	91,2	71,4	89,3	97,8	92,9	96,6	92,6	87,1	91,1	1 158
oui	9,6	14,2	11,0	8,5	14,3	9,8	8,8	28,6	10,7	2,2	7,1	3,4	7,4	12,9	8,9	113
N**	531	233	764	47	14	61	68	7	75	180	56	236	922	349	1 271	1 271
<i>données manquantes</i>	1 210	533	1 743	90	53	143	264	53	317	689	180	869	2 633	1 045	3 678	3 678
Type de la postcure prévue***																
appartement protégé de l'institution	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
service de postcure de l'institution	0,0	3,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,0	1
appartement protégé extérieur	6,4	3,2	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	2,4	3,9	4
service de postcure extérieur	34,0	25,8	30,8	50,0	0,0	33,3	75,0	100,0	80,0	50,0	0,0	28,6	37,1	22,0	31,1	32
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	25,5	35,5	29,5	25,0	50,0	33,3	25,0	0,0	20,0	25,0	33,3	28,6	24,2	31,7	27,2	28
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	14,3	6,5	0,0	3,9	4
autre centre de consultation	14,9	12,9	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	14,3	12,9	19,5	15,5	16
groupe d'entraide	8,5	3,2	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	20,0	0,0	0,0	0,0	6,5	4,9	5,8	6
groupe d'ancien-ne-s client-e-s de l'institution	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
autre	14,9	16,1	15,4	0,0	50,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	14,3	12,9	19,5	15,5	16
N**	47	31	78	4	2	6	4	1	5	4	3	7	62	41	103	103
<i>données manquantes</i>	4	2	6	0	0	0	2	1	3	0	1	1	6	4	10	10

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pour lesquels une postcure est prévue. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2020)

Problèmes addictifs à la sortie*	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
alcool	78,4	82,4	79,6	23,9	35,5	27,5	23,4	7,1	21,2	13,1	16,0	13,7	52,5	61,6	55,0	1 257
héroïne	1,1	1,9	1,4	57,7	48,4	54,9	2,3	3,6	2,5	0,4	2,7	0,8	3,8	4,2	3,9	89
méthadone	0,4	1,0	0,6	8,5	9,7	8,8	0,6	0,0	0,5	0,0	1,3	0,3	0,7	1,3	0,8	19
buprénorphine	0,3	0,7	0,4	1,4	0,0	1,0	0,6	0,0	0,5	0,0	1,3	0,3	0,3	0,6	0,4	9
fentanyl	0,3	0,7	0,4	0,0	3,2	1,0	0,6	0,0	0,5	0,0	1,3	0,3	0,3	0,8	0,4	10
autres opioïdes	0,6	0,7	0,7	7,0	6,5	6,9	0,6	0,0	0,5	0,7	1,3	0,8	1,1	1,0	1,0	24
cocaïne en poudre	5,1	3,6	4,6	22,5	25,8	23,5	74,3	67,9	73,4	4,6	6,7	5,0	13,2	8,1	11,8	270
crack	0,3	0,7	0,4	1,4	0,0	1,0	4,0	3,6	3,9	0,0	1,3	0,3	0,7	0,8	0,7	16
autre forme de cocaïne	0,2	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,0	0,0	1,3	0,3	0,2	0,6	0,3	8
amphétamines	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	4,0	3,6	3,9	1,1	1,3	1,1	1,5	1,1	1,4	32
méthamphétamines	0,2	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,5	0,0	1,3	0,3	0,4	1,0	0,5	12
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0,5	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	2,5	2,5	5,3	3,1	1,1	1,5	1,2	28
cathinones synthétiques	0,2	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,5	0,4	1,3	0,6	0,2	0,8	0,4	9
autres stimulants	0,2	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,5	0,0	1,3	0,3	0,2	1,0	0,4	9
barbituriques	0,3	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,5	0,0	1,3	0,3	0,2	0,6	0,3	8
benzodiazépines	1,0	1,4	1,2	16,9	16,1	16,7	1,1	0,0	1,0	0,7	4,0	1,4	2,2	4,5	2,8	64
GHB/GBL	0,5	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,5	0,0	1,3	0,3	0,4	0,6	0,4	10
autres somnifères et tranquillisants	0,3	0,7	0,4	0,0	3,2	1,0	0,6	0,0	0,5	0,0	1,3	0,3	0,4	1,1	0,6	14
LSD	0,4	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,5	1,1	1,3	1,1	0,7	0,8	0,7	17
kétamine	0,4	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,0	0,0	1,3	0,3	0,4	0,6	0,4	10
autres hallucinogènes	0,3	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,5	0,4	1,3	0,6	0,4	0,6	0,4	10
substances volatiles	0,3	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,3	8
cannabis	4,7	3,9	4,4	11,3	32,3	17,6	12,6	7,1	11,8	70,9	80,0	72,8	17,6	15,3	17,0	389
tabac	9,4	10,6	9,8	7,0	19,4	10,8	8,0	7,1	7,9	8,9	16,0	10,4	9,2	11,1	9,7	222
autre substance	0,6	0,5	0,6	1,4	0,0	1,0	1,1	0,0	1,0	0,4	0,0	0,3	1,0	0,8	1,0	22
jeu pathologique	0,6	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,3	3,0	2,3	2,8	64
dépendances aux ordinateurs/Internet	0,5	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,3	0,8	2,5	1,3	2,2	50
troubles alimentaires	0,5	2,2	1,0	0,0	3,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,6	0,4	3,5	1,2	28
autre comportement de type addictif	0,4	1,0	0,6	0,0	3,2	1,0	1,7	0,0	1,5	0,0	1,3	0,3	1,0	1,3	1,1	25
aucun	19,0	16,7	18,3	12,7	6,5	10,8	17,1	14,3	16,7	23,4	10,7	20,7	19,5	15,6	18,5	422
N**	966	414	1 380	71	31	102	175	28	203	282	75	357	1 667	620	2 287	2 287
données manquantes	775	352	1 127	66	36	102	157	32	189	587	161	748	1 888	774	2 662	2 662

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T37 Fréquence des rechutes et substance ou comportement impliqué pendant la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2020)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence des rechutes*																
aucune	51,5	37,2	47,3	50,0	33,3	45,0	45,5	66,7	47,2	65,9	61,1	65,1	54,1	38,3	50,0	368
une fois	7,8	8,8	8,1	7,1	16,7	10,0	3,0	0,0	2,8	12,5	0,0	10,4	8,3	8,8	8,4	62
deux fois	10,0	8,1	9,4	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	16,7	2,3	0,0	1,9	8,3	6,7	7,9	58
trois ou quatre fois	11,4	18,9	13,6	7,1	0,0	5,0	9,1	0,0	8,3	6,8	5,6	6,6	10,5	18,1	12,5	92
cinq fois ou plus	19,4	27,0	21,6	35,7	50,0	40,0	24,2	33,3	25,0	12,5	33,3	16,0	18,8	28,0	21,2	156
N**	361	148	509	14	6	20	33	3	36	88	18	106	543	193	736	736
<i>données manquantes</i>	1 380	618	1 998	123	61	184	299	57	356	781	218	999	3 012	1 201	4 213	4 213
Substance/comportement addictif lors des rechutes***																
alcool	97,5	97,6	97,6	20,0	33,3	25,0	35,3	0,0	33,3	23,1	33,3	25,0	77,7	86,8	80,6	266
opioïdes	1,9	2,4	2,0	80,0	33,3	62,5	5,9	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	4,0	2,8	3,6	12
cocaïne et dérivés	5,6	4,7	5,3	0,0	66,7	25,0	88,2	100,0	88,9	19,2	16,7	18,8	12,9	8,5	11,5	38
autres stimulants	1,9	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	5,6	7,7	0,0	6,3	3,1	0,9	2,4	8
somnifères/tranquillisants	1,2	0,0	0,8	0,0	33,3	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,9	1,5	5
hallucinogènes	0,6	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	5,6	3,8	0,0	3,1	1,3	0,0	0,9	3
substances volatiles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
cannabis	3,7	2,4	3,3	0,0	33,3	12,5	17,6	0,0	16,7	84,6	100,0	87,5	15,6	11,3	14,2	47
tabac	0,6	2,4	1,2	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	1,3	1,9	1,5	5
autres substances	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
jeu pathologique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	3,1	1,8	0,9	1,5	5
dépendances aux ordinateurs/Internet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	6,3	2,2	0,9	1,8	6
troubles alimentaires	0,6	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	3
autre comportement de type addictif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,9	1,5	5
N**	161	85	246	5	3	8	17	1	18	26	6	32	224	106	330	330
<i>données manquantes</i>	14	8	22	2	1	3	1	0	1	4	1	5	25	13	38	38

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2020)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	46,8	49,0	47,5	35,7	14,3	28,6	28,9	25,0	28,6	20,0	17,4	19,4	41,3	42,8	41,7	289
1 jour par semaine ou moins	0,9	0,7	0,8	7,1	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,0	1,4	0,5	1,2	8
2 à 3 jours par semaine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	4,8	6,7	0,0	5,1	1,6	0,0	1,2	8
4 à 6 jours par semaine	1,2	1,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	4,3	3,1	1,2	1,5	1,3	9
une fois par jour	2,4	0,7	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	4,3	3,1	2,0	1,0	1,7	12
plusieurs fois par jour	48,6	48,3	48,5	57,1	85,7	66,7	65,8	75,0	66,7	65,3	73,9	67,3	52,5	54,1	53,0	367
N**	327	145	472	14	7	21	38	4	42	75	23	98	499	194	693	693
<i>données manquantes</i>	1 414	621	2 035	123	60	183	294	56	350	794	213	1 007	3 056	1 200	4 256	4 256
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10 cigarettes par jour	21,6	27,1	23,2	28,6	40,0	33,3	25,0	66,7	29,6	50,0	37,5	47,1	29,5	31,9	30,1	100
11 à 20 cigarettes par jour	48,2	54,2	50,0	57,1	20,0	41,7	62,5	33,3	59,3	42,6	43,8	42,9	48,1	48,4	48,2	160
21 à 30 cigarettes par jour	20,1	18,6	19,7	14,3	20,0	16,7	12,5	0,0	11,1	3,7	12,5	5,7	14,9	16,5	15,4	51
31 cigarettes par jour ou plus	10,1	0,0	7,1	0,0	20,0	8,3	0,0	0,0	0,0	3,7	6,3	4,3	7,5	3,3	6,3	21
N**	139	59	198	7	5	12	24	3	27	54	16	70	241	91	332	332
<i>données manquantes</i>	35	15	50	2	1	3	3	0	3	6	3	9	52	20	72	72

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème¹ (seulement patient-e-s) (2020)

	Patient-e-s: principale substance posant problème ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Objectif de consommation*																
abstinence définitive	37,6	36,8	37,3	57,1	37,5	51,7	54,3	50,0	53,8	40,2	50,0	42,4	39,7	38,9	39,5	374
abstinence limitée dans le temps	13,4	13,5	13,4	9,5	0,0	6,9	4,3	0,0	3,8	6,5	3,1	5,8	11,2	10,7	11,1	105
consommation contrôlée	37,4	42,0	38,7	14,3	25,0	17,2	26,1	50,0	28,8	29,9	25,0	28,8	35,0	40,1	36,4	345
aucune limitation envisagée	1,9	1,6	1,8	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	1,9	3,7	3,1	3,6	2,0	1,5	1,9	18
pas déterminé pour l'instant	9,7	5,2	8,4	9,5	25,0	13,8	13,0	0,0	11,5	18,7	18,8	18,7	10,9	7,3	9,9	94
autre	0,0	1,0	0,3	9,5	12,5	10,3	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,7	1,0	1,5	1,2	11
N**	463	193	656	21	8	29	46	6	52	107	32	139	685	262	947	947
<i>données manquantes</i>	<i>1 278</i>	<i>573</i>	<i>1 851</i>	<i>116</i>	<i>59</i>	<i>175</i>	<i>286</i>	<i>54</i>	<i>340</i>	<i>762</i>	<i>204</i>	<i>966</i>	<i>2 870</i>	<i>1 132</i>	<i>4 002</i>	<i>4 002</i>
Pronostic*																
très bon pronostic	17,3	19,6	18,0	14,3	16,7	14,8	19,0	16,7	18,8	22,5	30,4	24,0	18,6	21,2	19,3	167
bon pronostic	46,0	41,7	44,7	47,6	16,7	40,7	33,3	66,7	37,5	55,9	47,8	54,4	47,1	41,9	45,8	397
plutôt mauvais pronostic	24,9	28,6	25,9	33,3	66,7	40,7	33,3	16,7	31,3	16,7	21,7	17,6	23,7	28,4	24,9	216
mauvais pronostic	11,8	10,1	11,4	4,8	0,0	3,7	14,3	0,0	12,5	4,9	0,0	4,0	10,5	8,6	10,0	87
N**	422	168	590	21	6	27	42	6	48	102	23	125	645	222	867	867
<i>données manquantes</i>	<i>1 319</i>	<i>598</i>	<i>1 917</i>	<i>116</i>	<i>61</i>	<i>177</i>	<i>290</i>	<i>54</i>	<i>344</i>	<i>767</i>	<i>213</i>	<i>980</i>	<i>2 910</i>	<i>1 172</i>	<i>4 082</i>	<i>4 082</i>

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu