



Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance

Résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2005

Recueil de tableaux statistiques

Mariana Astudillo, Etienne Maffli

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du monitoring *act-info*. Nous remercions également les collaborateurs et collaboratrices des services de consultation qui ont effectué les tâches de logistique et de saisie. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance et coordonne l'ensemble du réseau *act-info*. Un grand merci également à Edith Bacher pour la conception graphique et la mise en page de ce rapport ainsi qu'à Marina Delgrande Jordan pour sa précieuse collaboration dans le développement des syntaxes d'analyse.

Compléments d'information: Etienne Maffli, tél. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emaffli@sfa-ispa.ch

Réalisation: Mariana Astudillo & Etienne Maffli, Institut suisse de
prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA)

Diffusion: Librairie ISPA, case postale 870, 1001 Lausanne,
tél. 021/321 29 35, fax 021 321 29 40,
e-mail librairie@sfa-ispa.ch

Prix: Fr. 10.–

Langue du texte original: français

Graphisme/mise en page: ISPA

Copyright: © ISPA-SFA Lausanne 2007

Citation recommandée: Astudillo, M & Maffli, E. (2007). Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance: résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2005 – Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies.

Table des matières

act-info – Information network an addiction care and therapy in Switzerland

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance

ADMISSION

- T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2005)
- T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2005)
- T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2005)
- T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2005)
- T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2005)
- T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2005)
- T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2005)
- T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2005)
- T9 Instance d'envoi principale et secondaire, selon le problème principal et chez les proches (2005)
- T10 Type d'aide attendue à l'admission et statut légal de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2005)
- T11 Traitements/prises en charge avant l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2005)
- T12 Substitution et autre traitement/prise en charge à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2005)
- T13a Admission suite à une cure de sevrage, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2005)
- T13b Fréquence des sevrages sans aide professionnelle avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2005)
- T14 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2005)
- T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2005), hommes

-
- T15.1b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2005), hommes
- T15.2a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2005), femmes
- T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2005), femmes
- T15.3a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2005), hommes & femmes
- T15.3b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2005), hommes & femmes
- T16.1a Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2005), hommes
- T16.1b Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2005), femmes
- T16.1c Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2005), hommes & femmes
- T16.2a Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2005), hommes
- T16.2b Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2005), femmes
- T16.2c Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2005), hommes & femmes
- T17 Mode d'administration de la principale substance posant problème au cours des 6 derniers mois avant l'admission (2005)
- T18 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 6 derniers mois avant l'admission des injections, échange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois avant l'admission et âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2005)
- T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2005), hommes
- T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2005), femmes
- T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2005), hommes & femmes
- T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2005), hommes
- T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2005), femmes
- T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2005), hommes & femmes

-
- T20 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2005)
- T21 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2005)
- T22a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2005), hommes
- T22b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2005), femmes
- T22c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2005), hommes & femmes

SORTIE

- T23 Sexe et âge, selon le problème principal et chez les proches (2005)
- T24 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2005)
- T25 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2005)
- T26 Plus haute formation achevée, source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2005)
- T27 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2005)
- T28a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2005)
- T28b Destination des transferts, selon le problème principal et chez les proches (2005)
- T28c Cause de décès, selon le problème principal et chez les proches (2005)
- T29 Durée de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2005)
- T30 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2005)
- T31 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2005)
- T32 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2005)
- T33 Fréquence des rechutes, substance ou comportement impliqué et durée des rechutes pendant la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2005)
- T34 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2005)
- T35 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème (seulement patient-e-s) (2005)

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- SAMBAD (Statistique du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance)
- Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HegeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Méthadone (Statistique nationale des traitements de substitution)

Ces cinq statistiques, réalisées séparément jusqu'à fin 2003, disposent désormais d'instruments harmonisés et optimisés qui permettent la constitution d'une base de données nationale et garantissent la comparabilité des données tant au niveau national qu'international.

act-info est financé et coordonné par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne (ISPM), l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies à Lausanne (ISPA) et l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zürich (ISGF).

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)

Dès 2004, les instruments de monitoring *act-info* ont été introduits dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance et remplacent les anciens questionnaires en vigueur depuis 1994. La réalisation d'*act-info* dans ce secteur est confiée à l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA).

La statistique *act-info* SAMBAD offre un aperçu de la clientèle et des activités de l'aide ambulatoire en matière de dépendance en Suisse. Les données sont récoltées au début et à la fin de la prise en charge. Les informations rassemblées à l'admission renseignent en particulier sur les caractéristiques socio-démographiques des client-e-s, sur leurs expériences de traitement ainsi que sur leurs modes de consommation et problèmes psychosociaux avant la prise en charge. Les informations récoltées à la sortie rendent principalement compte des caractéristiques socio-démographiques des client-e-s à ce moment, des mesures prises par les intervenant-e-s durant la prise en charge et des circonstances de la fin de celle-ci.

En 2005, 49 institutions du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance ont participé au monitoring *act-info*, une majorité d'entre elles déjà au moyen des nouveaux instruments. Il s'agit de services de consultation spécialisés pour les problèmes liés à l'alcool et/ou aux drogues illégales ainsi que de divers types de services polyvalents offrant également une aide pour les problèmes addictifs. Le profil détaillé des institutions du secteur ambulatoire fait l'objet d'un autre rapport annuel basé sur une enquête réalisée en début d'année auprès de tous les services concernés.

Quelques explications concernant les tableaux

La présente statistique descriptive des données de l'enquête *act-info* auprès des client-e-s du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance repose sur deux types de tableaux:

- lorsque la question a des catégories de réponses prédéfinies ou recodées en tranches distinctes (par exemple "état civil" ou "âge"), le tableau indique les pourcentages des différentes catégories de réponses
- lorsque la question n'a pas de catégories prédéfinies, mais requiert une valeur numérique (par exemple "âge au début de la consommation problématique"), le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1er quartile, 3e quartile)

La plupart des tableaux présentent les résultats de façon distincte pour les sous-groupes de patients et patientes ayant mentionné l'**alcool**, un **opiacé** (héroïne notamment), la **cocaïne** (et dérivés) ou le **cannabis** comme problème principal au moment de leur admission. Les **proches** venant consulter pour les problèmes d'un tiers font également l'objet d'analyses séparées pour les aspects socio-démographiques. A l'exception des thèmes directement liés aux modes de consommation ou aux formes de comportements addictifs non liés aux substances, les résultats ne sont en revanche pas présentés séparément pour les client-e-s (peu nombreux) ayant mentionné d'autres substances (par exemple un stimulant ou les substances volatiles) ou un problème addictif non lié à une substance (par exemple jeu pathologique) comme problème principal. Ces personnes sont cependant incluses dans les analyses portant sur l'ensemble des prises en charge figurant dans les blocs à droite des tableaux respectifs. Toutes les analyses sont effectuées séparément pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour tous sexes confondus (colonnes "Total" comprenant également les quelques personnes dont le sexe n'est pas connu).

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Le nombre de réponses valides **N** représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages ou autres paramètres. Il est indiqué pour chaque groupe ou sous-groupe considéré. En dessous, le nombre correspondant de données manquantes figure également. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés particulièrement prudemment.

Des notes en bas de tableau renseignent sur les éventuelles particularités des groupes de référence ainsi que sur le type de question. Lorsque plusieurs réponses sont possibles (par exemple aux tableaux du thème T19, "autres problèmes addictifs") les pourcentages obtenus ne sont pas additifs.

T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2005)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sexe*																			
hommes			71.6			76.3			72.9			81.4			20.2			63.6	2'469
femmes			28.4			23.7			27.1			18.6			79.8			36.4	1'415
sexe pas connu			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	1'484	590	2'074	283	88	371	132	49	181	258	59	317	134	531	665	2'469	1'415	3'884	3'884
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	1.7	5.7	0.8	0.6	0.6	0.9	0.7	0.8	31
15-19	1.4	1.5	1.4	1.4	12.6	4.1	8.3	19.1	11.2	52.2	59.3	53.5	3.9	2.7	3.0	7.8	6.2	7.3	277
20-24	4.0	2.6	3.6	17.2	25.3	19.1	25.0	29.8	26.3	20.8	13.6	19.4	4.7	5.9	5.6	9.0	7.1	8.3	316
25-29	6.5	5.0	6.1	16.5	21.8	17.8	18.2	10.6	16.2	7.5	3.4	6.7	11.8	6.3	7.4	9.0	6.8	8.2	312
30-34	9.6	7.6	9.0	23.7	17.2	22.1	19.7	17.0	19.0	8.6	5.1	8.0	6.3	10.5	9.7	11.8	9.7	11.0	420
35-39	14.5	12.9	14.1	24.0	14.9	21.9	15.9	8.5	14.0	2.7	10.2	4.1	12.6	11.5	11.7	14.2	12.4	13.6	518
40-44	17.0	17.2	17.0	11.5	3.4	9.6	6.8	14.9	8.9	1.2	3.4	1.6	12.6	18.2	17.1	14.0	15.7	14.6	557
45-49	16.4	15.1	16.0	4.3	3.4	4.1	6.1	0.0	4.5	0.4	3.4	1.0	15.0	15.2	15.2	12.1	13.0	12.4	474
50-54	12.5	16.2	13.6	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	10.9	11.0	8.8	11.5	9.8	373
55-59	9.1	10.0	9.3	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	6.6	6.4	6.2	7.2	6.5	249
60-64	4.8	7.4	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	5.9	5.8	3.3	5.7	4.2	160
65-69	2.7	3.4	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	3.1	3.8	1.9	2.7	2.2	84
70-74	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.0	1.9	0.7	1.2	0.9	35
75 et plus	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.6	0.9	0.4	0.2	0.3	12
N**	1'467	582	2'049	279	87	366	132	47	179	255	59	314	127	512	639	2'434	1'384	3'818	3'818
données manquantes	17	8	25	4	1	5	0	2	2	3	0	3	7	19	26	35	31	66	66
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	44.1	45.8	44.6	33.1	28.4	32.0	30.1	27.9	29.5	21.1	22.6	21.4	43.9	43.5	43.6	39.1	41.8	40.1	
écart-type	11.7	11.5	11.7	7.4	7.7	7.7	8.2	8.6	8.3	6.3	9.3	7.0	15.1	12.9	13.4	13.3	13.5	13.5	
1er quartile	36.0	38.5	36.6	27.0	21.5	25.7	23.2	20.5	22.9	16.9	16.2	16.8	33.0	34.7	34.7	29.0	32.3	30.0	
valeur médiane	44.0	45.6	44.5	33.6	27.5	31.9	29.8	25.0	28.1	18.7	18.0	18.7	43.7	43.7	43.7	39.0	42.4	40.1	
3e quartile	51.9	53.7	52.5	38.0	34.8	37.0	35.8	34.0	35.5	23.8	26.0	23.9	52.4	51.7	51.8	48.3	51.2	49.4	
N**	1'467	582	2'049	279	87	366	132	47	179	255	59	314	127	512	639	2'434	1'384	3'818	
données manquantes	17	8	25	4	1	5	0	2	2	3	0	3	7	19	26	35	31	66	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2005)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Etat civil*																			
célibataire	35.7	26.3	33.0	72.9	61.9	70.3	74.4	73.2	74.1	94.6	81.8	92.5	29.0	22.0	23.4	48.5	31.1	42.1	1'517
marié-e	34.6	32.1	33.9	12.6	11.9	12.5	16.0	7.3	13.9	3.2	6.8	3.8	51.6	56.3	55.4	28.5	37.9	32.0	1'151
séparé-e	6.7	6.8	6.7	2.6	3.6	2.8	1.6	2.4	1.8	0.5	0.0	0.4	4.8	4.0	4.2	5.2	5.0	5.1	184
divorcé-e	20.9	28.9	23.2	11.2	21.4	13.6	7.2	14.6	9.0	1.8	11.4	3.4	12.1	15.6	14.9	16.3	22.2	18.4	664
veuf/veuve	1.9	5.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.8	1.8	1.3	3.6	2.1	76
partenariat enregistré	0.2	0.0	0.2	0.7	1.2	0.8	0.8	2.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	10
N**	1'405	560	1'965	269	84	353	125	41	166	222	44	266	124	499	623	2'288	1'314	3'602	3'602
données manquantes	79	30	109	14	4	18	7	8	15	36	15	51	10	32	42	181	101	282	282
Nationalité*																			
CH	73.0	84.4	76.3	70.3	80.9	72.6	72.0	83.9	74.6	81.9	93.3	83.6	82.9	74.2	76.0	73.1	79.3	75.3	2'270
EU	13.4	10.2	12.5	16.3	10.3	15.0	16.8	16.1	16.7	9.6	3.3	8.7	9.4	13.7	12.8	14.0	12.0	13.2	399
autre	13.5	5.4	11.2	13.4	8.8	12.4	11.2	0.0	8.7	8.5	3.3	7.7	7.7	12.1	11.2	13.0	8.7	11.4	344
N**	1'138	462	1'600	246	68	314	107	31	138	177	30	207	117	454	571	1'911	1'102	3'013	3'013
données manquantes	346	128	474	37	20	57	25	18	43	81	29	110	17	77	94	558	313	871	871

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2005)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	17.6	18.9	18.0	0.0	1.4	0.4	2.9	9.7	4.4	0.0	2.0	0.4	17.1	16.5	16.6	12.0	15.0	13.2	401
périphérie des grands centres	18.9	19.1	19.0	7.0	7.2	7.1	7.6	0.0	5.9	4.8	0.0	3.9	23.4	17.6	18.8	15.0	15.7	15.3	465
villes de moyenne importance	9.9	6.9	9.1	28.6	27.5	28.4	19.0	25.8	20.6	16.4	2.0	13.7	13.5	12.3	12.5	13.5	10.8	12.5	381
petites villes	29.1	31.7	29.9	42.7	36.2	41.1	40.0	45.2	41.2	39.1	40.8	39.5	23.4	28.3	27.4	33.0	32.4	32.8	999
campagne	24.4	23.3	24.1	21.6	27.5	23.0	30.5	19.4	27.9	39.6	55.1	42.6	22.5	25.2	24.7	26.5	26.0	26.3	802
N**	1'168	476	1'644	213	69	282	105	31	136	207	49	256	111	448	559	1'905	1'143	3'048	3'048
données manquantes	316	114	430	70	19	89	27	18	45	51	10	61	23	83	106	564	272	836	836
Type de ménage (30 derniers jours)*																			
seul-e en ménage	39.7	33.2	37.9	34.9	17.5	30.8	30.8	20.5	28.0	15.0	10.9	14.2	22.2	12.1	14.0	34.3	22.1	29.8	953
avec un ou les parents	7.2	3.7	6.2	18.8	16.3	18.2	19.2	13.6	17.7	57.5	49.1	55.9	5.1	5.6	5.5	16.4	8.6	13.6	434
avec enfant(s), sans partenaire	1.2	12.1	4.3	0.4	8.8	2.3	0.0	13.6	3.7	0.0	5.5	1.0	5.1	13.1	11.6	1.1	12.6	5.3	168
avec partenaire, sans enfant	23.3	29.1	25.0	16.1	31.3	19.6	15.8	20.5	17.1	3.3	9.1	4.4	30.3	23.8	25.0	19.5	25.7	21.8	695
avec partenaire et enfant(s)	21.0	15.9	19.5	11.9	8.8	11.1	12.5	9.1	11.6	3.3	7.3	4.1	33.3	42.5	40.8	17.7	24.2	20.0	640
avec d'autres proches	1.4	1.3	1.3	3.1	6.3	3.8	5.0	4.5	4.9	5.8	5.5	5.8	3.0	1.2	1.5	2.5	1.8	2.3	72
avec des amis (colocation)	1.4	1.7	1.5	3.1	3.8	3.2	4.2	2.3	3.7	4.2	7.3	4.7	1.0	0.9	0.9	2.1	1.7	1.9	62
autre	4.9	3.0	4.3	11.9	7.5	10.9	12.5	15.9	13.4	10.8	5.5	9.8	0.0	0.7	0.6	6.5	3.2	5.3	169
N**	1'174	464	1'638	261	80	341	120	44	164	240	55	295	99	428	527	2'035	1'158	3'193	3'193
données manquantes	310	126	436	22	8	30	12	5	17	18	4	22	35	103	138	434	257	691	691
Situation de domicile (30 dernier jours)*																			
domicile fixe	93.9	94.9	94.2	84.2	87.2	84.8	83.1	82.6	82.9	92.9	89.3	92.3	99.0	99.1	99.1	92.2	95.4	93.4	3063
sans domicile fixe	2.4	2.3	2.4	7.5	6.4	7.3	8.1	4.3	7.1	1.2	7.1	2.4	1.0	0.4	0.5	3.1	2.2	2.8	91
institution	3.7	2.7	3.5	8.3	6.4	7.9	8.9	13.0	10.0	5.8	3.6	5.4	0.0	0.4	0.4	4.7	2.4	3.9	127
N**	1'207	474	1'681	265	78	343	124	46	170	241	56	297	103	454	557	2'090	1'191	3'281	3'281
données manquantes	277	116	393	18	10	28	8	3	11	17	3	20	31	77	108	379	224	603	603

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2005)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	34.1	32.6	33.7	47.8	12.5	39.4	47.8	20.7	41.3	68.1	45.5	65.0	6.4	13.9	12.4	38.9	23.5	33.3	751
relations temporaires	4.0	8.9	5.4	7.8	12.5	8.9	7.6	10.3	8.3	10.6	13.6	11.0	3.8	2.2	2.5	5.6	6.8	6.0	136
parten. fixe, vivant séparé	14.9	12.5	14.2	15.1	31.3	19.0	7.6	31.0	13.2	13.5	27.3	15.3	20.5	14.9	16.0	14.7	16.3	15.3	344
parten. fixe, mén. commun	46.9	46.0	46.7	29.3	43.8	32.7	37.0	37.9	37.2	7.8	13.6	8.6	69.2	69.0	69.0	40.9	53.4	45.4	1'022
N**	844	337	1'181	205	64	269	92	29	121	141	22	163	78	316	394	1'444	809	2'253	2'253
données manquantes	640	253	893	78	24	102	40	20	60	117	37	154	56	215	271	1'025	606	1'631	1'631
Nombre d'enfants propres*																			
aucun	44.9	37.4	42.7	69.0	62.5	67.4	75.2	59.4	71.6	90.4	80.0	88.7	36.5	29.5	30.8	54.5	38.5	48.7	1'341
1 enfant	17.9	20.0	18.5	17.7	19.4	18.1	12.8	25.0	15.6	6.8	11.4	7.5	11.8	16.2	15.4	16.1	18.1	16.8	464
2 enfants	23.9	30.0	25.7	10.2	12.5	10.7	8.3	6.3	7.8	2.8	5.7	3.3	42.4	33.9	35.5	20.0	28.7	23.1	638
3 enfants ou plus	13.3	12.6	13.1	3.1	5.6	3.7	3.7	9.4	5.0	0.0	2.9	0.5	9.4	20.4	18.4	9.5	14.6	11.4	313
N**	1'045	420	1'465	226	72	298	109	32	141	177	35	212	85	383	468	1'752	1'004	2'756	2'756
données manquantes	439	170	609	57	16	73	23	17	40	81	24	105	49	148	197	717	411	1'128	1'128
Nombre d'enfants dans le ménage*																			
aucun	74.3	66.3	71.9	83.3	69.0	80.0	81.6	84.2	82.1	77.3	66.7	75.6	63.1	46.1	48.9	75.9	58.8	69.4	1'504
1 enfant	10.2	16.0	12.0	10.4	20.7	12.8	5.7	10.5	6.6	6.1	16.7	7.7	12.3	20.0	18.7	9.6	17.6	12.6	273
2 enfants	10.1	14.0	11.3	5.2	8.6	6.0	9.2	5.3	8.5	11.4	8.3	10.9	21.5	25.2	24.6	10.2	17.8	13.1	283
3 enfants ou plus	5.3	3.8	4.9	1.0	1.7	1.2	3.4	0.0	2.8	5.3	8.3	5.8	3.1	8.8	7.8	4.4	5.8	4.9	106
N**	810	344	1'154	192	58	250	87	19	106	132	24	156	65	330	395	1'350	816	2'166	2'166
données manquantes	674	246	920	91	30	121	45	30	75	126	35	161	69	201	270	1'119	599	1'718	1'718

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2005)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Plus haute formation achevée*																			
aucune form. achevée	3.6	5.7	4.2	4.3	9.6	5.5	4.2	2.5	3.8	18.6	13.5	17.8	2.5	5.4	4.8	5.3	6.0	5.6	158
scolarité obligatoire	15.2	20.4	16.6	26.1	37.0	28.5	32.8	37.5	34.0	49.5	48.6	49.4	12.3	24.4	22.0	22.5	26.1	23.7	673
scolarité complémentaire	4.1	8.6	5.3	9.3	9.6	9.4	2.5	12.5	5.0	2.4	5.4	2.8	2.5	6.6	5.8	4.9	8.3	6.1	172
apprentissage/école prof.	60.8	50.0	57.9	54.5	34.2	50.0	52.1	42.5	49.7	25.7	21.6	25.1	44.4	43.1	43.3	53.7	43.6	50.3	1'427
maturité/diplôme	4.1	5.9	4.6	1.6	6.8	2.7	2.5	0.0	1.9	2.4	8.1	3.2	1.2	4.8	4.1	3.3	5.4	4.0	114
école normale, pédagog.	0.5	2.2	0.9	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.1	1.9	0.4	1.8	0.8	24
form. profession. supérieure	5.3	4.2	5.0	1.2	1.4	1.2	4.2	2.5	3.8	1.0	0.0	0.8	12.3	6.3	7.5	4.4	4.3	4.3	123
école profession. supérieure	1.4	0.5	1.1	0.8	1.4	0.9	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	4.9	1.8	2.4	1.2	0.9	1.1	32
haute école spécialisée	0.9	0.7	0.9	0.4	0.0	0.3	0.8	0.0	0.6	0.5	2.7	0.8	6.2	1.5	2.4	1.0	1.0	1.0	28
université, haute école	4.1	1.7	3.5	1.6	0.0	1.2	0.0	2.5	0.6	0.0	0.0	0.0	12.3	3.9	5.6	3.3	2.4	3.0	85
N**	1'085	406	1'491	257	73	330	119	40	159	210	37	247	81	332	413	1'876	960	2'836	2'836
données manquantes	399	184	583	26	15	41	13	9	22	48	22	70	53	199	252	593	455	1'048	1'048
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	30.9	46.2	35.2	60.4	65.5	61.5	41.4	72.7	47.7	25.7	15.4	24.2	18.0	21.8	21.1	33.8	37.8	35.2	767
apprenti-e, stagiaire	1.3	0.6	1.1	1.0	7.3	2.4	6.9	0.0	5.5	25.7	30.8	26.4	1.6	2.5	2.4	4.3	2.9	3.8	83
manceuvre, aide	2.4	5.4	3.2	4.1	3.6	4.0	6.9	0.0	5.5	2.0	0.0	1.7	0.0	3.6	3.0	3.0	4.1	3.4	74
ouvrier/ère formé-e sur le tas	8.4	7.6	8.2	8.1	3.6	7.1	10.3	0.0	8.3	2.0	0.0	1.7	4.9	10.5	9.5	7.8	7.9	7.8	171
ouvrier/ère formé-e (CFC)	14.5	6.0	12.1	10.7	1.8	8.7	11.5	4.5	10.1	2.0	7.7	2.8	9.8	5.5	6.3	12.2	5.7	10.0	218
contremaître-sse	2.6	0.3	2.0	1.5	0.0	1.2	3.4	0.0	2.8	0.7	0.0	0.6	3.3	0.7	1.2	2.2	0.4	1.6	35
employé-e non qualifié-e	13.8	19.3	15.4	6.1	3.6	5.6	3.4	0.0	2.8	6.6	0.0	5.6	14.8	25.1	23.2	12.2	19.4	14.7	320
empl. qualifié-e, cadre moyen	10.8	5.4	9.3	3.0	3.6	3.2	5.7	9.1	6.4	1.3	3.8	1.7	23.0	9.5	11.9	8.5	6.8	7.9	172
employé-e, cadre supérieur	2.8	0.9	2.3	1.5	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	3.6	6.3	2.7	2.0	2.5	54
indépendant-e	10.5	5.7	9.2	2.0	0.0	1.6	4.6	0.0	3.7	0.7	0.0	0.6	6.6	11.3	10.4	7.5	6.8	7.2	158
écolier/ère, étudiant-e	0.7	0.9	0.8	0.0	9.1	2.0	4.6	9.1	5.5	33.6	42.3	34.8	0.0	3.3	2.7	4.6	4.1	4.4	97
autre statut	1.3	1.5	1.4	1.5	1.8	1.6	1.1	4.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.1	1.1	2.0	1.4	31
N**	846	331	1'177	197	55	252	87	22	109	152	26	178	61	275	336	1'431	749	2'180	2'180
données manquantes	638	259	897	86	33	119	45	27	72	106	33	139	73	256	329	1'038	666	1'704	1'704

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2005)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Source de revenu principale (au cours des 30 derniers jours)*																			
salaire	51.6	32.9	46.5	29.8	29.2	29.7	45.9	22.2	40.8	31.5	33.3	31.8	77.8	55.1	59.2	48.4	41.1	45.8	1'350
économies, épargne	1.5	0.7	1.3	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.8	0.5	0.0	0.5	0.0	1.2	1.0	1.2	0.8	1.0	30
rente (AVS, AI ou autre)	16.6	23.5	18.5	14.9	16.9	15.4	12.2	25.9	15.2	8.2	5.6	7.7	15.6	10.8	11.6	15.1	17.6	15.9	470
aide sociale	13.9	12.5	13.5	30.3	33.8	31.1	21.4	11.1	19.2	6.0	5.6	5.9	1.1	2.7	2.4	14.4	9.6	12.7	373
assurance-chômage	11.9	9.4	11.2	14.9	7.7	13.2	7.1	18.5	9.6	7.1	5.6	6.8	2.2	2.0	2.0	11.0	6.2	9.3	274
soutien du/de la partenaire	1.2	17.7	5.7	1.0	6.2	2.2	0.0	7.4	1.6	0.0	2.8	0.5	0.0	24.5	20.1	0.8	18.7	7.2	213
soutien parents/proches/amis	2.0	2.7	2.2	4.3	3.1	4.0	7.1	14.8	8.8	45.1	47.2	45.5	2.2	3.4	3.2	7.3	5.6	6.7	198
deal, combines	0.2	0.2	0.2	0.0	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	5
autres revenus illégaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autre	1.1	0.4	0.9	3.8	1.5	3.3	4.1	0.0	3.2	1.1	0.0	0.9	1.1	0.2	0.4	1.5	0.4	1.1	33
N**	1'191	447	1'638	208	65	273	98	27	125	184	36	220	90	408	498	1'893	1'054	2'947	2'947
<i>données manquantes</i>	293	143	436	75	23	98	34	22	56	74	23	97	44	123	167	576	361	937	937
Taux d'activité principal (au cours des 30 derniers jours)*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	46.5	21.2	39.7	26.7	16.7	24.5	39.2	15.6	32.7	22.4	14.0	21.0	69.8	31.5	38.6	42.1	24.0	35.9	1'092
activité à temps partiel	4.1	18.9	8.1	4.7	8.3	5.5	5.8	11.1	7.3	1.8	11.6	3.4	3.5	32.0	26.6	4.0	22.1	10.2	310
plusieurs activités occas.	1.9	1.2	1.7	4.7	2.8	4.3	2.5	2.2	2.4	3.7	0.0	3.1	0.0	1.3	1.1	2.6	1.2	2.1	65
en formation	1.2	1.6	1.3	0.8	12.5	3.4	7.5	2.2	6.1	42.9	48.8	43.9	3.5	5.6	5.2	6.5	6.4	6.5	197
sans activité prof.	20.2	37.2	24.7	26.7	30.6	27.5	20.0	33.3	23.6	12.8	7.0	11.8	17.4	25.8	24.2	20.2	31.3	24.0	730
sans trav., en quête d'emploi	23.0	17.6	21.6	31.4	23.6	29.7	20.8	33.3	24.2	14.6	16.3	14.9	4.7	2.7	3.1	21.6	12.9	18.6	566
sans trav., futur empl. garanti	0.4	0.5	0.4	0.0	2.8	0.6	0.0	2.2	0.6	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.4	11
autre	2.8	1.8	2.5	5.1	2.8	4.6	4.2	0.0	3.0	1.4	2.3	1.5	1.2	1.1	1.1	2.8	1.5	2.4	72
N**	1'181	433	1'614	255	72	327	120	45	165	219	43	262	86	372	458	1'998	1'045	3'043	3'043
<i>données manquantes</i>	303	157	460	28	16	44	12	4	16	39	16	55	48	159	207	471	370	841	841

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2005)

	Patient-e-s: problème principale												Proches			Toutes prises en charge				N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Revenu mensuel net (6 derniers mois)*																				
aucun revenu	24.1	30.2	25.7	28.9	31.6	29.5	20.8	26.7	22.1	46.1	46.4	46.2	14.3	25.7	23.8	27.7	30.7	28.6	362	
moins de 1000 fr.	3.7	5.3	4.1	6.7	13.2	8.1	17.0	20.0	17.6	29.7	25.0	28.8	0.0	4.3	3.6	8.7	8.9	8.8	111	
de 1001 à 2000 fr.	7.6	11.1	8.5	19.3	18.4	19.1	9.4	20.0	11.8	4.7	17.9	7.1	0.0	12.9	10.7	8.5	12.1	9.6	121	
de 2001 à 3000 fr.	14.4	24.3	17.0	19.3	31.6	22.0	7.5	20.0	10.3	6.3	7.1	6.4	0.0	17.1	14.3	12.9	22.4	15.7	199	
de 3001 à 4000 fr.	12.0	13.2	12.4	15.6	2.6	12.7	20.8	6.7	17.6	8.6	0.0	7.1	14.3	20.0	19.0	13.3	12.1	12.9	164	
de 4001 à 5000 fr.	19.2	8.5	16.3	5.2	2.6	4.6	17.0	0.0	13.2	3.1	3.6	3.2	21.4	11.4	13.1	15.1	7.3	12.8	162	
de 5001 à 6000 fr.	9.5	4.8	8.2	3.7	0.0	2.9	5.7	6.7	5.9	0.0	0.0	0.0	21.4	4.3	7.1	6.9	3.8	6.0	76	
de 6001 à 8000 fr.	7.4	2.6	6.1	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.5	1.6	0.0	1.3	28.6	4.3	8.3	5.2	2.7	4.5	57	
de 8001 à 10 000 fr.	1.4	0.0	1.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	9	
de 10 001 à 15 000 fr.	0.8	0.0	0.6	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	5	
plus de 15 000 fr.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1	
N**	515	189	704	135	38	173	53	15	68	128	28	156	14	70	84	896	371	1'267	1'267	
<i>données manquantes</i>	969	401	1'370	148	50	198	79	34	113	130	31	161	120	461	581	1'573	1'044	2'617	2'617	
Dettes*																				
aucune dette	62.0	75.2	65.8	38.0	48.4	40.3	32.7	76.9	41.5	70.7	82.4	72.4	81.5	91.5	89.6	58.1	77.3	64.3	805	
jusqu'à 5000 fr.	7.6	6.8	7.4	12.0	22.6	14.4	13.5	7.7	12.3	11.1	0.0	9.5	7.4	2.6	3.5	9.1	6.2	8.2	102	
de 5001 à 10 000 fr.	5.7	5.8	5.7	15.7	12.9	15.1	13.5	0.0	10.8	6.1	11.8	6.9	11.1	1.7	3.5	7.6	5.9	7.0	88	
de 10 001 à 25 000 fr.	9.6	4.9	8.2	17.6	6.5	15.1	15.4	7.7	13.8	4.0	0.0	3.4	0.0	3.4	2.8	10.1	4.9	8.4	105	
de 25 001 à 50 000 fr.	6.0	1.5	4.7	9.3	9.7	9.4	19.2	7.7	16.9	4.0	5.9	4.3	0.0	0.9	0.7	7.3	2.2	5.7	71	
de 50 001 à 100 000 fr.	2.9	1.9	2.6	5.6	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	2.8	1.0	2.2	28	
plus de 100 000 fr.	6.2	3.9	5.6	1.9	0.0	1.4	5.8	0.0	4.6	3.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	5.0	2.5	4.2	52	
N**	513	206	719	108	31	139	52	13	65	99	17	116	27	117	144	845	406	1'251	1'251	
<i>données manquantes</i>	971	384	1'355	175	57	232	80	36	116	159	42	201	107	414	521	1'624	1'009	2'633	2'633	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2005)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Emprisonnement ou détention préventive*																
aucun-e	88.3	97.8	91.1	47.3	75.5	54.4	63.6	91.3	70.0	89.9	100.0	92.0	82.7	95.3	86.3	1'581
emprisonnement	6.9	2.0	5.4	20.5	12.2	18.5	15.6	8.7	14.0	4.2	0.0	3.3	8.6	3.4	7.1	130
détention préventive	3.1	0.3	2.3	11.6	6.1	10.3	10.4	0.0	8.0	6.0	0.0	4.7	4.7	0.8	3.5	65
emprisonnement et détention préventive	1.7	0.0	1.2	20.5	6.1	16.9	10.4	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.6	3.0	55
N**	835	358	1'193	146	49	195	77	23	100	168	44	212	1'302	529	1'831	1'831
<i>données manquantes</i>	649	232	881	137	39	176	55	26	81	90	15	105	1'033	355	1'388	1'388
Durée totale de détention***																
jusqu'à 1 mois	30.3	14.3	28.9	28.6	57.1	32.1	37.5	0.0	35.3	50.0	0.0	50.0	31.0	31.3	31.0	53
> 1 à 2 mois	11.8	0.0	10.8	6.1	14.3	7.1	12.5	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	9.0	6.3	8.8	15
> 2 à 6 mois	22.4	42.9	24.1	18.4	28.6	19.6	31.3	100.0	35.3	20.0	0.0	20.0	21.9	43.8	24.0	41
> 6 à 12 mois	10.5	0.0	9.6	14.3	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	12.3	0.0	11.1	19
plus de 1 an	25.0	42.9	26.5	32.7	0.0	28.6	18.8	0.0	17.6	10.0	0.0	10.0	25.8	18.8	25.1	42
N**	76	7	83	48	7	55	16	1	17	10	0	10	154	16	170	170
<i>données manquantes</i>	22	1	23	29	5	34	12	1	13	7	0	7	71	9	80	80

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de détention. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T9 Instance d'envoi principale et secondaire, selon le problème principal et chez les proches (2005)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Instance d'envoi principale*																			
initiative personnelle	26.0	32.3	27.7	50.2	41.5	48.2	36.5	37.5	36.8	19.5	17.5	19.1	71.3	75.0	74.3	31.7	49.3	38.1	1'324
conjoint-e/partenaire	7.1	4.2	6.3	3.3	1.2	2.8	2.4	6.3	3.4	6.9	8.8	7.3	6.1	3.0	3.6	6.2	3.8	5.3	185
famille	3.6	5.4	4.1	5.1	4.9	5.1	7.9	8.3	8.0	15.4	8.8	14.2	3.5	5.7	5.3	5.5	5.6	5.5	192
ami-e-s, collègues, connaiss.	1.0	2.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.6	0.0	1.1	0.4	5.3	1.3	2.6	3.7	3.5	1.0	3.1	1.8	62
instüt. ambulatoire spécialisée	1.5	1.6	1.5	3.3	11.0	5.1	3.2	0.0	2.3	0.8	0.0	0.7	2.6	1.8	2.0	1.8	2.3	2.0	69
instüt. résidentielle spécialisée	5.3	6.6	5.7	3.3	1.2	2.8	2.4	6.3	3.4	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	3.9	3.3	3.7	127
cabinet médical	8.2	8.8	8.3	8.4	19.5	11.0	8.7	14.6	10.3	2.0	7.0	3.0	5.2	3.9	4.1	7.1	7.6	7.3	254
hôpital, clinique	14.9	18.8	16.0	4.4	4.9	4.5	7.1	10.4	8.0	5.3	10.5	6.3	0.9	1.4	1.3	10.6	10.0	10.4	360
service sociaux	5.4	7.6	6.0	8.1	6.1	7.6	5.6	6.3	5.7	3.3	0.0	2.6	1.7	1.4	1.5	5.1	4.4	4.9	169
mes. pénale/administrative	16.9	5.0	13.6	7.0	2.4	5.9	19.8	4.2	15.5	29.7	24.6	28.7	0.9	0.8	0.8	16.9	4.2	12.3	426
employeur/se	5.0	4.4	4.8	0.4	0.0	0.3	0.8	0.0	0.6	2.0	1.8	2.0	0.0	0.4	0.3	3.3	2.1	2.9	100
enseignant-e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	8.8	5.9	1.7	0.4	0.7	0.8	0.6	0.7	26
autre	5.1	3.0	4.5	5.5	6.1	5.6	4.0	6.3	4.6	8.9	7.0	8.6	3.5	2.4	2.6	6.0	3.7	5.1	178
N**	1'287	499	1'786	273	82	355	126	48	174	246	57	303	115	492	607	2'201	1'271	3'472	3'472
données manquantes	197	91	288	10	6	16	6	1	7	12	2	14	19	39	58	268	144	412	412
Instance d'envoi secondaire***																			
initiative personnelle	22.5	21.2	22.1	23.3	33.9	25.8	26.1	23.3	25.4	18.7	14.9	17.9	10.6	10.2	10.3	21.9	18.2	20.5	510
conjoint-e/partenaire	10.9	8.4	10.2	12.4	6.8	11.1	10.2	0.0	7.6	4.3	4.3	4.3	13.6	5.8	7.2	10.2	6.5	8.9	221
famille	4.2	6.4	4.8	13.0	13.6	13.1	11.4	13.3	11.9	10.7	12.8	11.1	6.1	8.2	7.8	6.7	7.7	7.0	175
ami-e-s, collègues, connaiss.	1.5	3.3	2.1	2.1	0.0	1.6	1.1	0.0	0.8	0.5	2.1	0.9	6.1	4.8	5.0	1.7	3.4	2.3	57
instüt. ambulatoire spécialisée	0.7	0.8	0.7	3.6	1.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	1.0	0.8	1.1	1.0	1.0	26
instüt. résidentielle spécialisée	2.2	1.8	2.1	1.6	0.0	1.2	4.5	3.3	4.2	1.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.9	0.9	1.6	39
cabinet médical	7.5	7.9	7.6	16.1	13.6	15.5	9.1	6.7	8.5	3.7	4.3	3.8	3.0	2.7	2.8	7.9	6.1	7.2	180
hôpital, clinique	4.1	6.6	4.8	4.7	1.7	4.0	2.3	6.7	3.4	0.0	2.1	0.4	4.5	2.0	2.5	3.5	4.4	3.8	95
service sociaux	3.1	4.8	3.6	6.2	3.4	5.6	5.7	3.3	5.1	1.6	6.4	2.6	3.0	2.7	2.8	3.5	4.1	3.7	92
mes. pénale/administrative	4.1	1.8	3.4	6.2	0.0	4.8	2.3	3.3	2.5	3.2	0.0	2.6	1.5	0.3	0.6	3.9	1.1	2.9	72
employeur/se	3.1	2.3	2.9	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	1.5	0.7	0.8	2.3	1.2	1.9	48
enseignant-e	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	2.1	0.0	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	10
autre	2.5	2.6	2.5	3.6	1.7	3.2	2.3	3.3	2.5	2.1	0.0	1.7	0.0	3.8	3.1	2.6	2.6	2.6	64
aucune	45.3	44.4	45.0	33.7	37.3	34.5	40.9	60.0	45.8	56.1	61.7	57.3	57.6	60.1	59.6	45.5	51.5	47.7	1'184
N**	972	392	1'364	193	59	252	88	30	118	187	47	234	66	293	359	1'597	887	2'484	2'484
données manquantes	512	198	710	90	29	119	44	19	63	71	12	83	68	238	306	872	528	1'400	1'400

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T10 Type d'aide attendue à l'admission et statut légal de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2005)

Type d'aide attendue*	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
problèmes addictifs	82.2	86.2	83.3	85.9	90.0	86.9	83.0	88.0	84.1	60.5	57.6	60.0	51.2	55.5	54.7	77.8	72.5	75.9	2'032
problèmes somatiques	4.3	3.9	4.2	8.0	6.7	7.7	4.5	4.0	4.4	0.0	3.0	0.5	2.4	2.9	2.8	4.4	4.0	4.3	114
problèmes psychiques	23.6	30.7	25.5	26.6	33.3	28.2	20.5	36.0	23.9	12.5	9.1	11.9	23.8	18.0	19.0	22.6	24.8	23.4	627
problèmes relationnels	18.3	24.1	19.9	22.6	26.7	23.6	8.0	36.0	14.2	8.6	15.2	9.7	38.1	40.1	39.7	18.5	29.9	22.7	607
problèmes familiaux	9.5	17.0	11.6	15.6	28.3	18.5	14.8	36.0	19.5	12.5	24.2	14.6	29.8	38.0	36.5	11.8	26.7	17.3	462
problèmes financiers	9.9	8.6	9.6	26.1	21.7	25.1	15.9	12.0	15.0	5.9	9.1	6.5	7.1	5.2	5.6	12.0	8.1	10.6	283
problèmes professionnels, de formatio	16.1	12.3	15.0	20.6	16.7	19.7	13.6	40.0	19.5	14.5	15.2	14.6	6.0	3.4	3.8	15.1	9.4	13.0	349
problèmes de logement	5.3	3.4	4.8	13.6	16.7	14.3	8.0	12.0	8.8	3.9	9.1	4.9	2.4	2.9	2.8	6.1	4.4	5.5	147
problèmes de violence	1.7	1.7	1.7	1.5	3.3	1.9	0.0	4.0	0.9	0.7	6.1	1.6	2.4	2.3	2.4	1.5	2.2	1.8	47
problèmes juridiques	16.7	5.2	13.5	14.1	10.0	13.1	11.4	8.0	10.6	10.5	6.1	9.7	7.1	3.6	4.3	14.5	4.9	11.1	296
autre(s)	2.5	3.2	2.7	3.5	5.0	3.9	8.0	4.0	7.1	3.3	0.0	2.7	6.0	3.1	3.6	3.8	3.8	3.8	102
aucune attente	5.7	4.4	5.4	4.5	1.7	3.9	3.4	0.0	2.7	23.7	36.4	25.9	2.4	1.0	1.3	7.3	4.1	6.1	164
N**	1'069	407	1'476	199	60	259	88	25	113	152	33	185	84	384	468	1'705	973	2'678	2'678
<i>données manquantes</i>	415	183	598	84	28	112	44	24	68	106	26	132	50	147	197	764	442	1'206	1'206
Statut légal du traitement/de la prise en charge*																			
suspension de la procédure, renoncement à infliger une peine, réprimande (art 19a ch. 2 Lstup)	0.6	0.0	0.4	0.5	0.0	0.4	1.0	3.4	1.6	7.3	8.7	7.6	1.6	0.0	0.3	1.6	0.6	1.2	31
abandon poursuite pénale si soumis à des mesures de protection contrôlées par un médecin (art 19a ch. 3 Lstup)	0.3	0.0	0.2	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	5
mesures concernant les délinquants anormaux (art 43 CPS)	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
traitement des alcooliques et des toxicomanes (art 44 CPS)	3.3	0.5	2.5	3.4	0.0	2.6	5.2	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.2	1.8	47
irresponsabilité (art 10 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
responsabilité restreinte (art 11 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
exécution de mesures pr toxicomanes dans une maison d'éducation au travail (art 2a ord. 3 rel. au CPS RS 311.03)	0.1	0.2	0.1	0.5	1.6	0.7	2.1	3.4	2.4	5.8	13.0	7.2	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.1	28
autre	12.9	6.2	11.0	4.9	6.3	5.2	12.5	3.4	10.4	24.6	13.0	22.4	1.6	1.0	1.1	12.5	4.9	9.8	249
aucune mesure (traitement volontaire)	82.8	93.1	85.8	90.2	92.1	90.7	80.2	89.7	82.4	61.8	65.2	62.4	96.8	99.0	98.6	81.9	93.3	85.9	2'190
N**	1'002	403	1'405	205	63	268	96	29	125	191	46	237	62	303	365	1'645	904	2'549	2'549
<i>données manquantes</i>	482	187	669	78	25	103	36	20	56	67	13	80	72	228	300	824	511	1'335	1'335

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T11 Traitements/prises en charge avant l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2005)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Prises en charge antérieures*																			
non	46.2	36.9	43.6	15.6	19.8	16.6	44.6	34.0	41.7	70.9	64.3	69.6	67.0	71.5	70.6	46.8	49.0	47.5	1'567
oui	53.8	63.1	56.4	84.4	80.2	83.4	55.4	66.0	58.3	29.1	35.7	30.4	33.0	28.5	29.4	53.2	51.0	52.5	1'729
N**	1'268	502	1'770	269	81	350	121	47	168	247	56	303	88	382	470	2'142	1'154	3'296	3'296
données manquantes	216	88	304	14	7	21	11	2	13	11	3	14	46	149	195	327	261	588	588
Type de prise en charge***																			
traitement avec prescript. d'héroïne	0.2	0.4	0.3	4.2	4.2	4.2	3.6	5.3	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	1.4	1.2	1.3	17
substitution (méthadone, subutex)	5.1	5.2	5.1	72.0	62.5	69.9	34.5	57.9	40.5	2.3	0.0	1.7	0.0	4.2	3.4	20.7	13.9	18.4	235
autre tt médicam. des dépendances	19.8	16.4	18.7	11.9	8.3	11.1	12.7	15.8	13.5	16.3	0.0	12.1	5.6	5.6	5.6	16.8	12.8	15.4	197
prise en charge ambulatoire	65.6	61.2	64.2	63.7	52.1	61.1	65.5	73.7	67.6	86.0	53.3	77.6	88.9	83.1	84.3	66.4	64.3	65.6	839
traitement résidentiel	46.9	48.4	47.4	43.5	43.8	43.5	32.7	36.8	33.8	18.6	46.7	25.9	11.1	8.5	9.0	42.6	40.6	41.9	536
sevrage	43.9	49.6	45.7	58.3	52.1	56.9	38.2	47.4	40.5	9.3	33.3	15.5	11.1	5.6	6.7	43.1	39.9	42.0	537
groupe d'entraide ou d'auto-support	10.6	11.2	10.8	1.8	0.0	1.4	3.6	5.3	4.1	2.3	13.3	5.2	5.6	7.0	6.7	7.9	9.0	8.3	106
autre(s)	2.8	3.2	3.0	1.2	4.2	1.9	3.6	5.3	4.1	2.3	13.3	5.2	11.1	7.0	7.9	3.3	4.6	3.8	48
N**	529	250	779	168	48	216	55	19	74	43	15	58	18	71	89	847	431	1'278	1'278
données manquantes	153	67	220	59	17	76	12	12	24	29	5	34	11	38	49	293	158	451	451

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de prise en charge antérieure. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T12 Substitution et autre traitement/prise en charge à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2005)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution ou prescription d'héroïne*																
non	98.5	98.5	98.5	51.0	44.4	49.4	86.6	61.5	81.3	100.0	100.0	100.0	91.4	90.7	91.2	1'957
oui	1.5	1.5	1.5	49.0	55.6	50.6	13.4	38.5	18.7	0.0	0.0	0.0	8.6	9.3	8.8	189
N**	998	390	1'388	206	63	269	97	26	123	178	41	219	1'566	580	2'146	2'146
<i>données manquantes</i>	486	200	686	77	25	102	35	23	58	80	18	98	769	304	1'073	1'073
Type de substitution***																
héroïne	0.0	0.0	0.0	2.0	2.9	2.3	7.7	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	2.3	1.9	2.2	4
méthadone	86.7	100.0	90.5	95.9	91.4	94.7	92.3	100.0	95.7	0.0	0.0	0.0	93.9	92.6	93.5	173
autres opiacés	0.0	0.0	0.0	2.0	2.9	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.9	1.6	3
autres substances	13.3	0.0	9.5	0.0	2.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.7	2.7	5
N**	15	6	21	98	35	133	13	10	23	0	0	0	131	54	185	185
<i>données manquantes</i>	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
Autre prise en charge parallèle*																
non	86.9	85.1	86.4	73.5	72.3	73.2	85.7	89.6	86.8	93.0	93.1	93.0	85.8	85.6	85.8	2'370
oui	13.1	14.9	13.6	26.5	27.7	26.8	14.3	10.4	13.2	7.0	6.9	7.0	14.2	14.4	14.2	393
N**	1'248	478	1'726	268	83	351	119	48	167	242	58	300	2'013	750	2'763	2'763
<i>données manquantes</i>	236	112	348	15	5	20	13	1	14	16	1	17	322	134	456	456
Type de la prise en charge parallèle****																
prise en charge ambulatoire	58.0	56.5	57.6	70.4	69.6	70.2	70.6	75.0	71.4	70.6	100.0	76.2	63.5	61.9	63.0	244
traitement résidentiel	18.5	20.3	19.0	18.3	26.1	20.2	11.8	25.0	14.3	11.8	0.0	9.5	17.4	21.0	18.3	71
groupe d'entraide ou d'auto-support	3.1	5.8	3.9	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	2.5	3.8	2.8	11
autre(s)	22.2	20.3	21.6	15.5	8.7	13.8	17.6	0.0	14.3	17.6	0.0	14.3	19.1	16.2	18.3	71
N**	162	69	231	71	23	94	17	4	21	17	4	21	282	105	387	387
<i>données manquantes</i>	2	2	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	3	6	6

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de substitution. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pris-e-s en charge parallèlement. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T13a Admission suite à une cure de sevrage, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2005)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Admission suite à une cure de sevrage*																
non	75.7	70.5	74.2	86.3	88.7	86.9	83.9	75.9	82.0	94.6	92.9	94.2	80.6	75.0	79.1	1'687
sevrage dans la même institution	0.7	1.5	0.9	0.5	1.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	0.8	18
sevrage dans une autre institution	23.5	28.0	24.9	13.2	9.7	12.4	16.1	24.1	18.0	5.4	7.1	5.8	18.8	23.4	20.1	428
N**	981	407	1'388	197	62	259	93	29	122	184	42	226	1'540	593	2'133	2'133
<i>données manquantes</i>	503	183	686	86	26	112	39	20	59	74	17	91	795	291	1'086	1'086

T13b Fréquence des sevrages sans aide professionnelle avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2005)

Fréq. sevrages sans accompagnement*	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
jamais	60.9	60.8	60.8	12.1	26.9	15.0	41.1	55.6	43.1	81.9	76.9	81.4	56.9	58.5	57.3	605
une fois	8.9	8.0	8.7	15.0	7.7	13.5	14.3	0.0	12.3	8.6	7.7	8.5	9.9	7.3	9.3	98
deux ou trois fois	12.4	11.9	12.3	16.8	34.6	20.3	8.9	22.2	10.8	4.8	0.0	4.2	11.1	14.1	11.8	125
plus de trois fois	17.8	19.3	18.2	56.1	30.8	51.1	35.7	22.2	33.8	4.8	15.4	5.9	22.0	20.2	21.6	228
N**	493	176	669	107	26	133	56	9	65	105	13	118	808	248	1'056	1'056
<i>données manquantes</i>	991	414	1'405	176	62	238	76	40	116	153	46	199	1'527	636	2'163	2'163

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T14 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2005)

Tous patients et patientes									
Problème principal*	Hommes	Femmes	Total	N		Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%			%	%	%	
alcool	65.9	68.8	66.7	2'074	alcool	65.9	68.8	66.7	2'074
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.3	0.4	0.3	10	cocktails	0.3	0.4	0.3	10
héroïne	11.7	9.7	11.1	346	opiacés	12.3	9.9	11.6	361
méthadone	0.6	0.2	0.5	15					
autres opiacés	0.0	0.0	0.0	0					
cocaïne	5.8	5.7	5.8	180	cocaïne et dérivés	5.9	5.7	5.8	181
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	1					
amphétamines	0.2	0.1	0.2	5	stimulants	0.4	0.4	0.4	12
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.2	0.2	0.2	7					
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0					
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0	médicaments	0.6	2.0	1.0	31
benzodiazépines	0.6	1.9	1.0	30					
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.1	0.0	1					
LSD	0.2	0.0	0.1	4	hallucinogènes	0.2	0.0	0.1	4
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0					
cannabis	11.5	6.9	10.2	317	cannabis	11.5	6.9	10.2	317
tabac	0.4	1.3	0.6	20	tabac	0.4	1.3	0.6	20
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0	autres substances	0.6	2.0	1.0	31
autre substance	0.6	2.0	1.0	31					
jeu pathologique	1.7	1.3	1.6	50	troubles assimilables à une addiction	2.0	2.7	2.2	69
troubles alimentaires	0.0	1.2	0.3	10					
autres troubles assimilables à une addiction	0.3	0.2	0.3	9					
N**	2'253	857	3'110	3'110		2'253	857	3'110	3'110
<i>données manquantes</i>	82	27	109	109		82	27	109	109

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2005), hommes

Patientes: principale substance posant problème										
Hommes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	29.0	16.7	23.3	28.2	12.5	25.0	25.0	23.9	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	8.9	0.0	13.2	16.4	25.0	0.0	50.0	10.6	14.3	0.0
2 à 3 jours par semaine	13.1	33.3	14.1	22.7	37.5	0.0	25.0	16.5	0.0	33.3
4 à 6 jours par semaine	13.1	0.0	4.8	11.8	12.5	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
une fois par jour	4.7	33.3	15.0	5.5	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0
plusieurs fois par jour	31.2	16.7	29.5	15.5	12.5	75.0	0.0	25.7	85.7	66.7
N**	1'073	6	227	110	8	12	4	218	7	3
données manquantes	411	1	49	22	1	2	0	40	2	11
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	9.9	16.7	12.7	12.2	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	8.5	0.0	18.0	17.6	0.0	0.0	33.3	12.0	0.0	0.0
2 à 3 jours par semaine	19.7	33.3	20.0	23.0	60.0	0.0	33.3	26.4	0.0	50.0
4 à 6 jours par semaine	13.4	0.0	8.7	20.3	40.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0
une fois par jour	6.3	33.3	19.3	5.4	0.0	20.0	0.0	8.8	0.0	0.0
plusieurs fois par jour	42.2	16.7	21.3	21.6	0.0	80.0	33.3	39.2	100.0	50.0
N**	756	6	150	74	5	5	3	125	5	2
données manquantes	728	1	126	58	4	9	1	133	4	12

T15.1b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2005), hommes

Patients: problème principal			
Hommes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	43.8	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	25.0	0.0	0.0
2 à 3 jours par semaine	12.5	0.0	0.0
4 à 6 jours par semaine	9.4	0.0	0.0
1 fois par jour	9.4	0.0	33.3
plusieurs fois par jour	0.0	0.0	66.7
N**	32	0	3
données manquantes	7	0	4
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	24.0	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	36.0	0.0	0.0
2 à 3 jours par semaine	28.0	0.0	0.0
4 à 6 jours par semaine	8.0	0.0	0.0
1 fois par jour	0.0	0.0	0.0
plusieurs fois par jour	4.0	0.0	100.0
N**	25	0	4
données manquantes	14	0	3

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.2a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2005), femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	23.0	0.0	22.7	35.7	100.0	16.7	0.0	10.9	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	8.7	33.3	7.6	9.5	0.0	0.0	0.0	28.3	0.0	0.0
2 à 3 jours par semaine	15.7	33.3	10.6	19.0	0.0	0.0	0.0	13.0	18.2	50.0
4 à 6 jours par semaine	9.0	33.3	10.6	11.9	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0
une fois par jour	4.6	0.0	10.6	2.4	0.0	8.3	0.0	13.0	0.0	0.0
plusieurs fois par jour	39.0	0.0	37.9	21.4	0.0	75.0	0.0	21.7	81.8	50.0
N**	413	3	66	42	2	12	0	46	11	2
<i>données manquantes</i>	177	0	19	7	1	5	0	13	0	15
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	4.9	0.0	5.1	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
1 jour par semaine ou moins	9.8	50.0	17.9	0.0	100.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0
2 à 3 jours par semaine	19.2	0.0	17.9	30.0	0.0	0.0	0.0	12.0	9.1	0.0
4 à 6 jours par semaine	9.4	50.0	5.1	10.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.1	0.0
une fois par jour	6.5	0.0	17.9	5.0	0.0	25.0	0.0	8.0	0.0	0.0
plusieurs fois par jour	50.2	0.0	35.9	35.0	0.0	75.0	0.0	52.0	81.8	0.0
N**	307	2	39	20	1	8	0	25	11	1
<i>données manquantes</i>	283	1	46	29	2	9	0	34	0	16

T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2005), femmes

Patients: problème principal			
Femmes	Jeux pathologiques	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	10.0	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	60.0	0.0	100.0
2 à 3 jours par semaine	10.0	25.0	0.0
4 à 6 jours par semaine	20.0	25.0	0.0
1 fois par jour	0.0	25.0	0.0
plusieurs fois par jour	0.0	25.0	0.0
N**	10	4	1
<i>données manquantes</i>	1	6	1
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	33.3	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	66.7	0.0	100.0
2 à 3 jours par semaine	0.0	33.3	0.0
4 à 6 jours par semaine	0.0	66.7	0.0
1 fois par jour	0.0	0.0	0.0
plusieurs fois par jour	0.0	0.0	0.0
N**	6	3	1
<i>données manquantes</i>	5	7	1

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.3a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2005), hommes & femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Hommes & femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	27.3	11.1	23.2	30.3	30.0	20.8	25.0	21.6	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	8.8	11.1	11.9	14.5	20.0	0.0	50.0	13.6	5.6	0.0
2 à 3 jours par semaine	13.9	33.3	13.3	21.7	30.0	0.0	25.0	15.9	11.1	40.0
4 à 6 jours par semaine	12.0	11.1	6.1	11.8	10.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0
une fois par jour	4.6	22.2	14.0	4.6	0.0	4.2	0.0	14.8	0.0	0.0
plusieurs fois par jour	33.4	11.1	31.4	17.1	10.0	75.0	0.0	25.0	83.3	60.0
N**	1'486	9	293	152	10	24	4	264	18	5
données manquantes	588	1	68	29	2	7	0	53	2	26
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	8.5	12.5	11.1	13.8	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	33.3
1 jour par semaine ou moins	8.8	12.5	18.0	13.8	16.7	0.0	33.3	14.0	0.0	0.0
2 à 3 jours par semaine	19.6	25.0	19.6	24.5	50.0	0.0	33.3	24.0	6.3	33.3
4 à 6 jours par semaine	12.2	12.5	7.9	18.1	33.3	0.0	0.0	8.7	6.3	0.0
une fois par jour	6.4	25.0	19.0	5.3	0.0	23.1	0.0	8.7	0.0	0.0
plusieurs fois par jour	44.5	12.5	24.3	24.5	0.0	76.9	33.3	41.3	87.5	33.3
N**	1'063	8	189	94	6	13	3	150	16	3
données manquantes	1011	2	172	87	6	18	1	167	4	28

T15.3b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2005), hommes & femmes

Patients: problème principal			
Hommes & femmes	Jeux pathologiques	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	35.7	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	33.3	0.0	25.0
2 à 3 jours par semaine	11.9	25.0	0.0
4 à 6 jours par semaine	11.9	25.0	0.0
1 fois par jour	7.1	25.0	25.0
plusieurs fois par jour	0.0	25.0	50.0
N**	42	4	4
données manquantes	8	6	5
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	25.8	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	41.9	0.0	20.0
2 à 3 jours par semaine	22.6	33.3	0.0
4 à 6 jours par semaine	6.5	66.7	0.0
1 fois par jour	0.0	0.0	0.0
plusieurs fois par jour	3.2	0.0	80.0
N**	31	3	5
données manquantes	19	7	4

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T16.1a Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2005), hommes

Patients: principale substance posant problème										
Hommes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	16.6	19.1	20.4	21.0	16.9	30.8	17.7	14.9	13.6	27.7
écart-type	4.4	6.9	5.5	6.3	1.3	7.3	0.6	2.3	3.5	6.1
1er quartile	15.0	15.0	17.0	17.0	17.0	25.0	17.0	14.0	10.0	21.0
valeur médiane	16.0	16.0	19.0	19.0	17.0	32.0	18.0	15.0	13.0	29.0
3e quartile	18.0	25.0	23.0	23.0	18.0	36.0	18.0	16.0	18.0	33.0
N*	697	7	207	97	7	9	3	170	7	3
données manquantes	787	0	69	35	2	5	1	88	2	11
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	22.5	21.2	22.2	21.9	18.7	32.0	18.0	16.2	15.6	27.7
écart-type	7.9	8.8	6.1	7.3	2.3	7.5	1.0	3.1	5.3	6.1
1er quartile	18.0	15.0	18.0	18.0	17.0	29.0	17.0	14.0	13.0	21.0
valeur médiane	20.0	16.0	20.0	20.0	18.0	32.0	18.0	16.0	14.0	29.0
3e quartile	25.0	25.0	25.0	25.0	19.0	37.0	19.0	17.0	20.0	33.0
N*	692	5	187	89	6	9	3	162	7	3
données manquantes	792	2	89	43	3	5	1	96	2	11
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	31.5	24.5	23.2	23.3	18.6	29.0	18.0	17.4	20.0	22.0
écart-type	10.8	9.0	6.9	8.2	1.3	10.8	.	4.4	9.8	.
1er quartile	23.0	18.0	18.5	19.0	18.0	17.0	18.0	15.0	13.0	22.0
valeur médiane	30.0	21.5	22.0	22.5	18.0	32.0	18.0	16.5	14.0	22.0
3e quartile	38.0	31.0	25.0	25.5	20.0	38.0	18.0	18.0	25.0	22.0
N*	485	4	116	56	5	3	1	102	5	1
données manquantes	999	3	160	76	4	11	3	156	4	13
Période de latence (en années)**										
moyenne	25.4	9.7	8.7	6.5	5.8	10.8	6.7	5.3	9.0	2.0
écart-type	12.0	.	6.8	6.0	2.8	6.2	4.7	4.8	10.0	.
1er quartile	16.2	9.7	4.0	2.3	3.9	6.5	3.4	2.0	2.2	2.0
valeur médiane	26.0	9.7	7.1	5.4	5.9	10.0	6.7	3.7	4.8	2.0
3e quartile	34.1	9.7	14.7	8.1	7.0	15.0	10.0	7.0	12.0	2.0
N*	323	1	34	45	6	4	2	124	6	1
données manquantes	263	0	7	9	1	2	0	51	1	8

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1b Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2005), femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	17.8	25.5	20.6	20.2	16.0	29.7	.	14.4	17.3	29.0
écart-type	5.5	12.0	6.4	6.6	.	9.2	.	2.0	4.0	12.7
1er quartile	16.0	17.0	17.0	17.0	16.0	20.0	.	13.0	15.0	20.0
valeur médiane	17.0	25.5	19.0	17.0	16.0	30.0	.	14.0	15.0	29.0
3e quartile	20.0	34.0	22.0	23.0	16.0	35.0	.	15.5	18.0	38.0
N*	242	2	63	34	1	13	0	32	9	2
données manquantes	348	1	22	15	2	4	0	27	2	15
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	26.0	26.0	21.1	21.3	.	29.4	.	15.8	18.2	34.0
écart-type	9.7	11.3	5.3	6.3	.	6.7	.	2.7	5.1	7.1
1er quartile	19.0	18.0	17.5	17.0	.	25.0	.	14.0	15.0	29.0
valeur médiane	23.0	26.0	20.0	20.0	.	29.0	.	15.0	16.0	34.0
3e quartile	32.0	34.0	23.5	27.0	.	35.5	.	16.0	18.0	39.0
N*	249	2	56	31	0	12	0	31	5	2
données manquantes	341	1	29	18	3	5	0	28	6	15
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	35.2	26.0	21.4	23.1	18.0	32.3	.	16.2	36.3	.
écart-type	10.9	11.3	5.1	7.2	.	12.5	.	2.6	22.2	.
1er quartile	26.0	18.0	17.0	17.0	18.0	20.0	.	14.0	16.0	.
valeur médiane	35.0	26.0	21.0	21.0	18.0	32.0	.	16.0	33.0	.
3e quartile	42.5	34.0	24.0	30.0	18.0	45.0	.	17.0	60.0	.
N*	192	2	34	15	1	3	0	15	3	0
données manquantes	398	1	51	34	2	14	0	44	8	17
Période de latence (en années)**										
moyenne	26.3	.	4.3	3.6	3.3	16.9	.	5.9	30.5	12.5
écart-type	9.7	.	5.3	3.0	.	11.1	.	6.1	14.1	10.6
1er quartile	20.3	.	1.4	1.7	3.3	8.0	.	2.7	19.9	5.0
valeur médiane	26.5	.	2.0	2.7	3.3	13.0	.	4.0	32.2	12.5
3e quartile	32.6	.	3.4	5.4	3.3	24.0	.	6.0	41.2	20.0
N*	98	0	13	14	1	5	0	21	4	2
données manquantes	87	0	3	2	1	1	0	15	2	5

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1c Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2005), hommes & femmes

Patient-e-s: principale substance posant problème										
Hommes & femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	16.9	20.6	20.4	20.8	16.8	30.1	17.7	14.8	15.7	28.2
écart-type	4.7	7.8	5.7	6.4	1.3	8.3	0.6	2.3	4.2	7.7
1er quartile	15.0	15.0	17.0	17.0	16.5	25.0	17.0	13.0	13.5	21.0
valeur médiane	16.0	17.0	19.0	19.0	17.0	30.5	18.0	15.0	15.0	29.0
3e quartile	18.0	25.0	23.0	23.0	17.5	36.0	18.0	16.0	18.0	33.0
N*	939	9	270	131	8	22	3	202	16	5
données manquantes	1'135	1	91	50	4	9	1	115	4	26
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	23.4	22.6	21.9	21.8	18.7	30.5	18.0	16.1	16.7	30.2
écart-type	8.5	8.8	6.0	7.0	2.3	7.0	1.0	3.1	5.1	6.6
1er quartile	18.0	15.0	18.0	17.0	17.0	27.0	17.0	14.0	13.5	29.0
valeur médiane	20.0	18.0	20.0	20.0	18.0	31.0	18.0	16.0	15.0	29.0
3e quartile	27.0	34.0	25.0	25.0	19.0	36.0	19.0	17.0	19.0	33.0
N*	941	7	243	120	6	21	3	193	12	5
données manquantes	1'133	3	118	61	6	10	1	124	8	26
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	32.6	25.0	22.8	23.2	18.5	30.7	18.0	17.2	26.1	22.0
écart-type	10.9	8.6	6.5	7.9	1.2	10.6	.	4.2	16.3	.
1er quartile	24.0	18.0	18.0	19.0	18.0	20.0	18.0	15.0	13.5	22.0
valeur médiane	31.0	21.5	21.0	22.0	18.0	32.0	18.0	16.0	20.5	22.0
3e quartile	40.0	34.0	25.0	27.0	20.0	38.0	18.0	18.0	34.0	22.0
N*	677	6	150	71	6	6	1	117	8	1
données manquantes	1'397	4	211	110	6	25	3	200	12	30
Période de latence (en années)**										
moyenne	25.6	9.7	7.5	5.8	5.5	14.1	6.7	5.4	17.6	9.0
écart-type	11.5	.	6.7	5.5	2.8	9.3	4.7	5.0	15.7	9.6
1er quartile	17.9	9.7	1.7	1.9	3.3	8.0	3.4	2.0	4.0	2.0
valeur médiane	26.0	9.7	5.0	4.9	5.0	11.0	6.7	3.9	12.2	5.0
3e quartile	33.7	9.7	13.0	8.0	7.0	19.0	10.0	7.0	28.1	20.0
N*	421	1	47	59	7	9	2	145	10	3
données manquantes	350	0	10	11	2	3	0	66	3	13

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2a Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2005), hommes

Patients: problème principal			
Hommes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	31.2	.	29.7
écart-type	10.7	.	11.9
1er quartile	22.0	.	20.0
valeur médiane	30.0	.	26.0
3e quartile	39.0	.	43.0
N*	22	0	3
<i>données manquantes</i>	17	0	4
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	33.0	.	30.3
écart-type	10.3	.	11.4
1er quartile	27.0	.	21.0
valeur médiane	34.5	.	27.0
3e quartile	39.0	.	43.0
N*	22	0	3
<i>données manquantes</i>	17	0	4
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	35.7	.	25.0
écart-type	12.3	.	15.2
1er quartile	30.0	.	22.0
valeur médiane	36.0	.	27.0
3e quartile	40.0	.	30.0
N*	21	0	5
<i>données manquantes</i>	18	0	2
Période de latence (en années)**			
moyenne	10.0	.	4.5
écart-type	8.1	.	0.5
1er quartile	3.5	.	4.0
valeur médiane	6.2	.	4.7
3e quartile	14.9	.	4.9
N*	21	0	3
<i>données manquantes</i>	18	0	4

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2b Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2005), femmes

Patientes: problème principal			
Femmes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	39.8	18.0	.
écart-type	17.0	8.6	.
1er quartile	26.5	15.0	.
valeur médiane	42.5	16.0	.
3e quartile	53.0	16.0	.
N*	4	6	0
<i>données manquantes</i>	7	4	2
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	44.8	17.0	.
écart-type	8.3	10.3	.
1er quartile	38.0	15.0	.
valeur médiane	44.0	16.0	.
3e quartile	50.0	17.0	.
N*	5	6	0
<i>données manquantes</i>	6	4	2
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	45.6	16.0	.
écart-type	7.4	0.8	.
1er quartile	40.0	15.5	.
valeur médiane	44.0	16.0	.
3e quartile	50.0	16.5	.
N*	5	4	0
<i>données manquantes</i>	6	6	2
Période de latence (en années)**			
moyenne	8.3	7.9	.
écart-type	10.6	6.5	.
1er quartile	1.8	3.2	.
valeur médiane	4.5	6.0	.
3e quartile	14.9	9.5	.
N*	4	6	0
<i>données manquantes</i>	7	4	2

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2c Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2005), hommes & femmes

Patients: problème principal			
Hommes & femmes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	32.5	18.0	29.7
écart-type	11.9	8.6	11.9
1er quartile	22.0	15.0	20.0
valeur médiane	32.0	16.0	26.0
3e quartile	39.0	16.0	43.0
N*	26	6	3
<i>données manquantes</i>	24	4	6
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	35.1	17.0	30.3
écart-type	10.9	10.3	11.4
1er quartile	27.0	15.0	21.0
valeur médiane	36.0	16.0	27.0
3e quartile	44.0	17.0	43.0
N*	27	6	3
<i>données manquantes</i>	23	4	6
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	37.6	16.0	25.0
écart-type	12.1	0.8	15.2
1er quartile	30.0	15.5	22.0
valeur médiane	37.5	16.0	27.0
3e quartile	45.0	16.5	30.0
N*	26	4	5
<i>données manquantes</i>	24	6	4
Période de latence (en années)**			
moyenne	9.7	7.9	4.5
écart-type	8.3	6.5	0.5
1er quartile	3.1	3.2	4.0
valeur médiane	6.0	6.0	4.7
3e quartile	14.9	9.5	4.9
N*	25	6	3
<i>données manquantes</i>	25	4	6

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T17 Mode d'administration de la principale substance posant problème au cours des 6 derniers mois avant l'admission (2005)

Patient-e-s: principale substance posant problème															
	Héroïne			Cocaïne			Amphétamines			Cannabis			Benzodiazépines		
	Hommes %	Femmes %	Total %	Hommes %	Femmes %	Total %	Hommes %	Femmes %	Total %	Hommes %	Femmes %	Total %	Hommes %	Femmes %	Total %
Mode d'administration*															
injection	27.6	34.2	29.1	13.0	13.3	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fumée/inhalation	40.9	39.5	40.6	23.2	26.7	23.8	0.0	0.0	0.0	96.9	100.0	97.3	0.0	0.0	0.0
ingestion (manger/boire)	0.8	0.0	0.6	0.0	6.7	1.2	25.0	0.0	25.0	3.1	0.0	2.7	80.0	87.5	84.6
sniff	29.9	26.3	29.1	63.8	53.3	61.9	75.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autre	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	12.5	15.4
N**	127	38	165	69	15	84	4	0	4	128	20	148	5	8	13
données manquantes	136	45	181	62	34	96	0	1	1	130	39	169	9	8	17

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

**T18 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 6 derniers mois avant l'admission des injections,
échange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois avant l'admission et âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2005)**

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Injections au cours de la vie*																
oui	5.3	5.1	5.3	64.6	64.9	64.7	32.2	35.7	33.1	4.0	14.7	5.8	14.6	14.0	14.5	302
non	94.7	94.9	94.7	35.4	35.1	35.3	67.8	64.3	66.9	96.0	85.3	94.2	85.4	86.0	85.5	1'784
N**	977	371	1'348	195	57	252	90	28	118	174	34	208	1'537	549	2'086	2'086
données manquantes	507	219	726	88	31	119	42	21	63	84	25	109	798	335	1'133	1'133
Injections au cours des 6 derniers mois*																
oui	1.2	0.5	1.0	35.3	40.7	36.6	17.6	20.0	18.2	1.1	6.3	1.9	6.1	6.1	6.1	125
non	98.8	99.5	99.0	64.7	59.3	63.4	82.4	80.0	81.8	98.9	93.8	98.1	93.9	93.9	93.9	1'917
N**	976	371	1'347	170	54	224	85	25	110	174	32	206	1'503	539	2'042	2'042
données manquantes	508	219	727	113	34	147	47	24	71	84	27	111	832	345	1'177	1'177
Injections au cours des 30 derniers jours*																
oui	0.7	0.5	0.7	32.6	34.8	33.1	11.5	15.4	12.5	0.0	2.9	0.5	4.3	4.7	4.4	87
non	99.3	99.5	99.3	67.4	65.2	66.9	88.5	84.6	87.5	100.0	97.1	99.5	95.7	95.3	95.6	1'876
N**	954	365	1'319	135	46	181	78	26	104	170	34	204	1'434	529	1'963	1'963
données manquantes	530	225	755	148	42	190	54	23	77	88	25	113	901	355	1'256	1'256
Echange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois***																
oui	0.0	0.0	0.0	28.9	8.3	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	5.6	15.8	12
non	100.0	100.0	100.0	71.1	91.7	76.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	81.0	94.4	84.2	64
N**	7	1	8	38	12	50	9	3	12	2	1	3	58	18	76	76
données manquantes	1	0	1	21	10	31	3	2	5	0	0	0	25	12	37	37
Age lors de la première injection****																
jusqu'à 14 ans	3.8	0.0	2.9	4.9	11.5	6.5	4.8	28.6	10.7	16.7	25.0	20.0	5.0	14.3	7.4	14
de 15 à 16 ans	11.5	0.0	8.8	12.2	7.7	11.1	9.5	0.0	7.1	16.7	25.0	20.0	11.4	6.1	10.1	19
de 17 à 18 ans	26.9	12.5	23.5	18.3	26.9	20.4	19.0	42.9	25.0	0.0	0.0	0.0	19.3	24.5	20.6	39
de 19 à 20 ans	23.1	0.0	17.6	15.9	11.5	14.8	28.6	0.0	21.4	33.3	25.0	30.0	20.7	12.2	18.5	35
de 21 à 25 ans	11.5	12.5	11.8	25.6	34.6	27.8	33.3	14.3	28.6	16.7	25.0	20.0	23.6	24.5	23.8	45
de 26 à 30 ans	15.4	50.0	23.5	17.1	3.8	13.9	4.8	14.3	7.1	16.7	0.0	10.0	15.0	12.2	14.3	27
de 31 à 39 ans	7.7	25.0	11.8	4.9	3.8	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	6.1	4.8	9
dès 40 ans	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	1
N**	26	8	34	82	26	108	21	7	28	6	4	10	140	49	189	189
données manquantes	26	11	37	44	11	55	8	3	11	1	1	2	85	28	113	113

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 6 derniers mois. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2005), hommes

Hommes

Patients: principale substance posant problème										
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool		33.3	28.1	41.0	0.0	15.4	50.0	21.9	42.9	42.9
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.4		7.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
héroïne	1.8	16.7	1.6	27.0	0.0	23.1	25.0	3.0	0.0	0.0
méthadone	1.3	66.7	34.4	10.7	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.1	0.0	4.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
cocaïne	4.7	33.3	51.4	0.0	22.2	15.4	0.0	11.0	14.3	0.0
crack, freebase	0.1	33.3	2.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
amphétamines	0.6	16.7	2.0	11.5	22.2	0.0	0.0	1.3	0.0	7.1
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.3	0.0	3.2	21.3	11.1	7.7	50.0	4.6	14.3	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.3	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	4.1	50.0	23.7	12.3	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.8	0.0	3.6	3.3	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.1	0.0	3.6	6.6	33.3	7.7	0.0	2.1	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.2	16.7	1.2	1.6	0.0	0.0	25.0	0.8	0.0	0.0
substances volatiles	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
cannabis	10.0	66.7	41.1	49.2	44.4	0.0	75.0		28.6	21.4
tabac	31.6	33.3	48.2	45.1	33.3	30.8	25.0	32.1		7.1
autres substances	0.6	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	25.0	0.8	0.0	
jeu pathologique	0.3	0.0	0.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.3	0.0	0.0	0.8	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	57.9	0.0	13.0	15.6	11.1	46.2	0.0	48.9	42.9	42.9
N**	1'146	6	253	122	9	13	4	237	7	14
<i>données manquantes</i>	338	1	23	10	0	1	0	21	2	0

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2005), femmes

Femmes

Patientes: principale substance posant problème										
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool		66.7	28.9	31.3	0.0	37.5	0.0	22.6	0.0	18.8
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.5		6.6	4.2	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
héroïne	2.6	0.0	0.0	33.3	0.0	18.8	0.0	5.7	0.0	6.3
méthadone	1.4	66.7	27.6	20.8	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	6.3
autres opiacés	0.9	0.0	1.3	6.3	0.0	6.3	0.0	1.9	0.0	0.0
cocaïne	4.0	0.0	43.4	0.0	0.0	18.8	0.0	7.5	0.0	6.3
crack, freebase	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.7	0.0	2.6	8.3	33.3	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	1.2	0.0	6.6	20.8	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.2	0.0	0.0	2.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	7.2	0.0	18.4	20.8	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	1.4	0.0	3.9	2.1	0.0	6.3	0.0	1.9	0.0	0.0
LSD	0.7	0.0	2.6	10.4	33.3	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	1.3	0.0	33.3	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
substances volatiles	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	5.8	0.0	35.5	43.8	66.7	12.5	0.0		0.0	18.8
tabac	30.4	33.3	42.1	20.8	0.0	31.3	0.0	24.5		0.0
autres substances	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	
jeu pathologique	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
troubles alimentaires	2.1	0.0	3.9	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	6.3
autres troubles assimilables à une addiction	0.5	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	57.2	0.0	22.4	20.8	33.3	31.3	0.0	49.1	88.9	56.3
N**	428	3	76	48	3	16	0	53	9	16
<i>données manquantes</i>	162	0	9	1	0	1	0	6	2	1

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2005), hommes & femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool		44.4	28.3	38.2	0.0	27.6	50.0	22.1	18.8	30.0
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.4		7.0	4.1	0.0	3.4	0.0	0.3	0.0	0.0
héroïne	2.0	11.1	1.2	28.8	0.0	20.7	25.0	3.4	0.0	3.3
méthadone	1.3	66.7	32.8	13.5	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	3.3
autres opiacés	0.3	0.0	3.3	2.9	0.0	3.4	0.0	0.7	0.0	0.0
cocaïne	4.5	22.2	49.5	0.0	16.7	17.2	0.0	10.3	6.3	3.3
crack, freebase	0.1	22.2	1.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
amphétamines	0.6	11.1	2.1	10.6	25.0	0.0	0.0	1.4	0.0	3.3
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.6	0.0	4.0	21.2	8.3	3.4	50.0	5.9	6.3	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.3	0.0	0.6	1.2	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	5.0	33.3	22.5	14.7	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	1.0	0.0	3.6	2.9	0.0	6.9	0.0	0.3	0.0	0.0
LSD	0.3	0.0	3.3	7.6	33.3	3.4	0.0	2.4	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.1	11.1	1.2	1.2	8.3	0.0	25.0	1.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
cannabis	8.9	44.4	39.8	47.6	50.0	6.9	75.0		12.5	20.0
tabac	31.3	33.3	46.8	38.2	25.0	31.0	25.0	30.7		3.3
autres substances	0.8	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	25.0	1.0	0.0	
jeu pathologique	0.4	0.0	0.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.9	0.0	0.9	2.4	8.3	0.0	0.0	0.0	6.3	3.3
autres troubles assimilables à une addiction	0.3	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	57.8	0.0	15.2	17.1	16.7	37.9	0.0	49.0	68.8	50.0
N**	1'574	9	329	170	12	29	4	290	16	30
données manquantes	500	1	32	11	0	2	0	27	4	1

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2005), hommes

Hommes

Patients: problème principal			
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	6.3	0.0	25.0
coktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	6.3	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	3.1	0.0	25.0
tabac	18.8	0.0	50.0
autres substances	6.3	0.0	0.0
jeu pathologique		0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0		0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	0.0	
aucun autre problème addictif	68.8	0.0	50.0
N**	32	0	4
<i>données manquantes</i>	7	0	3

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2005), femmes

Femmes

Patientes: problème principal			
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	0.0	0.0	0.0
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	0.0	0.0	0.0
tabac	0.0	0.0	0.0
autres substances	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0	0.0	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	100.0	100.0	100.0
N**	10	5	2
<i>données manquantes</i>	1	5	0

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2005), hommes & femmes

Hommes & femmes

Patient-e-s: problème principal			
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	4.8	0.0	16.7
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	4.8	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	2.4	0.0	16.7
tabac	14.3	0.0	33.3
autres substances	4.8	0.0	0.0
jeu pathologique		0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0		0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	0.0	
aucun autre problème addictif	76.2	100.0	66.7
N**	42	5	6
<i>données manquantes</i>	8	5	3

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T20 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2005)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation d'alcool*																
jamais	11.0	8.9	10.4	21.6	28.6	22.9	4.6	7.7	5.1	14.6	12.5	14.3	12.7	11.0	12.3	180
1 fois par mois ou moins	3.5	3.6	3.5	18.1	17.9	18.1	13.8	15.4	14.1	28.1	18.8	26.8	8.6	6.8	8.1	119
2 à 4 fois par mois	7.1	7.3	7.2	22.4	10.7	20.1	26.2	23.1	25.6	38.5	31.3	37.5	13.1	9.4	12.2	178
2 à 3 fois par semaine	17.9	18.8	18.2	14.7	32.1	18.1	24.6	30.8	25.6	17.7	31.3	19.6	17.7	20.2	18.4	269
4 fois ou plus par semaine	60.4	61.4	60.7	23.3	10.7	20.8	30.8	23.1	29.5	1.0	6.3	1.8	47.9	52.5	49.1	719
N**	770	303	1'073	116	28	144	65	13	78	96	16	112	1'084	381	1'465	1'465
<i>données manquantes</i>	714	287	1'001	167	60	227	67	36	103	162	43	205	1'251	503	1'754	1'754
Nbre de boissons standards par jour***																
1 ou 2	8.8	5.5	7.9	53.8	47.4	52.5	30.9	41.7	32.8	52.4	75.0	56.0	19.3	14.5	18.0	209
3 ou 4	19.7	19.3	19.6	25.0	26.3	25.3	40.0	16.7	35.8	25.4	8.3	22.7	21.8	18.7	21.0	243
5 ou 6	17.0	22.0	18.5	10.0	10.5	10.1	14.5	16.7	14.9	12.7	8.3	12.0	15.8	19.7	16.8	195
7 à 9	20.7	24.8	21.9	6.3	10.5	7.1	9.1	16.7	10.4	4.8	8.3	5.3	16.9	22.3	18.3	212
10 ou plus	33.8	28.3	32.2	5.0	5.3	5.1	5.5	8.3	6.0	4.8	0.0	4.0	26.2	24.8	25.8	299
N**	624	254	878	80	19	99	55	12	67	63	12	75	848	310	1'158	1'158
<i>données manquantes</i>	860	336	1'196	203	69	272	77	37	114	195	47	242	1'487	574	2'061	2'061
Fréquence de fortes consom. d'alcool***																
jamais	10.3	7.3	9.5	47.2	40.9	45.9	23.2	33.3	25.0	43.6	53.8	45.1	20.4	14.6	18.9	222
moins d'une fois par mois	9.4	9.7	9.5	22.5	27.3	23.4	30.4	16.7	27.9	35.9	30.8	35.2	14.6	12.6	14.1	166
1 fois par mois	13.1	11.3	12.6	9.0	9.1	9.0	21.4	8.3	19.1	16.7	0.0	14.3	13.4	10.4	12.6	148
1 fois par semaine	24.6	24.3	24.5	9.0	13.6	9.9	12.5	25.0	14.7	3.8	15.4	5.5	19.6	22.0	20.2	238
presque chaque jour	42.5	47.4	43.9	12.4	9.1	11.7	12.5	16.7	13.2	0.0	0.0	0.0	32.0	40.5	34.2	403
N**	609	247	856	89	22	111	56	12	68	78	13	91	868	309	1'177	1'177
<i>données manquantes</i>	875	343	1'218	194	66	260	76	37	113	180	46	226	1'467	575	2'042	2'042

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation d'alcool. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T21 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2005)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	24.2	28.2	25.3	3.2	6.3	3.8	7.5	11.1	7.9	14.7	0.0	13.2	18.7	23.8	20.0	228
1 jour par semaine ou moins	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.3	2.0	0.0	1.8	0.9	0.7	0.9	10
2 à 3 jours par semaine	2.3	1.9	2.1	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.6	1.9	1.4	1.8	20
4 à 6 jours par semaine	0.9	0.9	0.9	0.0	3.1	0.6	1.5	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.7	1.1	0.8	9
1 fois par jour	1.3	0.5	1.1	0.8	0.0	0.6	0.0	11.1	1.3	3.9	0.0	3.5	1.4	0.7	1.2	14
plusieurs fois par jour	70.4	67.6	69.6	95.2	90.6	94.3	89.6	77.8	88.2	76.5	100.0	78.9	76.4	72.3	75.4	861
N**	533	213	746	125	32	157	67	9	76	102	12	114	860	282	1'142	1'142
<i>données manquantes</i>	951	377	1'328	158	56	214	65	40	105	156	47	203	1'475	602	2'077	2'077
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10	11.7	14.3	12.3	4.7	7.7	5.3	10.4	14.3	10.9	36.9	66.7	40.5	13.2	16.3	13.9	105
11 à 20	40.2	38.7	39.8	50.9	34.6	47.7	52.1	42.9	50.9	38.5	0.0	33.8	42.7	34.9	40.9	309
21 à 30	26.8	31.1	27.9	31.1	38.5	32.6	31.3	42.9	32.7	24.6	33.3	25.7	28.3	33.1	29.4	222
31 ou plus	21.3	16.0	19.9	13.2	19.2	14.4	6.3	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	15.8	15.7	15.8	119
N**	343	119	462	106	26	132	48	7	55	65	9	74	583	172	755	755
<i>données manquantes</i>	61	34	95	15	4	19	14	1	15	22	3	25	116	43	159	159

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T22a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2005), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème										
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Objectif de consommation*										
abstinence définitive	38.1	80.0	72.5	77.4	85.7	41.7	100.0	51.8	25.0	60.0
abstinence limitée dans le temps	21.9	0.0	1.8	5.4	14.3	0.0	0.0	7.8	12.5	0.0
consommation contrôlée	23.5	20.0	9.5	9.7	0.0	33.3	0.0	24.1	25.0	40.0
aucune limitation envisagée	1.7	0.0	1.4	1.1	0.0	8.3	0.0	3.6	25.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	14.7	0.0	14.0	6.5	0.0	16.7	0.0	12.0	12.5	0.0
autre	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
N**	944	5	222	93	7	12	3	166	8	5
<i>données manquantes</i>	540	2	54	39	2	2	1	92	1	9

T22b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2005), femmes

Objectif de consommation*										
abstinence définitive	38.5	50.0	79.3	59.4	100.0	61.5	0.0	41.2	80.0	75.0
abstinence limitée dans le temps	16.4	0.0	1.7	9.4	0.0	7.7	0.0	8.8	0.0	0.0
consommation contrôlée	26.7	0.0	3.4	18.8	0.0	23.1	0.0	23.5	0.0	0.0
aucune limitation envisagée	0.9	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	10.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	17.0	50.0	12.1	12.5	0.0	7.7	0.0	20.6	10.0	25.0
autre	0.6	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	348	2	58	32	1	13	0	34	10	4
<i>données manquantes</i>	242	1	27	17	2	4	0	25	1	13

T22c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2005), hommes & femmes

Objectif de consommation*										
abstinence définitive	38.2	71.4	73.9	72.8	87.5	52.0	100.0	50.0	55.6	66.7
abstinence limitée dans le temps	20.4	0.0	1.8	6.4	12.5	4.0	0.0	8.0	5.6	0.0
consommation contrôlée	24.4	14.3	8.2	12.0	0.0	28.0	0.0	24.0	11.1	22.2
aucune limitation envisagée	1.5	0.0	1.4	0.8	0.0	4.0	0.0	4.0	16.7	0.0
pas déterminé pour l'instant	15.3	14.3	13.6	8.0	0.0	12.0	0.0	13.5	11.1	11.1
autres	0.2	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
N**	1'292	7	280	125	8	25	3	200	18	9
<i>données manquantes</i>	782	3	81	56	4	6	1	117	2	22

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23 Sexe et âge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2005)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sexe*																			
hommes	67.0			63.2			72.6			76.7			21.4			57.7			1'857
femmes	27.0			29.1			22.6			15.7			77.4			35.2			1'132
sexe pas connu	6.0			7.6			4.7			7.6			1.2			7.1			228
N**	972	391	1'450	141	65	223	77	24	106	181	37	236	104	377	487	1'857	1'132	3'217	3'217
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.7	2.0	0.5	0.9	0.7	0.5	0.6	19
15-19	0.9	1.3	1.0	1.4	12.7	4.9	5.2	20.8	8.9	57.5	62.9	58.4	5.1	2.2	2.8	7.7	5.2	6.7	199
20-24	3.7	2.8	3.5	16.3	20.6	17.6	24.7	25.0	24.8	15.6	5.7	14.0	3.0	4.4	4.1	6.9	5.9	6.6	194
25-29	6.8	4.4	6.1	17.7	22.2	19.1	15.6	20.8	16.8	8.9	8.6	8.9	11.1	6.3	7.3	8.7	7.8	8.4	247
30-34	9.7	8.5	9.4	24.1	17.5	22.1	16.9	8.3	14.9	8.4	5.7	7.9	6.1	9.6	8.8	11.1	9.4	10.5	310
35-39	13.8	12.4	13.4	23.4	17.5	21.6	23.4	12.5	20.8	3.9	5.7	4.2	11.1	10.7	10.8	14.0	11.8	13.2	389
40-44	16.0	15.7	15.9	12.8	4.8	10.3	6.5	12.5	7.9	0.0	5.7	0.9	14.1	18.3	17.4	13.5	14.7	13.9	412
45-49	16.6	16.2	16.5	2.1	3.2	2.5	7.8	0.0	5.9	0.6	5.7	1.4	13.1	14.8	14.4	12.7	13.7	13.1	386
50-54	12.7	15.5	13.5	0.7	1.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	12.6	12.7	9.5	11.9	10.4	308
55-59	10.6	9.8	10.4	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	4.0	10.1	8.8	7.4	8.5	7.8	231
60-64	4.7	7.7	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	5.2	5.6	4.0	6.0	4.8	141
65-69	2.3	3.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	3.6	4.1	2.1	2.9	2.4	71
70-74	1.3	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.1	1.3	1.2	1.3	1.3	37
75 et plus	0.6	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.8	1.1	0.4	0.4	0.4	12
N**	969	388	1'357	141	63	204	77	24	101	179	35	214	99	366	465	1'843	1'113	2'956	2'956
données manquantes	3	3	93	0	2	19	0	0	5	2	2	22	5	11	22	14	19	261	261
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	44.7	46.3	45.1	33.0	29.4	31.9	31.6	27.6	30.6	21.2	23.9	21.7	43.8	44.6	44.4	40.4	42.8	41.3	
écart-type	11.8	11.9	11.8	7.5	8.3	7.9	8.4	9.0	8.7	6.8	10.2	7.5	15.4	12.5	13.2	13.7	13.5	13.7	
1er quartile	36.6	38.4	37.1	28.1	22.6	26.0	24.3	20.4	23.4	16.8	16.8	16.8	32.3	36.1	35.7	30.5	33.2	31.4	
valeur médiane	44.6	46.0	45.1	33.0	28.0	31.9	31.9	26.3	29.9	18.8	18.2	18.6	43.9	44.6	44.4	40.3	43.7	41.5	
3e quartile	52.9	54.2	53.3	37.8	35.5	37.0	37.3	35.5	37.3	24.2	28.9	24.5	53.0	53.2	53.0	49.9	52.1	50.7	
N**	969	388	1'357	141	63	204	77	24	101	179	35	214	99	366	465	1'843	1'113	2'956	
données manquantes	3	3	93	0	2	19	0	0	5	2	2	22	5	11	22	14	19	261	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T24 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2005)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Etat civil*																			
célibataire	35.2	27.1	32.5	69.2	53.4	65.5	67.1	77.3	71.1	95.1	78.1	91.5	31.8	19.2	22.0	46.4	30.2	41.2	1'178
marié-e	32.5	33.9	33.2	13.1	20.7	14.8	18.6	13.6	16.5	3.7	3.1	4.2	49.4	56.5	55.0	29.0	38.4	32.0	916
séparé-e	6.3	6.0	6.4	1.5	3.4	2.5	5.7	4.5	5.2	0.0	12.5	2.4	4.7	5.4	5.4	4.7	5.6	5.3	152
divorcé-e	24.8	24.8	24.7	14.6	17.2	14.8	7.1	4.5	6.2	1.2	6.3	1.9	14.1	15.0	14.6	18.7	20.1	18.7	534
veuf/veuve	1.0	8.3	3.1	0.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.5	0.8	5.0	2.4	68
partenariat enregistré	0.2	0.0	0.2	1.5	3.4	2.0	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.3	0.7	0.4	12
N**	862	351	1'290	130	58	203	70	22	97	162	32	212	85	313	404	1'659	995	2'660	2'860
données manquantes	110	40	160	11	7	20	7	2	9	19	5	24	19	64	83	198	137	357	357
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	21.1	22.9	21.6	0.0	3.8	1.2	2.9	4.5	3.3	0.0	0.0	0.0	19.6	20.4	20.2	14.3	17.0	15.3	402
périphérie des grands centres	16.7	21.1	17.9	10.8	9.4	10.4	8.8	4.5	7.8	5.6	0.0	4.6	20.7	20.1	20.2	17.4	19.5	18.2	476
villes de moyenne importance	8.9	7.5	8.5	38.3	26.4	34.7	27.9	22.7	26.7	12.3	5.7	11.2	9.8	13.4	12.6	15.0	14.1	14.6	383
petites villes	28.8	27.1	28.3	25.8	32.1	27.7	30.9	40.9	33.3	33.3	40.0	34.5	29.3	24.8	25.7	27.6	26.7	27.3	714
campagne	24.6	21.4	23.7	25.0	28.3	26.0	29.4	27.3	28.9	48.8	54.3	49.7	20.7	21.3	21.1	25.8	22.8	24.6	645
N**	834	332	1'166	120	53	173	68	22	90	162	35	197	92	343	435	1'618	1'001	2'620	2'620
données manquantes	138	59	284	21	12	50	9	2	16	19	2	39	12	34	52	239	131	597	597

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T25 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2005)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de ménage*																			
seul-e en ménage	39.2	30.7	37.1	35.4	31.1	32.9	39.0	14.3	31.8	12.8	11.8	13.5	25.9	11.3	14.3	34.7	22.8	30.5	695
avec un ou les parents	9.1	2.8	7.2	14.2	11.1	13.5	16.9	33.3	21.2	62.8	55.9	60.5	3.4	7.0	6.5	16.7	8.9	14.0	318
avec enfant(s), sans partenaire	1.6	12.2	4.4	0.9	8.9	2.9	1.7	9.5	3.5	0.0	8.8	1.5	1.7	15.2	12.6	1.4	13.0	5.5	125
avec partenaire, sans enfant	25.4	31.1	26.5	16.8	22.2	17.6	11.9	28.6	16.5	3.2	5.9	4.0	19.0	22.2	21.4	20.7	25.4	21.9	498
avec partenaire et enfant(s)	18.7	15.7	18.5	10.6	13.3	11.2	10.2	0.0	7.1	3.8	2.9	3.5	41.4	41.3	41.2	16.9	23.3	19.4	441
avec d'autres proches	0.6	2.0	1.0	6.2	4.4	5.9	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	4.0	1.7	1.7	1.7	1.9	1.7	1.9	43
avec des amis (colocation)	1.9	1.6	1.6	8.0	4.4	7.1	5.1	0.0	4.7	3.8	0.0	3.0	6.9	0.9	2.0	2.9	1.3	2.3	52
autre	3.6	3.9	3.6	8.0	4.4	8.8	15.3	14.3	15.3	8.3	14.7	10.0	0.0	0.4	0.3	4.8	3.5	4.7	106
N**	638	254	971	113	45	170	59	21	85	156	34	200	58	230	294	1'324	763	2'278	2'278
données manquantes	334	137	479	28	20	53	18	3	21	25	3	36	46	147	193	533	369	939	939
Situation de domicile*																			
domicile fixe	94.7	94.9	95.2	82.2	85.4	82.1	78.3	85.7	79.1	91.7	81.8	89.3	98.6	99.3	99.2	93.0	95.0	93.6	2'313
sans domicile fixe	3.0	2.9	2.7	10.2	12.5	10.1	10.0	9.5	9.3	1.3	3.0	1.5	1.4	0.4	0.6	3.5	3.3	3.2	80
institution	2.3	2.2	2.1	7.6	2.1	7.8	11.7	4.8	11.6	7.1	15.2	9.3	0.0	0.4	0.3	3.5	1.7	3.2	79
N**	702	277	1'061	118	48	179	60	21	86	156	33	205	74	281	361	1'422	841	2'472	2'472
données manquantes	270	114	389	23	17	44	17	3	20	25	4	31	30	96	126	435	291	745	745
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	34.3	32.5	32.6	47.9	21.6	41.7	42.9	64.3	47.5	71.3	66.7	69.8	9.3	17.7	16.2	38.1	28.5	35.1	604
relations temporaires	7.4	7.3	7.7	6.3	10.8	7.6	14.3	0.0	9.8	9.2	20.0	11.2	7.0	1.1	2.6	7.2	6.6	7.3	125
partenaire fixe, vivant séparé	12.4	14.1	13.0	14.6	18.9	15.3	21.4	14.3	21.3	10.3	6.7	9.5	14.0	11.3	12.3	12.5	12.3	12.3	211
partenaire fixe, ménage commun	46.0	46.1	46.7	31.3	48.6	35.4	21.4	21.4	21.3	9.2	6.7	9.5	69.8	69.9	68.9	42.1	52.7	45.4	782
N**	461	191	705	96	37	144	42	14	61	87	15	116	43	186	235	968	594	1'722	1'722
données manquantes	511	200	745	45	28	79	35	10	45	94	22	120	61	191	252	889	538	1'495	1'495

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T26 Plus haute formation achevée, source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2005)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Plus haute formation achevée*																			
aucune form. achevée	4.1	4.3	4.1	10.5	20.0	13.0	5.1	0.0	3.9	24.8	20.0	24.1	2.0	5.1	4.4	7.2	5.9	6.8	124
scolarité obligatoire	13.5	25.6	16.8	23.7	40.0	27.9	25.4	41.2	28.9	45.4	56.0	47.0	9.8	18.6	16.7	19.7	26.0	21.9	398
scolarité complémentaire	1.6	6.2	2.8	2.6	0.0	1.9	3.4	0.0	2.6	2.8	4.0	3.0	2.0	1.7	1.8	2.4	4.0	3.0	54
apprentissage/école prof.	62.9	53.6	60.4	57.0	37.5	51.9	59.3	52.9	57.9	23.4	16.0	22.3	51.0	49.2	49.6	55.4	49.3	53.2	967
maturité/diplôme	3.5	4.3	3.7	1.8	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	2.1	4.0	2.4	2.0	5.6	4.8	2.9	4.3	3.4	62
école normale, pédagog.	0.2	1.9	0.6	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.7	1.8	0.3	2.1	0.9	16
form. profession. supérieure	7.6	1.9	6.1	2.6	2.5	2.6	5.1	0.0	3.9	0.7	0.0	0.6	9.8	9.6	9.6	5.9	3.8	5.2	94
école profession. supérieure	0.9	0.0	0.6	0.9	0.0	0.6	1.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	7.8	2.8	3.9	1.3	1.1	1.2	22
haute école spécialisée	0.7	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	1.1	2.2	0.8	1.0	0.8	15
université, haute école	5.0	1.9	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	1.3	0.7	0.0	0.6	7.8	4.5	5.3	4.1	2.6	3.6	65
N**	564	211	775	114	40	154	59	17	76	141	25	166	51	177	228	1'188	627	1'817	1'817
données manquantes	408	180	675	27	25	69	18	7	30	40	12	70	53	200	259	669	505	1'400	1'400
Source de revenu principale*																			
salaires	55.8	33.9	50.5	34.8	23.4	30.5	48.0	35.3	43.5	32.0	24.1	30.2	73.8	58.6	61.7	52.5	42.2	48.7	1'098
économies, épargne	1.3	0.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.2	1.3	0.7	0.5	0.6	14
rente (AVS, AI ou autre)	18.6	25.7	20.4	17.0	23.4	18.3	12.0	17.6	13.0	10.2	6.9	9.5	15.4	9.2	10.4	17.0	19.3	17.6	398
aide sociale	13.5	10.5	12.3	31.3	38.3	33.5	26.0	17.6	26.1	4.8	13.8	6.7	1.5	1.2	1.3	13.4	9.9	12.5	281
assurance-chômage	8.4	7.4	8.4	10.7	4.3	9.1	8.0	5.9	7.2	7.5	6.9	7.3	3.1	2.0	2.2	7.9	4.8	6.9	155
soutien du/de la partenaire	0.7	18.7	5.4	0.9	4.3	2.4	0.0	5.9	1.4	0.0	3.4	1.7	0.0	24.1	19.0	0.4	16.8	6.4	144
soutien parents/proches/amis	1.0	2.3	1.3	2.7	6.4	3.7	4.0	17.6	7.2	44.9	44.8	44.1	4.6	3.6	4.1	7.1	5.7	6.4	144
deal, combines	0.1	0.0	0.1	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
autres revenus illégaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
autre	0.4	1.2	0.7	1.8	0.0	1.8	2.0	0.0	1.4	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.8	18
N**	676	257	1'002	112	47	164	50	17	69	147	29	179	65	249	316	1'349	784	2'255	2'255
données manquantes	296	134	448	29	18	59	27	7	37	34	8	57	39	128	171	508	348	962	962
Taux d'activité principal*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	53.8	25.1	46.0	27.3	14.3	22.2	46.2	27.8	41.3	24.5	25.0	23.3	69.5	42.3	47.9	48.8	30.0	41.2	877
activité à temps partiel	5.2	16.3	8.3	5.5	7.1	5.6	0.0	22.2	5.3	2.8	6.3	3.1	1.7	25.0	19.9	4.4	18.0	9.1	194
plusieurs activités occas.	1.6	2.2	2.3	4.5	0.0	3.7	7.7	0.0	5.3	2.8	0.0	2.6	0.0	1.5	1.1	2.7	1.3	2.6	55
en formation	1.0	2.6	1.3	0.9	11.9	3.7	3.8	5.6	5.3	48.3	40.6	47.2	6.8	4.6	5.4	8.0	6.5	7.5	159
sans activité prof.	20.1	37.0	24.5	26.4	42.9	31.5	9.6	22.2	14.7	10.5	12.5	12.4	16.9	23.0	21.5	19.1	31.8	24.4	519
sans travail, en quête d'emploi	16.4	14.5	15.8	30.9	19.0	28.4	26.9	22.2	24.0	9.8	9.4	9.3	3.4	3.1	3.4	14.7	10.6	13.0	277
sans travail, futur emploi garanti	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	5
autre	1.5	1.8	1.5	4.5	4.8	4.9	5.8	0.0	4.0	0.7	6.3	1.6	1.7	0.5	0.8	1.9	1.6	2.0	42
N**	611	227	918	110	42	162	52	18	75	143	32	193	59	196	261	1'249	679	2'128	2'128
données manquantes	361	164	532	31	23	61	25	6	31	38	5	43	45	181	226	608	453	1'089	1'089

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T27 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2005)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	33.5	45.6	34.5	52.4	70.0	56.8	33.3	57.1	38.7	19.3	33.3	22.0	18.6	21.4	20.7	31.7	39.0	34.1	584
apprenti-e, stagiaire	0.9	0.5	0.7	1.9	10.0	4.1	6.7	7.1	6.5	33.0	27.8	29.1	2.3	3.0	2.8	5.1	3.5	4.1	71
manœuvre, aide	3.0	5.5	3.4	4.9	0.0	3.4	6.7	14.3	8.1	2.8	0.0	2.1	0.0	3.0	2.3	3.7	4.2	3.6	62
ouvrier/ère formé-e sur le tas	5.4	4.4	4.6	7.8	2.5	6.1	6.7	0.0	4.8	0.9	0.0	0.7	2.3	8.3	7.0	5.9	5.1	5.1	88
ouvrier/ère formé-e (CFC)	11.4	3.3	8.3	16.5	2.5	12.2	22.2	0.0	16.1	6.4	0.0	5.0	7.0	4.2	4.7	11.6	4.2	8.2	140
contremaître-sse	3.9	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	2.3	0.5	1.5	26
employé-e non qualifié-e	16.6	27.5	24.3	11.7	10.0	12.2	8.9	14.3	11.3	5.5	11.1	5.7	23.3	27.4	26.3	15.8	24.5	20.9	357
empl. qualifié-e, cadre moyen	10.3	3.3	7.9	1.9	0.0	1.4	4.4	0.0	3.2	0.9	5.6	1.4	18.6	17.3	17.8	8.2	7.4	7.5	128
employé-e, cadre supérieur	3.4	2.2	3.1	0.0	0.0	0.7	2.2	0.0	1.6	0.9	0.0	0.7	14.0	3.6	5.6	3.3	1.9	2.7	47
indépendant-e	9.9	4.4	8.3	2.9	0.0	2.0	4.4	0.0	3.2	2.8	0.0	2.1	11.6	9.5	9.9	7.7	5.8	6.8	116
écolier/ère, étudiant-e	0.6	1.1	0.7	0.0	5.0	1.4	0.0	7.1	3.2	25.7	22.2	29.1	2.3	1.2	1.9	3.8	2.8	4.0	69
autre statut	1.1	2.2	1.8	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.6	1.8	0.0	2.1	0.0	0.6	0.5	1.1	0.9	1.4	24
N**	465	182	713	103	40	148	45	14	62	109	18	141	43	168	213	1'004	567	1'712	1'712
données manquantes	507	209	737	38	25	75	32	10	44	72	19	95	61	209	274	853	565	1'505	1'505
Revenu mensuel net*																			
aucun revenu	25.4	38.5	28.6	29.4	52.4	36.1	29.2	44.4	33.3	52.2	70.6	55.1	9.1	24.3	20.8	28.7	36.8	31.0	248
moins de 1000 fr.	2.5	3.3	2.7	7.8	9.5	8.3	20.8	22.2	21.2	30.0	11.8	27.1	9.1	2.7	4.2	8.8	6.4	8.3	66
de 1001 à 2000 fr.	9.3	13.2	10.2	11.8	9.5	11.1	16.7	11.1	15.2	1.1	5.9	1.9	0.0	13.5	10.4	8.3	12.0	9.4	75
de 2001 à 3000 fr.	15.7	16.5	15.9	19.6	28.6	22.2	4.2	11.1	6.1	3.3	11.8	4.7	18.2	13.5	14.6	12.7	18.4	14.4	115
de 3001 à 4000 fr.	13.9	11.0	13.2	17.6	0.0	12.5	12.5	11.1	12.1	6.7	0.0	5.6	27.3	10.8	14.6	13.5	12.0	13.0	104
de 4001 à 5000 fr.	15.7	7.7	13.7	11.8	0.0	8.3	12.5	0.0	9.1	5.6	0.0	4.7	0.0	18.9	14.6	14.2	7.3	12.1	97
de 5001 à 6000 fr.	9.6	5.5	8.6	2.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	18.2	10.8	12.5	7.1	4.7	6.4	51
de 6001 à 8000 fr.	4.3	4.4	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	2.7	6.3	3.7	2.1	3.3	26
de 8001 à 10 000 fr.	2.5	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.1	1.9	0.4	1.5	12
de 10 001 à 15 000 fr.	1.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.6	5
plus de 15 000 fr.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	1
N**	280	91	371	51	21	72	24	9	33	90	17	107	11	37	48	565	234	800	800
données manquantes	692	300	1'079	90	44	151	53	15	73	91	20	129	93	340	439	1'292	898	2'417	2'417

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T28a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2005)

Raison principale*	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
fin régulière sans transfert	44.8	42.6	44.7	20.7	18.8	20.1	27.3	41.7	31.4	55.6	58.3	56.4	65.7	69.6	68.3	43.0	51.3	46.0	1'469
fin régulière avec transfert	5.8	6.2	5.7	18.6	17.2	18.3	9.1	16.7	12.4	4.4	0.0	3.4	2.9	2.2	2.7	7.5	5.3	7.0	224
changement de domicile	2.3	2.1	2.2	12.1	9.4	11.0	13.0	4.2	10.5	3.9	0.0	3.0	1.0	0.5	0.8	4.4	2.4	3.5	113
hospitalisation	0.7	1.8	1.0	2.1	0.0	1.4	3.9	8.3	4.8	0.0	2.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	0.9	28
détention	0.5	0.0	0.3	3.6	3.1	5.5	1.3	0.0	1.0	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	0.8	25
perte de contact	30.9	32.8	30.5	28.6	28.1	26.9	36.4	20.8	31.4	23.9	22.2	22.6	19.6	19.4	19.4	28.2	25.6	26.4	843
rupture explicite	10.7	10.5	11.0	5.7	10.9	7.3	7.8	8.3	7.6	7.8	11.1	9.4	6.9	6.2	6.3	9.8	10.1	10.2	324
décès	1.5	1.8	1.7	3.6	7.8	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	1.8	59
autre raison	2.8	2.3	2.9	5.0	4.7	4.6	1.3	0.0	1.0	3.9	5.6	4.3	3.9	2.2	2.5	3.5	2.6	3.3	106
N**	964	390	1'440	140	64	219	77	24	105	180	36	234	102	372	480	1'845	1'123	3'191	3'191
données manquantes	8	1	10	1	1	4	0	0	1	1	1	2	2	5	7	12	9	26	26

T28b Destination des transferts, selon le problème principal¹ et chez les proches (2005)

Destination des transferts***	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties			N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
traitement résidentiel	45.5	40.0	42.4	54.2	40.0	48.6	14.3	66.7	25.0	42.9	0.0	42.9	0.0	33.3	16.7	40.4	40.4	36.2	68
prise en charge ambulatoire	40.9	45.0	43.9	37.5	50.0	43.2	71.4	33.3	66.7	42.9	0.0	42.9	100.0	66.7	83.3	46.5	48.9	53.2	100
appartement protégé	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.5	1
autre institution spécialisée	13.6	15.0	13.6	8.3	10.0	8.1	14.3	0.0	8.3	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	13.2	8.5	10.1	19
N**	44	20	66	24	10	37	7	3	12	7	0	7	1	3	6	114	47	188	188
données manquantes	12	4	16	2	1	3	0	1	1	1	0	1	2	5	7	24	12	36	36

T28c Cause de décès, selon le problème principal¹ et chez les proches (2005)

Cause de décès****	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties			N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
suicide	14.3	0.0	7.1	20.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	6.7	12.2	5
accident	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
maladie	71.4	85.7	78.6	40.0	50.0	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5	66.7	61.0	25
surdose ou intoxication aiguë	0.0	0.0	0.0	20.0	25.0	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	13.3	12.2	5
autre cause de décès	14.3	14.3	14.3	20.0	25.0	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	13.3	14.6	6
N**	7	7	14	5	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	15	41	41
données manquantes	7	0	11	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	18	18

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s transféré-e-s. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s décédé-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T29 Durée de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2005)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
Durée de la prise en charge* (%)																			
1 semaine ou moins	11.3	13.0	11.1	4.3	7.8	6.8	3.9	4.3	4.8	9.6	19.4	11.3	21.6	20.4	20.6	11.2	16.0	12.6	337
> 1 semaine à 1 mois	7.5	6.0	6.8	5.0	4.7	5.4	2.6	8.7	3.8	10.2	13.9	10.4	13.7	10.2	10.8	7.7	8.2	7.7	205
> 1 à 2 mois	8.1	8.3	7.8	5.7	4.7	5.9	7.9	8.7	9.6	10.7	5.6	10.8	7.8	8.6	8.3	8.4	8.0	8.2	219
>2 à 3 mois	4.6	5.4	4.7	7.1	7.8	7.2	3.9	0.0	2.9	8.5	5.6	8.7	2.9	4.0	3.7	4.9	5.1	4.9	132
>3 à 6 mois	12.3	14.8	12.9	12.1	14.1	13.1	18.4	13.0	16.3	18.1	11.1	17.3	11.8	14.7	14.1	13.3	14.1	13.5	362
>6 mois à 1 an	26.0	27.2	25.7	27.9	23.4	25.3	32.9	47.8	34.6	29.9	30.6	28.6	31.4	32.2	32.0	27.7	29.6	27.8	744
>1 à 2 ans	15.9	15.5	15.9	22.9	20.3	20.8	21.1	13.0	19.2	9.0	8.3	9.1	9.8	7.0	7.9	15.4	12.0	14.3	383
>2 à 3 ans	8.7	4.4	8.3	7.9	4.7	6.3	7.9	0.0	6.7	2.3	2.8	2.2	0.0	1.6	1.2	6.8	3.1	5.8	156
>3 à 5 ans	4.2	4.7	5.3	5.0	9.4	5.9	1.3	4.3	1.9	1.7	2.8	1.7	1.0	0.8	0.8	3.4	3.2	3.9	103
>5 à 10 ans	1.3	0.8	1.3	2.1	3.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	1.1	0.7	1.0	28
plus de 10 ans	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
N**	967	386	1'440	140	64	221	76	23	104	177	36	231	102	373	481	1'576	950	2'672	2'672
<i>données manquantes</i>	5	5	10	1	1	2	1	1	2	4	1	5	2	4	6	281	182	545	545
Durée (en semaines)																			
moyenne	48.9	42.0	50.4	55.5	60.5	57.3	44.3	37.9	42.8	27.9	28.6	27.3	22.1	25.2	24.7	43.9	35.7	42.9	
écart-type	67.5	54.2	68.1	67.3	80.4	77.7	38.7	41.0	39.5	33.8	38.0	33.7	27.4	37.9	35.8	60.7	52.2	61.1	
1er quartile	7.3	7.0	7.8	13.3	12.4	11.9	16.8	17.9	14.6	5.1	2.4	4.7	1.6	3.0	2.9	7.0	4.3	6.1	
valeur médiane	29.0	26.1	29.9	34.1	30.4	32.0	29.1	28.0	28.2	19.3	18.0	18.1	15.6	16.9	16.9	26.6	23.0	26.1	
3e quartile	62.7	53.0	64.0	63.6	63.4	62.3	67.5	44.0	58.9	36.1	39.9	35.9	30.7	32.7	32.0	54.9	43.1	52.4	
N**	967	386	1'440	140	64	221	76	23	104	177	36	231	102	373	481	1'576	950	2'672	
<i>fehlende Angaben</i>	5	5	10	1	1	2	1	1	2	4	1	5	2	4	6	281	182	545	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T30 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2005)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution pendant la prise en charge*																
non	96.4	97.9	96.7	33.6	40.7	35.4	77.3	70.0	75.6	99.4	100.0	99.5	88.2	89.2	88.2	1'721
oui	3.6	2.1	3.3	66.4	59.3	64.6	22.7	30.0	24.4	0.6	0.0	0.5	11.8	10.8	11.8	231
N**	748	285	1'034	122	54	178	66	20	86	157	34	191	1'399	546	1'952	1'952
données manquantes	223	102	411	19	11	45	11	4	20	22	2	42	335	150	690	690
Type de substitution***																
héroïne	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	1
méthadone	29.6	16.7	26.5	91.1	93.5	92.0	86.7	100.0	90.5	100.0	0.0	100.0	79.9	79.7	80.0	182
autres opiacés	0.0	0.0	0.0	5.1	3.2	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.7	2.6	6
autres substances	70.4	83.3	73.5	2.5	3.2	2.7	13.3	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	16.5	18.6	17.0	39
N**	27	6	34	79	31	112	15	6	21	1	0	1	163	58	228	228
données manquantes	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3
Substitution après la prise en charge*																
non	99.4	100.0	99.5	62.1	65.9	63.3	87.3	83.3	86.3	100.0	100.0	100.0	94.8	95.2	94.9	1'591
oui	0.6	0.0	0.5	37.9	34.1	36.7	12.7	16.7	13.7	0.0	0.0	0.0	5.2	4.8	5.1	85
N**	637	251	888	103	44	147	55	18	73	134	25	159	1'199	475	1'676	1'676
données manquantes	334	136	557	38	21	76	22	6	33	45	11	74	535	221	966	966
Type de substitution***																
prescription d'héroïne	0.0	0.0	0.0	7.7	6.7	7.4	14.3	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	8.1	4.3	7.1	6
traitement de substitution	100.0	0.0	100.0	92.3	93.3	92.6	85.7	100.0	90.0	0.0	0.0	0.0	91.9	95.7	92.9	79
N**	4	0	4	39	15	54	7	3	10	0	0	0	62	23	85	85
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s substitué-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T31 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2005)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Postcure prévue et mise en place*																
non	90.1	87.6	89.3	69.0	60.0	66.5	74.6	72.2	74.0	92.1	96.8	92.9	86.4	84.3	85.8	1'493
oui	9.9	12.4	10.7	31.0	40.0	33.5	25.4	27.8	26.0	7.9	3.2	7.1	13.6	15.7	14.2	247
N**	655	259	915	113	45	158	59	18	77	151	31	182	1'254	483	1'740	1'740
<i>données manquantes</i>	316	128	530	28	20	65	18	6	29	28	5	51	480	213	902	902
Type de la postcure prévue***																
appartement protégé de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	1
service de postcure de l'institution	3.4	3.4	3.4	3.3	6.7	4.4	13.3	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	4.6	3.1	4.1	9
appartement protégé extérieur	1.7	3.4	2.2	0.0	6.7	2.2	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	8.3	1.3	4.7	2.3	5
service de postcure extérieur	15.3	17.2	15.7	20.0	20.0	20.0	26.7	0.0	22.2	9.1	0.0	8.3	16.4	12.5	15.2	33
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	23.7	20.7	22.5	0.0	13.3	4.4	0.0	33.3	5.6	9.1	0.0	8.3	15.8	18.8	16.6	36
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	3.4	3.4	3.4	33.3	26.7	31.1	20.0	33.3	22.2	27.3	0.0	25.0	12.5	10.9	12.0	26
autre centre de consultation	13.6	10.3	12.4	6.7	13.3	8.9	6.7	0.0	5.6	27.3	0.0	25.0	13.8	17.2	14.7	32
groupe d'entraide	6.8	10.3	9.0	3.3	6.7	4.4	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	8.3	6.6	9.4	7.8	17
groupe d'ancien-ne-s client-e-s de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	1
autre	39.0	34.5	37.1	36.7	26.7	33.3	33.3	33.3	33.3	54.5	100.0	58.3	36.2	28.1	33.6	73
N**	59	29	89	30	15	45	15	3	18	11	1	12	152	64	217	217
<i>données manquantes</i>	6	3	9	5	3	8	0	2	2	1	0	1	18	12	30	30

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pour lesquels une postcure est prévue. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T32 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2005)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Problèmes addictifs*																
alcool	63.1	67.9	64.5	30.8	22.7	28.5	28.0	21.4	26.6	9.4	15.0	10.2	49.0	54.4	50.5	766
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.7	0.5	0.7	13.1	13.6	13.2	2.0	21.4	6.3	0.0	0.0	0.0	1.9	2.6	2.1	32
héroïne	1.1	1.0	1.0	72.0	52.3	66.2	8.0	14.3	9.4	0.9	0.0	0.7	9.5	8.6	9.2	140
méthadone	1.3	1.0	1.2	38.3	43.2	39.7	6.0	14.3	7.8	0.9	0.0	0.7	6.4	7.2	6.6	100
autres opiacés	0.2	0.0	0.1	3.7	4.5	4.0	2.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.7	10
cocaïne	1.6	2.9	2.0	30.8	20.5	27.8	68.0	35.7	60.9	1.7	0.0	1.5	8.9	6.7	8.3	126
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.2	0.0	0.1	2
amphétamines	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	2.0	7.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.3	5
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	4.0	7.1	4.7	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	0.5	8
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
barbituriques	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	2
benzodizépines	1.6	2.9	2.0	15.9	9.1	13.9	2.0	0.0	1.6	0.0	5.0	0.7	3.5	5.0	4.0	60
autres somnifères et tranquillisants	0.2	1.0	0.4	0.9	4.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	0.8	12
LSD	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.4	0.0	0.3	4
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.3	0.2	0.3	4
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	1
cannabis	4.3	3.3	4.0	17.8	20.5	18.5	24.0	0.0	18.8	50.4	35.0	48.2	11.8	9.6	11.2	170
tabac	24.5	28.2	25.5	39.3	31.8	37.1	24.0	14.3	21.9	18.8	25.0	19.7	24.7	25.4	24.9	378
autres substances	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.5	7
jeu pathologique	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	0.8	12
troubles alimentaires	0.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.9	14
autres troubles assimilable à une addiction	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.5	0.6	0.2	0.5	8
aucun	30.2	25.8	29.0	10.3	15.9	11.9	14.0	28.6	17.2	41.9	40.0	41.6	28.5	24.9	27.5	418
N**	559	209	768	107	44	151	50	14	64	117	20	137	1'099	417	1'518	1'518
<i>données manquantes</i>	412	178	677	34	21	72	27	10	42	62	16	96	635	279	1'124	1'124

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T33 Fréquence des rechutes, substance ou comportement impliqué et durée des rechutes pendant la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2005)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence des rechutes*																
aucune	60.0	47.2	56.5	34.3	22.2	31.6	22.2	53.8	30.6	69.7	63.2	67.9	53.4	42.6	50.3	617
une fois	8.4	10.7	8.6	10.4	22.2	13.7	11.1	7.7	10.2	6.7	5.3	6.4	8.5	10.4	8.6	106
deux fois	7.5	7.3	8.1	10.4	14.8	11.6	19.4	0.0	14.3	10.1	10.5	11.0	9.1	9.5	9.8	120
trois ou quatre fois	13.0	18.5	13.8	14.9	11.1	13.7	19.4	7.7	16.3	10.1	15.8	11.0	13.2	16.9	13.6	167
cinq fois ou plus	11.0	16.3	12.9	29.9	29.6	29.5	27.8	30.8	28.6	3.4	5.3	3.7	15.8	20.7	17.6	216
N**	438	178	651	67	27	95	36	13	49	89	19	109	834	338	1'226	1'226
<i>données manquantes</i>	533	209	794	74	38	128	41	11	57	90	17	124	900	358	1'416	1'416
Substance/comportement addictif lors des rechutes***																
alcool	98.7	100.0	99.1	19.5	33.3	24.2	29.2	0.0	24.1	22.7	16.7	21.4	73.9	79.7	75.7	390
cocktails (héroïne et cocaïne)	1.3	1.3	1.3	19.5	14.3	17.7	4.2	40.0	10.3	0.0	0.0	0.0	3.5	4.1	3.7	19
opiacés	2.0	3.8	2.6	82.9	66.7	77.4	12.5	40.0	17.2	4.5	0.0	3.6	16.4	14.0	15.9	82
cocaïne et dérivés	1.3	5.0	2.6	22.0	38.1	27.4	87.5	40.0	79.3	4.5	0.0	3.6	14.4	12.8	13.8	71
stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	20.0	13.8	4.5	0.0	3.6	1.5	2.3	1.7	9
médicaments	2.6	6.3	3.9	14.6	14.3	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	8.1	7.4	38
hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.6	3
cannabis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
tabac	2.6	1.3	2.2	9.8	4.8	8.1	16.7	0.0	13.8	86.4	100.0	89.3	11.1	9.9	11.1	57
substances volatiles	3.3	5.0	3.9	7.3	4.8	6.5	4.2	0.0	3.4	4.5	16.7	7.1	5.0	6.4	5.6	29
autres substances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
jeu pathologique	0.0	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.6	1.0	5
troubles alimentaires	0.0	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.0	5
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.4	2
N**	152	80	232	41	21	62	24	5	29	22	6	28	341	172	515	515
<i>données manquantes</i>	23	14	51	3	0	3	4	1	5	5	1	7	48	22	94	94
Durée des rechutes****																
1 à 2 jours	33.9	25.9	31.3	7.7	37.5	19.0	75.0	100.0	77.8	70.0	100.0	76.9	35.8	41.3	37.7	69
3 à 6 jours	35.7	33.3	34.9	38.5	12.5	28.6	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	7.7	30.0	25.4	28.4	52
7 à 10 jours	10.7	22.2	14.5	15.4	12.5	14.3	12.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	12.5	15.9	13.7	25
>10 jours à 2 semaines	5.4	14.8	8.4	7.7	0.0	4.8	12.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	4.2	9.5	6.0	11
>2 à 4 semaines	8.9	3.7	7.2	15.4	25.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	6.3	7.7	14
>4 à 6 semaines	1.8	0.0	1.2	7.7	12.5	9.5	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	15.4	5.8	1.6	4.4	8
>6 à 8 semaines	1.8	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.5	1
>2 mois	1.8	0.0	1.2	7.7	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	1.6	3
N**	56	27	83	13	8	21	8	1	9	10	3	13	120	63	183	183
<i>données manquantes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Pourcentages par colonne, une seule catégorie possible

T34 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal¹ (selement patient-e-s) (2005)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	26.2	33.3	28.2	11.8	7.4	10.5	11.4	12.5	11.6	21.1	0.0	19.0	24.9	28.4	25.8	247
1 jour par semaine ou moins	1.4	0.7	1.2	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	1.3	1.1	1.6	1.3	12
2 à 3 jours par semaine	1.4	0.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.3	1.3	0.8	1.1	11
4 à 6 jours par semaine	1.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	2.3	1.4	0.0	1.3	1.3	0.4	1.0	10
une fois par jour	0.6	0.0	0.4	4.4	3.7	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.8	0.9	9
plusieurs fois par jour	69.3	65.2	68.2	82.4	88.9	84.2	88.6	75.0	86.0	76.1	87.5	77.2	70.4	68.1	69.9	670
N**	362	138	500	68	27	95	35	8	43	71	8	79	700	257	959	959
<i>données manquantes</i>	609	249	945	73	38	128	42	16	63	108	28	154	1'034	439	1'683	1'683
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10 cigarettes par jour	14.3	14.1	14.2	6.1	6.7	6.3	7.1	50.0	12.5	32.1	37.5	33.3	15.1	16.7	15.5	72
11 à 20 cigarettes par jour	37.9	34.4	37.0	54.5	60.0	56.3	42.9	50.0	43.8	53.6	37.5	50.0	42.3	42.1	42.2	196
21 à 30 cigarettes par jour	31.9	39.1	33.7	30.3	26.7	29.2	35.7	0.0	31.3	14.3	25.0	16.7	29.6	31.7	30.3	141
31 cigarettes par jour ou plus	15.9	12.5	15.0	9.1	6.7	8.3	14.3	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	13.0	9.5	12.0	56
N**	182	64	246	33	15	48	14	2	16	28	8	36	338	126	465	465
<i>données manquantes</i>	85	28	113	27	10	37	17	5	22	28	0	28	188	58	247	247

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T35 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème¹ (seulement patient-e-s) (2005)

	Patient-e-s: principale substance posant problème ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Objectif de consommation*																
abstinence définitive	33.1	41.8	36.7	63.3	64.9	63.7	56.3	69.2	60.0	46.3	39.1	46.9	41.1	46.7	44.2	630
abstinence limitée dans le temps	13.9	11.6	12.8	6.1	0.0	4.8	0.0	7.7	1.5	8.3	8.7	7.6	11.5	8.8	10.2	145
consommation contrôlée	35.9	32.8	34.6	10.2	5.4	10.3	12.5	7.7	10.8	31.5	26.1	29.0	31.4	28.3	29.6	422
aucune limitation envisagée	5.2	1.6	4.5	3.1	8.1	4.1	0.0	0.0	0.0	4.6	4.3	4.8	3.8	3.3	3.9	56
pas déterminé pour l'instant	10.5	12.2	10.5	17.3	21.6	17.1	31.3	15.4	27.7	9.3	21.7	11.7	11.4	11.8	11.3	161
autre	1.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	0.8	12
N**	459	189	687	98	37	146	48	13	65	108	23	145	940	364	1'426	1'426
<i>données manquantes</i>	512	198	758	43	28	77	29	11	41	71	13	88	794	332	1'216	1'216
Pronostic*																
très bon pronostic	10.4	9.0	9.4	5.6	5.7	5.6	2.3	13.3	5.2	19.6	10.0	18.0	13.0	10.4	11.7	168
bon pronostic	45.4	44.7	47.1	22.2	28.6	24.0	30.2	26.7	29.3	48.2	55.0	48.9	42.1	41.5	43.7	628
plutôt mauvais pronostic	32.1	28.6	30.6	48.9	40.0	46.4	44.2	40.0	43.1	22.3	30.0	24.1	31.4	31.9	30.9	444
mauvais pronostic	12.1	17.6	12.9	23.3	25.7	24.0	23.3	20.0	22.4	9.8	5.0	9.0	13.5	16.2	13.6	196
N**	520	199	768	90	35	125	43	15	58	112	20	133	992	376	1'436	1'436
<i>données manquantes</i>	451	188	677	51	30	98	34	9	48	67	16	100	742	320	1'206	1'206

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu