



Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance

Résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2007

Recueil de tableaux statistiques

Mariana Astudillo, Etienne Maffli

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du monitoring act-info. Nous remercions également les collaborateurs et collaboratrices des services de consultation qui ont effectué les tâches de logistique et de saisie. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance et coordonne l'ensemble du réseau act-info. Un grand merci également à Edith Bacher et Christiane Gmel pour la conception graphique et la mise en page de ce rapport ainsi qu'à Marina Delgrande Jordan pour sa précieuse collaboration dans le développement des syntaxes d'analyse.

Compléments d'information: Etienne Maffli, tél. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emaffli@sfa-ispa.ch

Réalisation: Mariana Astudillo & Etienne Maffli, Institut suisse de
prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA)

Diffusion: Librairie ISPA, case postale 870, 1001 Lausanne,
tél. 021/321 29 35, fax 021 321 29 40,
e-mail librairie@sfa-ispa.ch

Prix: Fr. 10.–

Langue du texte original: français

Graphisme/mise en page: ISPA

Copyright: © ISPA-SFA Lausanne 2009

Citation recommandée: Astudillo, M & Maffli, E. (2009). Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance: résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2007 – Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies.

Table des matières

act-info – Information network an addiction care and therapy in Switzerland

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance

ADMISSION

- T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2007)
- T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2007)
- T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2007)
- T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2007)
- T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2007)
- T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2007)
- T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2007)
- T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2007)
- T9 Instance d'envoi principale et secondaire, selon le problème principal et chez les proches (2007)
- T10 Type d'aide attendue à l'admission et statut légal de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2007)
- T11 Traitements/prises en charge avant l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2007)
- T12 Substitution et autre traitement/prise en charge à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2007)
- T13a Admission suite à une cure de sevrage, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2007)
- T13b Fréquence des sevrages sans aide professionnelle avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2007)
- T14 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2007)
- T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2007), hommes
- T15.1b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2007), hommes

- T15.2a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2007), femmes
- T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2007), femmes
- T15.3a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2007), hommes & femmes
- T15.3b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2007), hommes & femmes
- T16.1a Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2007), hommes
- T16.1b Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2007), femmes
- T16.1c Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2007), hommes & femmes
- T16.2a Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2007), hommes
- T16.2b Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2007), femmes
- T16.2c Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2007), hommes & femmes
- T17 Mode d'administration de la principale substance posant problème au cours des 6 derniers mois avant l'admission (2007)
- T18 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 6 derniers mois avant l'admission des injections, échange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois avant l'admission et âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2007)
- T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2007), hommes
- T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2007), femmes
- T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2007), hommes & femmes
- T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2007), hommes
- T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2007), femmes
- T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2007), hommes & femmes
- T20 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2007)

- T21 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2007)
- T22a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2007), hommes
- T22b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2007), femmes
- T22c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2007), hommes & femmes
- T23.1a Problèmes psychiques au cours de la vie (2007), hommes
- T23.1b Problèmes psychiques au cours de la vie (2007), femmes
- T23.1c Problèmes psychiques au cours de la vie (2007), hommes & femmes
- T24 Proches: Lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2007)
- T25 Proches: problème principal et autres problèmes de la tierce personne (2007)
- T26 Proches: Propres problèmes des proches liés au problème de la tierce personne (2007)

SORTIE

- T27 Sexe et âge, selon le problème principal et chez les proches (2007)
- T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2007)
- T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2007)
- T30 Plus haute formation achevée, source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2007)
- T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2007)
- T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2007)
- T32b Destination des transferts, selon le problème principal et chez les proches (2007)
- T32c Cause de décès, selon le problème principal et chez les proches (2007)
- T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2007)
- T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2007)
- T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2007)
- T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2007)

- T37 Fréquence des rechutes, substance ou comportement impliqué et durée des rechutes pendant la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2007)
- T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (selement patient-e-s) (2007)
- T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème (seulement patient-e-s) (2007)

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- SAMBAD (Statistique du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance)
- Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HegeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Méthadone (Statistique nationale des traitements de substitution)

Ces cinq statistiques disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés. Les données communes sont intégrées dans une base de données centralisée, permettant ainsi de procéder à des analyses sur l'ensemble des secteurs. Avec l'adoption des standards européens (Treatment Demand Indicator), la comparabilité des données au plan international est également garantie.

act-info est financé et coordonné par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne (ISPM), l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies à Lausanne (ISPA) et l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zürich (ISGF).

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)

Dès 2004, les instruments de monitoring *act-info* ont été introduits dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance et remplacent les anciens questionnaires en vigueur depuis 1994. Seuls quelques services isolés ont encore utilisé les anciens instruments pour le relevé de 2007. La réalisation d'*act-info* dans ce secteur est confiée à l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA).

La statistique *act-info* SAMBAD offre un aperçu de la clientèle et des activités de l'aide ambulatoire en matière de dépendance en Suisse. Les données sont récoltées au début et à la fin de la prise en charge. Les informations rassemblées à l'admission renseignent en particulier sur les caractéristiques socio-démographiques des client-e-s, sur leurs expériences de traitement ainsi que sur leurs modes de consommation et problèmes psychosociaux avant la prise en charge. Les informations récoltées à la sortie rendent principalement compte des caractéristiques socio-démographiques des client-e-s à ce moment, des mesures prises par les intervenant-e-s durant la prise en charge et des circonstances de la fin de celle-ci.

En 2007, 77 des 224 institutions recensées dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance ont participé au monitoring *act-info*. Il s'agit de services de consultation spécialisés pour les problèmes liés à l'alcool et/ou aux drogues illégales ainsi que de divers types de services polyvalents offrant également une aide pour les problèmes addictifs.

Quelques explications concernant les tableaux

La présente statistique descriptive des données de l'enquête act-*info* auprès des client-e-s du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance repose sur deux types de tableaux:

- lorsque la question a des catégories de réponses prédéfinies ou recodées en tranches distinctes (par exemple "état civil" ou "âge"), le tableau indique les pourcentages des différentes catégories de réponses
- lorsque la question n'a pas de catégories prédéfinies, mais requiert une valeur numérique (par exemple "âge au début de la consommation problématique"), le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1er quartile, 3e quartile)

La plupart des tableaux présentent les résultats de façon distincte pour les sous-groupes de patients et patientes ayant mentionné l'**alcool**, un **opiacé** (héroïne notamment), la **cocaïne** (et dérivés) ou le **cannabis** comme problème principal au moment de leur admission. Les **proches** venant consulter pour les problèmes d'un tiers font également l'objet d'analyses séparées pour les aspects socio-démographiques. A l'exception des thèmes directement liés aux modes de consommation ou aux formes de comportements addictifs non liés aux substances, les résultats ne sont en revanche pas présentés séparément pour les client-e-s (peu nombreux) ayant mentionné d'autres substances (par exemple un stimulant ou les substances volatiles) ou un problème addictif non lié à une substance (par exemple jeu pathologique) comme problème principal. Ces personnes sont cependant incluses dans les analyses portant sur l'ensemble des prises en charge figurant dans les blocs à droite des tableaux respectifs. Toutes les analyses sont effectuées séparément pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour tous sexes confondus (colonnes "Total" comprenant également les quelques personnes dont le sexe n'est pas connu).

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Le nombre de réponses valides **N** représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages ou autres paramètres. Il est indiqué pour chaque groupe ou sous-groupe considéré. Au dessous, le nombre correspondant de données manquantes figure également. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés particulièrement prudemment.

Des notes en bas de tableau renseignent sur les éventuelles particularités des groupes de référence ainsi que sur le type de question. Lorsque plusieurs réponses sont possibles (par exemple aux tableaux du thème T19, "autres problèmes addictifs") les pourcentages obtenus ne sont pas additifs.

T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2007)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sexe*																			
hommes	69.6			72.4			77.8			84.1			24.8			63.6		4'240	
femmes	30.4			27.6			22.2			15.9			75.2			36.4		2'426	
sexe pas connu	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		1	
N**	2'504	1'093	3'598	443	169	612	228	65	293	550	104	654	271	823	1'094	4'240	2'426	6'667	6'667
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.9	3.7	5.2	1.2	2.2	1.1	0.9	1.0	67
15-19	2.2	2.6	2.3	2.3	9.0	4.1	8.8	13.8	9.9	60.5	56.3	59.8	17.2	3.7	7.0	11.4	6.5	9.6	639
20-24	5.5	2.8	4.7	15.2	15.0	15.1	25.4	20.0	24.2	14.4	15.5	14.6	6.0	3.9	4.4	9.2	5.8	8.0	528
25-29	8.2	4.7	7.1	15.2	19.2	16.3	23.2	21.5	22.9	8.6	6.8	8.3	7.5	8.1	7.9	9.8	7.7	9.1	601
30-34	8.4	8.0	8.3	17.9	18.6	18.1	16.2	23.1	17.7	5.3	3.9	5.1	5.6	8.8	8.0	9.4	9.3	9.4	621
35-39	13.4	12.2	13.1	27.7	18.6	25.2	14.5	7.7	13.0	3.6	3.9	3.7	7.5	10.1	9.4	13.4	11.4	12.7	841
40-44	15.5	15.7	15.6	12.5	13.2	12.7	7.9	7.7	7.8	2.0	3.9	2.3	9.3	14.8	13.5	12.4	14.0	13.0	863
45-49	15.0	18.5	16.0	6.8	4.2	6.1	3.1	4.6	3.4	1.1	4.9	1.7	15.7	16.8	16.5	11.4	15.3	12.8	850
50-54	11.7	13.6	12.3	2.0	2.4	2.1	0.9	0.0	0.7	0.4	0.0	0.3	10.1	12.4	11.8	8.2	11.1	9.2	613
55-59	9.0	9.6	9.2	0.5	0.0	0.3	0.0	1.5	0.3	0.5	0.0	0.5	5.2	8.1	7.4	6.3	7.8	6.8	453
60-64	6.2	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	5.0	4.9	4.1	4.8	4.4	290
65-69	2.7	3.6	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.3	3.3	1.9	3.0	2.3	154
70-74	1.4	1.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.3	2.2	1.0	1.4	1.1	75
75 et plus	0.4	1.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	1.1	1.3	1.3	0.4	1.1	0.6	42
N**	2'494	1'091	3'586	441	167	608	228	65	293	549	103	652	268	815	1'083	4'223	2'413	6'637	6'637
données manquantes	10	2	12	2	2	4	0	0	0	1	1	2	3	8	11	17	13	30	30
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	43.8	45.9	44.4	34.1	31.9	33.5	29.7	29.7	29.7	21.3	22.9	21.6	38.6	44.0	42.7	38.4	42.3	39.8	
écart-type	12.7	12.3	12.6	8.2	8.5	8.3	7.9	8.8	8.1	7.6	11.5	8.3	16.8	13.7	14.7	14.3	14.0	14.3	
1er quartile	35.1	38.1	36.0	27.6	25.1	26.7	23.2	22.0	23.1	16.7	16.6	16.7	22.6	34.6	32.0	26.7	32.4	28.5	
valeur médiane	43.9	45.9	44.6	34.9	32.3	34.0	28.5	29.0	28.6	18.0	17.8	18.0	40.8	44.7	44.0	38.3	42.9	40.1	
3e quartile	52.7	54.0	53.1	39.3	38.0	39.1	35.3	33.6	35.2	23.4	24.8	23.7	50.3	52.6	52.0	48.5	51.8	49.8	
N**	2'494	1'091	3'586	441	167	608	228	65	293	549	103	652	268	815	1'083	4'223	2'413	6'637	6'637
données manquantes	10	2	12	2	2	4	0	0	0	1	1	2	3	8	11	17	13	30	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2007)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
Etat civil*																			
célibataire	40.0	29.2	36.7	76.3	65.6	73.4	76.1	72.1	75.3	92.4	90.6	92.1	44.9	24.7	29.7	53.3	35.3	46.7	2'947
marié-e	34.1	32.0	33.4	10.6	12.5	11.1	10.6	6.6	9.7	4.1	4.2	4.1	45.7	52.0	50.4	27.1	34.7	29.9	1'885
séparé-e	5.5	6.8	5.9	2.6	3.1	2.7	3.7	6.6	4.3	1.2	2.1	1.3	1.6	4.2	3.6	4.1	5.2	4.5	285
divorcé-e	18.7	26.6	21.1	9.6	15.6	11.3	9.6	11.5	10.0	2.0	3.1	2.1	6.7	14.1	12.3	14.1	19.9	16.3	1'025
veuf/veuve	1.5	5.2	2.6	0.5	2.5	1.0	0.0	3.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	4.4	3.5	1.0	4.4	2.3	142
partenariat enregistré	0.3	0.2	0.3	0.5	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.4	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	22
N**	2'363	1'047	3'411	426	160	586	218	61	279	511	96	607	254	781	1'035	3'998	2'307	6'306	6'306
<i>données manquantes</i>	141	46	187	17	9	26	10	4	14	39	8	47	17	42	59	242	119	361	361
Nationalité*																			
CH	81.8	89.1	84.1	73.5	84.6	76.5	76.7	85.0	78.5	87.2	86.8	87.2	84.4	87.7	86.8	81.2	88.0	83.7	5'286
EU	10.0	7.7	9.3	16.4	11.5	15.1	14.2	10.0	13.3	6.9	3.3	6.3	9.2	7.3	7.8	10.4	7.7	9.5	597
autre	8.2	3.2	6.6	10.1	3.8	8.4	9.1	5.0	8.2	5.9	9.9	6.5	6.5	5.0	5.4	8.3	4.3	6.9	434
N**	2'359	1'046	3'405	427	156	583	219	60	279	524	91	615	262	779	1'041	4'023	2'294	6'317	6'317
<i>données manquantes</i>	145	47	193	16	13	29	9	5	14	26	13	39	9	44	53	217	132	350	350

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2007)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	8.9	11.2	9.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	9.3	9.1	9.1	6.1	8.3	6.9	428
périphérie des grands centres	10.5	11.9	10.9	1.8	1.4	1.7	2.6	1.9	2.4	2.6	2.1	2.5	12.0	12.5	12.4	7.8	10.3	8.7	539
villes de moyenne importance	18.0	19.5	18.5	28.4	28.4	28.4	29.6	29.6	29.6	26.6	21.6	25.8	23.2	22.6	22.7	21.7	22.1	21.9	1'349
petites villes	35.3	31.3	34.1	46.8	41.8	45.5	41.3	48.1	42.8	34.1	41.2	35.3	31.3	27.8	28.7	36.4	31.9	34.7	2'143
campagne	27.4	26.1	27.0	22.9	28.4	24.4	26.0	20.4	24.8	36.7	35.1	36.4	24.3	28.0	27.1	28.0	27.4	27.8	1'713
N**	2'332	1'032	3'365	380	141	521	196	54	250	493	97	590	259	783	1'042	3'896	2'275	6'172	6'172
données manquantes	172	61	233	63	28	91	32	11	43	57	7	64	12	40	52	344	151	495	495
Type de ménage (30 derniers jours)*																			
seul-e en ménage	38.6	32.2	36.6	44.6	26.0	39.5	33.0	29.8	32.3	14.8	15.2	14.9	8.1	13.6	12.4	33.4	24.6	30.3	1'507
avec un ou les parents	7.9	4.3	6.8	12.8	13.0	12.9	28.4	8.8	24.0	69.2	46.7	65.6	25.0	5.9	10.2	20.1	8.9	16.1	800
avec enfant(s), sans partenaire	1.5	12.9	5.0	0.5	7.5	2.5	1.0	7.0	2.4	0.2	2.2	0.5	3.8	14.2	11.9	1.3	11.9	5.1	252
avec partenaire, sans enfant	22.9	25.0	23.6	14.1	24.7	17.0	13.7	31.6	17.7	4.6	13.0	5.9	20.0	23.9	23.0	18.3	23.8	20.2	1'008
avec partenaire et enfant(s)	19.3	17.4	18.7	8.6	8.2	8.5	7.1	0.0	5.5	2.1	2.2	2.1	38.8	40.4	40.0	15.9	22.4	18.2	906
avec d'autres proches	1.5	1.1	1.4	3.1	3.4	3.2	2.5	7.0	3.5	2.7	1.1	2.4	1.3	0.5	0.7	1.9	1.3	1.7	85
avec des amis (colocation)	2.4	1.4	2.1	2.9	4.1	3.2	5.6	5.3	5.5	1.3	1.1	1.2	1.9	0.7	1.0	2.4	1.6	2.1	106
autre	5.9	5.6	5.8	13.3	13.0	13.2	8.6	10.5	9.1	5.2	18.5	7.3	1.3	0.7	0.8	6.8	5.5	6.3	314
N**	1'774	788	2'562	383	146	529	197	57	254	480	92	572	160	557	717	3'199	1'779	4'978	4'978
données manquantes	730	305	1'036	60	23	83	31	8	39	70	12	82	111	266	377	1'041	647	1'689	1'689
Situation de domicile (30 dernier jours)*																			
domicile fixe	93.7	94.2	93.9	85.2	83.2	84.7	85.1	87.0	85.5	94.6	81.1	92.5	95.5	98.5	97.8	92.5	94.1	93.1	4'769
sans domicile fixe	4.6	3.7	4.3	9.5	12.1	10.2	11.3	7.4	10.4	4.6	10.0	5.4	4.0	1.5	2.1	5.3	4.0	4.8	248
institution	1.7	2.1	1.8	5.3	4.7	5.1	3.6	5.6	4.0	0.8	8.9	2.1	0.6	0.0	0.1	2.2	1.9	2.1	107
N**	1'866	806	2'672	379	149	528	195	54	249	482	90	572	177	586	763	3'304	1'820	5'124	5'124
données manquantes	638	287	926	64	20	84	33	11	44	68	14	82	94	237	331	936	606	1'543	1'543

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2007)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	32.0	32.0	32.0	51.1	21.4	43.2	39.7	25.0	36.4	60.9	42.2	58.0	19.0	13.8	14.9	37.8	26.3	33.6	1'430
relations temporaires	4.2	5.5	4.6	4.4	15.4	7.3	11.7	25.0	14.7	12.0	12.5	12.0	5.6	1.4	2.3	5.7	6.0	5.8	246
parten. fixe, vivant séparé	13.8	14.4	14.0	15.0	21.4	16.7	23.5	17.3	22.1	15.7	25.0	17.2	10.6	13.6	12.9	14.6	14.7	14.6	622
parten. fixe, mén. commun	50.1	48.1	49.5	29.6	41.9	32.9	25.1	32.7	26.8	11.4	20.3	12.8	64.8	71.3	69.9	42.0	53.0	46.1	1'962
N**	1'527	709	2'236	321	117	438	179	52	231	343	64	407	142	509	651	2'686	1'574	4'260	4'260
données manquantes	977	384	1'362	122	52	174	49	13	62	207	40	247	129	314	443	1'554	852	2'407	2'407
Nombre d'enfants propres*																			
aucun	45.8	33.6	41.9	69.2	64.2	67.8	74.7	67.3	72.9	91.7	86.4	90.9	48.4	26.6	31.6	56.6	38.4	49.8	2'544
1 enfant	16.7	24.0	19.1	21.6	20.9	21.4	13.2	16.4	14.0	5.7	4.9	5.6	11.2	18.5	16.8	15.3	20.4	17.2	879
2 enfants	25.1	28.3	26.1	6.8	9.5	7.5	9.2	9.1	9.2	2.4	4.9	2.8	25.0	33.7	31.6	18.9	26.6	21.8	1'114
3 enfants ou plus	12.4	14.2	13.0	2.4	5.4	3.3	2.9	7.3	3.9	0.2	3.7	0.8	15.4	21.3	19.9	9.2	14.6	11.2	571
N**	1'851	867	2'718	370	148	518	174	55	229	423	81	504	188	621	809	3'200	1'908	5'108	5'108
données manquantes	653	226	880	73	21	94	54	10	64	127	23	150	83	202	285	1'040	518	1'559	1'559
Nombre d'enfants dans le ménage*																			
aucun	73.5	62.4	70.0	85.0	78.9	83.2	83.5	91.7	85.4	76.3	67.5	74.8	46.4	40.5	41.9	73.6	57.6	67.6	3'196
1 enfant	10.9	18.6	13.4	7.3	12.5	8.8	7.0	6.3	6.8	3.4	10.4	4.5	13.5	23.4	21.0	9.6	18.8	13.0	617
2 enfants	11.2	14.6	12.2	5.1	6.3	5.4	6.3	2.1	5.3	14.2	13.0	14.0	28.6	24.8	25.7	11.9	16.8	13.7	649
3 enfants ou plus	4.4	4.5	4.4	2.6	2.3	2.5	3.2	0.0	2.4	6.2	9.1	6.7	11.5	11.3	11.3	4.9	6.8	5.6	267
N**	1'719	797	2'516	313	128	441	158	48	206	388	77	465	192	593	785	2'956	1'773	4'729	4'729
données manquantes	785	296	1'082	130	41	171	70	17	87	162	27	189	79	230	309	1'284	653	1'938	1'938

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2007)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Plus haute formation achevée*																			
aucune form. achevée	4.4	4.7	4.5	5.2	5.1	5.2	3.3	8.3	4.4	14.7	19.4	15.5	17.1	3.3	7.1	6.8	5.8	6.5	309
scolarité obligatoire	12.8	17.7	14.2	26.5	41.0	30.5	23.8	43.3	28.1	55.2	48.4	54.1	18.8	14.6	15.8	22.3	22.1	22.2	1'062
scolarité complémentaire	4.4	6.8	5.1	6.4	8.3	7.0	5.7	6.7	5.9	5.3	8.6	5.8	1.8	4.2	3.5	4.7	6.2	5.2	250
apprentissage/école prof.	61.6	53.2	59.1	55.0	39.1	50.5	57.6	35.0	52.6	20.7	16.1	19.9	40.0	55.1	51.0	52.4	48.8	51.2	2'446
maturité/diplôme	3.6	5.8	4.2	2.2	1.9	2.1	1.9	3.3	2.2	2.5	2.2	2.4	3.5	4.2	4.0	3.3	5.0	3.9	186
école normale, pédagog.	0.7	1.7	1.0	0.2	0.6	0.4	0.5	1.7	0.7	0.2	2.2	0.5	0.6	4.0	3.1	0.5	2.1	1.1	51
form. profession. supérieure	6.9	5.2	6.4	2.5	3.2	2.7	2.9	1.7	2.6	1.2	2.2	1.4	5.9	6.6	6.4	5.3	5.2	5.2	250
école profession. supérieure	1.1	1.0	1.1	1.2	0.0	0.9	1.9	0.0	1.5	0.2	0.0	0.2	1.8	0.9	1.1	1.0	0.7	0.9	44
haute école spécialisée	1.4	1.2	1.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	2.4	2.7	2.6	1.0	1.3	1.1	53
université, haute école	3.3	2.8	3.1	0.7	0.6	0.7	1.4	0.0	1.1	0.0	1.1	0.2	8.2	4.4	5.5	2.6	2.7	2.6	125
N**	1'733	725	2'458	404	156	560	210	60	270	489	93	582	170	452	622	3'173	1'603	4'776	4'776
données manquantes	771	368	1'140	39	13	52	18	5	23	61	11	72	101	371	472	1'067	823	1'891	1'891
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	32.1	48.8	37.4	58.3	64.4	59.9	28.2	75.8	39.2	20.1	25.9	20.9	14.7	28.0	24.2	33.1	44.0	36.9	993
apprenti-e, stagiaire	2.7	1.3	2.3	1.9	7.8	3.4	7.3	0.0	5.6	25.1	3.7	22.3	7.8	2.4	3.9	5.4	2.5	4.4	119
manceuvre, aide	3.6	3.4	3.5	6.6	0.0	4.9	8.2	3.0	7.0	3.9	7.4	4.4	5.9	3.9	4.5	4.5	3.2	4.1	110
ouvrier/ère formé-e sur le tas	5.4	6.3	5.7	7.7	5.6	7.2	10.0	3.0	8.4	3.9	7.4	4.4	2.9	6.7	5.6	5.9	6.3	6.1	163
ouvrier/ère formé-e (CFC)	14.1	4.9	11.2	14.3	6.7	12.3	19.1	6.1	16.1	8.9	3.7	8.3	7.8	8.3	8.1	13.3	5.9	10.7	289
contremaître-sse	2.7	0.2	1.9	0.4	0.0	0.3	5.5	0.0	4.2	0.6	0.0	0.5	1.0	0.0	0.3	2.1	0.3	1.5	40
employé-e non qualifié-e	12.0	19.2	14.3	4.6	8.9	5.7	14.5	6.1	12.6	4.5	11.1	5.3	12.7	20.1	18.0	10.7	17.9	13.2	355
empl. qualifié-e, cadre moyen	10.3	6.8	9.2	1.9	4.4	2.6	4.5	6.1	4.9	1.7	3.7	1.9	8.8	18.1	15.4	7.7	9.7	8.4	226
employé-e, cadre supérieur	3.6	1.5	2.9	1.2	1.1	1.1	0.9	0.0	0.7	0.6	0.0	0.5	4.9	1.2	2.2	2.9	1.2	2.3	62
indépendant-e	9.5	5.7	8.3	0.4	1.1	0.6	0.9	0.0	0.7	1.7	3.7	1.9	14.7	7.9	9.8	7.2	5.5	6.6	178
écolier/ère, étudiant-e	2.3	1.1	1.9	1.2	0.0	0.9	0.9	0.0	0.7	28.5	33.3	29.1	17.6	2.4	6.7	5.8	2.7	4.8	128
autre statut	1.7	0.8	1.4	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1.0	1.2	1.1	1.4	0.8	1.2	31
N**	1'024	473	1'497	259	90	349	110	33	143	179	27	206	102	254	356	1'763	931	2'694	2'694
données manquantes	1'480	620	2'101	184	79	263	118	32	150	371	77	448	169	569	738	2'477	1'495	3'973	3'973

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2007)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Source de revenu principale (au cours des 30 derniers jours)*																			
salaire	55.5	38.4	50.3	28.5	28.7	28.6	64.1	31.4	57.2	31.4	20.4	29.6	56.9	55.4	55.8	50.1	42.5	47.4	2'592
économies, épargne	1.4	2.3	1.7	1.3	0.0	1.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.7	1.2	1.3	1.2	66
rente (AVS, AI ou autre)	15.8	19.3	16.8	13.1	16.1	13.9	4.2	17.6	7.0	4.9	8.6	5.5	8.3	11.6	10.7	12.8	16.0	13.9	762
aide sociale	13.1	11.9	12.7	36.6	34.3	36.0	13.5	33.3	17.7	7.8	14.0	8.8	4.6	3.4	3.7	14.2	11.4	13.2	723
assurance-chômage	7.5	6.1	7.1	9.4	3.5	7.8	8.3	3.9	7.4	3.0	3.2	3.0	0.9	2.0	1.7	6.5	4.1	5.6	307
soutien du/de la partenaire	1.5	16.8	6.1	1.8	3.5	2.3	0.5	5.9	1.6	0.4	1.1	0.5	1.9	21.2	16.1	1.3	15.4	6.3	346
soutien parents/proches/amis	3.5	3.2	3.4	6.3	9.1	7.0	7.8	7.8	7.8	51.9	47.3	51.1	25.9	5.4	10.7	12.2	7.6	10.6	578
deal, combines	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.8	0.5	0.0	0.4	0.0	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	10
autres revenus illégaux	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0	0.2	0.5	0.0	0.4	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	6
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2
autre	1.6	1.8	1.7	1.8	2.8	2.1	0.0	0.0	0.0	0.4	4.3	1.1	0.9	0.3	0.5	1.4	1.4	1.4	77
N**	2'053	881	2'934	382	143	525	192	51	243	474	93	567	216	614	830	3'532	1'937	5'469	5'469
<i>données manquantes</i>	451	212	664	61	26	87	36	14	50	76	11	87	55	209	264	708	489	1'198	1'198
Taux d'activité principal (au cours des 30 derniers jours)*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	50.6	24.3	42.7	24.8	22.2	24.1	52.8	23.0	46.2	22.3	13.8	20.9	52.6	35.0	39.6	44.1	27.5	38.4	2'052
activité à temps partiel	5.0	19.9	9.5	3.4	7.8	4.6	5.6	9.8	6.5	2.6	7.4	3.4	3.2	30.6	23.4	4.4	20.6	10.0	532
plusieurs activités occas.	1.2	1.1	1.1	2.2	3.9	2.7	1.4	0.0	1.1	0.6	2.1	0.8	0.5	1.3	1.1	1.2	1.4	1.3	67
en formation	3.4	2.1	3.0	2.4	6.5	3.5	8.3	4.9	7.6	52.0	44.7	50.8	24.7	4.9	10.2	11.9	6.8	10.2	543
sans activité prof.	19.1	32.3	23.0	26.0	29.4	26.9	8.8	32.8	14.1	6.6	10.6	7.3	8.9	22.9	19.2	16.9	27.6	20.6	1'099
sans trav., en quête d'emploi	13.3	13.0	13.3	21.4	15.0	19.6	13.0	21.3	14.8	7.2	8.5	7.4	4.2	2.8	3.2	12.5	9.7	11.5	616
sans trav., futur empl. garanti	0.4	0.5	0.4	0.2	0.0	0.2	1.4	0.0	1.1	0.6	2.1	0.8	0.5	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	23
autre	7.0	6.8	6.9	19.7	15.0	18.4	8.8	8.2	8.7	8.0	10.6	8.4	5.3	2.3	3.1	8.6	6.1	7.7	414
N**	1'978	843	2'821	412	153	565	216	61	277	498	94	592	190	529	719	3'514	1'832	5'346	5'346
<i>données manquantes</i>	526	250	777	31	16	47	12	4	16	52	10	62	81	294	375	726	594	1'321	1'321

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2007)

	Patient-e-s: problème principale									Proches			Toutes prises en charge						
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Revenu mensuel net (6 derniers mois)*																			
aucun revenu	28.8	33.6	30.2	25.5	30.4	26.7	19.3	38.5	25.3	41.6	62.5	44.5	27.3	14.1	17.2	28.6	32.0	29.6	438
moins de 1000 fr.	4.1	6.1	4.7	16.4	8.9	14.5	7.0	3.8	6.0	32.2	25.0	31.2	9.1	12.7	11.8	10.7	8.0	9.9	146
de 1001 à 2000 fr.	6.6	11.8	8.0	18.2	25.0	19.9	14.0	23.1	16.9	6.7	4.2	6.4	4.5	9.9	8.6	8.6	13.5	10.1	149
de 2001 à 3000 fr.	11.6	25.3	15.5	15.2	17.9	15.8	14.0	11.5	13.3	3.4	4.2	3.5	4.5	16.9	14.0	10.7	21.0	13.7	203
de 3001 à 4000 fr.	14.8	10.9	13.7	14.5	14.3	14.5	17.5	23.1	19.3	5.4	4.2	5.2	9.1	15.5	14.0	13.4	13.0	13.3	197
de 4001 à 5000 fr.	15.9	8.3	13.7	6.7	3.6	5.9	21.1	0.0	14.5	6.0	0.0	5.2	4.5	12.7	10.8	13.2	7.3	11.5	170
de 5001 à 6000 fr.	9.8	3.1	7.9	3.0	0.0	2.3	5.3	0.0	3.6	2.0	0.0	1.7	13.6	8.5	9.7	8.1	3.2	6.6	98
de 6001 à 8000 fr.	5.7	0.9	4.3	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.2	2.0	0.0	1.7	9.1	8.5	8.6	4.5	1.8	3.7	55
de 8001 à 10 000 fr.	2.1	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	18.2	1.4	5.4	1.6	0.2	1.2	18
de 10 001 à 15 000 fr.	0.3	0.0	0.2	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	4
plus de 15 000 fr.	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	2
N**	580	229	809	165	56	221	57	26	83	149	24	173	22	71	93	1'042	438	1'480	1'480
<i>données manquantes</i>	1'924	864	2'789	278	113	391	171	39	210	401	80	481	249	752	1'001	3'198	1'988	5'187	5'187
Dettes*																			
aucune dette	63.2	77.6	67.5	28.7	32.3	29.6	44.2	46.4	44.7	79.8	96.0	82.2	85.1	87.7	87.1	61.8	76.1	66.6	1'499
jusqu'à 5000 fr.	4.6	7.0	5.3	19.9	11.3	17.7	11.5	14.3	12.1	7.7	4.0	7.1	1.5	2.6	2.4	7.5	6.0	7.0	158
de 5001 à 10 000 fr.	9.4	6.4	8.5	8.8	21.0	11.9	7.1	17.9	9.2	4.2	0.0	3.6	3.0	2.6	2.7	7.7	6.5	7.3	164
de 10 001 à 25 000 fr.	9.0	5.1	7.9	18.2	14.5	17.3	14.2	14.3	14.2	3.1	0.0	2.7	1.5	4.4	3.7	9.1	5.7	8.0	180
de 25 001 à 50 000 fr.	5.1	1.9	4.2	11.0	16.1	12.3	16.8	7.1	14.9	3.5	0.0	3.0	4.5	1.8	2.4	6.1	3.2	5.2	116
de 50 001 à 100 000 fr.	4.0	0.3	2.9	7.7	3.2	6.6	2.7	0.0	2.1	1.4	0.0	1.2	3.0	0.9	1.4	3.9	1.2	3.0	68
plus de 100 000 fr.	4.7	1.6	3.8	5.5	1.6	4.5	3.5	0.0	2.8	0.3	0.0	0.3	1.5	0.0	0.3	3.9	1.2	3.0	67
N**	744	313	1'057	181	62	243	113	28	141	287	50	337	67	228	295	1'503	749	2'252	2'252
<i>données manquantes</i>	1'760	780	2'541	262	107	369	115	37	152	263	54	317	204	595	799	2'737	1'677	4'415	4'415

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2007)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Emprisonnement ou détention préventive*																
aucun-e	89.3	98.8	92.3	41.5	78.2	50.9	68.5	88.0	73.5	88.5	96.6	89.7	82.5	96.1	86.5	1'661
emprisonnement	7.1	0.5	5.0	20.8	12.7	18.7	12.3	8.0	11.2	7.1	3.4	6.5	9.0	2.3	7.0	135
détention préventive	2.1	0.7	1.7	11.3	7.3	10.3	9.6	4.0	8.2	3.2	0.0	2.7	3.7	1.4	3.0	58
emprisonnement et détention préventive	1.4	0.0	1.0	26.4	1.8	20.1	9.6	0.0	7.1	1.3	0.0	1.1	4.8	0.2	3.5	67
N**	900	410	1'310	159	55	214	73	25	98	156	29	185	1'361	560	1'921	1'921
<i>données manquantes</i>	1'604	683	2'288	284	114	398	155	40	195	394	75	469	2'608	1'043	3'652	3'652
Durée totale de détention***																
jusqu'à 1 mois	30.6	33.3	30.7	22.6	22.2	22.5	22.2	50.0	25.0	40.0	0.0	36.4	26.0	31.3	26.5	49
> 1 à 2 mois	5.6	33.3	6.7	8.1	0.0	7.0	11.1	0.0	10.0	10.0	0.0	9.1	7.7	6.3	7.6	14
> 2 à 6 mois	31.9	33.3	32.0	24.2	55.6	28.2	33.3	50.0	35.0	30.0	0.0	27.3	29.0	43.8	30.3	55
> 6 à 12 mois	12.5	0.0	12.0	6.5	11.1	7.0	16.7	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	9.5	6.3	9.2	17
plus de 1 an	19.4	0.0	18.7	38.7	11.1	35.2	16.7	0.0	15.0	20.0	100.0	27.3	27.8	12.5	26.5	49
N**	71	3	74	62	9	71	18	2	20	10	1	11	168	16	184	184
<i>données manquantes</i>	25	2	27	31	3	34	5	1	6	8	0	8	70	6	76	76

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de détention. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T9 Instance d'envoi principale et secondaire, selon le problème principal et chez les proches (2007)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Instance d'envoi principale*																			
initiative personnelle	31.5	36.2	33.0	45.1	50.6	46.6	39.5	31.0	37.7	21.2	28.1	22.3	55.1	73.4	68.8	34.0	50.6	40.1	2'316
conjoint-e/partenaire	5.7	3.7	5.1	2.7	3.9	3.0	5.6	3.4	5.1	2.1	0.0	1.8	3.6	2.3	2.7	4.7	2.9	4.0	232
famille	3.6	5.0	4.0	5.4	4.5	5.2	11.2	15.5	12.1	9.6	6.7	9.1	15.8	4.8	7.6	6.1	5.2	5.8	334
ami-e-s, collègues, connaiss.	1.3	2.6	1.7	2.7	0.6	2.1	2.8	10.3	4.4	0.6	5.6	1.4	1.6	4.1	3.5	1.5	3.7	2.3	134
instit. ambulatoire spécialisée	1.9	1.7	1.8	5.7	3.2	5.0	1.9	5.2	2.6	0.8	1.1	0.9	1.2	1.1	1.1	2.1	1.6	1.9	110
instit. résidentielle spécialisée	5.6	6.4	5.9	4.7	5.8	5.0	1.9	3.4	2.2	1.7	1.1	1.6	0.8	1.1	1.0	4.3	3.9	4.1	239
cabinet médical	7.8	11.4	8.9	11.1	9.1	10.5	8.8	10.3	9.2	4.0	3.4	3.9	4.5	3.4	3.7	7.4	8.0	7.6	441
hôpital, clinique	10.3	14.9	11.8	3.4	1.9	3.0	2.8	6.9	3.7	1.7	3.4	1.9	1.2	1.9	1.7	7.1	8.0	7.4	427
service sociaux	5.9	6.4	6.1	8.1	9.7	8.6	5.6	5.2	5.5	3.7	1.1	3.3	4.5	2.5	3.0	5.7	5.1	5.5	318
mes. pénale/administrative	17.6	6.5	14.1	8.1	5.2	7.3	13.5	5.2	11.7	44.5	29.2	42.1	5.3	1.0	2.0	18.1	5.0	13.3	767
employeur/se	5.1	2.6	4.3	0.5	1.9	0.9	1.9	0.0	1.5	3.3	3.4	3.3	2.4	0.3	0.8	3.9	1.6	3.0	176
enseignant-e	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.4	2.6	2.0	1.0	1.2	0.7	0.7	0.7	40
autre	3.4	2.5	3.1	2.5	3.2	2.7	4.7	3.4	4.4	4.4	13.5	5.8	2.0	3.2	2.9	4.3	3.7	4.1	237
N**	2'070	937	3'008	406	154	560	215	58	273	481	89	570	247	730	977	3'643	2'127	5'771	5'771
<i>données manquantes</i>	434	156	590	37	15	52	13	7	20	69	15	84	24	93	117	597	299	896	896
Instance d'envoi secondaire***																			
initiative personnelle	27.8	26.0	27.3	23.3	25.6	24.0	34.7	18.2	30.5	22.2	14.7	21.1	10.4	9.6	9.8	26.1	20.3	24.1	684
conjoint-e/partenaire	8.1	4.8	7.2	5.8	8.9	6.7	9.5	6.1	8.6	6.7	5.9	6.6	6.5	5.4	5.6	7.6	5.6	6.9	196
famille	4.3	6.9	5.0	4.0	11.1	6.1	10.5	3.0	8.6	8.2	5.9	7.9	15.6	8.6	10.1	5.4	7.2	6.0	170
ami-e-s, collègues, connaiss.	1.5	1.9	1.6	1.3	3.3	1.9	1.1	6.1	2.3	1.5	0.0	1.3	1.3	5.7	4.8	1.4	3.3	2.1	59
instit. ambulatoire spécialisée	0.9	0.6	0.9	3.1	6.7	4.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	1.3	1.8	1.7	1.1	1.4	1.2	34
instit. résidentielle spécialisée	1.9	2.7	2.1	3.6	0.0	2.6	2.1	6.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.6	1.7	48
cabinet médical	5.7	8.0	6.3	10.8	13.3	11.5	11.6	9.1	10.9	1.5	2.9	1.8	3.9	3.2	3.4	5.9	6.7	6.2	175
hôpital, clinique	3.7	4.6	4.0	4.5	2.2	3.8	2.1	6.1	3.1	1.5	0.0	1.3	2.6	1.4	1.7	3.3	3.3	3.3	93
service sociaux	1.8	1.3	1.6	5.8	3.3	5.1	1.1	18.2	5.5	2.1	0.0	1.8	7.8	0.7	2.2	2.4	1.9	2.2	63
mes. pénale/administrative	3.3	1.5	2.8	3.1	2.2	2.9	6.3	3.0	5.5	2.1	2.9	2.2	1.3	0.0	0.3	3.1	1.1	2.4	69
employeur/se	3.3	1.5	2.7	2.2	1.1	1.9	1.1	0.0	0.8	0.5	0.0	0.4	0.0	0.7	0.6	2.6	1.0	2.1	59
enseignant-e	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.3	0.0	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	8
autre	2.5	2.3	2.4	2.7	4.4	3.2	0.0	9.1	2.3	1.5	2.9	1.8	3.9	3.2	3.4	2.5	3.4	2.8	79
aucune	44.0	46.1	44.6	43.0	26.7	38.3	42.1	36.4	40.6	55.7	67.6	57.5	50.6	63.2	60.5	45.8	50.0	47.2	1'340
N**	1'168	477	1'645	223	90	313	95	33	128	194	34	228	77	280	357	1'864	972	2'836	2'836
<i>données manquantes</i>	1'336	616	1'953	220	79	299	133	32	165	356	70	426	194	543	737	2'376	1'454	3'831	3'831

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T10 Type d'aide attendue à l'admission et statut légal de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2007)

Type d'aide attendue*	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
problèmes addictifs	78.6	84.1	80.2	85.3	91.7	87.0	80.0	86.8	81.8	72.9	61.1	71.1	60.2	52.8	54.5	76.5	73.1	75.3	2'455
problèmes somatiques	4.3	4.6	4.4	5.4	8.3	6.2	4.8	7.9	5.6	1.5	2.8	1.7	0.0	0.6	0.4	3.8	3.7	3.8	123
problèmes psychiques	16.9	28.7	20.4	21.2	26.0	22.5	15.2	34.2	20.3	12.3	16.7	13.0	11.1	18.8	17.0	16.1	24.4	19.1	622
problèmes relationnels	14.1	21.0	16.2	18.9	18.8	18.9	11.4	39.5	18.9	6.9	5.6	6.7	32.4	44.4	41.6	14.6	27.5	19.1	624
problèmes familiaux	8.5	16.0	10.8	12.7	17.7	14.1	10.5	34.2	16.8	13.3	13.9	13.4	38.0	44.9	43.3	10.9	25.9	16.3	530
problèmes financiers	6.9	5.0	6.3	17.4	20.8	18.3	10.5	23.7	14.0	4.9	2.8	4.6	7.4	4.8	5.4	8.6	7.1	8.1	263
problèmes professionnels, de formati	12.2	9.8	11.5	16.6	12.5	15.5	11.4	36.8	18.2	13.3	5.6	12.1	4.6	3.4	3.7	12.0	8.4	10.7	350
problèmes de logement	3.0	4.1	3.4	10.4	11.5	10.7	6.7	13.2	8.4	1.5	5.6	2.1	2.8	3.9	3.7	4.0	4.9	4.3	141
problèmes de violence	1.4	1.4	1.4	1.2	3.1	1.7	0.0	5.3	1.4	0.5	2.8	0.8	4.6	3.9	4.1	1.4	2.4	1.7	57
problèmes juridiques	9.9	3.6	8.0	8.9	10.4	9.3	20.0	5.3	16.1	16.3	8.3	15.1	5.6	3.1	3.7	10.4	4.1	8.1	265
autre(s)	2.0	1.1	1.7	2.7	5.2	3.4	2.9	0.0	2.1	1.0	2.8	1.3	0.9	2.0	1.7	3.3	2.8	3.1	102
aucune attente	11.9	7.5	10.6	4.6	2.1	3.9	8.6	2.6	7.0	14.8	33.3	17.6	3.7	0.8	1.5	11.0	5.7	9.1	297
N**	1'315	561	1'876	259	96	355	105	38	143	203	36	239	108	356	464	2'103	1'158	3'261	3'261
données manquantes	1'189	532	1'722	184	73	257	123	27	150	347	68	415	163	467	630	2'137	1'268	3'406	3'406
Statut légal du traitement/de la prise en charge*																			
suspension de la procédure, renoncement à infliger une peine, réprimande (art 19a ch. 2 Lstup)	0.7	0.4	0.6	1.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	6.3	8.8	6.7	0.0	0.0	0.0	1.3	0.5	1.0	30
abandon poursuite pénale si soumis à des mesures de protection contrôlées par un médecin (art 19a ch. 3 Lstup)	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
mesures concernant les délinquants anormaux (art 43 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
traitement des alcooliques et des toxicomanes (art 44 CPS)	2.1	1.2	1.8	0.9	2.3	1.3	4.2	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.8	1.3	39
irresponsabilité (art 10 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
responsabilité restreinte (art 11 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
exécution de mesures pr toxicomanes dans une maison d'éducation au travail (art 2a ord. 3 rel. au CPS RS 311.03)	0.3	0.0	0.2	0.4	1.2	0.6	2.1	0.0	1.5	7.9	11.8	8.4	0.0	0.0	0.0	1.2	0.5	1.0	28
autre	10.4	4.3	8.6	4.8	7.0	5.4	20.8	2.9	16.2	23.6	14.7	22.2	3.5	0.7	1.3	11.2	3.6	8.6	250
aucune mesure (traitement volontaire)	86.4	94.1	88.7	92.2	89.5	91.5	72.9	97.1	79.2	62.3	64.7	62.7	96.5	99.3	98.7	84.6	94.7	88.1	2'573
N**	1'207	508	1'715	231	86	317	96	34	130	191	34	225	85	292	377	1'910	1'011	2'921	2'921
données manquantes	1'297	585	1'883	212	83	295	132	31	163	359	70	429	186	531	717	2'330	1'415	3'746	3'746

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T11 Traitements/prises en charge avant l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2007)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Prises en charge antérieures*																			
non	46.8	40.2	44.8	15.5	18.7	16.4	57.6	37.0	53.2	77.1	73.4	76.5	71.9	71.9	71.9	50.9	51.7	51.2	2'732
oui	53.2	59.8	55.2	84.5	81.3	83.6	42.4	63.0	46.8	22.9	26.6	23.5	28.1	28.1	28.1	49.1	48.3	48.8	2'605
N**	1'983	880	2'863	374	139	513	198	54	252	484	94	578	185	594	779	3'433	1'904	5'337	5'337
<i>données manquantes</i>	521	213	735	69	30	99	30	11	41	66	10	76	86	229	315	807	522	1'330	1'330
Type de prise en charge***																			
traitement avec prescript. d'héroïne	0.9	1.0	0.9	5.1	6.1	5.4	0.0	3.8	1.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	42
substitution (méthadone, subutex)	3.5	4.1	3.7	63.9	66.7	64.6	20.8	46.2	27.6	5.0	4.3	4.8	0.0	4.2	3.0	15.6	13.1	14.8	348
autre tt médicam. des dépendances	10.6	8.1	9.8	9.9	6.1	8.8	8.3	3.8	7.1	1.0	8.7	2.4	2.1	0.8	1.2	9.4	6.6	8.4	199
prise en charge ambulatoire	66.4	66.6	66.4	59.5	62.6	60.3	61.1	76.9	65.3	78.2	65.2	75.8	78.7	87.4	84.9	66.2	70.1	67.6	1'594
traitement résidentiel	48.4	55.4	50.7	48.2	35.4	44.8	40.3	38.5	39.8	22.8	39.1	25.8	19.1	11.8	13.9	44.9	44.6	44.8	1'057
sevrage	41.4	46.8	43.2	55.1	44.4	52.3	41.7	38.5	40.8	12.9	17.4	13.7	12.8	9.2	10.2	40.6	37.9	39.7	936
groupe d'entraide ou d'auto-support	5.6	6.5	5.9	2.6	0.0	1.9	1.4	7.7	3.1	2.0	4.3	2.4	2.1	8.4	6.6	4.6	5.7	5.0	117
autre(s)	2.3	2.6	2.4	1.8	5.1	2.7	2.8	3.8	3.1	3.0	13.0	4.8	8.5	3.4	4.8	2.5	3.3	2.8	66
N**	996	491	1'487	274	99	373	72	26	98	101	23	124	47	119	166	1'552	807	2'359	2'359
<i>données manquantes</i>	58	35	93	42	14	56	12	8	20	10	2	12	5	48	53	133	113	246	246

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de prise en charge antérieure. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T12 Substitution et autre traitement/prise en charge à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2007)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution ou prescription d'héroïne*																
non	98.3	97.7	98.1	56.7	45.6	53.6	92.4	78.3	89.4	99.3	100.0	99.4	93.0	91.3	92.5	3'649
oui	1.7	2.3	1.9	43.3	54.4	46.4	7.6	21.7	10.6	0.7	0.0	0.6	7.0	8.7	7.5	294
N**	1'694	738	2'432	328	125	453	171	46	217	444	84	528	2'822	1'121	3'943	3'943
données manquantes	810	355	1'166	115	44	159	57	19	76	106	20	126	1'147	482	1'630	1'630
Type de substitution***																
héroïne	3.8	6.3	4.8	4.3	3.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.2	3.5	10
méthadone	57.7	62.5	59.5	87.9	92.4	89.4	92.3	100.0	95.7	66.7	0.0	66.7	83.9	88.3	85.4	245
autres opiacés	11.5	6.3	9.5	6.4	4.5	5.8	7.7	0.0	4.3	33.3	0.0	33.3	7.8	4.3	6.6	19
autres substances	26.9	25.0	26.2	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.3	4.5	13
N**	26	16	42	141	66	207	13	10	23	3	0	3	193	94	287	287
données manquantes	3	1	4	1	2	3	0	0	0	0	0	0	4	3	7	7
Autre prise en charge parallèle*																
non	87.2	80.0	85.1	75.5	78.6	76.3	88.0	79.1	85.6	94.1	100.0	95.0	86.9	81.7	85.5	2'321
oui	12.8	20.0	14.9	24.5	21.4	23.7	12.0	20.9	14.4	5.9	0.0	5.0	13.1	18.3	14.5	395
N**	1'213	520	1'733	273	103	376	117	43	160	237	41	278	1'950	766	2'716	2'716
données manquantes	1'291	573	1'865	170	66	236	111	22	133	313	63	376	2'019	837	2'857	2'857
Type de la prise en charge parallèle****																
prise en charge ambulatoire	55.5	70.9	61.6	71.6	81.8	74.2	53.8	77.8	63.6	78.6	0.0	78.6	61.4	71.9	65.1	256
traitement résidentiel	12.3	9.7	11.2	13.4	9.1	12.4	38.5	22.2	31.8	7.1	0.0	7.1	13.8	10.8	12.7	50
groupe d'entraide ou d'auto-support	3.2	2.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.2	2.0	8
autre(s)	30.3	21.4	26.7	16.4	9.1	14.6	7.7	0.0	4.5	14.3	0.0	14.3	24.0	18.7	22.1	87
N**	155	103	258	67	22	89	13	9	22	14	0	14	254	139	393	393
données manquantes	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de substitution. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pris-e-s en charge parallèlement. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T13a Admission suite à une cure de sevrage, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2007)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Admission suite à une cure de sevrage*																
non	78.5	71.1	76.3	86.3	88.2	86.8	92.3	88.2	91.2	93.5	97.2	94.1	82.4	76.5	80.7	1'951
sevrage dans la même institution	1.4	2.1	1.6	0.0	1.2	0.3	0.0	2.9	0.8	0.5	0.0	0.5	1.0	1.9	1.2	30
sevrage dans une autre institution	20.1	26.8	22.1	13.7	10.6	12.9	7.7	8.8	8.0	5.9	2.8	5.4	16.7	21.6	18.1	437
N**	1'120	485	1'605	226	85	311	91	34	125	186	36	222	1'723	695	2'418	2'418
données manquantes	1'384	608	1'993	217	84	301	137	31	168	364	68	432	2'246	908	3'155	3'155

T13b Fréquence des sevrages sans aide professionnelle avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2007)

Fréq. sevrages sans accompagnement*	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%					
jamais	62.7	53.8	59.9	11.2	19.0	13.2	46.7	28.6	42.0	77.3	73.3	76.7	56.0	51.2	54.6	676
une fois	8.0	7.6	7.9	7.2	11.9	8.4	5.0	14.3	7.4	10.2	13.3	10.7	7.8	9.1	8.2	101
deux ou trois fois	9.1	10.0	9.4	23.2	14.3	21.0	13.3	9.5	12.3	5.7	6.7	5.8	11.3	9.7	10.8	134
plus de trois fois	20.3	28.5	22.8	58.4	54.8	57.5	35.0	47.6	38.3	6.8	6.7	6.8	25.0	29.9	26.4	327
N**	552	249	801	125	42	167	60	21	81	88	15	103	877	361	1'238	1'238
données manquantes	1'952	844	2'797	318	127	445	168	44	212	462	89	551	3'092	1'242	4'335	4'335

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T14 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2007)

Tous patients et patientes									
Problème principal*	Hommes	Femmes	Total	N		Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%			%	%	%	
alcool	63.1	68.2	64.6	3'598	alcool	63.1	68.2	64.6	3'598
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.6	0.4	0.5	29	cocktails	0.6	0.4	0.5	29
héroïne	9.7	9.2	9.6	533	opiacés	10.6	10.2	10.5	583
méthadone	0.7	0.6	0.6	36					
autres opiacés	0.2	0.4	0.3	14					
cocaïne	5.7	4.1	5.2	292	cocaïne et dérivés	5.7	4.1	5.3	293
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	1					
amphétamines	0.2	0.2	0.2	10	stimulants	0.4	0.2	0.4	20
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.3	0.0	0.2	10					
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0					
barbituriques	0.2	0.1	0.1	8	médicaments	0.9	1.1	1.0	54
benzodiazépines	0.7	0.9	0.8	42					
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.1	0.1	4					
LSD	0.0	0.1	0.0	2	hallucinogènes	0.0	0.1	0.0	2
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0					
cannabis	13.9	6.5	11.7	654	cannabis	13.9	6.5	11.7	654
tabac	1.4	3.9	2.1	117	tabac	1.4	3.9	2.1	117
substances volatiles	0.1	0.0	0.1	3	autres substances	0.4	0.3	0.4	21
autre substance	0.3	0.3	0.3	18					
jeu pathologique	2.2	1.4	2.0	109	troubles assimilables à une addiction	3.0	5.1	3.6	202
troubles alimentaires	0.1	2.6	0.8	46					
autres troubles assimilables à une addiction	0.7	1.1	0.8	47					
N**	3'969	1'603	5'573	5'573		3'969	1'603	5'573	5'573
<i>données manquantes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2007), hommes

Patientes: principale substance posant problème										
Hommes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	27.6	40.0	24.8	29.4	30.8	30.8	0.0	22.0	0.0	16.7
1 jour par semaine ou moins	9.0	13.3	9.2	26.1	7.7	0.0	0.0	18.5	6.3	0.0
2 à 3 jours par semaine	14.1	6.7	12.1	21.1	23.1	7.7	0.0	17.5	2.1	33.3
4 à 6 jours par semaine	11.4	6.7	7.3	9.4	7.7	0.0	0.0	9.3	8.3	0.0
une fois par jour	7.2	6.7	18.1	2.8	0.0	15.4	0.0	10.1	2.1	16.7
plusieurs fois par jour	30.6	26.7	28.6	11.1	30.8	46.2	0.0	22.6	81.3	33.3
N**	1'483	15	315	180	13	26	0	464	48	6
<i>données manquantes</i>	1'021	8	105	48	3	10	1	86	6	10
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	7.8	13.3	15.8	11.8	11.1	4.5	0.0	6.7	0.0	9.1
1 jour par semaine ou moins	8.2	33.3	15.1	24.8	33.3	4.5	0.0	22.0	4.3	18.2
2 à 3 jours par semaine	16.7	0.0	13.9	26.1	22.2	0.0	0.0	19.3	4.3	9.1
4 à 6 jours par semaine	14.5	20.0	9.3	14.3	11.1	4.5	0.0	8.9	4.3	0.0
une fois par jour	9.2	6.7	18.5	9.9	0.0	22.7	0.0	7.4	2.1	9.1
plusieurs fois par jour	43.6	26.7	27.4	13.0	22.2	63.6	0.0	35.6	85.1	54.5
N**	1'430	15	259	161	9	22	0	404	47	11
<i>données manquantes</i>	1'074	8	161	67	7	14	1	146	7	5

T15.1b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2007), hommes

Patients: problème principal			
Hommes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	62.7	0.0	15.4
1 jour par semaine ou moins	17.9	0.0	7.7
2 à 3 jours par semaine	9.0	0.0	15.4
4 à 6 jours par semaine	1.5	0.0	15.4
1 fois par jour	1.5	50.0	15.4
plusieurs fois par jour	7.5	50.0	30.8
N**	67	4	13
<i>données manquantes</i>	20	1	16
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	43.4	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	39.6	0.0	7.7
2 à 3 jours par semaine	11.3	0.0	15.4
4 à 6 jours par semaine	1.9	0.0	7.7
1 fois par jour	1.9	33.3	23.1
plusieurs fois par jour	1.9	66.7	46.2
N**	53	3	13
<i>données manquantes</i>	34	2	16

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.2a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2007), femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	24.7	16.7	21.8	30.2	50.0	30.8	100.0	14.6	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	9.4	0.0	15.3	22.6	25.0	7.7	0.0	18.3	2.1	0.0
2 à 3 jours par semaine	14.2	16.7	16.9	26.4	25.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0
4 à 6 jours par semaine	12.7	0.0	8.1	11.3	0.0	15.4	0.0	14.6	2.1	0.0
une fois par jour	4.7	33.3	11.3	5.7	0.0	7.7	0.0	15.9	4.2	0.0
plusieurs fois par jour	34.4	33.3	26.6	3.8	0.0	38.5	0.0	24.4	91.7	100.0
N**	663	6	124	53	4	13	1	82	48	1
<i>données manquantes</i>	430	0	39	12	0	5	0	22	15	4
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	8.5	16.7	15.4	4.7	33.3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	6.9	16.7	17.3	32.6	0.0	0.0	0.0	27.0	2.1	33.3
2 à 3 jours par semaine	18.2	0.0	15.4	34.9	33.3	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0
4 à 6 jours par semaine	12.4	0.0	7.7	14.0	0.0	13.3	0.0	6.8	2.1	0.0
une fois par jour	6.2	33.3	15.4	9.3	33.3	0.0	0.0	10.8	2.1	0.0
plusieurs fois par jour	47.8	33.3	28.8	4.7	0.0	86.7	0.0	41.9	93.6	66.7
N**	627	6	104	43	3	15	1	74	47	3
<i>données manquantes</i>	466	0	59	22	1	3	0	30	16	2

T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2007), femmes

Patients: problème principal			
Femmes	Jeux pathologiques	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	52.6	7.7	20.0
1 jour par semaine ou moins	31.6	15.4	40.0
2 à 3 jours par semaine	5.3	3.8	40.0
4 à 6 jours par semaine	10.5	15.4	0.0
1 fois par jour	0.0	19.2	0.0
plusieurs fois par jour	0.0	38.5	0.0
N**	19	26	5
<i>données manquantes</i>	3	15	13
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	71.4	4.3	20.0
1 jour par semaine ou moins	14.3	13.0	20.0
2 à 3 jours par semaine	7.1	8.7	60.0
4 à 6 jours par semaine	7.1	21.7	0.0
1 fois par jour	0.0	13.0	0.0
plusieurs fois par jour	0.0	39.1	0.0
N**	14	23	5
<i>données manquantes</i>	8	18	13

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.3a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2007), hommes & femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Hommes & femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	26.7	33.3	23.9	29.6	35.3	30.8	100.0	20.9	0.0	14.3
1 jour par semaine ou moins	9.1	9.5	10.9	25.3	11.8	2.6	0.0	18.5	4.2	0.0
2 à 3 jours par semaine	14.1	9.5	13.4	22.3	23.5	5.1	0.0	16.7	1.0	28.6
4 à 6 jours par semaine	11.8	4.8	7.5	9.9	5.9	5.1	0.0	10.1	5.2	0.0
une fois par jour	6.4	14.3	16.2	3.4	0.0	12.8	0.0	11.0	3.1	14.3
plusieurs fois par jour	31.8	28.6	28.0	9.4	23.5	43.6	0.0	22.9	86.5	42.9
N**	2'146	21	439	233	17	39	1	546	96	7
données manquantes	1'452	8	144	60	3	15	1	108	21	14
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	8.0	14.3	15.7	10.3	16.7	2.7	100.0	5.6	0.0	7.1
1 jour par semaine ou moins	7.8	28.6	15.7	26.5	25.0	2.7	0.0	22.8	3.2	21.4
2 à 3 jours par semaine	17.2	0.0	14.3	27.9	25.0	0.0	0.0	18.4	2.1	7.1
4 à 6 jours par semaine	13.9	14.3	8.8	14.2	8.3	8.1	0.0	8.6	3.2	0.0
une fois par jour	8.3	14.3	17.6	9.8	8.3	13.5	0.0	7.9	2.1	7.1
plusieurs fois par jour	44.9	28.6	27.8	11.3	16.7	73.0	0.0	36.6	89.4	57.1
N**	2'057	21	363	204	12	37	1	478	94	14
données manquantes	1'541	8	220	89	8	17	1	176	23	7

T15.3b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2007), hommes & femmes

Patients: problème principal			
Hommes & femmes	Jeux pathologiques	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	60.5	6.7	16.7
1 jour par semaine ou moins	20.9	13.3	16.7
2 à 3 jours par semaine	8.1	3.3	22.2
4 à 6 jours par semaine	3.5	13.3	11.1
1 fois par jour	1.2	23.3	11.1
plusieurs fois par jour	5.8	40.0	22.2
N**	86	30	18
données manquantes	23	16	29
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	49.3	3.8	5.6
1 jour par semaine ou moins	34.3	11.5	11.1
2 à 3 jours par semaine	10.4	7.7	27.8
4 à 6 jours par semaine	3.0	19.2	5.6
1 fois par jour	1.5	15.4	16.7
plusieurs fois par jour	1.5	42.3	33.3
N**	67	26	18
données manquantes	42	20	29

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T16.1a Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2007), hommes

Patients: principale substance posant problème										
Hommes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	16.2	20.7	20.9	21.8	21.3	29.4	16.0	14.9	17.4	20.5
écart-type	3.5	6.1	6.3	6.5	9.5	17.4	.	2.5	5.7	13.7
1er quartile	15.0	17.0	17.0	18.0	16.0	19.0	16.0	14.0	15.0	12.0
valeur médiane	16.0	18.0	19.0	20.0	20.0	21.0	16.0	15.0	16.0	16.0
3e quartile	18.0	24.0	23.0	24.0	21.0	31.0	16.0	16.0	18.0	26.9
N*	899	9	267	159	9	9	1	403	27	6
données manquantes	1'605	14	153	69	7	27	0	147	27	10
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	21.6	21.1	22.6	23.6	22.2	31.6	16.0	16.2	19.7	21.8
écart-type	6.6	6.1	6.6	6.6	9.1	16.3	.	3.1	6.2	14.8
1er quartile	17.0	17.0	18.0	19.0	16.0	20.0	16.0	15.0	16.0	14.0
valeur médiane	20.0	19.0	21.0	22.0	21.0	25.0	16.0	16.0	18.0	16.0
3e quartile	25.0	24.0	25.0	26.0	23.0	44.0	16.0	17.0	20.0	26.9
N*	935	9	256	156	9	10	1	357	23	5
données manquantes	1'569	14	164	72	7	26	0	193	31	11
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	31.0	21.3	23.0	25.3	24.6	35.3	16.0	16.9	21.1	36.0
écart-type	10.9	6.2	6.2	7.0	11.7	17.2	.	3.9	6.3	12.8
1er quartile	22.0	17.0	19.0	20.0	19.0	24.0	16.0	15.0	18.0	26.9
valeur médiane	30.0	20.0	22.0	24.0	20.0	29.0	16.0	16.0	20.0	36.0
3e quartile	40.0	24.0	25.0	29.0	23.0	44.0	16.0	17.0	25.0	45.0
N*	735	7	171	114	5	6	1	253	21	2
données manquantes	1'769	16	249	114	11	30	0	297	33	14
Période de latence (en années)**										
moyenne	23.5	26.3	8.7	6.7	4.4	.	.	5.7	21.7	6.5
écart-type	12.1	.	7.4	5.7	3.7	.	.	6.5	15.0	8.9
1er quartile	14.6	26.3	2.4	2.2	2.0	.	.	1.7	10.8	1.0
valeur médiane	23.3	26.3	5.9	5.0	3.0	.	.	3.0	19.3	1.8
3e quartile	32.7	26.3	15.3	9.9	8.0	.	.	7.6	30.5	16.7
N*	415	1	44	92	6	0	0	304	19	3
données manquantes	514	1	12	22	1	10	0	69	16	3

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1b Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2007), femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	17.8	18.0	20.1	21.3	19.5	28.1	17.0	14.6	16.8	12.5
écart-type	6.6	1.4	6.4	5.9	7.0	12.0	.	2.7	7.2	2.1
1er quartile	15.0	17.0	16.0	17.0	15.5	20.0	17.0	13.5	14.0	11.0
valeur médiane	17.0	18.0	18.0	20.0	16.5	27.0	17.0	14.0	15.0	12.5
3e quartile	20.0	19.0	21.0	27.0	23.5	38.0	17.0	15.0	17.0	14.0
N*	327	2	95	46	4	10	1	72	26	2
données manquantes	766	4	68	19	0	8	0	32	37	3
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	26.8	18.5	21.6	23.1	21.7	30.9	.	16.2	18.3	15.0
écart-type	10.7	2.1	6.4	6.3	9.0	9.4	.	4.6	7.7	5.7
1er quartile	18.0	17.0	18.0	18.0	16.0	23.0	.	14.0	15.0	11.0
valeur médiane	25.0	18.5	20.0	22.0	17.0	29.0	.	15.0	16.0	15.0
3e quartile	33.0	20.0	24.0	27.0	32.0	38.0	.	17.0	18.0	19.0
N*	355	2	88	40	3	9	0	63	21	2
données manquantes	738	4	75	25	1	9	1	41	42	3
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	34.6	19.5	23.1	24.0	22.3	42.5	.	16.7	21.7	.
écart-type	12.2	3.5	8.0	5.8	10.1	27.6	.	3.8	9.9	.
1er quartile	25.0	17.0	18.0	19.0	16.0	23.0	.	14.0	16.0	.
valeur médiane	34.0	19.5	20.0	25.0	17.0	42.5	.	16.0	18.0	.
3e quartile	43.0	22.0	28.0	27.0	34.0	62.0	.	17.0	24.0	.
N*	327	2	60	27	3	2	0	47	17	0
données manquantes	766	4	103	38	1	16	1	57	46	5
Période de latence (en années)**										
moyenne	23.6	.	5.2	7.1	2.4	21.0	2.6	8.6	25.4	11.3
écart-type	11.2	.	4.9	7.0	1.8	13.2	.	13.3	17.0	11.7
1er quartile	15.6	.	1.7	2.2	1.3	11.6	2.6	1.9	10.2	3.0
valeur médiane	24.5	.	3.7	5.1	1.4	25.2	2.6	3.8	27.9	11.3
3e quartile	32.5	.	7.8	9.7	4.6	30.4	2.6	8.0	39.0	19.5
N*	137	0	21	17	3	4	1	53	23	2
données manquantes	217	0	5	3	0	1	0	16	13	0

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1c Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2007), hommes & femmes

Patient-e-s: principale substance posant problème										
Hommes & femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	16.6	20.2	20.7	21.7	20.8	28.7	16.5	14.9	17.1	18.5
écart-type	4.6	5.6	6.3	6.4	8.6	14.4	0.7	2.5	6.5	12.2
1er quartile	15.0	17.0	17.0	18.0	16.0	19.0	16.0	14.0	15.0	11.5
valeur médiane	16.0	18.0	19.0	20.0	17.0	25.0	16.5	15.0	16.0	14.5
3e quartile	18.0	24.0	22.0	25.0	21.0	38.0	17.0	16.0	17.0	22.0
N*	1'226	11	362	205	13	19	2	475	53	8
données manquantes	2'372	18	221	88	7	35	0	179	64	13
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	23.0	20.6	22.4	23.5	22.1	31.3	16.0	16.2	19.1	19.8
écart-type	8.3	5.6	6.5	6.5	8.7	13.1	.	3.3	6.9	12.8
1er quartile	18.0	17.0	18.0	19.0	16.0	20.0	16.0	14.0	15.0	11.0
valeur médiane	20.0	19.0	20.0	22.0	19.0	26.0	16.0	15.0	17.5	16.0
3e quartile	26.0	24.0	25.0	26.0	23.5	42.0	16.0	17.0	20.0	26.9
N*	1'290	11	344	196	12	19	1	420	44	7
données manquantes	2'308	18	239	97	8	35	1	234	73	14
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	32.1	20.9	23.0	25.1	23.8	37.1	16.0	16.9	21.4	36.0
écart-type	11.5	5.6	6.7	6.8	10.4	18.2	.	3.8	8.0	12.8
1er quartile	23.0	17.0	18.0	20.0	16.5	23.5	16.0	15.0	16.0	26.9
valeur médiane	30.0	20.0	21.0	24.0	19.5	29.0	16.0	16.0	19.5	36.0
3e quartile	40.0	22.0	25.0	29.0	28.5	53.0	16.0	17.0	25.0	45.0
N*	1'062	9	231	141	8	8	1	300	38	2
données manquantes	2'536	20	352	152	12	46	1	354	79	19
Période de latence (en années)**										
moyenne	23.6	26.3	7.6	6.7	3.7	21.0	2.6	6.1	23.7	8.4
écart-type	11.9	.	6.9	5.9	3.2	13.2	.	7.9	16.1	8.9
1er quartile	14.9	26.3	2.1	2.2	1.4	11.6	2.6	1.7	10.8	1.8
valeur médiane	23.4	26.3	5.0	5.0	3.0	25.2	2.6	3.1	23.1	3.0
3e quartile	32.7	26.3	11.5	9.8	4.6	30.4	2.6	7.6	36.2	16.7
N*	552	1	65	109	9	4	1	357	42	5
données manquantes	731	1	17	25	1	11	0	85	29	3

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2a Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2007), hommes

Patients: problème principal			
Hommes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	28.6	32.3	26.6
écart-type	9.2	16.6	14.9
1er quartile	21.5	17.0	17.0
valeur médiane	28.0	30.0	17.0
3e quartile	34.5	50.0	33.0
N*	32	3	5
<i>données manquantes</i>	55	2	24
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	30.6	32.7	28.6
écart-type	8.6	16.2	13.3
1er quartile	23.0	18.0	19.0
valeur médiane	28.0	30.0	28.0
3e quartile	38.0	50.0	30.0
N*	31	3	5
<i>données manquantes</i>	56	2	24
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	33.5	34.0	33.1
écart-type	11.8	22.6	12.1
1er quartile	25.5	18.0	23.0
valeur médiane	30.5	34.0	32.0
3e quartile	39.5	50.0	40.0
N*	28	2	8
<i>données manquantes</i>	59	3	21
Période de latence (en années)**			
moyenne	8.6	6.4	10.3
écart-type	9.8	4.1	8.7
1er quartile	3.0	2.4	3.8
valeur médiane	4.4	6.2	7.6
3e quartile	10.4	10.6	17.0
N*	32	3	5
<i>données manquantes</i>	55	2	24

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2b Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2007), femmes

Patientes: problème principal			
Femmes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	37.5	16.0	18.0
écart-type	12.9	4.1	.
1er quartile	27.5	13.0	18.0
valeur médiane	33.5	15.0	18.0
3e quartile	49.5	16.0	18.0
N*	8	17	1
<i>données manquantes</i>	14	24	17
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	38.3	17.2	26.5
écart-type	12.4	4.2	12.0
1er quartile	32.0	14.0	18.0
valeur médiane	35.0	16.0	26.5
3e quartile	47.0	17.0	35.0
N*	9	17	2
<i>données manquantes</i>	13	24	16
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	37.6	18.9	31.8
écart-type	12.7	6.3	12.9
1er quartile	30.0	15.0	22.0
valeur médiane	34.5	16.5	30.5
3e quartile	48.0	22.0	41.5
N*	10	16	4
<i>données manquantes</i>	12	25	14
Période de latence (en années)**			
moyenne	6.1	9.5	9.7
écart-type	5.3	6.3	.
1er quartile	3.3	4.7	9.7
valeur médiane	4.2	8.2	9.7
3e quartile	6.3	14.0	9.7
N*	8	17	1
<i>données manquantes</i>	14	24	17

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2c Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2007), hommes & femmes

Patients: problème principal			
Hommes & femmes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	30.4	18.5	25.2
écart-type	10.5	8.9	13.8
1er quartile	23.0	13.5	17.0
valeur médiane	28.0	15.0	17.5
3e quartile	36.5	19.5	33.0
N*	40	20	6
<i>données manquantes</i>	69	26	41
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	32.4	19.5	28.0
écart-type	10.0	8.6	12.0
1er quartile	24.0	14.0	18.0
valeur médiane	32.0	16.0	28.0
3e quartile	40.0	23.5	35.0
N*	40	20	7
<i>données manquantes</i>	69	26	40
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	34.6	20.6	32.7
écart-type	12.0	9.4	11.8
1er quartile	27.0	16.0	23.0
valeur médiane	33.5	17.0	32.0
3e quartile	40.0	24.0	40.0
N*	38	18	12
<i>données manquantes</i>	71	28	35
Période de latence (en années)**			
moyenne	8.1	9.1	10.2
écart-type	9.1	6.1	7.8
1er quartile	3.1	4.5	3.8
valeur médiane	4.4	8.0	8.6
3e quartile	8.9	12.3	17.0
N*	40	20	6
<i>données manquantes</i>	69	26	41

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T17 Mode d'administration de la principale substance posant problème au cours des 6 derniers mois avant l'admission (2007)

Patient-e-s: principale substance posant problème															
Mode d'administration*	Héroïne			Cocaïne			Amphétamines			Cannabis			Benzodiazépines		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
injection	35.5	30.0	34.1	5.3	12.5	7.0	33.3	0.0	16.7	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
fumée/inhalation	36.9	40.0	37.7	18.3	30.0	21.1	0.0	33.3	16.7	99.2	100.0	99.3	0.0	0.0	0.0
ingestion (manger/boire)	0.5	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	16.7	0.6	0.0	0.5	88.2	100.0	92.9
sniff	26.6	28.6	27.1	76.3	57.5	71.9	33.3	66.7	50.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	3.6
autre	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	3.6
N**	203	70	273	131	40	171	3	3	6	356	69	425	17	11	28
données manquantes	183	77	260	96	25	121	3	1	4	194	35	229	11	3	14

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

**T18 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 6 derniers mois avant l'admission des injections,
échange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois avant l'admission et âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2007)**

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Injections au cours de la vie*																
oui	5.8	5.6	5.8	67.5	63.7	66.5	18.1	31.7	21.1	5.0	5.3	5.1	14.1	12.8	13.7	457
non	94.2	94.4	94.2	32.5	36.3	33.5	81.9	68.3	78.9	95.0	94.7	94.9	85.9	87.2	86.3	2'874
N**	1'405	624	2'029	280	102	382	149	41	190	418	76	494	2'385	946	3'331	3'331
données manquantes	1'099	469	1'569	163	67	230	79	24	103	132	28	160	1'584	657	2'242	2'242
Injections au cours des 6 derniers mois*																
oui	0.9	0.6	0.8	44.1	36.0	41.9	10.2	17.1	11.7	2.4	1.3	2.2	6.9	5.2	6.4	213
non	99.1	99.4	99.2	55.9	64.0	58.1	89.8	82.9	88.3	97.6	98.7	97.8	93.1	94.8	93.6	3'106
N**	1'405	625	2'030	272	100	372	147	41	188	417	76	493	2'374	945	3'319	3'319
données manquantes	1'099	468	1'568	171	69	240	81	24	105	133	28	161	1'595	658	2'254	2'254
Injections au cours des 30 derniers jours*																
oui	0.3	0.3	0.3	41.3	31.6	38.7	8.5	17.5	10.4	0.5	0.0	0.4	5.3	4.1	5.0	177
non	99.7	99.7	99.7	58.7	68.4	61.3	91.5	82.5	89.6	99.5	100.0	99.6	94.7	95.9	95.0	3'380
N**	1'544	677	2'221	269	98	367	153	40	193	421	80	501	2'544	1'013	3'557	3'557
données manquantes	960	416	1'377	174	71	245	75	25	100	129	24	153	1'425	590	2'016	2'016
Echange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois***																
oui	0.0	0.0	0.0	12.9	23.5	15.2	20.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	10.5	16.7	11.8	14
non	100.0	100.0	100.0	87.1	76.5	84.8	80.0	100.0	84.6	100.0	100.0	100.0	89.5	83.3	88.2	105
N**	10	2	12	62	17	79	10	3	13	9	1	10	95	24	119	119
données manquantes	1	1	2	36	14	50	4	3	7	0	0	0	43	18	61	61
Age lors de la première injection****																
jusqu'à 14 ans	4.3	14.3	6.6	3.9	5.6	4.3	0.0	12.5	4.5	0.0	33.3	7.1	3.3	10.8	5.1	14
de 15 à 16 ans	14.9	14.3	14.8	6.3	16.7	8.5	14.3	12.5	13.6	9.1	33.3	14.3	8.6	15.4	10.2	28
de 17 à 18 ans	25.5	21.4	24.6	21.9	25.0	22.6	14.3	12.5	13.6	27.3	0.0	21.4	23.3	21.5	22.9	63
de 19 à 20 ans	17.0	21.4	18.0	21.1	27.8	22.6	42.9	0.0	27.3	27.3	33.3	28.6	21.9	23.1	22.2	61
de 21 à 25 ans	29.8	28.6	29.5	25.0	13.9	22.6	14.3	25.0	18.2	9.1	0.0	7.1	24.3	18.5	22.9	63
de 26 à 30 ans	8.5	0.0	6.6	10.9	11.1	11.0	7.1	37.5	18.2	27.3	0.0	21.4	11.0	10.8	10.9	30
de 31 à 39 ans	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	6.1	7.1	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	4.4	12
dès 40 ans	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.5	4
N**	47	14	61	128	36	164	14	8	22	11	3	14	210	65	275	275
données manquantes	35	21	56	61	29	90	13	5	18	10	1	11	126	56	182	182

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 6 derniers mois. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2007), hommes

Hommes

	Patients: principale substance posant problème									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool		33.3	34.6	42.1	41.7	29.6	0.0	25.0	30.0	21.4
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.2		8.3	0.6	8.3	11.1	0.0	0.2	0.0	0.0
héroïne	1.8	0.0	3.7	19.1	8.3	11.1	0.0	2.8	0.0	7.1
méthadone	0.7	26.7	19.9	5.6	8.3	11.1	0.0	0.9	0.0	0.0
autres opiacés	0.2	6.7	1.8	2.8	16.7	3.7	100.0	0.2	0.0	0.0
cocaïne	4.3	6.7	39.8	0.0	50.0	11.1	0.0	9.8	3.3	7.1
crack, freebase	0.1	0.0	0.6	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.4	0.0	4.9	2.8	8.3	0.0	100.0	2.3	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.9	6.7	5.5	12.9	8.3	3.7	0.0	4.4	0.0	0.0
autres stimulants	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
barbituriques	0.4	6.7	0.9	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	3.8	20.0	21.7	7.3	8.3	3.7	0.0	1.2	0.0	7.1
autres somnifères et tranquillisants	0.9	0.0	2.4	0.6	0.0	3.7	0.0	0.2	0.0	0.0
LSD	0.4	0.0	4.0	4.5	25.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.1	0.0	1.2	0.6	8.3	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	7.1
cannabis	11.4	46.7	40.7	45.5	50.0	14.8	0.0		6.7	28.6
tabac	28.3	40.0	39.4	29.2	41.7	18.5	0.0	34.1		7.1
autres substances	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	
jeu pathologique	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.2	6.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.2	6.7	0.0
aucun autre problème addictif	58.7	13.3	15.0	24.2	25.0	37.0	0.0	46.0	66.7	42.9
N**	1'386	15	327	178	12	27	1	428	30	14
<i>données manquantes</i>	<i>1'118</i>	<i>8</i>	<i>93</i>	<i>50</i>	<i>4</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>122</i>	<i>23</i>	<i>2</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2007), femmes

Femmes

Patientes: principale substance posant problème										
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool		40.0	31.7	50.0	100.0	21.4	0.0	29.5	7.4	0.0
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.2		5.8	1.9	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
héroïne	1.6	20.0	0.8	33.3	0.0	7.1	0.0	3.8	0.0	0.0
méthadone	1.0	0.0	21.7	13.0	0.0	7.1	0.0	1.3	0.0	0.0
autres opiacés	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne	4.2	0.0	31.7	0.0	33.3	7.1	0.0	9.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	20.0	0.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.7	0.0	1.7	3.7	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	1.1	0.0	1.7	20.4	100.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	7.5	40.0	19.2	16.7	0.0	0.0	0.0	1.3	3.7	0.0
autres somnifères et tranquillisants	2.6	0.0	3.3	1.9	0.0	7.1	0.0	1.3	3.7	0.0
LSD	0.3	0.0	0.8	11.1	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	7.4	60.0	38.3	31.5	66.7	0.0	0.0		7.4	0.0
tabac	32.0	40.0	35.8	33.3	33.3	21.4	0.0	35.9		0.0
autres substances	1.0	0.0	0.0	1.9	0.0	21.4	0.0	1.3	0.0	
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
troubles alimentaires	2.9	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	2.6	3.7	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	54.6	20.0	21.7	14.8	0.0	50.0	0.0	41.0	77.8	100.0
N**	612	5	120	54	3	14	0	78	27	4
<i>données manquantes</i>	<i>481</i>	<i>1</i>	<i>43</i>	<i>11</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>26</i>	<i>36</i>	<i>1</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2007), hommes & femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool		35.0	33.8	44.0	53.3	26.8	0.0	25.7	19.3	16.7
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.2		7.6	0.9	6.7	7.3	0.0	0.4	0.0	0.0
héroïne	1.8	5.0	2.9	22.4	6.7	9.8	0.0	3.0	0.0	5.6
méthadone	0.8	20.0	20.4	7.3	6.7	9.8	0.0	1.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.3	5.0	1.3	2.2	13.3	2.4	100.0	0.2	0.0	0.0
cocaïne	4.3	5.0	37.6	0.0	46.7	9.8	0.0	9.7	1.8	5.6
crack, freebase	0.1	5.0	0.7	0.4	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.5	0.0	4.0	3.0	6.7	0.0	100.0	2.4	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	1.0	5.0	4.5	14.7	26.7	2.4	0.0	4.7	0.0	0.0
autres stimulants	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
barbituriques	0.3	5.0	0.9	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	5.0	25.0	21.0	9.5	6.7	2.4	0.0	1.2	1.8	5.6
autres somnifères et tranquillisants	1.5	0.0	2.7	0.9	0.0	4.9	0.0	0.4	1.8	0.0
LSD	0.4	0.0	3.1	6.0	20.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.2	0.0	0.9	0.4	6.7	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	5.6
cannabis	10.2	50.0	40.0	42.2	53.3	9.8	0.0		7.0	22.2
tabac	29.4	40.0	38.5	30.2	40.0	19.5	0.0	34.4		5.6
autres substances	0.6	0.0	0.0	0.4	0.0	7.3	0.0	0.8	0.0	
jeu pathologique	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
troubles alimentaires	1.1	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.3	5.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2	3.5	0.0
aucun autre problème addictif	57.5	15.0	16.8	22.0	20.0	41.5	0.0	45.3	71.9	55.6
N**	1'998	20	447	232	15	41	1	506	57	18
<i>données manquantes</i>	<i>1'600</i>	<i>9</i>	<i>136</i>	<i>61</i>	<i>5</i>	<i>13</i>	<i>1</i>	<i>148</i>	<i>59</i>	<i>3</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2007), hommes

Hommes

Patients: problème principal			
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	8.5	33.3	0.0
coktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	0.0	8.3
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	1.7	0.0	0.0
tabac	15.3	33.3	8.3
autres substances	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique		0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0		0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	0.0	
aucun autre problème addictif	76.3	33.3	91.7
N**	59	3	12
<i>données manquantes</i>	28	2	17

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2007), femmes

Femmes

Patientes: problème principal			
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	16.7	13.6	0.0
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	0.0	0.0	0.0
tabac	8.3	4.5	0.0
autres substances	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique		0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0		0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	0.0	
aucun autre problème addictif	75.0	86.4	100.0
N**	12	22	5
<i>données manquantes</i>	10	19	13

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2007), hommes & femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal		
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	9.9	16.0	0.0
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	0.0	5.9
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	1.4	0.0	0.0
tabac	14.1	8.0	5.9
autres substances	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique		0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0		0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	0.0	
aucun autre problème addictif	76.1	80.0	94.1
N**	71	25	17
<i>données manquantes</i>	38	21	30

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T20 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2007)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Fréquence de la consommation d'alcool*																
jamais	9.9	9.0	9.6	12.8	15.8	13.6	6.3	5.6	6.2	15.6	13.8	15.3	11.1	10.8	11.0	342
1 fois par mois ou moins	3.0	5.4	3.7	11.4	23.7	14.6	12.7	5.6	11.1	22.5	23.1	22.6	7.7	9.1	8.1	251
2 à 4 fois par mois	6.7	5.9	6.4	18.5	13.2	17.1	27.8	22.2	26.5	34.4	36.9	34.8	14.0	10.4	13.0	405
2 à 3 fois par semaine	17.0	17.5	17.2	23.7	19.7	22.6	23.8	22.2	23.5	20.7	20.0	20.6	18.8	17.9	18.6	577
4 fois ou plus par semaine	63.4	62.2	63.1	33.6	27.6	32.1	29.4	44.4	32.7	6.9	6.2	6.8	48.4	51.8	49.4	1'535
N**	1'485	646	2'131	211	76	287	126	36	162	334	65	399	2'243	867	3'110	3'110
<i>données manquantes</i>	1'019	447	1'467	232	93	325	102	29	131	216	39	255	1'726	736	2'463	2'463
Nbre de boissons standards par jour***																
1 ou 2	7.8	6.9	7.5	43.6	44.6	43.9	35.9	30.8	34.9	47.1	49.0	47.4	19.3	16.0	18.4	464
3 ou 4	17.2	14.3	16.3	39.4	23.2	35.3	37.9	34.6	37.2	34.0	36.7	34.5	23.1	17.7	21.6	547
5 ou 6	20.9	23.0	21.6	10.3	19.6	12.7	13.6	23.1	15.5	9.4	10.2	9.6	17.6	21.3	18.6	471
7 à 9	19.5	21.7	20.2	3.0	5.4	3.6	6.8	3.8	6.2	4.9	4.1	4.8	14.9	17.9	15.7	397
10 ou plus	34.6	34.0	34.4	3.6	7.1	4.5	5.8	7.7	6.2	4.5	0.0	3.8	25.1	27.0	25.6	648
N**	1'252	538	1'790	165	56	221	103	26	129	244	49	293	1'828	699	2'527	2'527
<i>données manquantes</i>	1'252	555	1'808	278	113	391	125	39	164	306	55	361	2'141	904	3'046	3'046
Fréquence de fortes consom. d'alcool***																
jamais	12.3	14.2	12.9	39.2	45.0	40.7	35.2	20.8	32.6	52.8	61.1	54.1	23.3	23.2	23.3	626
moins d'une fois par mois	9.3	12.4	10.2	23.3	20.0	22.5	21.9	25.0	22.5	19.2	24.1	20.0	13.4	14.3	13.6	367
1 fois par mois	11.5	8.5	10.6	14.2	18.3	15.3	16.2	16.7	16.3	14.7	7.4	13.5	12.3	9.4	11.5	310
1 fois par semaine	22.1	19.5	21.3	14.2	11.7	13.6	18.1	12.5	17.1	11.9	7.4	11.2	19.2	17.0	18.6	501
presque chaque jour	44.8	45.4	45.0	9.1	5.0	8.1	8.6	25.0	11.6	1.4	0.0	1.2	31.8	36.0	33.0	887
N**	1'308	564	1'872	176	60	236	105	24	129	286	54	340	1'950	741	2'691	2'691
<i>données manquantes</i>	1'196	529	1'726	267	109	376	123	41	164	264	50	314	2'019	862	2'882	2'882

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation d'alcool. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**T21 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission,
selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2007)**

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	28.6	35.9	30.8	2.4	2.5	2.5	15.2	0.0	12.0	20.3	14.5	19.4	22.1	27.2	23.5	522
1 jour par semaine ou moins	0.9	0.8	0.9	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.5	1.6	3.6	1.9	1.3	0.9	1.2	26
2 à 3 jours par semaine	1.3	0.8	1.1	0.5	0.0	0.4	0.9	6.7	2.1	3.0	3.6	3.1	1.4	1.1	1.3	29
4 à 6 jours par semaine	0.6	1.0	0.7	0.5	0.0	0.4	0.0	3.3	0.7	3.0	0.0	2.5	1.2	0.8	1.1	24
1 fois par jour	2.0	1.0	1.7	2.0	1.3	1.8	0.9	0.0	0.7	3.3	5.5	3.6	2.0	1.9	2.0	44
plusieurs fois par jour	66.7	60.5	64.7	94.6	96.2	95.1	78.6	90.0	81.0	68.9	72.7	69.4	72.0	68.1	70.9	1'572
N**	858	390	1'248	205	79	284	112	30	142	305	55	360	1'581	636	2'217	2'217
<i>données manquantes</i>	1'646	703	2'350	238	90	328	116	35	151	245	49	294	2'388	967	3'356	3'356
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10	12.8	15.7	13.6	10.9	15.3	12.1	15.6	25.9	17.9	45.3	39.5	44.4	19.3	19.0	19.2	284
11 à 20	37.4	41.4	38.5	52.1	54.2	52.7	50.0	51.9	50.4	42.5	53.5	44.4	41.5	44.9	42.4	626
21 à 30	34.6	29.5	33.2	30.3	20.3	27.7	30.0	18.5	27.4	9.8	7.0	9.3	28.3	24.1	27.2	401
31 ou plus	15.2	13.3	14.7	6.7	10.2	7.6	4.4	3.7	4.3	2.3	0.0	1.9	10.9	11.9	11.2	165
N**	538	210	748	165	59	224	90	27	117	214	43	257	1'082	394	1'476	1'476
<i>données manquantes</i>	75	40	115	35	18	53	5	3	8	29	4	33	150	69	219	219

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T22a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2007), hommes

	Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Objectif de consommation*										
abstinence définitive	32.3	75.0	74.2	78.0	85.7	42.1	0.0	45.8	66.7	57.1
abstinence limitée dans le temps	24.4	0.0	2.3	5.5	0.0	5.3	0.0	9.4	16.7	0.0
consommation contrôlée	25.8	25.0	10.5	7.3	0.0	26.3	0.0	25.6	16.7	14.3
aucune limitation envisagée	3.4	0.0	2.0	0.9	0.0	5.3	0.0	7.4	0.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	13.3	0.0	9.4	8.3	14.3	21.1	0.0	11.8	0.0	28.6
autre	0.8	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	1'129	4	256	109	7	19	0	203	6	7
<i>données manquantes</i>	1'375	19	164	119	9	17	1	347	48	9

T22b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2007), femmes

Objectif de consommation*										
abstinence définitive	40.0	100.0	66.7	69.2	100.0	64.3	0.0	31.4	66.7	50.0
abstinence limitée dans le temps	16.9	0.0	3.2	5.1	0.0	0.0	0.0	8.6	11.1	0.0
consommation contrôlée	29.1	0.0	10.8	7.7	0.0	28.6	0.0	31.4	11.1	0.0
aucune limitation envisagée	1.7	0.0	1.1	5.1	0.0	0.0	0.0	5.7	11.1	0.0
pas déterminé pour l'instant	12.0	0.0	17.2	10.3	0.0	7.1	0.0	22.9	0.0	50.0
autre	0.2	0.0	1.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	467	1	93	39	1	14	0	35	9	2
<i>données manquantes</i>	626	5	70	26	3	4	1	69	54	3

T22c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2007), hommes & femmes

Objectif de consommation*										
abstinence définitive	34.6	80.0	72.2	75.7	87.5	51.5	0.0	43.7	66.7	55.6
abstinence limitée dans le temps	22.2	0.0	2.6	5.4	0.0	3.0	0.0	9.2	13.3	0.0
consommation contrôlée	26.8	20.0	10.6	7.4	0.0	27.3	0.0	26.5	13.3	11.1
aucune limitation envisagée	2.9	0.0	1.7	2.0	0.0	3.0	0.0	7.1	6.7	0.0
pas déterminé pour l'instant	12.9	0.0	11.5	8.8	12.5	15.2	0.0	13.4	0.0	33.3
autres	0.6	0.0	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	1'596	5	349	148	8	33	0	238	15	9
<i>données manquantes</i>	2'002	24	234	145	12	21	2	416	102	12

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23a Problèmes psychiques au cours de la vie (2007), hommes

Hommes

	Patients: problème principal									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*										
dépansions sévères	31.7	33.3	40.9	30.8	0.0	50.0	0.0	24.2	50.0	50.0
états anxieux/tension nerv. importants	28.3	66.7	38.0	28.2	25.0	71.4	0.0	25.8	16.7	33.3
diffic. compréhension/mémoire/concentr.	14.3	33.3	17.5	16.7	50.0	14.3	0.0	20.5	0.0	16.7
hallucinations	3.6	16.7	7.6	9.0	25.0	0.0	100.0	6.8	0.0	16.7
diffic. à contrôler comportement violent	12.4	33.3	15.8	16.7	25.0	21.4	0.0	22.7	0.0	16.7
problèmes psychiques traités avec médic.	13.2	66.7	22.8	10.3	50.0	28.6	100.0	4.5	0.0	0.0
pensées suicidaires sérieuses	12.5	16.7	15.8	11.5	0.0	28.6	0.0	16.7	16.7	16.7
tentatives de suicide	6.6	16.7	11.1	6.4	0.0	21.4	0.0	8.3	0.0	16.7
autre(s) problème(s) psychique(s)	2.9	0.0	4.1	1.3	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0
aucun	41.0	0.0	25.1	42.3	0.0	7.1	0.0	46.2	33.3	33.3
N**	896	6	171	78	4	14	1	132	6	6
<i>données manquantes</i>	<i>1'608</i>	<i>17</i>	<i>249</i>	<i>150</i>	<i>12</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>418</i>	<i>48</i>	<i>10</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23b Problèmes psychiques au cours de la vie (2007), femmes

Femmes

	Patientes: problème principal									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*										
dépansions sévères	47.6	0.0	41.7	32.1	0.0	50.0	0.0	35.7	27.3	33.3
états anxieux/tension nerv. importants	41.6	0.0	36.1	60.7	0.0	66.7	0.0	46.4	18.2	33.3
diffic. compréhension/mémoire/concentr.	13.9	0.0	18.1	10.7	0.0	41.7	0.0	10.7	0.0	0.0
hallucinations	3.6	0.0	4.2	21.4	0.0	8.3	0.0	7.1	9.1	33.3
diffic. à contrôler comportement violent	7.5	0.0	8.3	17.9	0.0	16.7	0.0	7.1	0.0	33.3
problèmes psychiques traités avec médic.	22.6	100.0	25.0	32.1	100.0	25.0	0.0	7.1	18.2	0.0
pensées suicidaires sérieuses	17.7	0.0	18.1	25.0	0.0	50.0	0.0	14.3	9.1	33.3
tentatives de suicide	10.0	0.0	16.7	14.3	0.0	41.7	0.0	10.7	9.1	33.3
autre(s) problème(s) psychique(s)	4.4	0.0	2.8	0.0	0.0	16.7	0.0	3.6	0.0	0.0
aucun	18.8	0.0	30.6	21.4	0.0	0.0	0.0	35.7	54.5	66.7
N**	389	1	72	28	1	12	0	28	11	3
<i>données manquantes</i>	703	5	91	37	3	6	1	76	52	2

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23c Problèmes psychiques au cours de la vie (2007), hommes & femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*										
dépressions sévères	36.5	28.6	41.2	31.1	0.0	50.0	0.0	26.3	35.3	44.4
états anxieux/tension nerv. importants	32.4	57.1	37.4	36.8	20.0	69.2	0.0	29.4	17.6	33.3
diffic. compréhension/mémoire/concentr.	14.2	28.6	17.7	15.1	40.0	26.9	0.0	18.8	0.0	11.1
hallucinations	3.6	14.3	6.6	12.3	20.0	3.8	100.0	6.9	5.9	22.2
diffic. à contrôler comportement violent	10.9	28.6	13.6	17.0	20.0	19.2	0.0	20.0	0.0	22.2
problèmes psychiques traités avec médic.	16.0	71.4	23.5	16.0	60.0	26.9	100.0	5.0	11.8	0.0
pensées suicidaires sérieuses	14.1	14.3	16.5	15.1	0.0	38.5	0.0	16.3	11.8	22.2
tentatives de suicide	7.6	14.3	12.8	8.5	0.0	30.8	0.0	8.8	5.9	22.2
autre(s) problème(s) psychique(s)	3.3	0.0	3.7	0.9	0.0	7.7	0.0	3.8	0.0	0.0
aucun	34.2	0.0	26.7	36.8	0.0	3.8	0.0	44.4	47.1	44.4
N**	1'285	7	243	106	5	26	1	160	17	9
<i>données manquantes</i>	<i>2'312</i>	<i>22</i>	<i>340</i>	<i>187</i>	<i>15</i>	<i>28</i>	<i>1</i>	<i>494</i>	<i>100</i>	<i>12</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24 Proches: Lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2007)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	
lien avec la tierce personne (le/la client-e est):*				
mère/père	26.4	27.9	27.6	283
filles/fils	15.9	11.0	12.1	124
sœur/frère	5.3	3.1	3.6	37
conjoint-e/partenaire	33.0	47.5	44.3	455
autre proche/parent-e	2.2	5.0	4.4	45
collègue/ami-e	4.0	2.0	2.4	25
employeur/se, enseignant-e	2.6	1.1	1.5	15
tuteur/trice, curateur/trice	0.0	0.0	0.0	0
autre	10.6	2.4	4.2	43
N**	227	800	1'027	1'027
<i>données manquantes</i>	44	23	67	67

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T25 Proches: problème principal de la tierce personne (2007)

Proches					
	Total			Total	
	%	N		%	N
Problème principal de la tierce personne*			Autres problèmes de la tierce personne***		
alcool	69.5	693	alcool	31.0	113
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.3	3	cocktails (héroïne et cocaïne)	1.1	4
héroïne	4.2	42	héroïne	4.1	15
méthadone	0.2	2	méthadone	3.3	12
autres opiacés (morphine, codéine, etc)	0.0	0	autres opiacés (morphine, codéine, etc)	0.0	0
cocaïne	4.1	41	cocaïne	9.3	34
crack, feebase	0.0	0	crack, feebase	0.0	0
amphétamines	0.2	2	amphétamines	1.4	5
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.3	3	MDMA et substances similaires (ecsta)	2.2	8
autres stimulants (khat, etc)	0.0	0	autres stimulants (khat, etc)	0.3	1
barbituriques	0.6	6	barbituriques	0.8	3
benzodiazépines	0.1	1	benzodiazépines	4.7	17
autres somnifères et tranquillisants	0.1	1	autres somnifères et tranquillisants	0.5	2
LSD	0.0	0	LSD	0.5	2
autres hallucinogènes	0.9	9	autres hallucinogènes	0.0	0
substances volatiles (solvants, etc)	0.0	0	substances volatiles (solvants, etc)	0.0	0
cannabis	13.5	135	cannabis	16.5	60
tabac	0.7	7	tabac	26.1	95
autre substance	0.2	2	autre substance	0.5	2
jeu pathologique	0.8	8	jeu pathologique	1.9	7
troubles alimentaires	1.6	16	troubles alimentaires	1.4	5
autre comportement de type addictif	2.6	26	autre comportement de type addictif	1.1	4
			aucun	30.8	112
N**	997	997	N**	364	364
<i>données manquantes</i>	<i>97</i>	<i>97</i>	<i>données manquantes</i>	<i>730</i>	<i>730</i>

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

*** Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T26 Proches: Propres problèmes des proches liés au problème de la tierce personne (2007)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	
propres problèmes*				
propres probl. de consom. de substances	7.8	9.2	8.9	34
propres comportements de type addictif	0.0	2.0	1.6	6
propres problèmes somatiques	2.6	6.2	5.5	21
propres problèmes psychiques	27.3	40.8	38.1	146
problèmes de couple	42.9	45.4	44.9	172
problèmes familiaux	48.1	54.9	53.5	205
problèmes financiers	11.7	13.4	13.1	50
problèmes liés à la profession/formation	7.8	3.6	4.4	17
problèmes de logement	5.2	7.8	7.3	28
problèmes de violence (victime)	7.8	7.2	7.3	28
problèmes à contrôler sa propre violence	3.9	1.3	1.8	7
problèmes juridiques	6.5	2.6	3.4	13
autre	0.0	2.6	2.1	8
aucun	23.4	12.4	14.6	56
N**	77	306	383	383
<i>données manquantes</i>	<i>194</i>	<i>517</i>	<i>711</i>	<i>711</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T27 Sexe et âge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2007)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Sexe*																			
hommes			71.7			72.7			74.1			82.8			22.2			63.2	3'163
femmes			28.3			25.2			22.4			15.8			77.5			36.4	1'821
sexe pas connu			0.0			2.2			3.4			1.4			0.2			0.5	23
N**	2'000	790	2'790	303	105	417	129	39	174	366	70	442	199	694	895	3'163	1'821	5'007	5'007
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.9	2.3	3.6	0.9	1.5	0.7	0.7	0.7	35
15-19	1.5	1.7	1.5	1.3	8.6	3.2	10.1	17.9	11.8	53.3	52.9	53.2	10.3	2.5	4.2	8.7	5.1	7.4	368
20-24	4.1	3.7	4.0	15.2	15.2	15.2	21.7	25.6	22.5	18.6	21.4	19.0	7.2	5.2	5.7	8.3	6.7	7.7	383
25-29	6.3	4.6	5.8	19.9	21.9	20.4	27.1	15.4	24.3	9.6	10.0	9.6	7.2	7.4	7.4	9.1	7.6	8.6	425
30-34	7.7	7.6	7.7	19.2	13.3	17.7	15.5	15.4	16.0	7.7	4.3	7.1	4.6	9.4	8.4	9.1	8.9	9.0	449
35-39	12.6	9.9	11.9	26.5	18.1	24.3	13.2	12.8	13.0	5.5	1.4	4.8	6.2	9.4	8.7	13.0	10.4	12.1	599
40-44	15.0	15.1	15.0	9.6	16.2	11.3	10.9	7.7	10.1	1.4	2.9	1.6	12.9	14.9	14.5	12.3	14.0	12.9	641
45-49	16.6	17.3	16.8	6.3	2.9	5.4	1.6	5.1	2.4	1.4	2.9	1.6	16.5	17.0	16.9	12.8	14.8	13.5	672
50-54	11.9	15.1	12.8	2.0	2.9	2.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	10.8	10.7	10.7	8.7	11.4	9.6	479
55-59	11.2	11.4	11.3	0.0	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	9.7	8.7	7.7	9.2	8.3	411
60-64	7.2	6.1	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	5.7	5.3	5.0	5.0	5.0	247
65-69	3.4	4.4	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	3.8	4.0	2.6	3.5	2.9	146
70-74	1.4	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.2	2.5	1.2	1.5	1.3	65
75 et plus	0.8	1.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.2	3.1	1.3	1.7	0.7	1.3	0.9	46
N**	1'994	787	2'781	302	105	407	129	39	169	366	70	436	194	690	884	3'151	1'814	4'966	4'966
données manquantes	6	3	9	1	0	10	0	0	5	0	0	6	5	4	11	12	7	41	41
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	45.6	46.8	45.9	33.5	32.3	33.2	29.3	29.0	29.3	22.4	23.1	22.5	42.4	44.5	44.0	40.4	43.2	41.4	
écart-type	12.5	12.4	12.5	7.6	9.2	8.0	7.2	8.7	7.5	7.5	11.6	8.3	17.3	13.7	14.6	14.4	14.1	14.4	
1er quartile	37.3	39.2	37.6	27.3	25.2	26.3	24.1	22.0	23.5	17.2	17.4	17.2	26.6	34.9	33.8	29.0	33.0	30.3	
valeur médiane	45.8	47.1	46.1	33.5	32.1	33.3	27.2	26.5	27.2	19.2	18.7	19.2	44.5	45.0	44.9	40.3	44.0	41.8	
3e quartile	54.4	55.0	54.7	38.5	39.1	38.7	35.0	36.7	35.0	25.1	24.7	25.0	53.7	53.6	53.7	50.4	53.1	51.5	
N**	1'994	787	2'781	302	105	407	129	39	169	366	70	436	194	690	884	3'151	1'814	4'966	
données manquantes	6	3	9	1	0	10	0	0	5	0	0	6	5	4	11	12	7	41	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2007)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Etat civil*																			
célibataire	37.5	28.0	34.8	78.4	70.3	76.5	78.2	70.3	76.5	93.3	90.0	92.8	39.2	24.7	27.7	50.7	34.1	44.8	2'099
marié-e	35.6	32.3	34.7	10.8	11.9	10.9	11.3	13.5	11.4	4.8	7.1	5.1	51.7	53.4	53.0	29.2	37.1	31.9	1'496
séparé-e	5.5	5.8	5.6	0.7	3.0	1.3	5.6	2.7	5.4	0.6	0.0	0.5	0.0	3.9	3.0	3.9	4.4	4.1	192
divorcé-e	19.4	28.3	21.9	8.4	11.9	9.3	4.8	13.5	6.6	1.4	2.9	1.6	8.5	14.6	13.4	14.7	20.3	16.7	781
veuf/veuve	1.8	5.4	2.8	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.3	2.7	1.2	3.9	2.2	103
partenariat enregistré	0.2	0.1	0.2	1.7	1.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	14
N**	1'863	736	2'599	287	101	396	124	37	166	357	70	432	176	644	822	2'962	1'703	4'685	4'685
<i>données manquantes</i>	137	54	191	16	4	21	5	2	8	9	0	10	23	50	73	201	118	322	322
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	11.2	12.6	11.6	0.0	1.0	0.3	1.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	13.0	11.4	11.7	8.0	10.0	8.7	407
périphérie des grands centres	14.3	14.9	14.4	1.1	6.1	2.4	0.8	0.0	0.6	4.0	0.0	3.3	17.4	16.9	17.0	10.9	13.6	11.9	554
villes de moyenne importance	14.2	15.2	14.5	31.2	18.2	27.7	14.9	21.1	16.4	16.2	23.9	17.5	16.3	12.6	13.4	16.8	15.9	16.5	767
petites villes	34.2	32.5	33.7	42.8	46.5	43.7	49.6	47.4	49.1	40.7	38.8	40.4	23.9	31.1	29.6	36.0	33.2	34.9	1'626
campagne	26.1	24.9	25.8	25.0	28.3	25.9	33.1	31.6	32.7	39.0	37.3	38.8	29.3	28.0	28.3	28.2	27.4	27.9	1'299
N**	1'836	732	2'568	276	99	375	121	38	159	351	67	418	184	668	852	2'931	1'722	4'653	4'653
<i>données manquantes</i>	164	58	222	27	6	42	8	1	15	15	3	24	15	26	43	232	99	354	354

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2007)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de ménage*																			
seul-e en ménage	41.8	34.4	39.8	49.5	37.2	46.7	37.2	31.3	35.1	17.5	16.4	17.1	10.7	15.4	14.5	36.7	26.4	33.1	1'074
avec un ou les parents	6.7	4.5	6.1	10.9	9.0	10.8	21.3	12.5	19.1	62.3	34.4	57.8	19.6	5.1	8.3	17.0	7.8	13.9	450
avec enfant(s), sans partenaire	2.0	12.4	4.9	0.0	5.1	1.6	0.0	9.4	2.3	0.3	3.3	1.1	3.6	13.8	11.5	1.5	11.5	5.0	163
avec partenaire, sans enfant	22.2	29.7	24.3	13.2	17.9	14.1	13.8	28.1	17.6	4.9	13.1	6.4	19.6	26.2	24.6	18.0	25.8	20.7	671
avec partenaire et enfant(s)	19.9	13.0	18.0	11.4	10.3	10.8	11.7	6.3	9.9	4.5	3.3	4.3	43.8	37.7	39.1	18.1	21.2	19.1	619
avec d'autres proches	1.3	1.0	1.2	2.7	5.1	3.3	0.0	6.3	2.3	3.9	4.9	4.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.4	1.7	54
avec des amis (colocation)	2.4	1.4	2.1	2.3	0.0	1.6	5.3	0.0	3.8	1.3	8.2	2.4	1.8	1.0	1.2	2.3	1.7	2.1	67
autre	3.6	3.5	3.6	10.0	15.4	11.1	10.6	6.3	9.9	5.2	16.4	7.0	0.9	0.8	0.8	4.8	4.2	4.6	148
N**	1'245	485	1'730	220	78	306	94	32	131	308	61	374	112	390	504	2'099	1'127	3'246	3'246
données manquantes	755	305	1'060	83	27	111	35	7	43	58	9	68	87	304	391	1'064	694	1'761	1'761
Situation de domicile*																			
domicile fixe	95.4	94.5	95.2	87.7	78.5	85.1	88.4	87.1	88.5	90.6	81.4	88.9	97.6	97.2	97.3	93.8	93.6	93.7	3'149
sans domicile fixe	2.9	4.3	3.3	6.1	17.7	8.9	5.3	9.7	6.1	6.4	8.5	6.6	2.4	2.6	2.5	3.7	5.0	4.1	138
institution	1.7	1.2	1.6	6.1	3.8	6.0	6.3	3.2	5.3	3.0	10.2	4.4	0.0	0.2	0.2	2.5	1.4	2.2	74
N**	1'290	511	1'801	228	79	315	95	31	131	297	59	361	125	424	551	2'154	1'187	3'361	3'361
données manquantes	710	279	989	75	26	102	34	8	43	69	11	81	74	270	344	1'009	634	1'646	1'646
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	29.7	30.0	29.8	42.3	28.1	40.1	37.7	23.1	34.7	56.9	30.6	51.8	15.3	14.7	15.0	33.0	24.5	30.1	764
relations temporaires	5.9	6.9	6.2	7.7	10.5	8.2	5.8	23.1	10.9	11.8	16.7	12.4	6.1	3.4	4.0	6.4	6.4	6.4	162
partenaire fixe, vivant séparé	10.6	11.3	10.8	13.7	15.8	14.2	17.4	7.7	14.9	13.7	16.7	15.0	5.1	11.2	9.8	11.3	11.6	11.5	292
partenaire fixe, ménage commun	53.8	51.7	53.2	36.3	45.6	37.5	39.1	46.2	39.6	17.6	36.1	20.7	73.5	70.7	71.2	49.3	57.4	52.0	1'321
N**	1'007	406	1'413	168	57	232	69	26	101	153	36	193	98	348	448	1'587	933	2'539	2'539
données manquantes	993	384	1'377	135	48	185	60	13	73	213	34	249	101	346	447	1'576	888	2'468	2'468

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T30 Plus haute formation achevée, source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2007)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Plus haute formation achevée*																			
aucune form. achevée	6.4	6.3	6.4	8.3	13.9	9.6	5.0	13.9	7.3	17.6	18.5	17.8	9.2	4.0	5.3	8.6	7.2	8.1	251
scolarité obligatoire	11.7	17.5	13.2	36.2	43.1	37.9	32.7	27.8	31.4	53.2	53.7	53.3	12.6	14.8	14.2	21.7	21.1	21.5	664
scolarité complémentaire	3.2	9.0	4.7	3.1	6.9	4.0	4.0	11.1	5.8	2.7	1.9	2.6	3.4	4.5	4.2	3.2	6.7	4.3	134
apprentissage/école prof. maturité/diplôme	60.3	51.6	58.0	47.2	30.6	43.2	50.5	38.9	47.4	24.4	11.1	22.3	42.9	56.5	53.1	51.7	48.7	50.7	1'565
école normale, pédagog.	4.0	3.4	3.8	1.7	2.8	2.0	2.0	5.6	2.9	1.7	11.1	3.2	6.7	5.1	5.5	3.5	4.5	3.9	119
form. profession. supérieure	0.7	1.3	0.8	0.9	1.4	1.0	1.0	0.0	0.7	0.3	1.9	0.6	1.7	2.8	2.5	0.7	1.8	1.1	33
école profession. supérieure	7.4	6.1	7.0	1.3	1.4	1.3	5.0	2.8	4.4	0.0	1.9	0.3	5.9	6.3	6.2	5.3	5.5	5.4	166
haute école spécialisée	1.5	1.1	1.4	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.9	2.3	1.5	0.8	1.2	38
université, haute école	1.6	0.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.0	2.3	1.2	1.0	1.1	35
N**	1'218	446	1'664	229	72	301	101	36	137	295	54	349	119	352	471	2'057	1'029	3'086	3'086
données manquantes	782	344	1'126	74	33	116	28	3	37	71	16	93	80	342	424	1'106	792	1'921	1'921
Source de revenu principale*																			
salaires	60.3	40.6	54.7	36.6	28.0	34.4	62.1	31.3	54.3	33.3	20.3	31.0	68.2	62.4	63.8	55.5	46.7	52.3	1'892
économies, épargne	1.0	0.9	1.0	0.0	2.4	0.6	1.1	0.0	0.8	0.3	0.0	0.3	0.0	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	28
rente (AVS, AI ou autre)	17.7	21.3	18.7	18.8	19.5	18.8	10.5	18.8	12.6	5.4	11.9	6.4	13.5	10.6	11.3	15.4	16.6	15.8	572
aide sociale	10.6	11.3	10.8	35.3	35.4	35.4	11.6	28.1	15.7	6.4	6.8	6.4	0.7	3.2	2.6	11.5	10.1	11.0	397
assurance-chômage	6.3	6.1	6.2	4.5	6.1	4.9	4.2	9.4	5.5	4.0	5.1	4.2	2.0	1.5	1.6	5.4	4.1	4.9	177
soutien du/de la partenaire	0.8	15.7	5.1	0.4	3.7	1.3	1.1	6.3	2.4	0.0	3.4	0.6	2.0	17.8	14.0	0.8	14.6	5.8	209
soutien parents/proches/amis	1.9	2.1	2.0	2.2	4.9	2.9	6.3	6.3	6.3	48.5	47.5	48.6	13.5	3.8	6.1	9.2	6.0	8.1	294
deal, combines	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
autres revenus illégaux	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autre	1.3	1.8	1.4	1.3	0.0	1.0	3.2	0.0	2.4	1.0	5.1	1.7	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	1.1	41
N**	1'412	559	1'971	224	82	308	95	32	127	297	59	358	148	473	622	2'314	1'298	3'617	3'617
données manquantes	588	231	819	79	23	109	34	7	47	69	11	84	51	221	273	849	523	1'390	1'390
Taux d'activité principal*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	56.7	29.3	48.9	30.8	18.4	28.1	57.6	23.3	48.1	26.0	6.6	22.7	65.0	40.4	46.2	50.6	31.0	43.7	1'454
activité à temps partiel	4.5	17.2	8.1	2.7	11.8	5.0	3.0	6.7	3.7	3.3	8.2	4.1	2.4	28.4	22.4	4.0	19.5	9.4	314
plusieurs activités occas.	1.8	1.8	1.8	5.4	3.9	5.0	1.0	3.3	2.2	1.7	0.0	1.4	0.8	1.3	1.2	2.1	1.6	2.0	65
en formation	2.3	1.8	2.1	1.4	3.9	2.3	7.1	10.0	8.1	48.7	45.9	48.4	16.3	4.9	7.7	10.1	6.6	9.0	299
sans activité prof.	19.8	34.0	23.8	29.9	27.6	29.1	13.1	30.0	18.5	5.0	14.8	6.8	11.4	21.4	18.9	17.7	27.6	21.2	706
sans travail, en quête d'emploi	10.2	11.3	10.5	13.1	17.1	13.9	8.1	23.3	11.1	9.3	11.5	9.6	2.4	3.6	3.3	9.4	9.1	9.3	308
sans travail, futur emploi garanti	0.2	0.0	0.2	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	7
autre	4.5	4.7	4.5	16.3	17.1	16.2	10.1	3.3	8.1	5.3	13.1	6.6	1.6	0.0	0.4	5.7	4.5	5.3	175
N**	1'280	512	1'792	221	76	302	99	30	135	300	61	366	123	384	509	2'156	1'154	3'328	3'328
données manquantes	720	278	998	82	29	115	30	9	39	66	9	76	76	310	386	1'007	667	1'679	1'679

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2007)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	29.2	44.1	33.5	55.5	67.5	57.0	25.0	61.1	35.9	12.0	53.8	16.8	14.1	28.5	24.9	29.4	39.9	33.1	602
apprenti-e, stagiaire	1.4	1.4	1.4	0.6	2.5	1.0	5.4	0.0	3.8	30.6	0.0	26.4	5.1	0.9	1.9	4.5	1.7	3.5	64
manœuvre, aide	4.2	5.9	4.7	3.9	2.5	3.5	3.6	5.6	3.8	4.6	7.7	4.8	2.6	3.4	3.2	4.1	4.8	4.3	78
ouvrier/ère formé-e sur le tas	5.3	5.9	5.5	11.0	10.0	10.5	19.6	5.6	15.4	9.3	0.0	8.0	1.3	7.7	6.1	7.1	6.7	6.9	125
ouvrier/ère formé-e (CFC)	14.4	2.4	11.0	9.7	7.5	9.0	7.1	0.0	5.1	9.3	0.0	8.0	12.8	7.7	8.9	12.9	4.9	10.0	182
contremaître-sse	2.5	0.0	1.8	1.3	0.0	1.0	10.7	0.0	7.7	3.7	0.0	3.2	1.3	0.4	0.6	2.7	0.2	1.8	33
employé-e non qualifié-e	14.5	27.1	18.1	7.7	2.5	8.0	21.4	11.1	17.9	9.3	7.7	8.8	9.0	23.4	19.8	13.4	22.7	16.7	303
empl. qualifié-e, cadre moyen	10.9	5.2	9.3	4.5	2.5	4.0	1.8	5.6	2.6	0.9	0.0	0.8	28.2	13.6	17.3	9.8	8.1	9.1	166
employé-e, cadre supérieur	3.2	2.4	3.0	1.9	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.7	3.2	2.8	1.7	2.4	44
indépendant-e	11.7	3.5	9.4	2.6	0.0	2.0	1.8	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	15.4	7.7	9.6	9.0	4.6	7.4	134
écolier/ère, étudiant-e	1.1	1.0	1.1	0.6	2.5	1.5	0.0	11.1	3.8	19.4	23.1	21.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.0	3.4	61
autre statut	1.4	1.0	1.3	0.6	2.5	1.0	3.6	0.0	2.6	0.9	7.7	1.6	0.0	2.6	1.9	1.2	1.7	1.4	25
N**	715	288	1'003	155	40	200	56	18	78	108	13	125	78	235	313	1'173	631	1'817	1'817
<i>données manquantes</i>	<i>1'285</i>	<i>502</i>	<i>1'787</i>	<i>148</i>	<i>65</i>	<i>217</i>	<i>73</i>	<i>21</i>	<i>96</i>	<i>258</i>	<i>57</i>	<i>317</i>	<i>121</i>	<i>459</i>	<i>582</i>	<i>1'990</i>	<i>1'190</i>	<i>3'190</i>	<i>3'190</i>
Revenu mensuel net*																			
aucun revenu	24.6	35.7	27.5	24.1	24.1	24.1	24.2	60.0	35.4	47.3	52.6	48.1	22.2	10.8	13.0	27.9	31.0	28.8	298
moins de 1000 fr.	3.5	6.5	4.3	15.7	17.2	16.1	9.1	6.7	8.3	27.7	21.1	26.7	11.1	5.4	6.5	9.5	7.6	8.9	92
de 1001 à 2000 fr.	9.0	11.7	9.7	21.7	17.2	20.5	6.1	6.7	6.3	7.1	10.5	7.6	5.6	8.1	7.6	9.9	11.1	10.3	106
de 2001 à 3000 fr.	11.4	24.0	14.7	21.7	27.6	23.2	9.1	20.0	12.5	3.6	10.5	4.6	5.6	27.0	22.8	10.4	24.7	14.8	153
de 3001 à 4000 fr.	14.2	13.0	13.8	7.2	10.3	8.0	18.2	6.7	14.6	7.1	0.0	6.1	5.6	20.3	17.4	12.4	12.7	12.5	129
de 4001 à 5000 fr.	15.1	5.2	12.5	2.4	0.0	1.8	15.2	0.0	10.4	5.4	5.3	5.3	0.0	14.9	12.0	11.7	6.6	10.2	105
de 5001 à 6000 fr.	13.2	2.6	10.4	4.8	0.0	3.6	12.1	0.0	8.3	1.8	0.0	1.5	11.1	5.4	6.5	10.9	3.2	8.5	88
de 6001 à 8000 fr.	7.0	1.3	5.5	1.2	0.0	0.9	6.1	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	11.1	6.8	7.6	5.2	2.5	4.4	45
de 8001 à 10 000 fr.	0.9	0.0	0.7	1.2	3.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	1.4	5.4	1.3	0.6	1.1	11
de 10 001 à 15 000 fr.	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	1.1	0.4	0.0	0.3	3
plus de 15 000 fr.	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	4
N**	431	154	585	83	29	112	33	15	48	112	19	131	18	74	92	718	316	1'034	1'034
<i>données manquantes</i>	<i>1'569</i>	<i>636</i>	<i>2'205</i>	<i>220</i>	<i>76</i>	<i>305</i>	<i>96</i>	<i>24</i>	<i>126</i>	<i>254</i>	<i>51</i>	<i>311</i>	<i>181</i>	<i>620</i>	<i>803</i>	<i>2'445</i>	<i>1'505</i>	<i>3'973</i>	<i>3'973</i>

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2007)

Raison principale*	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
fin régulière sans transfert	48.4	45.0	47.4	20.0	17.6	20.0	34.1	25.6	32.8	60.7	65.7	61.6	66.5	61.7	62.8	48.0	50.6	49.0	2'416
fin régulière avec transfert	6.0	7.4	6.4	18.7	24.5	20.2	14.7	7.7	12.6	5.5	7.1	5.7	3.6	3.4	3.4	7.2	6.8	7.1	348
changement de domicile	3.0	2.8	3.0	7.7	6.9	7.3	6.2	5.1	5.7	1.4	0.0	1.4	2.0	1.2	1.4	3.4	2.2	3.0	146
hospitalisation	1.0	0.6	0.9	1.7	0.0	1.2	0.8	0.0	0.6	0.0	1.4	0.2	0.0	0.3	0.2	0.9	0.6	0.8	39
détention	0.2	0.0	0.1	3.7	1.0	2.9	0.8	0.0	0.6	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.1	0.6	0.1	0.4	20
perte de contact	23.6	25.8	24.2	26.7	27.5	26.3	29.5	35.9	31.6	18.4	10.0	17.0	16.8	21.1	20.1	23.0	23.4	23.1	1'140
rupture explicite	11.3	13.2	11.8	15.0	15.7	15.1	10.1	20.5	12.1	9.3	10.0	9.3	6.1	6.9	6.7	10.8	10.8	10.8	533
décès	2.5	1.5	2.3	3.7	3.9	4.1	0.8	5.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2.1	1.1	1.8	87
autre raison	4.0	3.6	3.9	3.0	2.9	2.9	3.1	0.0	2.3	4.1	5.7	4.3	4.6	5.3	5.1	4.0	4.5	4.1	204
N**	1'973	775	2'748	300	102	411	129	39	174	364	70	440	197	681	880	3'126	1'784	4'933	4'933
données manquantes	27	15	42	3	3	6	0	0	0	2	0	2	2	13	15	37	37	74	74

T32b Destination des transferts, selon le problème principal¹ et chez les proches (2007)

Destination des transferts***	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
traitement résidentiel	39.5	28.9	36.1	37.7	50.0	41.1	33.3	0.0	27.8	28.6	20.0	26.3	0.0	14.3	11.8	36.5	31.0	34.7	87
prise en charge ambulatoire	44.4	47.4	45.4	47.2	45.0	46.6	53.3	100.0	61.1	50.0	40.0	47.4	100.0	71.4	76.5	47.9	52.4	49.4	124
appartement protégé	2.5	2.6	2.5	0.0	5.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.4	1.6	4
autre institution spécialisée	13.6	21.1	16.0	15.1	0.0	11.0	13.3	0.0	11.1	21.4	40.0	26.3	0.0	14.3	11.8	14.4	14.3	14.3	36
N**	81	38	119	53	20	73	15	3	18	14	5	19	3	14	17	167	84	251	251
données manquantes	38	19	57	3	5	10	4	0	4	6	0	6	4	9	13	58	37	97	97

T32c Cause de décès, selon le problème principal¹ et chez les proches (2007)

Cause de décès****	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
suicide	11.1	33.3	15.2	20.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	23.1	14.6	7
accident	0.0	16.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	2.1	1
maladie	70.4	50.0	66.7	40.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	65.7	30.8	56.3	27
surdose ou intoxication aiguë	3.7	0.0	3.0	40.0	66.7	50.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	30.8	16.7	8
autre cause de décès	14.8	0.0	12.1	0.0	33.3	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	7.7	10.4	5
N**	27	6	33	5	3	8	1	2	3	0	0	0	0	1	1	35	13	48	48
données manquantes	23	6	29	6	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	7	39	39

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s transféré-e-s. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s décédé-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2007)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
Durée de la prise en charge* (%)																			
1 semaine ou moins	6.3	7.7	6.7	1.7	3.8	2.2	2.3	2.6	2.3	3.6	2.9	4.1	12.1	9.7	10.2	6.4	8.2	7.1	353
> 1 semaine à 1 mois	3.2	4.3	3.5	2.0	2.9	2.2	0.8	5.1	1.7	9.3	5.7	8.6	4.0	2.3	2.8	3.9	3.4	3.7	185
> 1 à 2 mois	4.8	6.5	5.3	3.0	1.9	2.6	2.3	0.0	1.7	6.0	11.4	7.0	6.5	5.8	6.0	4.8	6.3	5.3	266
>2 à 3 mois	3.3	4.6	3.6	3.0	3.8	3.1	3.9	2.6	3.5	4.9	7.1	5.2	3.5	3.6	3.6	3.6	4.4	3.9	194
>3 à 6 mois	10.4	11.5	10.7	10.9	10.5	11.0	16.4	15.4	15.6	12.9	18.6	13.6	16.1	16.9	16.8	11.5	13.8	12.4	618
>6 mois à 1 an	29.3	28.0	29.0	27.7	30.5	27.8	35.2	30.8	34.7	36.7	34.3	36.1	39.7	39.1	39.1	31.2	33.3	31.9	1'593
>1 à 2 ans	23.1	22.2	22.8	25.7	20.0	24.5	23.4	30.8	25.4	21.6	15.7	20.6	13.6	15.3	14.8	21.9	18.6	20.7	1'035
>2 à 3 ans	8.8	5.8	8.0	12.2	6.7	10.6	8.6	10.3	9.2	3.3	2.9	3.2	0.0	3.8	2.9	7.7	5.1	6.7	336
>3 à 5 ans	6.1	6.1	6.1	4.6	9.5	5.8	5.5	2.6	4.6	1.4	1.4	1.4	1.5	2.9	2.6	4.8	4.5	4.7	234
>5 à 10 ans	4.0	2.7	3.6	7.6	8.6	8.2	1.6	0.0	1.2	0.3	0.0	0.2	2.5	0.4	0.9	3.6	1.8	3.0	148
plus de 10 ans	0.7	0.8	0.7	1.7	1.9	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.2	0.6	0.5	0.6	31
N**	1'994	790	2'784	303	105	417	128	39	173	365	70	441	199	688	889	3'155	1'815	4'993	4'993
<i>données manquantes</i>	6	0	6	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	6	6	8	6	14	14
Durée (en semaines)																			
moyenne	72.1	64.3	69.9	94.5	98.1	98.5	61.9	52.0	60.0	40.4	36.0	39.4	42.6	41.0	41.3	66.4	54.1	62.1	
écart-type	96.5	88.8	94.4	114.3	127.0	122.7	62.0	42.0	57.4	40.9	37.1	40.3	75.0	49.5	56.2	90.8	75.7	86.5	
1er quartile	20.4	14.7	18.7	27.6	26.4	27.0	23.3	21.7	24.9	14.0	10.0	12.3	10.6	14.4	13.6	18.6	14.4	17.1	
valeur médiane	43.1	38.2	41.6	54.6	45.4	53.3	41.1	39.3	41.1	31.7	27.1	31.1	27.3	28.6	28.3	39.1	33.0	37.0	
3e quartile	85.4	77.0	82.6	107.1	112.6	112.6	78.1	68.0	77.6	53.1	48.0	52.1	41.9	49.2	47.9	77.6	62.0	71.1	
N**	1'994	790	2'784	303	105	417	128	39	173	365	70	441	199	688	889	3'155	1'815	4'993	
<i>données manquantes</i>	6	0	6	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	6	6	8	6	14	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2007)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution pendant la prise en charge*																
non	96.6	96.9	96.7	41.6	45.1	42.3	88.5	77.1	85.6	99.0	98.3	98.9	90.4	90.9	90.5	2'728
oui	3.4	3.1	3.3	58.4	54.9	57.7	11.5	22.9	14.4	1.0	1.7	1.1	9.6	9.1	9.5	285
N**	1'407	546	1'953	243	82	326	104	35	139	311	60	371	2'198	814	3'013	3'013
<i>données manquantes</i>	593	244	837	60	23	91	25	4	35	55	10	71	766	313	1'099	1'099
Type de substitution***																
héroïne	2.1	0.0	1.5	4.3	4.4	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.7	3.2	9
méthadone	45.8	58.8	49.2	88.7	91.1	89.3	91.7	100.0	95.0	66.7	100.0	75.0	78.9	83.6	80.2	227
autres opiacés	4.2	0.0	3.1	4.3	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.4	3.2	9
autres substances	47.9	41.2	46.2	2.8	4.4	3.2	8.3	0.0	5.0	33.3	0.0	25.0	13.9	12.3	13.4	38
N**	48	17	65	141	45	187	12	8	20	3	1	4	209	73	283	283
<i>données manquantes</i>	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
Substitution après la prise en charge*																
non	99.3	98.6	99.1	65.1	60.6	63.9	93.8	81.3	90.6	98.7	100.0	98.9	95.6	94.5	95.3	2'673
oui	0.7	1.4	0.9	34.9	39.4	36.1	6.3	18.8	9.4	1.3	0.0	1.1	4.4	5.5	4.7	131
N**	1'328	514	1'842	195	71	266	96	32	128	302	57	359	2'043	761	2'804	2'804
<i>données manquantes</i>	672	276	948	108	34	151	33	7	46	64	13	83	921	366	1'308	1'308
Type de substitution***																
prescription d'héroïne	22.2	14.3	18.8	11.8	7.1	10.4	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	13.5	7.1	11.5	15
traitement de substitution	77.8	85.7	81.3	88.2	92.9	89.6	100.0	100.0	100.0	50.0	0.0	50.0	86.5	92.9	88.5	116
N**	9	7	16	68	28	96	6	6	12	4	0	4	89	42	131	131
<i>données manquantes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s substitué-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2007)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Postcure prévue et mise en place*																
non	87.8	80.1	85.8	64.7	55.0	62.4	84.1	84.6	84.3	89.3	76.9	87.8	85.3	78.0	83.4	1789
oui	12.2	19.9	14.2	35.3	45.0	37.6	15.9	15.4	15.7	10.7	23.1	12.2	14.7	22.0	16.6	356
N**	1'060	386	1'446	190	60	250	82	26	108	187	26	213	1'594	551	2'145	2'145
<i>données manquantes</i>	940	404	1'344	113	45	167	47	13	66	179	44	229	1'370	576	1'967	1'967
Type de la postcure prévue***																
appartement protégé de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
service de postcure de l'institution	1.9	3.4	2.4	3.4	3.8	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	2.3	7
appartement protégé extérieur	0.9	3.4	1.8	3.4	11.5	5.9	0.0	25.0	6.7	0.0	0.0	0.0	1.5	5.9	3.0	9
service de postcure extérieur	10.4	6.8	9.1	10.2	11.5	10.6	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.0	9.0	9.9	9.3	28
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	26.4	27.1	26.7	13.6	7.7	11.8	9.1	0.0	6.7	10.5	16.7	12.0	19.6	18.8	19.3	58
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	0.0	1.7	0.6	23.7	38.5	28.2	27.3	0.0	20.0	10.5	0.0	8.0	10.1	10.9	10.3	31
autre centre de consultation	12.3	18.6	14.5	6.8	7.7	7.1	27.3	50.0	33.3	15.8	33.3	20.0	12.1	16.8	13.7	41
groupe d'entraide	14.2	13.6	13.9	0.0	3.8	1.2	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.0	8.0	8.9	8.3	25
groupe d'ancien-ne-s client-e-s de l'institution	1.9	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	2
autre	34.9	40.7	37.0	39.0	23.1	34.1	63.6	25.0	53.3	57.9	50.0	56.0	40.2	36.6	39.0	117
N**	106	59	165	59	26	85	11	4	15	19	6	25	199	101	300	300
<i>données manquantes</i>	23	18	41	8	1	9	2	0	2	1	0	1	36	20	56	56

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pour lesquels une postcure est prévue. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2007)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Problèmes addictifs*																
alcool	57.1	60.3	58.0	20.9	26.8	22.5	15.9	28.0	18.7	12.3	15.7	12.8	42.3	46.4	43.5	1'098
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.3	0.0	0.2	5.2	7.0	5.7	3.7	4.0	3.7	0.0	2.0	0.3	0.9	1.0	1.0	24
héroïne	1.0	0.6	0.9	53.4	52.1	53.1	12.2	24.0	15.0	1.5	2.0	1.6	7.2	6.7	7.1	179
méthadone	0.3	0.2	0.2	29.3	25.4	28.2	4.9	20.0	8.4	0.4	0.0	0.3	3.7	3.4	3.6	91
autres opiacés	0.2	0.0	0.1	1.0	4.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	8
cocaïne	1.7	0.8	1.4	14.7	19.7	16.0	35.4	52.0	39.3	2.3	3.9	2.6	4.6	4.7	4.6	116
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
amphétamines	0.1	0.0	0.1	0.0	2.8	0.8	0.0	4.0	0.9	0.0	3.9	0.6	0.2	0.7	0.3	8
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.1	0.0	0.1	0.0	1.4	0.4	1.2	12.0	3.7	0.0	2.0	0.3	0.2	0.7	0.3	8
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
barbituriques	0.3	0.2	0.2	0.0	1.4	0.4	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	6
benzodizépines	1.9	3.4	2.3	16.2	21.1	17.6	3.7	8.0	4.7	0.8	0.0	0.6	3.7	5.4	4.2	106
autres somnifères et tranquillisants	0.3	0.8	0.5	1.6	1.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	0.6	14
LSD	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	2
cannabis	3.7	1.3	3.0	19.4	25.4	21.0	9.8	16.0	11.2	46.7	51.0	47.4	11.8	7.7	10.6	269
tabac	14.3	14.3	14.3	16.2	18.3	16.8	9.8	8.0	9.3	11.9	5.9	10.9	14.5	15.3	14.7	372
autres substances	0.3	0.6	0.4	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.4	11
jeu pathologique	0.0	0.2	0.1	0.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.8	19
troubles alimentaires	0.1	2.7	0.8	0.0	1.4	0.4	0.0	4.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.1	5.0	1.5	37
autres troubles assimilable à une addiction	0.0	0.2	0.1	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.5	1.0	0.7	17
aucun	39.1	34.0	37.6	26.2	15.5	23.3	42.7	20.0	37.4	43.3	45.1	43.6	38.5	31.8	36.7	926
N**	1'185	476	1'661	191	71	262	82	25	107	261	51	312	1'822	704	2'526	2'526
<i>données manquantes</i>	<i>815</i>	<i>314</i>	<i>1'129</i>	<i>112</i>	<i>34</i>	<i>155</i>	<i>47</i>	<i>14</i>	<i>67</i>	<i>105</i>	<i>19</i>	<i>130</i>	<i>1'142</i>	<i>423</i>	<i>1'586</i>	<i>1'586</i>

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T37 Fréquence des rechutes, substance ou comportement impliqué et durée des rechutes pendant la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2007)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence des rechutes*																
aucune	60.2	45.0	56.1	25.5	25.0	25.4	49.0	28.6	44.4	68.8	50.0	66.2	57.1	44.1	53.8	741
une fois	9.5	12.0	10.2	13.6	10.7	13.0	14.3	14.3	14.3	8.0	11.1	8.5	10.2	11.3	10.4	144
deux fois	6.4	8.1	6.8	10.9	3.6	9.4	16.3	14.3	15.9	8.9	5.6	8.5	7.6	7.9	7.7	106
trois ou quatre fois	11.5	19.8	13.7	13.6	14.3	13.8	12.2	14.3	12.7	7.1	22.2	9.2	11.1	18.4	13.0	179
cinq fois ou plus	12.5	15.1	13.2	36.4	46.4	38.4	8.2	28.6	12.7	7.1	11.1	7.7	14.0	18.4	15.1	208
N**	706	258	964	110	28	138	49	14	63	112	18	130	1'024	354	1'378	1'378
données manquantes	1'294	532	1'826	193	77	279	80	25	111	254	52	312	1'940	773	2'734	2'734
Substance/comportement addictif lors des rechutes***																
alcool	95.4	97.0	96.0	28.4	35.0	29.8	29.2	40.0	32.4	11.8	12.5	11.9	70.0	76.3	72.0	426
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.4	0.0	0.3	6.8	5.0	6.4	4.2	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	1.7	1.1	1.5	9
opiacés	3.8	1.5	3.0	81.1	85.0	81.9	16.7	80.0	35.3	8.8	12.5	9.5	19.7	15.6	18.4	109
cocaïne et dérivés	3.8	0.7	2.8	33.8	30.0	33.0	66.7	60.0	64.7	5.9	0.0	4.8	13.3	7.5	11.5	68
stimulants	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.1	8.3	10.0	8.8	11.8	12.5	11.9	2.0	1.1	1.7	10
médicaments	2.3	3.7	2.8	18.9	20.0	19.1	8.3	20.0	11.8	2.9	0.0	2.4	6.4	6.5	6.4	38
hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
cannabis	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	1
tabac	6.5	1.5	4.8	17.6	15.0	17.0	16.7	20.0	17.6	67.6	62.5	66.7	14.0	6.5	11.7	69
substances volatiles	3.4	2.2	3.0	5.4	10.0	6.4	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	4.8	3.7	3.8	3.7	22
autres substances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.6	1.5	9
troubles alimentaires	0.4	0.7	0.5	1.4	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.8	1.5	9
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.5	3
N**	263	134	397	74	20	94	24	10	34	34	8	42	406	186	592	592
données manquantes	18	8	26	8	1	9	1	0	1	1	1	2	33	12	45	45
Durée des rechutes****																
1 à 2 jours	33.9	27.8	32.0	23.3	33.3	24.2	42.9	66.7	50.0	37.5	0.0	30.0	33.5	30.8	32.8	76
3 à 6 jours	33.1	18.5	28.5	23.3	0.0	21.2	14.3	0.0	10.0	62.5	0.0	50.0	31.7	15.4	27.2	63
7 à 10 jours	7.6	20.4	11.6	10.0	0.0	9.1	14.3	0.0	10.0	0.0	50.0	10.0	7.8	18.5	10.8	25
>10 jours à 2 semaines	2.5	7.4	4.1	3.3	0.0	3.0	14.3	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.2	3.9	9
>2 à 4 semaines	11.9	11.1	11.6	13.3	33.3	15.2	0.0	33.3	10.0	0.0	0.0	0.0	10.8	12.3	11.2	26
>4 à 6 semaines	5.9	3.7	5.2	3.3	33.3	6.1	14.3	0.0	10.0	0.0	50.0	10.0	5.4	7.7	6.0	14
>6 à 8 semaines	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	1
>2 mois	5.1	11.1	7.0	20.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	9.2	7.8	18
N**	118	54	172	30	3	33	7	3	10	8	2	10	167	65	232	232
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Pourcentages par colonne, une seule catégorie possible

T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal¹ (selement patient-e-s) (2007)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	33.5	37.4	34.6	4.3	0.0	3.3	23.9	0.0	18.6	8.6	15.4	9.4	27.5	30.6	28.3	316
1 jour par semaine ou moins	0.7	0.0	0.5	0.0	3.3	0.8	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.8	0.9	0.7	0.8	9
2 à 3 jours par semaine	0.9	0.9	0.9	1.1	3.3	1.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.9	1.4	1.0	11
4 à 6 jours par semaine	2.2	0.9	1.8	2.2	3.3	2.5	2.2	0.0	1.7	2.2	0.0	1.9	2.1	1.0	1.8	20
une fois par jour	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.5	0.3	0.4	5
plusieurs fois par jour	62.2	60.3	61.7	92.4	90.0	91.8	73.9	100.0	79.7	83.9	84.6	84.0	68.3	66.0	67.7	756
N**	558	214	772	92	30	122	46	13	59	93	13	106	823	294	1'117	1'117
<i>données manquantes</i>	1'442	576	2'018	211	75	295	83	26	115	273	57	336	2'141	833	2'995	2'995
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10 cigarettes par jour	14.5	23.9	16.9	8.6	11.1	9.2	15.0	11.1	13.8	38.5	16.7	36.2	16.8	22.0	18.1	97
11 à 20 cigarettes par jour	46.9	44.3	46.3	44.8	61.1	48.7	55.0	66.7	58.6	42.3	50.0	43.1	46.9	47.7	47.1	253
21 à 30 cigarettes par jour	28.6	19.3	26.3	41.4	16.7	35.5	25.0	22.2	24.1	13.5	33.3	15.5	28.1	18.2	25.7	138
31 cigarettes par jour ou plus	9.9	12.5	10.6	5.2	11.1	6.6	5.0	0.0	3.4	5.8	0.0	5.2	8.1	12.1	9.1	49
N**	262	88	350	58	18	76	20	9	29	52	6	58	405	132	537	537
<i>données manquantes</i>	109	46	155	30	12	42	15	4	19	33	5	38	192	72	264	264

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème¹ (seulement patient-e-s) (2007)

	Patient-e-s: principale substance posant problème ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Objectif de consommation*																
abstinence définitive	36.6	39.3	37.3	60.9	60.0	60.7	68.9	68.8	68.3	41.7	38.5	42.0	40.9	42.8	41.6	728
abstinence limitée dans le temps	17.8	12.0	16.3	0.7	2.2	1.0	1.6	0.0	1.2	5.6	7.7	5.7	13.0	9.2	11.9	209
consommation contrôlée	32.4	32.5	32.4	15.9	15.6	15.9	16.4	18.8	15.9	27.8	26.9	27.6	29.9	29.7	29.7	521
aucune limitation envisagée	3.6	4.5	3.9	6.0	2.2	5.5	0.0	0.0	0.0	11.8	11.5	11.5	4.8	4.8	4.8	84
pas déterminé pour l'instant	8.2	10.7	8.8	15.9	17.8	15.9	11.5	12.5	13.4	12.5	15.4	12.6	10.1	11.4	10.4	183
autre	1.5	1.0	1.3	0.7	2.2	1.0	1.6	0.0	1.2	0.7	0.0	0.6	1.4	2.1	1.5	27
N**	883	308	1'191	151	45	201	61	16	82	144	26	174	1'301	437	1'752	1'752
données manquantes	1'117	482	1'599	152	60	216	68	23	92	222	44	268	1'663	690	2'360	2'360
Pronostic*																
très bon pronostic	13.0	12.6	12.9	9.3	6.0	8.6	11.1	5.3	9.8	16.7	19.0	16.9	12.9	11.8	12.6	233
bon pronostic	45.8	40.8	44.5	31.4	24.0	29.7	52.4	36.8	48.8	46.2	57.1	47.5	44.6	40.6	43.6	803
plutôt mauvais pronostic	28.6	33.3	29.8	45.9	52.0	47.3	30.2	42.1	32.9	28.8	23.8	28.2	30.6	34.5	31.6	582
mauvais pronostic	12.6	13.2	12.8	13.4	18.0	14.4	6.3	15.8	8.5	8.3	0.0	7.3	11.9	13.1	12.2	225
N**	920	333	1'253	172	50	222	63	19	82	156	21	177	1'377	466	1'843	1'843
données manquantes	1'080	457	1'537	131	55	195	66	20	92	210	49	265	1'587	661	2'269	2'269

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu