



Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance

Résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2008

Recueil de tableaux statistiques

Mariana Astudillo, Etienne Maffli

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du monitoring act-info. Nous remercions également les collaborateurs et collaboratrices des services de consultation qui ont effectué les tâches de logistique et de saisie. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance et coordonne l'ensemble du réseau act-info. Un grand merci également à Edith Bacher et Christiane Gmel pour la conception graphique et la mise en page de ce rapport ainsi qu'à Marina Delgrande Jordan pour sa précieuse collaboration dans le développement des syntaxes d'analyse.

Compléments d'information: Etienne Maffli, tél. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emaffli@sfa-ispa.ch

Réalisation: Mariana Astudillo & Etienne Maffli, Institut suisse de
prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA)

Diffusion: Librairie ISPA, case postale 870, 1001 Lausanne,
tél. 021/321 29 35, fax 021 321 29 40,
e-mail librairie@sfa-ispa.ch

Prix: Fr. 10.–

Langue du texte original: français

Graphisme/mise en page: ISPA

Copyright: © ISPA-SFA Lausanne 2009

Citation recommandée: Astudillo, M & Maffli, E. (2009). Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance: résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2008 – Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies.

Table des matières

act-info – Information network an addiction care and therapy in Switzerland

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance

ADMISSION

- T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2008)
- T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2008)
- T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2008)
- T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2008)
- T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2008)
- T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2008)
- T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2008)
- T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2008)
- T9 Instance d'envoi principale et secondaire, selon le problème principal et chez les proches (2008)
- T10 Type d'aide attendue à l'admission et statut légal de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2008)
- T11 Traitements/prises en charge avant l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2008)
- T12 Substitution et autre traitement/prise en charge à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2008)
- T13a Admission suite à une cure de sevrage, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2008)
- T13b Fréquence des sevrages sans aide professionnelle avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2008)
- T14 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2008)
- T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2008), hommes
- T15.1b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2008), hommes

- T15.2a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2008), femmes
- T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2008), femmes
- T15.3a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2008), hommes & femmes
- T15.3b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2008), hommes & femmes
- T16.1a Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2008), hommes
- T16.1b Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2008), femmes
- T16.1c Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2008), hommes & femmes
- T16.2a Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2008), hommes
- T16.2b Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2008), femmes
- T16.2c Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2008), hommes & femmes
- T17 Mode d'administration de la principale substance posant problème au cours des 6 derniers mois avant l'admission (2008)
- T18 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 6 derniers mois avant l'admission des injections, échange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois avant l'admission et âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2008)
- T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2008), hommes
- T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2008), femmes
- T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2008), hommes & femmes
- T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2008), hommes
- T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2008), femmes
- T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2008), hommes & femmes
- T20 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2008)

- T21 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2008)
- T22a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2008), hommes
- T22b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2008), femmes
- T22c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2008), hommes & femmes
- T23a Problèmes psychiques au cours de la vie (2008), hommes
- T23b Problèmes psychiques au cours de la vie (2008), femmes
- T23c Problèmes psychiques au cours de la vie (2008), hommes & femmes
- T24 Proches: Lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2008)
- T25 Proches: problème principal et autres problèmes de la tierce personne (2008)
- T26 Proches: Propres problèmes des proches liés au problème de la tierce personne (2008)

SORTIE

- T27 Sexe et âge, selon le problème principal et chez les proches (2008)
- T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2008)
- T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2008)
- T30 Plus haute formation achevée, source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2008)
- T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2008)
- T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2008)
- T32b Destination des transferts, selon le problème principal et chez les proches (2008)
- T32c Cause de décès, selon le problème principal et chez les proches (2008)
- T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2008)
- T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2008)
- T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2008)
- T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2008)

- T37 Fréquence des rechutes, substance ou comportement impliqué et durée des rechutes pendant la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2008)
- T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2008)
- T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème (seulement patient-e-s) (2008)

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- SAMBAD (Statistique du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance)
- Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HegeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Méthadone (Statistique nationale des traitements de substitution)

Ces cinq statistiques disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés. Les données communes sont intégrées dans une base de données centralisée, permettant ainsi de procéder à des analyses sur l'ensemble des secteurs. Avec l'adoption des standards européens (Treatment Demand Indicator), la comparabilité des données au plan international est également garantie.

act-info est financé et coordonné par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne (ISPM), l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies à Lausanne (ISPA) et l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zürich (ISGF).

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)

Dès 2004, les instruments de monitoring *act-info* ont été introduits dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance et remplacent les anciens questionnaires en vigueur depuis 1994. Seuls quelques services isolés ont encore utilisé les anciens instruments pour le relevé de 2008. La réalisation d'*act-info* dans ce secteur est confiée à l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA).

La statistique *act-info* SAMBAD offre un aperçu de la clientèle et des activités de l'aide ambulatoire en matière de dépendance en Suisse. Les données sont récoltées au début et à la fin de la prise en charge. Les informations rassemblées à l'admission renseignent en particulier sur les caractéristiques socio-démographiques des client-e-s, sur leurs expériences de traitement ainsi que sur leurs modes de consommation et problèmes psychosociaux avant la prise en charge. Les informations récoltées à la sortie rendent principalement compte des caractéristiques socio-démographiques des client-e-s à ce moment, des mesures prises par les intervenant-e-s durant la prise en charge et des circonstances de la fin de celle-ci.

En 2008, 79 des 223 institutions recensées dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance ont participé au monitoring *act-info*. Il s'agit de services de consultation spécialisés pour les problèmes liés à l'alcool et/ou aux drogues illégales ainsi que de divers types de services polyvalents offrant également une aide pour les problèmes addictifs.

Quelques explications concernant les tableaux

La présente statistique descriptive des données de l'enquête act-info auprès des client-e-s du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance repose sur deux types de tableaux:

- lorsque la question a des catégories de réponses prédéfinies ou recodées en tranches distinctes (par exemple "état civil" ou "âge"), le tableau indique les pourcentages des différentes catégories de réponses
- lorsque la question n'a pas de catégories prédéfinies, mais requiert une valeur numérique (par exemple "âge au début de la consommation problématique"), le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1er quartile, 3e quartile)

La plupart des tableaux présentent les résultats de façon distincte pour les sous-groupes de patients et patientes ayant mentionné l'**alcool**, un **opiacé** (héroïne notamment), la **cocaïne** (et dérivés) ou le **cannabis** comme problème principal au moment de leur admission. Les **proches** venant consulter pour les problèmes d'un tiers font également l'objet d'analyses séparées pour les aspects socio-démographiques. A l'exception des thèmes directement liés aux modes de consommation ou aux formes de comportements addictifs non liés aux substances, les résultats ne sont en revanche pas présentés séparément pour les client-e-s (peu nombreux) ayant mentionné d'autres substances (par exemple un stimulant ou les substances volatiles) ou un problème addictif non lié à une substance (par exemple jeu pathologique) comme problème principal. Ces personnes sont cependant incluses dans les analyses portant sur l'ensemble des prises en charge figurant dans les blocs à droite des tableaux respectifs. Toutes les analyses sont effectuées séparément pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour tous sexes confondus (colonnes "Total" comprenant également les quelques personnes dont le sexe n'est pas connu).

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Le nombre de réponses valides **N** représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages ou autres paramètres. Il est indiqué pour chaque groupe ou sous-groupe considéré. Au dessous, le nombre correspondant de données manquantes figure également. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés particulièrement prudemment.

Des notes en bas de tableau renseignent sur les éventuelles particularités des groupes de référence ainsi que sur le type de question. Lorsque plusieurs réponses sont possibles (par exemple aux tableaux du thème T19, "autres problèmes addictifs") les pourcentages obtenus ne sont pas additifs.

T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2008)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sexe*																			
hommes	70.1			72.2			74.3			83.6			23.9			63.9		4'481	
femmes	29.9			27.8			25.7			16.4			76.1			36.1		2'533	
sexe pas connu	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		0	
N**	2'548	1'085	3'633	496	191	687	248	86	334	642	126	768	268	852	1'120	4'481	2'533	7'014	7'014
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.7	5.6	1.1	0.5	0.6	1.0	0.9	1.0	68
15-19	2.7	3.0	2.8	2.6	13.6	5.7	4.1	18.6	7.9	59.8	46.8	57.6	6.9	3.3	4.2	11.8	7.6	10.3	720
20-24	5.7	3.1	4.9	12.7	22.5	15.5	20.0	27.9	22.1	15.0	15.1	15.0	4.2	5.2	5.0	8.9	7.6	8.4	587
25-29	7.8	4.9	6.9	18.6	14.7	17.5	26.1	14.0	23.0	8.9	11.9	9.4	3.8	7.1	6.3	10.2	7.4	9.2	645
30-34	9.6	8.0	9.1	19.8	18.3	19.4	20.4	18.6	19.9	4.2	7.1	4.7	5.0	8.4	7.6	10.3	9.5	10.0	699
35-39	13.4	12.2	13.1	20.0	15.2	18.7	13.5	8.1	12.1	3.1	4.0	3.3	8.8	11.4	10.7	12.4	11.2	12.0	837
40-44	15.6	14.7	15.3	15.4	11.5	14.3	8.6	9.3	8.8	2.5	2.4	2.5	12.6	17.2	16.1	12.6	14.1	13.2	920
45-49	14.8	15.7	15.1	8.5	3.1	7.0	5.7	2.3	4.8	1.4	3.2	1.7	19.1	15.0	16.0	11.8	12.9	12.2	851
50-54	11.0	14.1	11.9	2.0	1.0	1.7	1.6	1.2	1.5	0.2	0.0	0.1	11.8	11.1	11.3	7.8	10.5	8.7	610
55-59	8.9	11.8	9.7	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	8.2	8.7	5.9	8.3	6.8	474
60-64	5.8	6.0	5.9	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	6.4	6.6	3.9	5.1	4.3	301
65-69	2.7	3.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	3.2	3.5	2.0	2.9	2.3	159
70-74	1.3	1.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.1	2.4	1.0	1.5	1.2	82
75 et plus	0.6	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	1.1	0.9	1.0	0.4	0.6	0.5	32
N**	2'540	1'083	3'623	495	191	686	245	86	331	641	126	767	262	845	1'107	4'461	2'524	6'985	6'985
données manquantes	8	2	10	1	0	1	3	0	3	1	0	1	6	7	13	20	9	29	29
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	43.4	45.6	44.1	34.2	30.3	33.1	31.2	28.3	30.4	21.0	22.9	21.3	45.7	44.1	44.5	38.1	41.5	39.3	
écart-type	12.8	12.6	12.7	8.4	8.6	8.7	7.9	8.8	8.2	7.3	11.9	8.2	14.8	13.5	13.8	14.2	14.4	14.4	
1er quartile	34.5	37.9	35.5	27.5	23.3	26.0	25.5	22.0	24.0	16.5	16.6	16.5	38.0	35.2	36.0	26.5	30.6	27.8	
valeur médiane	43.5	46.2	44.1	33.8	29.6	33.0	30.0	26.2	29.3	17.9	18.2	17.9	47.0	44.0	44.9	38.1	42.0	39.6	
3e quartile	52.1	54.4	52.9	40.5	37.3	39.4	35.69	34.5	35.5	23.0	26.2	23.6	55.3	53.0	53.7	48.3	51.5	49.3	
N**	2'540	1'083	3'623	495	191	686	245	86	331	641	126	767	262	845	1'107	4'461	2'524	6'985	6'985
données manquantes	8	2	10	1	0	1	3	0	3	1	0	1	6	7	13	20	9	29	29

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2008)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Etat civil*																			
célibataire	42.0	30.6	38.6	74.3	72.7	73.8	74.6	72.0	73.9	94.7	87.8	93.6	26.4	23.4	24.1	55.0	37.8	48.8	3'291
marié-e	31.3	30.5	31.1	11.9	11.8	11.9	16.0	9.8	14.4	2.9	6.5	3.5	62.0	53.4	55.4	25.8	33.9	28.8	1'939
séparé-e	5.5	7.0	5.9	4.0	4.3	4.1	1.2	3.7	1.8	1.1	3.3	1.5	0.8	4.5	3.6	4.0	5.3	4.5	303
divorcé-e	19.4	26.0	21.4	9.0	8.6	8.9	7.4	12.2	8.6	1.3	2.4	1.5	7.8	14.3	12.7	13.6	18.3	15.3	1'031
veuf/veuve	1.8	5.6	2.9	0.2	1.6	0.6	0.0	2.4	0.6	0.0	0.0	0.0	2.3	3.2	3.0	1.2	4.0	2.2	149
partenariat enregistré	0.1	0.3	0.1	0.6	1.1	0.8	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.8	1.2	1.1	0.3	0.7	0.4	30
N**	2'443	1'048	3'491	478	187	665	244	82	326	623	123	746	258	817	1'075	4'306	2'437	6'743	6'743
données manquantes	105	37	142	18	4	22	4	4	8	19	3	22	10	35	45	175	96	271	271
Nationalité*																			
CH	79.5	88.7	82.2	72.3	84.7	75.7	72.1	84.1	75.2	84.2	91.7	85.4	90.1	86.4	87.3	79.1	87.4	82.1	5'553
EU	12.7	7.5	11.2	18.6	14.3	17.4	16.0	8.5	14.1	8.5	5.8	8.0	6.3	8.3	7.9	12.7	8.4	11.1	751
autre	7.8	3.8	6.6	9.1	1.1	6.8	11.9	7.3	10.7	7.3	2.5	6.6	3.6	5.3	4.9	8.2	4.3	6.8	461
N**	2'454	1'049	3'503	483	189	672	244	82	326	627	121	748	252	817	1'069	4'322	2'443	6'765	6'765
données manquantes	94	36	130	13	2	15	4	4	8	15	5	20	16	35	51	159	90	249	249

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2008)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	8.2	9.9	8.7	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	1.1	0.0	0.0	0.0	6.6	9.6	8.9	5.2	7.6	6.1	396
périphérie des grands centres	11.1	11.9	11.3	0.9	2.3	1.3	2.9	1.4	2.5	3.1	2.6	3.0	10.5	8.3	8.8	7.9	8.6	8.1	527
villes de moyenne importance	17.0	19.1	17.6	27.9	23.3	26.6	26.7	32.9	28.3	29.1	21.4	27.8	19.8	21.7	21.2	21.1	21.3	21.2	1'372
petites villes	35.5	32.7	34.7	48.6	43.8	47.2	43.2	38.6	42.0	30.8	35.0	31.6	30.4	31.5	31.2	36.8	33.6	35.6	2'307
campagne	28.1	26.3	27.6	22.6	30.7	24.9	26.2	25.7	26.1	36.9	41.0	37.6	32.7	29.0	29.8	29.0	28.9	29.0	1'876
N**	2'360	1'006	3'366	430	176	606	206	70	276	577	117	694	257	822	1'079	4'098	2'380	6'478	6'478
données manquantes	188	79	267	66	15	81	42	16	58	65	9	74	11	30	41	383	153	536	536
Type de ménage (30 derniers jours)*																			
seul-e en ménage	39.8	34.3	38.2	40.8	23.6	36.3	35.8	23.9	32.7	12.7	18.2	13.6	13.2	13.3	13.3	33.4	25.3	30.5	1'704
avec un ou les parents	8.2	4.6	7.1	16.7	16.9	16.8	21.9	22.5	22.1	66.3	47.3	63.2	14.8	5.4	7.6	20.3	10.1	16.6	929
avec enfant(s), sans partenaire	1.9	13.0	5.3	0.5	10.1	3.0	1.0	7.0	2.6	0.7	8.2	1.9	3.3	12.5	10.4	1.5	11.9	5.2	291
avec partenaire, sans enfant	22.0	23.7	22.5	13.6	25.0	16.6	18.9	18.3	18.8	3.9	6.4	4.3	25.8	25.2	25.3	18.1	22.3	19.6	1'093
avec partenaire et enfant(s)	18.6	16.2	17.9	9.5	10.8	9.8	14.4	5.6	12.1	2.0	4.5	2.4	40.7	40.9	40.8	15.9	22.4	18.2	1'018
avec d'autres proches	1.3	1.5	1.4	1.2	1.4	1.3	1.0	4.2	1.8	2.1	1.8	2.1	1.1	0.6	0.7	1.3	1.5	1.4	76
avec des amis (colocation)	2.2	1.5	2.0	3.9	2.0	3.4	1.5	8.5	3.3	2.3	2.7	2.4	0.5	1.3	1.1	2.4	1.9	2.2	123
autre	5.9	5.1	5.7	13.8	10.1	12.9	5.5	9.9	6.6	10.0	10.9	10.1	0.5	0.8	0.7	7.1	4.7	6.3	349
N**	2'014	874	2'888	412	148	560	201	71	272	561	110	671	182	624	806	3'603	1'980	5'583	5'583
données manquantes	534	211	745	84	43	127	47	15	62	81	16	97	86	228	314	878	553	1'431	1'431
Situation de domicile (30 dernier jours)*																			
domicile fixe	93.9	95.2	94.3	82.0	80.0	81.5	88.3	90.4	88.8	91.2	90.1	91.0	97.0	97.4	97.3	92.1	94.2	92.9	5'319
sans domicile fixe	3.8	2.8	3.5	12.2	14.7	12.8	9.3	5.5	8.3	4.5	6.3	4.8	2.5	2.6	2.6	5.1	4.0	4.7	269
institution	2.2	2.0	2.2	5.8	5.3	5.7	2.4	4.1	2.9	4.3	3.6	4.2	0.5	0.0	0.1	2.8	1.8	2.4	140
N**	2'093	889	2'982	411	150	561	205	73	278	557	111	668	197	656	853	3'698	2'030	5'728	5'728
données manquantes	455	196	651	85	41	126	43	13	56	85	15	100	71	196	267	783	503	1286	1'286

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2008)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	33.3	34.5	33.6	46.5	25.5	40.6	35.8	39.7	36.9	65.8	60.0	64.8	14.6	16.4	16.0	38.3	30.1	35.3	1'694
relations temporaires	4.3	4.1	4.3	8.1	10.2	8.7	7.4	11.8	8.6	10.1	10.6	10.2	1.8	1.9	1.9	5.5	4.4	5.1	244
parten. fixe, vivant séparé	13.6	16.5	14.5	15.3	26.3	18.4	15.9	23.5	18.0	15.9	15.3	15.8	9.1	11.1	10.7	14.1	15.7	14.7	703
parten. fixe, mén. commun	48.8	44.9	47.6	30.1	38.0	32.3	40.9	25.0	36.5	8.2	14.1	9.2	74.4	70.6	71.4	42.2	49.8	45.0	2'157
N**	1'749	780	2'529	346	137	483	176	68	244	415	85	500	164	574	738	3'036	1'762	4'798	4'798
données manquantes	799	305	1'104	150	54	204	72	18	90	227	41	268	104	278	382	1'445	771	2'216	2'216
Nombre d'enfants propres*																			
aucun	45.7	36.2	42.7	69.2	60.3	66.7	65.3	60.0	63.9	94.7	81.9	92.6	31.6	26.1	27.3	56.9	39.1	50.4	2'814
1 enfant	18.0	22.3	19.3	17.5	23.1	19.1	20.7	22.9	21.3	3.1	7.6	3.9	15.3	17.4	17.0	15.3	19.9	17.0	950
2 enfants	25.8	27.9	26.4	10.3	10.3	10.3	10.4	14.3	11.4	1.4	8.6	2.6	31.1	35.4	34.5	19.3	26.5	22.0	1'228
3 enfants ou plus	10.6	13.6	11.6	3.0	6.4	4.0	3.6	2.9	3.4	0.8	1.9	1.0	21.9	21.1	21.3	8.4	14.5	10.7	596
N**	1'988	903	2'891	399	156	555	193	70	263	514	105	619	196	683	879	3'523	2'065	5'588	5'588
données manquantes	560	182	742	97	35	132	55	16	71	128	21	149	72	169	241	958	468	1'426	1'426
Nombre d'enfants dans le ménage*																			
aucun	74.2	63.8	70.9	85.0	66.7	79.7	78.9	72.6	77.1	70.9	62.4	69.3	45.2	41.7	42.5	73.3	56.8	67.0	3'375
1 enfant	11.7	19.4	14.1	6.8	22.9	11.5	11.8	17.7	13.5	6.8	10.9	7.6	21.3	20.8	20.9	11.0	19.6	14.3	718
2 enfants	10.1	13.0	11.0	6.5	6.3	6.4	6.8	8.1	7.2	14.3	19.8	15.3	25.0	26.4	26.1	11.1	16.9	13.3	671
3 enfants ou plus	4.1	3.9	4.0	1.7	4.2	2.4	2.5	1.6	2.2	7.9	6.9	7.8	8.5	11.0	10.5	4.6	6.7	5.4	273
N**	1'737	803	2'540	353	144	497	161	62	223	453	101	554	188	662	850	3'122	1'915	5'037	5'037
données manquantes	811	282	1'093	143	47	190	87	24	111	189	25	214	80	190	270	1'359	618	1'977	1'977

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2008)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Plus haute formation achevée*																			
aucune form. achevée	3.6	6.7	4.5	5.4	8.2	6.1	6.5	4.4	6.0	20.5	17.4	20.0	4.3	4.0	4.1	7.1	6.7	7.0	366
scolarité obligatoire	14.2	16.0	14.8	29.4	42.5	32.8	19.5	42.6	25.1	54.0	46.1	52.7	17.7	13.9	14.9	23.7	21.7	23.0	1'205
scolarité complémentaire	3.7	6.8	4.6	4.0	4.8	4.2	3.7	4.4	3.9	4.3	6.1	4.6	0.6	4.8	3.8	3.7	5.8	4.4	228
apprentissage/école prof.	61.3	54.4	59.3	55.4	34.2	50.0	59.5	39.7	54.8	17.8	23.5	18.7	44.5	54.7	52.1	51.4	49.0	50.6	2'651
maturité/diplôme	3.2	3.8	3.4	1.4	6.2	2.6	1.9	1.5	1.8	1.6	4.3	2.0	6.7	5.9	6.1	3.1	5.2	3.8	198
école normale, pédagog.	0.9	2.0	1.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.3	1.8	4.0	3.4	0.7	2.3	1.2	63
form. profession. supérieure	6.0	5.2	5.7	1.4	1.4	1.4	3.7	7.4	4.6	1.2	0.9	1.2	15.2	6.7	8.9	4.9	5.0	5.0	260
école profession. supérieure	0.9	1.5	1.1	1.2	0.0	0.9	1.9	0.0	1.4	0.3	0.0	0.3	1.2	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	49
haute école spécialisée	2.4	1.1	2.0	0.2	0.7	0.3	1.9	0.0	1.4	0.2	0.0	0.1	3.0	2.3	2.5	1.8	1.2	1.6	84
université, haute école	3.7	2.5	3.4	1.4	2.1	1.6	1.4	0.0	1.1	0.2	0.0	0.1	4.9	2.7	3.3	2.7	2.2	2.6	135
N**	1'909	794	2'703	428	146	574	215	68	283	580	115	695	164	475	639	3'505	1'734	5'239	5'239
données manquantes	639	291	930	68	45	113	33	18	51	62	11	73	104	377	481	976	799	1'775	1'775
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	34.1	49.2	38.5	55.7	63.9	58.0	31.0	52.8	36.2	22.3	15.6	21.4	17.4	26.5	24.3	34.5	43.3	37.4	1'058
apprenti-e, stagiaire	2.3	1.2	2.0	2.4	6.2	3.5	0.0	11.1	2.6	22.3	9.4	20.5	1.4	1.8	1.7	4.5	3.0	4.0	114
manceuvre, aide	3.9	3.7	3.8	6.1	3.1	5.2	3.4	0.0	2.6	2.0	3.1	2.2	0.0	2.3	1.7	3.8	3.2	3.6	102
ouvrier/ère formé-e sur le tas	7.6	5.1	6.9	11.8	9.3	11.1	7.8	5.6	7.2	2.5	9.4	3.5	4.3	6.4	5.9	7.8	6.0	7.2	203
ouvrier/ère formé-e (CFC)	15.8	6.4	13.0	11.0	6.2	9.6	25.9	0.0	19.7	13.2	9.4	12.7	13.0	9.1	10.1	15.3	7.1	12.5	355
contremaître-sse	2.3	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	3.9	0.5	3.1	0.9	0.0	0.0	0.0	1.8	0.1	1.3	36
employé-e non qualifié-e	10.6	21.0	13.7	5.3	7.2	5.8	7.8	22.2	11.2	5.6	6.3	5.7	15.9	23.7	21.9	9.7	19.8	13.0	369
empl. qualifié-e, cadre moyen	9.2	7.2	8.6	3.7	0.0	2.6	5.2	2.8	4.6	0.5	3.1	0.9	18.8	15.5	16.3	7.3	8.0	7.6	214
employé-e, cadre supérieur	3.8	0.2	2.7	0.4	1.0	0.6	1.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	8.7	1.8	3.5	3.0	0.6	2.2	63
indépendant-e	8.3	3.7	7.0	0.8	1.0	0.9	7.8	0.0	5.9	1.0	0.0	0.9	15.9	7.8	9.7	6.6	4.2	5.8	164
écolier/ère, étudiant-e	1.2	1.4	1.3	1.2	2.1	1.5	2.6	5.6	3.3	29.9	40.6	31.4	4.3	3.2	3.5	4.9	3.9	4.6	129
autre statut	0.8	0.8	0.8	1.6	0.0	1.2	1.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.4	0.8	0.9	0.8	23
N**	1'151	486	1'637	246	97	343	116	36	152	197	32	229	69	219	288	1'895	935	2'830	2'830
données manquantes	1'397	599	1'996	250	94	344	132	50	182	445	94	539	199	633	832	2'586	1'598	4'184	4'184

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2008)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Source de revenu principale (au cours des 30 derniers jours)*																			
salaire	59.4	40.2	53.7	32.2	23.2	29.7	60.1	40.3	55.3	25.0	27.8	25.4	69.7	57.8	60.8	51.5	44.4	49.0	2'896
économies, épargne	1.4	1.4	1.4	0.7	0.0	0.5	1.0	1.5	1.1	1.4	0.9	1.3	0.9	0.8	0.8	1.3	1.0	1.2	68
rente (AVS, AI ou autre)	14.8	16.7	15.4	11.8	14.6	12.6	9.1	4.5	8.0	3.6	5.2	3.9	14.0	11.7	12.3	12.3	13.9	12.9	760
aide sociale	13.9	16.3	14.6	35.2	39.0	36.2	13.5	28.4	17.1	9.9	13.0	10.5	2.3	2.9	2.7	14.7	13.4	14.3	844
assurance-chômage	5.4	5.2	5.3	9.0	6.1	8.2	5.8	6.0	5.8	2.2	2.6	2.2	1.8	1.2	1.4	5.3	3.5	4.6	274
soutien du/de la partenaire	0.9	15.3	5.2	1.6	6.7	3.0	1.0	7.5	2.5	0.5	3.5	1.0	1.4	20.0	15.4	1.0	14.8	5.8	345
soutien parents/proches/amis	2.9	3.2	3.0	5.1	8.5	6.0	6.3	7.5	6.5	55.3	46.1	53.7	9.5	4.8	6.0	12.1	7.9	10.6	628
deal, combinés	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	1.4	0.0	1.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	8
autres revenus illégaux	0.1	0.1	0.1	1.2	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	10
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
autre	1.2	1.4	1.2	2.5	0.6	2.0	1.9	4.5	2.5	1.8	0.9	1.6	0.5	0.8	0.7	1.5	1.1	1.3	79
N**	2'152	902	3'054	432	164	596	208	67	275	553	115	668	221	664	885	3'827	2'086	5'913	5'913
données manquantes	396	183	579	64	27	91	40	19	59	89	11	100	47	188	235	654	447	1'101	1'101
Taux d'activité principal (au cours des 30 derniers jours)*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	52.7	25.2	44.6	27.3	16.6	24.4	53.0	31.3	47.5	20.9	18.5	20.5	68.0	37.9	45.5	45.3	28.8	39.7	2'391
activité à temps partiel	4.7	18.8	8.9	5.7	10.7	7.1	5.1	6.3	5.4	2.1	8.4	3.2	3.0	27.7	21.5	4.3	19.1	9.4	564
plusieurs activités occas.	1.5	1.0	1.4	1.3	2.4	1.6	2.1	6.3	3.2	1.0	1.7	1.1	0.5	1.2	1.0	1.4	1.4	1.4	86
en formation	3.5	3.1	3.4	2.4	3.6	2.7	3.4	8.8	4.7	54.2	47.9	53.2	7.6	6.2	6.5	12.0	8.2	10.7	644
sans activité prof.	18.1	30.3	21.7	22.9	32.0	25.3	16.9	21.3	18.0	6.9	9.2	7.3	13.7	22.2	20.1	16.5	26.0	19.7	1'189
sans trav., en quête d'emploi	12.7	14.8	13.3	25.3	22.5	24.5	12.3	15.0	13.0	8.2	3.4	7.4	5.6	2.4	3.2	13.0	10.1	12.0	724
sans trav., futur empl. garanti	0.4	0.1	0.3	0.4	0.6	0.5	0.8	0.0	0.6	0.5	0.0	0.4	0.0	0.2	0.1	0.4	0.1	0.3	19
autre	6.5	6.8	6.6	14.7	11.8	13.9	6.4	11.3	7.6	6.1	10.9	6.9	1.5	2.2	2.0	7.1	6.2	6.8	409
N**	2'213	928	3'141	455	169	624	236	80	316	607	119	726	197	585	782	3'970	2'056	6'026	6'026
données manquantes	335	157	492	41	22	63	12	6	18	35	7	42	71	267	338	511	477	988	988

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2008)

	Patient-e-s: problème principale									Proches			Toutes prises en charge							
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								%
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Revenu mensuel net (6 derniers mois)*																				
aucun revenu	21.7	39.5	26.7	32.6	28.3	31.6	29.4	30.0	29.6	45.5	50.0	46.2	23.5	16.5	17.7	26.5	33.1	28.4	440	
moins de 1000 fr.	5.6	3.3	4.9	9.2	13.2	10.1	3.9	15.0	7.0	29.8	18.2	28.0	5.9	5.1	5.2	8.9	6.9	8.3	129	
de 1001 à 2000 fr.	8.3	6.2	7.7	13.6	20.8	15.2	7.8	10.0	8.5	9.1	9.1	9.1	11.8	11.4	11.5	9.0	9.8	9.2	143	
de 2001 à 3000 fr.	12.5	20.6	14.8	19.0	22.6	19.8	17.6	15.0	16.9	2.5	0.0	2.1	5.9	16.5	14.6	12.3	18.4	14.1	218	
de 3001 à 4000 fr.	11.9	12.3	12.0	13.6	13.2	13.5	7.8	20.0	11.3	5.0	4.5	4.9	5.9	20.3	17.7	10.8	14.0	11.7	181	
de 4001 à 5000 fr.	15.9	9.5	14.1	7.1	1.9	5.9	21.6	5.0	16.9	6.6	18.2	8.4	17.6	16.5	16.7	14.0	9.8	12.8	198	
de 5001 à 6000 fr.	12.5	3.7	10.1	4.3	0.0	3.4	9.8	5.0	8.5	0.8	0.0	0.7	5.9	6.3	6.3	9.8	3.6	8.0	123	
de 6001 à 8000 fr.	7.9	4.1	6.9	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	5.9	6.3	6.3	5.7	3.8	5.2	80	
de 8001 à 10 000 fr.	2.1	0.8	1.7	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	2.1	1.6	0.4	1.3	20	
de 10 001 à 15 000 fr.	1.6	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	1.0	1.2	0.0	0.8	13	
plus de 15 000 fr.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.0	0.1	0.2	0.1	2	
N**	630	243	873	184	53	237	51	20	71	121	22	143	17	79	96	1'097	450	1'547	1'547	
<i>données manquantes</i>	1'918	842	2'760	312	138	450	197	66	263	521	104	625	251	773	1'024	3'384	2'083	5'467	5'467	
Dettes*																				
aucune dette	64.1	77.2	67.8	32.9	49.3	36.8	37.0	54.1	41.9	86.3	90.8	87.0	87.8	89.3	88.9	63.6	78.4	68.3	1'763	
jusqu'à 5000 fr.	5.5	7.5	6.1	16.0	13.4	15.4	12.0	27.0	16.3	5.7	1.5	5.0	2.7	3.1	3.0	7.2	6.7	7.1	182	
de 5001 à 10 000 fr.	7.2	7.0	7.1	12.2	11.9	12.1	17.4	2.7	13.2	3.3	3.1	3.2	1.4	3.1	2.7	7.2	5.7	6.7	173	
de 10 001 à 25 000 fr.	8.2	5.6	7.4	21.6	16.4	20.4	13.0	8.1	11.6	2.7	0.0	2.2	1.4	2.7	2.3	9.0	5.5	7.9	204	
de 25 001 à 50 000 fr.	6.3	0.8	4.7	8.9	6.0	8.2	5.4	5.4	5.4	1.8	3.1	2.0	4.1	0.9	1.7	5.6	1.8	4.4	113	
de 50 001 à 100 000 fr.	4.2	0.8	3.2	6.1	3.0	5.4	9.8	2.7	7.8	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.7	3.9	1.0	2.9	76	
plus de 100 000 fr.	4.5	1.1	3.6	2.3	0.0	1.8	5.4	0.0	3.9	0.3	1.5	0.5	0.0	0.9	0.7	3.5	0.9	2.7	69	
N**	905	359	1'264	213	67	280	92	37	129	336	65	401	74	224	298	1'760	820	2'580	2'580	
<i>données manquantes</i>	1'643	726	2'369	283	124	407	156	49	205	306	61	367	194	628	822	2'721	1'713	4'434	4'434	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2008)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Emprisonnement ou détention préventive*																
aucun-e	87.9	96.7	90.6	51.5	73.6	57.2	62.5	85.0	67.9	92.7	100.0	93.8	82.2	93.9	85.5	1'779
emprisonnement	6.3	1.2	4.8	20.1	11.1	17.8	21.9	5.0	17.9	1.3	0.0	1.1	8.5	2.4	6.7	140
détention préventive	3.4	1.6	2.9	13.7	8.3	12.3	9.4	5.0	8.3	4.6	0.0	3.9	5.0	2.4	4.3	89
emprisonnement et détention préventive	2.4	0.5	1.8	14.7	6.9	12.7	6.3	5.0	6.0	1.3	0.0	1.1	4.3	1.3	3.5	72
N**	978	425	1'403	204	72	276	64	20	84	151	27	178	1'487	593	2'080	2'080
données manquantes	1'570	660	2'230	292	119	411	184	66	250	491	99	590	2'726	1'088	3'814	3'814
Durée totale de détention***																
jusqu'à 1 mois	28.9	50.0	30.6	24.7	30.8	25.6	26.7	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	25.9	41.7	27.6	61
> 1 à 2 mois	7.8	0.0	7.1	7.8	15.4	8.9	26.7	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	9.6	8.3	9.5	21
> 2 à 6 mois	33.3	37.5	33.7	27.3	38.5	28.9	13.3	33.3	16.7	50.0	0.0	50.0	28.4	37.5	29.4	64
> 6 à 12 mois	10.0	12.5	10.2	16.9	7.7	15.6	13.3	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	12.7	8.3	12.2	27
plus de 1 an	20.0	0.0	18.4	23.4	7.7	21.1	20.0	0.0	16.7	50.0	0.0	50.0	23.4	4.2	21.3	47
N**	90	8	98	76	13	89	15	3	18	4	0	4	196	24	220	220
données manquantes	28	6	34	23	6	29	9	0	9	7	0	7	69	12	81	81

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de détention. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T9 Instance d'envoi principale et secondaire, selon le problème principal et chez les proches (2008)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge				N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							%	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Instance d'envoi principale*																				
initiative personnelle	30.5	39.1	33.1	50.6	45.7	49.3	34.3	31.3	33.5	15.4	37.1	19.0	64.3	72.4	70.5	33.1	51.2	39.6	2'659	
conjoint-e/partenaire	5.3	3.0	4.6	2.9	3.3	3.0	10.5	3.6	8.7	2.4	1.6	2.3	5.9	2.7	3.5	4.8	2.8	4.1	273	
famille	3.9	4.9	4.2	4.8	4.3	4.6	11.7	16.9	13.0	11.9	6.5	11.0	3.5	4.2	4.1	5.9	5.6	5.8	388	
ami-e-s, collègues, connaiss.	1.8	2.8	2.1	3.5	2.7	3.3	2.5	1.2	2.2	1.4	1.6	1.5	3.1	4.4	4.1	2.1	3.2	2.5	168	
instit. ambulatoire spécialisée	1.9	2.3	2.0	3.9	3.3	3.7	0.4	6.0	1.9	0.6	0.0	0.5	1.6	1.2	1.3	1.8	1.9	1.8	121	
instit. résidentielle spécialisée	4.7	5.6	4.9	2.7	6.5	3.7	5.4	2.4	4.7	1.1	1.6	1.2	0.8	0.9	0.9	3.6	3.4	3.5	237	
cabinet médical	8.0	9.2	8.4	7.0	10.3	7.9	5.0	10.8	6.5	2.2	3.2	2.4	3.9	3.1	3.3	6.5	6.9	6.6	444	
hôpital, clinique	11.3	15.5	12.5	3.9	2.2	3.4	4.2	7.2	5.0	2.5	1.6	2.4	2.0	1.5	1.6	7.8	8.0	7.9	529	
service sociaux	5.8	6.3	6.0	7.4	11.4	8.5	5.4	4.8	5.3	5.1	4.0	4.9	4.7	2.5	3.0	5.9	5.1	5.6	376	
mes. pénale/administrative	17.3	4.4	13.5	9.7	6.0	8.7	14.6	7.2	12.7	46.7	33.9	44.5	4.3	2.4	2.8	19.0	5.3	14.1	946	
employeur/se	5.2	2.6	4.4	1.2	1.6	1.3	2.1	0.0	1.6	2.4	0.0	2.0	2.7	0.1	0.8	3.9	1.6	3.0	204	
enseignant-e	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1.9	4.0	2.3	0.8	1.2	1.1	0.6	1.0	0.7	50	
autre	4.2	3.9	4.1	2.3	2.7	2.4	3.3	8.4	4.7	6.2	4.8	6.0	2.4	3.2	3.0	5.1	4.1	4.7	318	
N**	2'422	1'038	3'460	484	184	668	239	83	322	628	124	752	255	801	1'056	4'301	2'412	6'713	6'713	
données manquantes	126	47	173	12	7	19	9	3	12	14	2	16	13	51	64	180	121	301	301	
Instance d'envoi secondaire***																				
initiative personnelle	27.7	21.1	25.9	24.0	28.9	25.3	31.1	44.8	34.1	20.3	12.5	19.2	12.2	12.2	12.2	25.8	19.3	23.7	727	
conjoint-e/partenaire	8.5	8.2	8.4	3.1	6.7	4.1	6.8	6.9	6.8	1.6	3.1	1.9	6.1	6.8	6.7	6.8	7.0	6.9	211	
famille	4.5	5.9	4.9	6.3	8.9	7.0	6.8	13.8	8.3	7.1	9.4	7.5	9.8	8.3	8.6	5.2	7.0	5.8	178	
ami-e-s, collègues, connaiss.	1.8	3.1	2.1	2.4	5.6	3.2	3.9	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	2.4	5.0	4.4	1.9	3.7	2.5	76	
instit. ambulatoire spécialisée	1.1	1.8	1.3	3.1	3.3	3.2	0.0	3.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.8	1.1	1.6	1.2	38	
instit. résidentielle spécialisée	2.8	2.9	2.8	2.4	2.2	2.3	1.9	0.0	1.5	0.0	3.1	0.5	0.0	0.7	0.6	2.2	2.0	2.1	66	
cabinet médical	5.5	5.9	5.6	13.4	12.2	13.1	4.9	3.4	4.5	1.1	12.5	2.8	1.2	3.6	3.1	5.5	6.3	5.8	177	
hôpital, clinique	3.7	3.9	3.7	2.4	1.1	2.0	2.9	6.9	3.8	1.1	0.0	0.9	0.0	1.1	0.8	2.9	2.5	2.8	86	
service sociaux	1.5	2.7	1.8	5.1	3.3	4.7	3.9	10.3	5.3	0.5	3.1	0.9	2.4	2.2	2.2	2.0	2.8	2.3	70	
mes. pénale/administrative	4.0	1.8	3.4	2.8	0.0	2.0	8.7	0.0	6.8	0.5	0.0	0.5	1.2	0.7	0.8	3.6	1.1	2.8	86	
employeur/se	3.2	1.2	2.7	1.2	0.0	0.9	1.0	0.0	0.8	1.6	3.1	1.9	1.2	0.0	0.3	2.4	0.7	1.9	57	
enseignant-e	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	7	
autre	2.4	3.5	2.7	1.2	2.2	1.5	2.9	10.3	4.5	2.7	6.3	3.3	1.2	3.6	3.1	2.4	3.7	2.8	87	
aucune	42.5	48.0	44.0	44.5	40.0	43.3	45.6	31.0	42.4	63.2	56.3	62.1	63.4	60.1	60.8	46.8	51.4	48.3	1'483	
N**	1'312	488	1'800	254	90	344	103	29	132	182	32	214	82	278	360	2'080	990	3'070	3'070	
données manquantes	1'236	597	1'833	242	101	343	145	57	202	460	94	554	186	574	760	2'401	1'543	3'944	3'944	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T10 Type d'aide attendue à l'admission et statut légal de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2008)

Type d'aide attendue*	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
problèmes addictifs	80.3	88.6	82.6	89.5	84.3	88.2	83.3	89.2	84.7	72.1	78.4	73.0	66.0	51.7	55.0	78.4	76.9	77.9	2'695
problèmes somatiques	5.2	5.3	5.2	5.9	7.8	6.4	0.8	2.7	1.3	0.9	0.0	0.8	2.1	1.9	2.0	4.3	4.3	4.3	150
problèmes psychiques	18.3	24.8	20.1	20.2	25.5	21.6	14.2	16.2	14.6	7.9	16.2	9.1	11.7	15.6	14.7	16.7	21.3	18.2	630
problèmes relationnels	14.5	20.7	16.3	10.8	17.6	12.6	18.3	18.9	18.5	4.7	10.8	5.6	36.2	42.5	41.1	13.9	25.4	17.7	614
problèmes familiaux	8.4	16.0	10.5	11.1	13.7	11.8	11.7	21.6	14.0	7.4	21.6	9.5	38.3	48.3	46.0	10.2	24.7	15.0	520
problèmes financiers	6.3	7.4	6.6	19.9	19.6	19.8	15.0	13.5	14.6	4.7	0.0	4.0	4.3	7.3	6.6	8.4	8.3	8.4	290
problèmes professionnels, de formatic	13.4	12.0	13.0	17.1	12.7	15.9	14.2	18.9	15.3	12.1	13.5	12.3	6.4	4.4	4.9	13.1	9.8	12.0	415
problèmes de logement	3.6	4.0	3.7	8.7	10.8	9.3	5.0	5.4	5.1	1.9	0.0	1.6	2.1	4.1	3.7	4.2	4.3	4.2	145
problèmes de violence	1.9	2.6	2.1	1.4	3.9	2.1	3.3	0.0	2.5	0.0	2.7	0.4	2.1	6.7	5.6	1.6	3.7	2.3	81
problèmes juridiques	8.9	3.9	7.5	12.2	3.9	10.0	15.0	8.1	13.4	11.2	5.4	10.3	4.3	3.8	3.9	9.6	3.8	7.7	266
autre(s)	2.2	0.5	1.7	2.4	2.9	2.6	2.5	2.7	2.5	3.7	2.7	3.6	3.2	2.9	2.9	4.3	2.4	3.7	127
aucune attente	11.5	6.2	10.0	4.2	5.9	4.6	7.5	5.4	7.0	15.3	10.8	14.7	0.0	0.6	0.5	10.2	4.7	8.4	289
N**	1'435	569	2'004	287	102	389	120	37	157	215	37	252	94	315	409	2'311	1'150	3'461	3'461
données manquantes	1'113	516	1'629	209	89	298	128	49	177	427	89	516	174	537	711	2'170	1'383	3'553	3'553
Statut légal du traitement/de la prise en charge*																			
suspension de la procédure, renoncement à infliger une peine, réprimande (art 19a ch. 2 Lstup)	0.0	0.2	0.1	1.2	1.1	1.2	0.0	0.0	0.0	8.9	10.7	9.2	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.8	25
abandon poursuite pénale si soumis à des mesures de protection contrôlées par un médecin (art 19a ch. 3 Lstup)	0.3	0.0	0.2	0.4	0.0	0.3	1.0	0.0	0.8	1.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	8
mesures concernant les délinquants anormaux (art 43 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
traitement des alcooliques et des toxicomanes (art 44 CPS)	3.1	1.4	2.7	1.6	1.1	1.5	1.9	0.0	1.5	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.3	0.8	1.8	56
irresponsabilité (art 10 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
responsabilité restreinte (art 11 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
exécution de mesures pr toxicomanes dans une maison d'éducation au travail (art 2a ord. 3 rel. au CPS RS 311.03)	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.5	8.9	3.6	8.2	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.8	25
autre	9.9	6.0	8.9	5.5	3.4	5.0	14.6	13.8	14.4	17.9	10.7	16.9	1.2	1.1	1.1	10.2	4.5	8.3	254
aucune mesure (traitement volontaire)	86.3	92.1	87.9	91.4	94.3	92.1	80.6	86.2	81.8	62.6	78.6	64.7	98.8	98.9	98.9	85.1	94.1	88.0	2'683
N**	1'310	496	1'806	256	87	343	103	29	132	179	28	207	85	276	361	2'068	982	3'050	3'050
données manquantes	1'238	589	1'827	240	104	344	145	57	202	463	98	561	183	576	759	2'413	1'551	3'964	3'964

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T11 Traitements/prises en charge avant l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2008)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Prises en charge antérieures*																			
non	46.8	38.4	44.3	18.4	15.8	17.7	51.9	51.4	51.7	78.7	76.0	78.3	70.7	67.4	68.2	51.0	49.6	50.5	2'960
oui	53.2	61.6	55.7	81.6	84.2	82.3	48.1	48.6	48.3	21.3	24.0	21.7	29.3	32.6	31.8	49.0	50.4	49.5	2'898
N**	2'161	906	3'067	435	165	600	212	74	286	555	104	659	198	642	840	3'808	2'050	5'858	5'858
<i>données manquantes</i>	387	179	566	61	26	87	36	12	48	87	22	109	70	210	280	673	483	1'156	1'156
Type de prise en charge***																			
traitement avec prescript. d'héroïne	1.3	1.2	1.3	5.7	2.8	5.0	1.3	0.0	0.9	1.1	0.0	0.9	5.0	1.4	2.2	2.3	1.3	1.9	47
substitution (méthadone, subutex)	4.6	4.3	4.5	67.6	75.7	69.7	30.4	34.4	31.5	4.3	9.1	5.2	5.0	2.1	2.8	18.7	14.2	17.1	414
autre tt médicam. des dépendances	9.9	9.6	9.8	10.8	5.6	9.4	3.8	9.4	5.4	0.0	4.5	0.9	5.0	1.4	2.2	9.2	7.6	8.6	209
prise en charge ambulatoire	66.5	66.1	66.3	52.7	52.3	52.6	70.9	78.1	73.0	79.8	81.8	80.2	80.0	84.4	83.4	65.4	68.7	66.5	1'609
traitement résidentiel	47.3	53.0	49.2	40.5	40.2	40.4	43.0	34.4	40.5	18.1	27.3	19.8	22.5	10.6	13.3	42.8	41.5	42.3	1'024
sevrage	40.0	44.8	41.6	49.0	57.0	51.1	43.0	46.9	44.1	14.9	13.6	14.7	10.0	9.9	9.9	38.8	37.6	38.4	928
groupe d'entraide ou d'auto-support	6.6	9.4	7.5	3.7	3.7	3.7	1.3	0.0	0.9	1.1	0.0	0.9	5.0	2.1	2.8	5.3	6.4	5.7	138
autre(s)	3.6	4.1	3.8	2.0	2.8	2.2	1.3	3.1	1.8	4.3	0.0	3.4	2.5	6.4	5.5	3.3	4.5	3.7	90
N**	990	489	1'479	296	107	403	79	32	111	94	22	116	40	141	181	1'572	846	2'418	2'418
<i>données manquantes</i>	159	69	228	59	32	91	23	4	27	24	3	27	18	68	86	293	187	480	480

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de prise en charge antérieure. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T12 Substitution et autre traitement/prise en charge à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2008)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution ou prescription d'héroïne*																
non	97.9	98.2	98.0	52.4	43.8	50.2	87.7	81.7	86.0	99.6	98.0	99.3	91.9	91.2	91.7	3'933
oui	2.1	1.8	2.0	47.6	56.2	49.8	12.3	18.3	14.0	0.4	2.0	0.7	8.1	8.8	8.3	357
N**	1'849	763	2'612	374	130	504	162	60	222	508	98	606	3'109	1'181	4'290	4'290
données manquantes	699	322	1'021	122	61	183	86	26	112	134	28	162	1'104	500	1'604	1'604
Type de substitution***																
héroïne	7.9	16.7	10.0	4.6	2.8	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.1	4.3	15
méthadone	78.9	75.0	78.0	85.1	93.1	87.4	89.5	100.0	93.1	100.0	100.0	100.0	84.3	91.8	86.5	300
autres opiacés	2.6	0.0	2.0	7.4	1.4	5.7	10.5	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	5.5	19
autres substances	10.5	8.3	10.0	2.9	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.1	3.7	13
N**	38	12	50	175	72	247	19	10	29	2	1	3	249	98	347	347
données manquantes	0	2	2	3	1	4	1	1	2	0	1	1	4	6	10	10
Autre prise en charge parallèle*																
non	88.0	82.1	86.4	81.7	78.8	81.0	84.6	76.2	82.6	94.4	97.2	94.8	88.0	82.5	86.6	2'675
oui	12.0	17.9	13.6	18.3	21.2	19.0	15.4	23.8	17.4	5.6	2.8	5.2	12.0	17.5	13.4	415
N**	1'459	565	2'024	301	104	405	130	42	172	234	36	270	2'272	818	3'090	3'090
données manquantes	1'089	520	1'609	195	87	282	118	44	162	408	90	498	1'941	863	2'804	2'804
Type de la prise en charge parallèle****																
prise en charge ambulatoire	58.4	63.4	60.2	65.5	68.2	66.2	50.0	50.0	50.0	92.3	100.0	92.9	60.7	63.6	61.7	255
traitement résidentiel	21.4	15.8	19.3	20.0	13.6	18.2	10.0	30.0	16.7	0.0	0.0	0.0	19.6	16.8	18.6	77
groupe d'entraide ou d'auto-support	1.2	4.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.8	1.5	6
autre(s)	26.6	21.8	24.8	18.2	18.2	18.2	40.0	30.0	36.7	7.7	0.0	7.1	24.8	21.7	23.7	98
N**	173	101	274	55	22	77	20	10	30	13	1	14	270	143	413	413
données manquantes	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de substitution. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pris-e-s en charge parallèlement. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T13a Admission suite à une cure de sevrage, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2008)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Admission suite à une cure de sevrage*																
non	75.9	76.0	76.0	84.9	92.1	86.8	87.0	89.7	87.6	94.9	93.1	94.6	80.6	80.6	80.6	2'079
sevrage dans la même institution	1.7	2.3	1.9	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.8	1.3	33
sevrage dans une autre institution	22.4	21.7	22.2	15.1	6.7	12.9	13.0	10.3	12.4	5.1	6.9	5.4	18.3	17.7	18.1	468
N**	1'239	470	1'709	251	89	340	100	29	129	175	29	204	1'901	679	2'580	2'580
<i>données manquantes</i>	1'309	615	1'924	245	102	347	148	57	205	467	97	564	2'312	1'002	3'314	3'314

T13b Fréquence des sevrages sans aide professionnelle avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2008)

Fréq. sevrages sans accompagnement*	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%					
jamais	62.8	56.7	61.2	19.9	26.4	21.6	54.2	45.5	51.9	74.5	75.0	74.6	58.5	54.7	57.5	854
une fois	9.8	9.0	9.6	10.3	9.4	10.1	10.2	13.6	11.1	8.2	0.0	7.1	9.5	8.5	9.2	137
deux ou trois fois	9.2	7.8	8.8	19.9	26.4	21.6	10.2	13.6	11.1	9.1	6.3	8.7	10.5	10.1	10.4	154
plus de trois fois	18.2	26.5	20.4	50.0	37.7	46.7	25.4	27.3	25.9	8.2	18.8	9.5	21.6	26.7	22.9	340
N**	716	268	984	146	53	199	59	22	81	110	16	126	1'099	386	1'485	1'485
<i>données manquantes</i>	1'832	817	2'649	350	138	488	189	64	253	532	110	642	3'114	1'295	4'409	4'409

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T14 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2008)

Tous patients et patientes										
Problème principal*	Hommes	Femmes	Total	N		Hommes	Femmes	Total	N	
	%	%	%			%	%	%		
alcool	60.5	64.5	61.6	3'633	alcool	60.5	64.5	61.6	3'633	
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.6	0.2	0.5	28	cocktails	0.6	0.2	0.5	28	
héroïne	10.2	9.6	10.0	592	opiacés	11.2	11.1	11.2	659	
méthadone	0.8	1.2	0.9	55						
autres opiacés	0.1	0.4	0.2	12						
cocaïne	5.9	5.1	5.6	332	cocaïne et dérivés	5.9	5.1	5.7	334	
crack, freebase	0.0	0.1	0.0	2						
amphétamines	0.4	0.4	0.4	23	stimulants	0.5	0.9	0.6	37	
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.1	0.2	0.2	10						
autres stimulants	0.0	0.2	0.1	4						
barbituriques	0.1	0.1	0.1	4	médicaments	0.5	1.2	0.7	42	
benzodiazépines	0.4	0.8	0.5	28						
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.4	0.2	10						
LSD	0.0	0.1	0.0	2	hallucinogènes	0.0	0.1	0.1	3	
autres hallucinogènes	0.0	0.1	0.0	1						
cannabis	15.2	7.5	13.0	768	cannabis	15.2	7.5	13.0	768	
tabac	1.4	3.1	1.9	112	tabac	1.4	3.1	1.9	112	
substances volatiles	0.1	0.1	0.1	4	autres substances	0.6	0.6	0.6	35	
autre substance	0.5	0.5	0.5	31						
jeu pathologique	2.5	1.4	2.2	128	troubles assimilables à une addiction	3.6	5.5	4.1	243	
troubles alimentaires	0.1	3.2	1.0	56						
autres troubles assimilables à une addiction	1.0	1.0	1.0	59						
N**	4'213	1'681	5'894	5'894		4'213	1'681	5'894	5'894	
<i>données manquantes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2008), hommes

Patientes: principale substance posant problème										
Hommes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	29.8	64.7	30.0	38.2	38.9	11.8	0.0	26.9	12.8	33.3
1 jour par semaine ou moins	8.4	17.6	10.4	17.2	11.1	5.9	100.0	18.5	0.0	33.3
2 à 3 jours par semaine	13.0	0.0	10.1	19.9	27.8	5.9	0.0	19.4	4.3	0.0
4 à 6 jours par semaine	12.0	5.9	9.0	8.6	11.1	5.9	0.0	6.4	6.4	11.1
une fois par jour	5.4	0.0	11.7	2.2	5.6	5.9	0.0	7.1	0.0	11.1
plusieurs fois par jour	31.4	11.8	28.9	14.0	5.6	64.7	0.0	21.8	76.6	11.1
N**	1'744	17	367	186	18	17	1	547	47	9
<i>données manquantes</i>	804	7	105	62	4	4	0	95	13	16
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	9.2	6.3	17.1	13.6	15.0	7.1	0.0	7.0	2.2	25.0
1 jour par semaine ou moins	7.8	43.8	14.4	21.1	20.0	14.3	0.0	22.6	0.0	6.3
2 à 3 jours par semaine	17.5	0.0	14.7	27.2	25.0	21.4	100.0	20.6	4.3	12.5
4 à 6 jours par semaine	15.0	12.5	8.4	13.6	5.0	0.0	0.0	10.2	4.3	18.8
une fois par jour	7.1	6.3	15.7	6.1	20.0	14.3	0.0	7.2	0.0	12.5
plusieurs fois par jour	43.4	31.3	29.8	18.4	15.0	42.9	0.0	32.3	89.1	25.0
N**	1'543	16	299	147	20	14	1	470	46	16
<i>données manquantes</i>	1'005	8	173	101	2	7	0	172	14	9

T15.1b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2008), hommes

Patients: problème principal			
Hommes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	63.2	0.0	28.6
1 jour par semaine ou moins	14.9	0.0	19.0
2 à 3 jours par semaine	4.6	0.0	4.8
4 à 6 jours par semaine	3.4	0.0	0.0
1 fois par jour	4.6	0.0	4.8
plusieurs fois par jour	9.2	100.0	42.9
N**	87	1	21
<i>données manquantes</i>	18	2	21
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	50.0	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	27.9	0.0	10.0
2 à 3 jours par semaine	11.8	0.0	15.0
4 à 6 jours par semaine	1.5	0.0	5.0
1 fois par jour	2.9	0.0	10.0
plusieurs fois par jour	5.9	100.0	60.0
N**	68	1	20
<i>données manquantes</i>	37	2	22

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.2a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2008), femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	24.3	0.0	30.8	27.5	38.5	21.4	0.0	18.2	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	10.1	0.0	7.5	15.9	23.1	14.3	100.0	16.4	0.0	0.0
2 à 3 jours par semaine	14.6	33.3	5.8	31.9	23.1	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0
4 à 6 jours par semaine	13.4	33.3	10.8	7.2	7.7	0.0	0.0	6.4	7.7	0.0
une fois par jour	6.4	33.3	17.5	7.2	7.7	14.3	0.0	8.2	2.6	0.0
plusieurs fois par jour	31.1	0.0	27.5	10.1	0.0	50.0	0.0	35.5	89.7	0.0
N**	732	3	120	69	13	14	1	110	39	0
<i>données manquantes</i>	353	1	67	17	2	7	1	16	13	10
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	6.3	0.0	19.6	15.1	15.4	0.0	0.0	3.1	2.6	0.0
1 jour par semaine ou moins	9.7	33.3	9.3	18.9	30.8	8.3	100.0	24.0	2.6	20.0
2 à 3 jours par semaine	17.9	33.3	10.3	32.1	23.1	0.0	0.0	10.4	0.0	20.0
4 à 6 jours par semaine	15.7	0.0	12.4	15.1	30.8	0.0	0.0	7.3	2.6	20.0
une fois par jour	8.0	33.3	11.3	9.4	0.0	8.3	0.0	6.3	2.6	0.0
plusieurs fois par jour	42.3	0.0	37.1	9.4	0.0	83.3	0.0	49.0	89.5	40.0
N**	648	3	97	53	13	12	1	96	38	5
<i>données manquantes</i>	437	1	90	33	2	9	1	30	14	5

T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2008), femmes

Patients: problème principal			
Femmes	Jeux pathologiques	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	55.0	4.3	0.0
1 jour par semaine ou moins	15.0	4.3	28.6
2 à 3 jours par semaine	0.0	21.7	0.0
4 à 6 jours par semaine	20.0	8.7	28.6
1 fois par jour	0.0	13.0	28.6
plusieurs fois par jour	10.0	47.8	14.3
N**	20	23	7
<i>données manquantes</i>	3	30	10
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	60.0	5.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	20.0	10.0	28.6
2 à 3 jours par semaine	0.0	15.0	28.6
4 à 6 jours par semaine	10.0	10.0	0.0
1 fois par jour	10.0	15.0	28.6
plusieurs fois par jour	0.0	45.0	14.3
N**	10	20	7
<i>données manquantes</i>	13	33	10

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.3a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2008), hommes & femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Hommes & femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	28.2	55.0	30.2	35.3	38.7	16.1	0.0	25.4	7.0	33.3
1 jour par semaine ou moins	8.9	15.0	9.7	16.9	16.1	9.7	100.0	18.1	0.0	33.3
2 à 3 jours par semaine	13.4	5.0	9.0	23.1	25.8	3.2	0.0	18.7	2.3	0.0
4 à 6 jours par semaine	12.4	10.0	9.4	8.2	9.7	3.2	0.0	6.4	7.0	11.1
une fois par jour	5.7	5.0	13.1	3.5	6.5	9.7	0.0	7.3	1.2	11.1
plusieurs fois par jour	31.3	10.0	28.5	12.9	3.2	58.1	0.0	24.0	82.6	11.1
N**	2'476	20	487	255	31	31	2	657	86	9
données manquantes	1'157	8	172	79	6	11	1	111	26	26
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	8.4	5.3	17.7	14.0	15.2	3.8	0.0	6.4	2.4	19.0
1 jour par semaine ou moins	8.4	42.1	13.1	20.5	24.2	11.5	50.0	22.8	1.2	9.5
2 à 3 jours par semaine	17.6	5.3	13.6	28.5	24.2	11.5	50.0	18.9	2.4	14.3
4 à 6 jours par semaine	15.2	10.5	9.3	14.0	15.2	0.0	0.0	9.7	3.6	19.0
une fois par jour	7.4	10.5	14.6	7.0	12.1	11.5	0.0	7.1	1.2	9.5
plusieurs fois par jour	43.1	26.3	31.6	16.0	9.1	61.5	0.0	35.2	89.3	28.6
N**	2'191	19	396	200	33	26	2	566	84	21
données manquantes	1'442	9	263	134	4	16	1	202	28	14

T15.3b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2008), hommes & femmes

Patients: problème principal			
Hommes & femmes	Jeux pathologiques	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	61.7	4.2	21.4
1 jour par semaine ou moins	15.0	4.2	21.4
2 à 3 jours par semaine	3.7	20.8	3.6
4 à 6 jours par semaine	6.5	8.3	7.1
1 fois par jour	3.7	12.5	10.7
plusieurs fois par jour	9.3	50.0	35.7
N**	107	24	28
données manquantes	21	32	31
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	51.3	4.8	0.0
1 jour par semaine ou moins	26.9	9.5	14.8
2 à 3 jours par semaine	10.3	14.3	18.5
4 à 6 jours par semaine	2.6	9.5	3.7
1 fois par jour	3.8	14.3	14.8
plusieurs fois par jour	5.1	47.6	48.1
N**	78	21	27
données manquantes	50	35	32

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T16.1a Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2008), hommes

Patients: principale substance posant problème										
Hommes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	16.0	18.5	21.3	22.5	20.5	22.6	23.0	14.7	15.2	16.4
écart-type	3.7	5.1	5.8	6.9	4.3	5.8	.	2.0	2.7	4.3
1er quartile	14.0	14.0	18.0	18.0	18.0	17.0	23.0	13.5	13.0	15.0
valeur médiane	16.0	17.0	20.0	20.0	18.0	22.0	23.0	15.0	15.0	16.0
3e quartile	17.0	20.0	24.0	26.0	25.0	28.0	23.0	16.0	16.0	17.0
N*	1'051	13	311	160	17	10	1	488	33	14
données manquantes	1'497	11	161	88	5	11	0	154	27	11
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	22.2	19.8	22.5	24.7	20.9	24.4	23.0	15.9	16.9	21.0
écart-type	7.9	5.3	6.0	7.5	4.4	6.6	.	2.8	2.8	8.6
1er quartile	17.0	16.0	18.0	19.0	18.0	18.0	23.0	15.0	15.0	15.0
valeur médiane	20.0	20.0	21.0	23.0	19.0	24.0	23.0	15.0	16.0	18.0
3e quartile	25.0	23.0	25.0	29.0	25.0	30.0	23.0	17.0	18.0	25.0
N*	1'104	13	298	149	15	11	1	423	36	11
données manquantes	1'444	11	174	99	7	10	0	219	24	14
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	31.1	21.2	22.9	27.1	21.5	27.3	.	16.8	20.6	23.8
écart-type	11.6	5.1	5.8	8.3	4.6	8.6	.	3.3	9.1	9.4
1er quartile	21.0	18.0	19.0	20.0	18.0	20.0	.	15.0	15.0	18.0
valeur médiane	30.0	20.0	22.0	25.0	20.0	30.0	.	16.0	18.0	18.0
3e quartile	40.0	23.0	25.0	33.0	25.0	33.0	.	17.0	22.0	29.0
N*	881	13	207	99	11	9	0	328	35	5
données manquantes	1'667	11	265	149	11	12	1	314	25	20
Période de latence (en années)**										
moyenne	24.0	16.3	9.4	8.2	4.8	13.7	7.4	4.6	14.3	8.9
écart-type	12.7	8.9	9.3	6.9	3.8	.	.	5.6	14.6	11.5
1er quartile	14.0	7.0	3.0	3.0	2.1	13.7	7.4	1.4	3.4	0.9
valeur médiane	23.3	17.3	5.9	5.8	3.8	13.7	7.4	2.8	6.0	4.9
3e quartile	33.0	24.7	12.8	11.1	7.9	13.7	7.4	5.2	30.0	9.4
N*	492	3	57	86	10	1	1	380	22	7
données manquantes	520	2	18	24	0	1	0	57	14	4

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1b Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2008), femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	17.5	22.0	20.3	19.0	19.8	24.4	18.0	15.0	14.3	19.3
écart-type	5.8	7.1	6.3	4.2	6.0	7.9	.	2.9	3.0	8.0
1er quartile	15.0	17.0	16.0	16.0	16.5	17.0	18.0	13.0	12.0	12.5
valeur médiane	16.0	22.0	18.0	18.0	18.0	21.0	18.0	14.0	14.0	18.5
3e quartile	19.0	27.0	23.0	21.0	21.5	34.0	18.0	16.0	17.0	26.0
N*	415	2	111	63	12	7	1	95	18	4
données manquantes	670	2	76	23	3	14	1	31	34	6
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	27.5	22.5	21.3	21.3	20.4	24.6	.	15.9	16.8	20.5
écart-type	11.0	6.4	6.3	6.3	6.0	7.4	.	3.1	4.1	8.7
1er quartile	19.0	18.0	17.0	17.0	17.0	19.0	.	14.0	14.5	13.0
valeur médiane	25.0	22.5	20.0	20.0	18.0	22.5	.	15.0	15.5	21.0
3e quartile	31.0	27.0	24.0	23.0	24.0	31.5	.	16.0	19.0	28.0
N*	445	2	107	58	11	8	0	80	16	4
données manquantes	640	2	80	28	4	13	2	46	36	6
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	34.4	18.0	21.6	23.4	21.5	24.6	.	17.6	20.8	.
écart-type	12.3	.	6.5	7.0	6.1	3.3	.	5.2	8.8	.
1er quartile	25.0	18.0	17.0	18.0	18.0	22.0	.	15.0	15.0	.
valeur médiane	34.0	18.0	20.0	22.0	19.0	24.0	.	16.0	19.0	.
3e quartile	42.0	18.0	24.0	28.0	24.0	28.0	.	17.0	24.5	.
N*	379	1	80	45	10	5	0	64	16	0
données manquantes	706	3	107	41	5	16	2	62	36	10
Période de latence (en années)**										
moyenne	24.8	.	4.8	4.3	3.9	0.8	.	5.1	13.3	4.7
écart-type	13.4	.	5.7	4.7	5.9	.	.	5.3	14.9	1.0
1er quartile	15.0	.	0.8	1.1	0.4	0.8	.	1.1	1.4	4.1
valeur médiane	24.0	.	2.3	3.0	1.7	0.8	.	2.5	6.6	4.7
3e quartile	33.0	.	6.1	6.0	4.9	0.8	.	8.2	22.9	5.4
N*	165	0	22	34	7	1	0	69	11	2
données manquantes	183	0	4	4	1	3	0	10	18	4

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1c Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2008), hommes & femmes

Patient-e-s: principale substance posant problème										
Hommes & femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	16.4	18.9	21.0	21.5	20.2	23.4	20.5	14.7	14.9	17.1
écart-type	4.5	5.2	6.0	6.4	5.0	6.6	3.5	2.2	2.8	5.2
1er quartile	14.0	14.0	17.0	17.0	17.0	17.0	18.0	13.0	13.0	14.0
valeur médiane	16.0	17.0	20.0	20.0	18.0	21.0	20.5	15.0	15.0	16.0
3e quartile	18.0	23.0	23.0	25.0	24.0	28.0	23.0	16.0	16.0	18.0
N*	1'466	15	422	223	29	17	2	583	51	18
données manquantes	2'167	13	237	111	8	25	1	185	61	17
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	23.7	20.2	22.2	23.7	20.7	24.5	23.0	15.9	16.9	20.9
écart-type	9.2	5.2	6.1	7.3	5.0	6.8	.	2.8	3.2	8.3
1er quartile	18.0	16.0	18.0	18.0	17.0	18.0	23.0	14.0	15.0	15.0
valeur médiane	20.0	20.0	20.0	22.0	18.5	23.0	23.0	15.0	16.0	18.0
3e quartile	27.0	23.0	25.0	27.0	24.0	30.0	23.0	16.0	18.0	28.0
N*	1'549	15	405	207	26	19	1	503	52	15
données manquantes	2'084	13	254	127	11	23	2	265	60	20
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	32.1	20.9	22.6	26.0	21.5	26.4	.	16.9	20.7	23.8
écart-type	11.9	5.0	6.0	8.1	5.2	7.1	.	3.7	8.9	9.4
1er quartile	22.0	18.0	18.0	20.0	18.0	21.0	.	15.0	15.0	18.0
valeur médiane	30.0	20.0	21.0	24.0	19.0	26.0	.	16.0	18.0	18.0
3e quartile	40.0	23.0	25.0	31.0	24.0	30.0	.	17.0	22.0	29.0
N*	1'260	14	287	144	21	14	0	392	51	5
données manquantes	2'373	14	372	190	16	28	3	376	61	30
Période de latence (en années)**										
moyenne	24.2	16.3	8.1	7.1	4.4	7.3	7.4	4.7	14.0	7.9
écart-type	12.9	8.9	8.7	6.6	4.6	9.1	.	5.5	14.5	10.1
1er quartile	14.2	7.0	1.6	2.2	1.0	0.8	7.4	1.3	3.4	4.0
valeur médiane	23.8	17.3	4.5	5.3	2.8	7.3	7.4	2.7	6.2	4.9
3e quartile	33.0	24.7	11.4	9.4	6.7	13.7	7.4	5.5	27.1	8.0
N*	657	3	79	120	17	2	1	449	33	9
données manquantes	703	2	22	28	1	4	0	67	32	8

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2a Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2008), hommes

Patients: problème principal			
Hommes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	30.7	19.0	18.2
écart-type	10.5	.	8.2
1er quartile	22.0	19.0	13.0
valeur médiane	30.0	19.0	15.0
3e quartile	39.0	19.0	22.0
N*	45	1	9
<i>données manquantes</i>	60	2	33
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	32.6	20.0	21.8
écart-type	10.3	.	15.9
1er quartile	24.0	20.0	15.0
valeur médiane	33.5	20.0	16.0
3e quartile	40.0	20.0	20.0
N*	46	1	12
<i>données manquantes</i>	59	2	30
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	33.1	20.0	24.5
écart-type	10.0	.	15.0
1er quartile	25.0	20.0	16.0
valeur médiane	32.5	20.0	19.0
3e quartile	40.0	20.0	30.0
N*	50	1	14
<i>données manquantes</i>	55	2	28
Période de latence (en années)**			
moyenne	7.1	1.8	15.4
écart-type	7.6	.	14.4
1er quartile	1.7	1.8	5.2
valeur médiane	3.9	1.8	6.9
3e quartile	8.9	1.8	31.3
N*	45	1	9
<i>données manquantes</i>	60	2	33

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2b Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2008), femmes

Patientes: problème principal			
Femmes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	50.4	18.2	15.0
écart-type	17.4	4.8	0.0
1er quartile	54.0	15.0	15.0
valeur médiane	55.0	18.0	15.0
3e quartile	61.0	20.0	15.0
N*	5	21	2
<i>données manquantes</i>	18	32	15
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	43.4	20.7	24.3
écart-type	16.3	5.6	8.0
1er quartile	37.0	16.5	16.0
valeur médiane	43.0	19.5	25.0
3e quartile	56.0	23.0	32.0
N*	5	20	3
<i>données manquantes</i>	18	33	14
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	47.7	22.7	27.0
écart-type	13.9	6.8	6.8
1er quartile	40.0	19.0	25.0
valeur médiane	53.0	20.5	30.0
3e quartile	56.0	30.0	32.0
N*	9	18	5
<i>données manquantes</i>	14	35	12
Période de latence (en années)**			
moyenne	2.1	7.7	16.0
écart-type	0.3	7.7	18.2
1er quartile	1.8	1.7	3.1
valeur médiane	2.3	4.8	16.0
3e quartile	2.3	11.4	28.9
N*	5	21	2
<i>données manquantes</i>	18	32	15

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2c Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2008), hommes & femmes

Patients: problème principal			
Hommes & femmes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	32.7	18.2	17.6
écart-type	12.6	4.7	7.5
1er quartile	22.0	15.0	13.0
valeur médiane	32.0	18.0	15.0
3e quartile	40.0	20.0	22.0
N*	50	22	11
<i>données manquantes</i>	78	34	48
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	33.7	20.7	22.3
écart-type	11.2	5.5	14.5
1er quartile	24.0	17.0	15.0
valeur médiane	34.0	20.0	16.0
3e quartile	41.0	23.0	25.0
N*	51	21	15
<i>données manquantes</i>	77	35	44
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	35.4	22.6	25.2
écart-type	11.8	6.7	13.2
1er quartile	25.0	19.0	16.0
valeur médiane	34.0	20.0	20.0
3e quartile	42.0	30.0	31.0
N*	59	19	19
<i>données manquantes</i>	69	37	40
Période de latence (en années)**			
moyenne	6.6	7.5	15.5
écart-type	7.4	7.6	14.1
1er quartile	1.8	1.7	3.6
valeur médiane	3.3	4.0	6.9
3e quartile	8.8	11.4	31.3
N*	50	22	11
<i>données manquantes</i>	78	34	48

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T17 Mode d'administration de la principale substance posant problème au cours des 6 derniers mois avant l'admission (2008)

Patient-e-s: principale substance posant problème															
Mode d'administration*	Héroïne			Cocaïne			Amphétamines			Cannabis			Benzodiazépines		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
injection	32.7	33.3	32.9	7.8	17.3	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0
fumée/inhalation	39.7	36.4	38.9	15.6	23.1	17.8	0.0	0.0	0.0	99.8	98.9	99.6	10.0	0.0	6.3
ingestion (manger/boire)	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10.0	25.0	14.3	0.0	0.0	0.0	90.0	100.0	93.8
sniff	26.6	30.3	27.5	76.6	59.6	71.7	90.0	75.0	85.7	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
autre	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	214	66	280	128	52	180	10	4	14	455	92	547	10	6	16
données manquantes	217	95	312	119	33	152	6	3	9	187	34	221	5	7	12

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

**T18 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 6 derniers mois avant l'admission des injections,
échange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois avant l'admission et âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2008)**

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Injections au cours de la vie*																
oui	6.7	5.0	6.1	66.3	64.5	65.8	15.6	29.1	19.5	4.9	1.0	4.2	14.5	12.1	13.8	501
non	93.3	95.0	93.9	33.7	35.5	34.2	84.4	70.9	80.5	95.1	99.0	95.8	85.5	87.9	86.2	3'127
N**	1'485	684	2'169	323	110	433	135	55	190	468	98	566	2'574	1'054	3'628	3'628
données manquantes	1'063	401	1'464	173	81	254	113	31	144	174	28	202	1'639	627	2'266	2'266
Injections au cours des 6 derniers mois*																
oui	0.7	0.9	0.8	39.6	36.2	38.7	11.9	20.4	14.3	3.6	1.0	3.2	6.5	5.4	6.2	223
non	99.3	99.1	99.2	60.4	63.8	61.3	88.1	79.6	85.7	96.4	99.0	96.8	93.5	94.6	93.8	3'391
N**	1'497	682	2'179	303	105	408	135	54	189	469	98	567	2'565	1'049	3'614	3'614
données manquantes	1'051	403	1'454	193	86	279	113	32	145	173	28	201	1'648	632	2'280	2'280
Injections au cours des 30 derniers jours*																
oui	0.3	0.3	0.3	34.1	35.7	34.5	7.9	17.9	10.7	0.0	1.0	0.2	4.4	4.7	4.5	172
non	99.7	99.7	99.7	65.9	64.3	65.5	92.1	82.1	89.3	100.0	99.0	99.8	95.6	95.3	95.5	3'660
N**	1'607	738	2'345	299	112	411	140	56	196	472	101	573	2'696	1'136	3'832	3'832
données manquantes	941	347	1'288	197	79	276	108	30	138	170	25	195	1'517	545	2'062	2'062
Echange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois***																
oui	0.0	100.0	12.5	9.5	15.8	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	17.4	8.3	10
non	100.0	0.0	87.5	90.5	84.2	89.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	93.8	82.6	91.7	110
N**	7	1	8	63	19	82	10	2	12	16	0	16	97	23	120	120
données manquantes	2	5	7	35	12	47	4	6	10	1	0	1	43	23	66	66
Age lors de la première injection****																
jusqu'à 14 ans	4.4	7.7	5.2	3.4	12.5	5.7	8.3	18.2	13.0	0.0	0.0	0.0	3.7	13.2	6.2	18
de 15 à 16 ans	17.8	23.1	19.0	4.1	16.7	7.2	16.7	0.0	8.7	25.0	0.0	25.0	8.4	18.4	11.0	32
de 17 à 18 ans	17.8	46.2	24.1	21.2	16.7	20.1	33.3	9.1	21.7	0.0	0.0	0.0	20.5	19.7	20.3	59
de 19 à 20 ans	17.8	15.4	17.2	23.3	16.7	21.6	8.3	9.1	8.7	50.0	0.0	50.0	21.9	14.5	19.9	58
de 21 à 25 ans	24.4	7.7	20.7	32.9	25.0	30.9	8.3	54.5	30.4	25.0	0.0	25.0	29.3	25.0	28.2	82
de 26 à 30 ans	11.1	0.0	8.6	12.3	10.4	11.9	8.3	9.1	8.7	0.0	0.0	0.0	12.1	7.9	11.0	32
de 31 à 39 ans	6.7	0.0	5.2	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.3	2.4	7
dès 40 ans	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	16.7	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	3
N**	45	13	58	146	48	194	12	11	23	4	0	4	215	76	291	291
données manquantes	54	21	75	68	23	91	9	5	14	19	1	20	158	52	210	210

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 6 derniers mois. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2008), hommes

Hommes

Patients: principale substance posant problème										
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool		50.0	32.0	45.7	31.6	50.0	0.0	22.1	5.4	27.3
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.3		4.4	1.5	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
héroïne	2.7	7.1	3.0	12.2	0.0	22.2	100.0	1.8	2.7	9.1
méthadone	0.8	7.1	22.1	4.6	0.0	11.1	0.0	0.2	0.0	0.0
autres opiacés	0.3	7.1	1.4	0.0	0.0	11.1	0.0	0.2	0.0	0.0
cocaïne	5.6	7.1	33.9	0.5	26.3	38.9	0.0	7.4	0.0	9.1
crack, freebase	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.7	0.0	2.5	7.1	5.3	0.0	100.0	2.5	0.0	4.5
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.9	0.0	2.7	11.2	36.8	0.0	100.0	4.3	0.0	9.1
autres stimulants	0.2	0.0	0.8	1.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	2.7	14.3	19.1	5.1	0.0	16.7	0.0	1.2	2.7	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.4	14.3	1.9	0.0	0.0	11.1	0.0	0.4	0.0	0.0
LSD	0.4	0.0	2.7	6.1	5.3	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	100.0	1.2	0.0	0.0
substances volatiles	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
cannabis	12.6	50.0	38.5	34.5	52.6	22.2	0.0		13.5	18.2
tabac	30.9	35.7	36.3	35.5	31.6	22.2	0.0	33.4		9.1
autres substances	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	5.4	
jeu pathologique	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.7	0.0
aucun autre problème addictif	57.7	21.4	19.9	24.9	21.1	5.6	0.0	51.6	81.1	59.1
N**	1'656	14	366	197	19	18	1	512	37	22
<i>données manquantes</i>	892	10	106	51	3	3	0	130	23	3

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2008), femmes

Femmes

Patientes: principale substance posant problème										
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool		50.0	30.4	42.3	27.3	40.0	100.0	20.8	17.4	20.0
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.3		5.9	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
héroïne	2.0	50.0	5.9	23.9	0.0	6.7	0.0	1.0	0.0	0.0
méthadone	0.6	0.0	19.3	12.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	10.0
autres opiacés	0.4	0.0	3.0	2.8	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne	5.1	50.0	38.5	0.0	45.5	6.7	0.0	5.0	0.0	10.0
crack, freebase	0.0	0.0	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	1.5	5.6	9.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	1.4	0.0	5.2	18.3	36.4	0.0	100.0	2.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
barbituriques	0.6	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
benzodiazépines	6.8	0.0	23.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
autres somnifères et tranquillisants	2.0	0.0	1.5	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.1	0.0	3.0	8.5	18.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.1	0.0	0.7	4.2	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.1	0.0	0.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	5.4	0.0	30.4	36.6	45.5	13.3	0.0		4.3	10.0
tabac	29.7	0.0	31.1	39.4	27.3	33.3	0.0	34.7		0.0
autres substances	0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
troubles alimentaires	2.4	0.0	2.2	4.2	0.0	13.3	0.0	2.0	13.0	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	57.1	0.0	24.4	18.3	18.2	33.3	0.0	49.5	69.6	70.0
N**	704	2	135	71	11	15	1	101	23	10
<i>données manquantes</i>	381	2	52	15	4	6	1	25	29	0

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2008), hommes & femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool		50.0	31.5	44.8	30.0	45.5	50.0	21.9	10.0	25.0
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.3		4.8	1.1	3.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
héroïne	2.5	12.5	3.8	15.3	0.0	15.2	50.0	1.6	1.7	6.3
méthadone	0.8	6.3	21.4	6.7	0.0	9.1	0.0	0.2	0.0	3.1
autres opiacés	0.3	6.3	1.8	0.7	0.0	9.1	0.0	0.2	0.0	0.0
cocaïne	5.4	12.5	35.1	0.4	33.3	24.2	0.0	7.0	0.0	9.4
crack, freebase	0.0	0.0	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.5	0.0	2.2	6.7	6.7	0.0	50.0	2.3	0.0	3.1
MDMA et substances similaires (ecstasy)	1.1	0.0	3.4	13.1	36.7	0.0	100.0	3.9	0.0	6.3
autres stimulants	0.1	0.0	0.8	0.7	3.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
barbituriques	0.2	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
benzodiazépines	3.9	12.5	20.4	7.1	0.0	9.1	0.0	1.0	1.7	3.1
autres somnifères et tranquillisants	0.8	12.5	1.8	0.0	0.0	12.1	0.0	0.3	0.0	0.0
LSD	0.3	0.0	2.8	6.7	10.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.1	0.0	0.2	1.9	0.0	0.0	100.0	1.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.1	0.0	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
cannabis	10.4	43.8	36.3	35.1	50.0	18.2	0.0		10.0	15.6
tabac	30.5	31.3	34.9	36.6	30.0	27.3	0.0	33.6		6.3
autres substances	0.4	0.0	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	3.3	
jeu pathologique	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	3.1
troubles alimentaires	1.0	0.0	0.8	1.1	0.0	6.1	0.0	0.3	5.0	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.2	1.7	0.0
aucun autre problème addictif	57.5	18.8	21.2	23.1	20.0	18.2	0.0	51.2	76.7	62.5
N**	2'360	16	501	268	30	33	2	613	60	32
<i>données manquantes</i>	<i>1'273</i>	<i>12</i>	<i>158</i>	<i>66</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>155</i>	<i>52</i>	<i>3</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2008), hommes

Hommes

Patients: problème principal			
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	1.4	0.0	10.5
coktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	0.0	5.3
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	1.4	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	1.4	0.0	5.3
tabac	9.9	0.0	10.5
autres substances	1.4	0.0	0.0
jeu pathologique		0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0		0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	0.0	
aucun autre problème addictif	84.5	100.0	68.4
N**	71	1	19
<i>données manquantes</i>	<i>34</i>	<i>2</i>	<i>23</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2008), femmes

Femmes

Patientes: problème principal			
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	0.0	25.8	0.0
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	3.2	25.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	3.2	12.5
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	0.0	0.0	0.0
tabac	13.3	12.9	12.5
autres substances	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique		0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0		25.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	3.2	
aucun autre problème addictif	86.7	58.1	37.5
N**	15	31	8
<i>données manquantes</i>	8	22	9

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2008), hommes & femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal		
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	1.2	25.0	7.4
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	0.0	3.7
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	1.2	3.1	7.4
autres somnifères et tranquillisants	0.0	3.1	3.7
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	1.2	0.0	3.7
tabac	10.5	12.5	11.1
autres substances	1.2	0.0	0.0
jeu pathologique		0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0		7.4
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	3.1	
aucun autre problème addictif	84.9	59.4	59.3
N**	86	32	27
<i>données manquantes</i>	42	24	32

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T20 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2008)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation d'alcool*																
jamais	10.8	9.4	10.4	18.5	20.2	18.9	6.7	8.3	7.1	13.0	18.4	13.9	12.3	12.3	12.3	425
1 fois par mois ou moins	4.4	4.9	4.5	14.6	15.5	14.8	12.5	10.4	11.9	30.1	25.0	29.3	10.3	8.6	9.8	338
2 à 4 fois par mois	6.2	7.3	6.5	20.5	25.0	21.6	25.0	29.2	26.2	34.5	43.4	36.0	14.1	14.0	14.1	485
2 à 3 fois par semaine	16.8	19.0	17.5	20.9	16.7	19.8	23.3	20.8	22.6	15.8	11.8	15.2	17.7	17.9	17.8	612
4 fois ou plus par semaine	61.8	59.4	61.0	25.6	22.6	24.9	32.5	31.3	32.1	6.5	1.3	5.6	45.6	47.1	46.0	1'586
N**	1'593	699	2'292	254	84	338	120	48	168	385	76	461	2'474	972	3'446	3'446
<i>données manquantes</i>	955	386	1'341	242	107	349	128	38	166	257	50	307	1'739	709	2'448	2'448
Nbre de boissons standards par jour***																
1 ou 2	7.0	7.8	7.2	43.5	54.1	46.0	37.8	44.7	39.7	58.5	62.5	59.1	21.3	20.2	21.0	576
3 ou 4	18.8	16.5	18.1	30.4	27.9	29.8	35.7	23.7	32.4	26.3	22.9	25.8	22.9	18.1	21.5	590
5 ou 6	20.9	23.1	21.5	15.2	8.2	13.5	11.2	23.7	14.7	9.7	4.2	8.9	17.4	20.1	18.1	497
7 à 9	18.9	24.8	20.7	4.7	3.3	4.4	4.1	5.3	4.4	2.4	2.1	2.4	13.7	19.6	15.3	420
10 ou plus	34.5	27.8	32.5	6.3	6.6	6.3	11.2	2.6	8.8	3.1	8.3	3.9	24.7	22.0	24.0	656
N**	1'309	576	1'885	191	61	252	98	38	136	289	48	337	1'972	767	2'739	2'739
<i>données manquantes</i>	1'239	509	1'748	305	130	435	150	48	198	353	78	431	2'241	914	3'155	3'155
Fréquence de fortes consom. d'alcool***																
jamais	12.4	16.2	13.6	43.2	46.2	43.9	33.3	37.5	34.6	57.7	59.6	58.0	25.2	26.9	25.7	762
moins d'une fois par mois	10.9	11.6	11.1	22.5	29.2	24.1	25.0	25.0	25.0	23.0	22.8	22.9	15.3	14.2	15.0	446
1 fois par mois	9.9	9.2	9.7	14.6	9.2	13.3	12.5	10.0	11.8	9.1	10.5	9.3	10.5	9.2	10.1	301
1 fois par semaine	25.8	22.1	24.7	12.2	7.7	11.2	19.8	22.5	20.6	9.7	7.0	9.3	20.7	18.9	20.2	600
presque chaque jour	41.0	40.9	41.0	7.5	7.7	7.6	9.4	5.0	8.1	0.6	0.0	0.5	28.2	30.8	28.9	859
N**	1'394	606	2'000	213	65	278	96	40	136	331	57	388	2'138	830	2'968	2'968
<i>données manquantes</i>	1'154	479	1'633	283	126	409	152	46	198	311	69	380	2'075	851	2'926	2'926

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation d'alcool. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**T21 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission,
selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2008)**

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	27.9	36.7	30.5	3.3	5.3	3.8	12.6	7.1	10.9	24.2	17.3	23.1	23.0	27.9	24.4	596
1 jour par semaine ou moins	1.5	0.7	1.3	0.5	0.0	0.3	1.1	4.8	2.2	2.8	5.3	3.2	1.6	1.3	1.5	37
2 à 3 jours par semaine	1.2	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.8	2.2	2.5	5.3	3.0	1.3	1.2	1.2	30
4 à 6 jours par semaine	0.8	1.2	0.9	0.9	0.0	0.7	1.1	0.0	0.7	2.2	1.3	2.1	1.2	1.3	1.2	30
1 fois par jour	0.9	0.2	0.7	0.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	2.2	2.7	2.3	1.0	0.7	0.9	22
plusieurs fois par jour	67.6	60.6	65.6	95.3	93.3	94.8	84.2	83.3	83.9	66.1	68.0	66.4	72.0	67.6	70.7	1'728
N**	973	406	1'379	213	75	288	95	42	137	363	75	438	1'758	685	2'443	2'443
<i>données manquantes</i>	1'575	679	2'254	283	116	399	153	44	197	279	51	330	2'455	996	3'451	3'451
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10	15.9	17.2	16.2	7.9	13.8	9.4	17.5	36.1	24.2	45.8	39.2	44.6	20.6	21.0	20.7	326
11 à 20	39.3	45.6	41.0	45.8	48.3	46.4	50.8	41.7	47.5	42.4	43.1	42.5	41.6	44.0	42.3	667
21 à 30	28.8	24.7	27.7	35.6	29.3	34.0	19.0	13.9	17.2	8.5	9.8	8.7	25.3	22.9	24.7	389
31 ou plus	16.0	12.6	15.1	10.7	8.6	10.2	12.7	8.3	11.1	3.4	7.8	4.2	12.5	12.1	12.4	196
N**	605	215	820	177	58	235	63	36	99	236	51	287	1'158	420	1'578	1'578
<i>données manquantes</i>	97	42	139	29	13	42	20	3	23	39	11	50	195	74	269	269

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T22a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2008), hommes

	Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Objectif de consommation*										
abstinence définitive	32.8	77.8	72.4	75.4	75.0	62.5	0.0	50.5	68.8	60.0
abstinence limitée dans le temps	23.1	0.0	2.9	5.6	0.0	12.5	100.0	6.1	0.0	20.0
consommation contrôlée	26.2	11.1	12.1	5.6	12.5	25.0	0.0	19.9	12.5	0.0
aucune limitation envisagée	3.1	11.1	1.1	2.4	0.0	0.0	0.0	5.6	12.5	0.0
pas déterminé pour l'instant	14.3	0.0	11.0	10.3	12.5	0.0	0.0	17.9	6.3	20.0
autre	0.5	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	1'340	9	272	126	8	8	1	196	16	15
<i>données manquantes</i>	<i>1'208</i>	<i>15</i>	<i>200</i>	<i>122</i>	<i>14</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>446</i>	<i>44</i>	<i>10</i>

T22b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2008), femmes

Objectif de consommation*										
abstinence définitive	37.3	100.0	67.0	62.5	50.0	66.7	0.0	46.7	0.0	42.9
abstinence limitée dans le temps	17.3	0.0	1.1	7.5	50.0	11.1	0.0	6.7	0.0	0.0
consommation contrôlée	30.3	0.0	11.0	15.0	0.0	22.2	0.0	33.3	50.0	28.6
aucune limitation envisagée	1.2	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	25.0	14.3
pas déterminé pour l'instant	13.0	0.0	16.5	15.0	0.0	0.0	0.0	10.0	25.0	14.3
autre	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	515	1	91	40	2	9	0	30	4	7
<i>données manquantes</i>	<i>570</i>	<i>3</i>	<i>96</i>	<i>46</i>	<i>13</i>	<i>12</i>	<i>2</i>	<i>96</i>	<i>48</i>	<i>3</i>

T22c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2008), hommes & femmes

Objectif de consommation*										
abstinence définitive	34.1	80.0	71.1	72.3	70.0	64.7	0.0	50.0	55.0	54.5
abstinence limitée dans le temps	21.5	0.0	2.5	6.0	10.0	11.8	100.0	6.2	0.0	13.6
consommation contrôlée	27.3	10.0	11.8	7.8	10.0	23.5	0.0	21.7	20.0	9.1
aucune limitation envisagée	2.5	10.0	1.9	1.8	0.0	0.0	0.0	5.3	15.0	4.5
pas déterminé pour l'instant	14.0	0.0	12.4	11.4	10.0	0.0	0.0	16.8	10.0	18.2
autres	0.6	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	1'855	10	363	166	10	17	1	226	20	22
<i>données manquantes</i>	<i>1'778</i>	<i>18</i>	<i>296</i>	<i>168</i>	<i>27</i>	<i>25</i>	<i>2</i>	<i>542</i>	<i>92</i>	<i>13</i>

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23a Problèmes psychiques au cours de la vie (2008), hommes

Hommes

	Patients: problème principal									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*										
dépansions sévères	33.3	14.3	39.2	31.6	37.5	66.7	100.0	26.2	37.5	33.3
états anxieux/tension nerv. importants	30.5	14.3	37.3	32.9	37.5	44.4	0.0	16.6	12.5	26.7
diffic. compréhension/mémoire/concentr.	12.5	14.3	19.1	14.5	12.5	44.4	0.0	15.9	12.5	26.7
hallucinations	3.4	28.6	4.4	9.2	0.0	44.4	0.0	9.7	12.5	6.7
diffic. à contrôler comportement violent	13.5	14.3	16.2	21.1	12.5	11.1	0.0	17.9	25.0	20.0
problèmes psychiques traités avec médic.	17.6	28.6	15.2	13.2	0.0	44.4	0.0	8.3	25.0	6.7
pensées suicidaires sérieuses	13.2	14.3	17.2	18.4	25.0	33.3	0.0	14.5	12.5	13.3
tentatives de suicide	7.1	0.0	10.8	10.5	12.5	0.0	0.0	3.4	12.5	6.7
autre(s) problème(s) psychique(s)	4.2	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	12.5	6.7
aucun	36.7	57.1	31.9	42.1	50.0	0.0	0.0	51.7	50.0	46.7
N**	942	7	204	76	8	9	1	145	8	15
<i>données manquantes</i>	<i>1'606</i>	<i>17</i>	<i>268</i>	<i>172</i>	<i>14</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>497</i>	<i>52</i>	<i>10</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23b Problèmes psychiques au cours de la vie (2008), femmes

Femmes

	Patientes: problème principal									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*										
dépansions sévères	44.2	100.0	40.3	36.4	66.7	27.3	0.0	37.0	0.0	100.0
états anxieux/tension nerv. importants	41.4	100.0	33.3	31.8	0.0	63.6	0.0	22.2	0.0	85.7
diffic. compréhension/mémoire/concentr.	13.9	100.0	13.9	18.2	0.0	27.3	0.0	33.3	0.0	28.6
hallucinations	3.0	0.0	4.2	0.0	0.0	9.1	0.0	14.8	0.0	14.3
diffic. à contrôler comportement violent	10.2	0.0	13.9	4.5	33.3	9.1	0.0	18.5	0.0	28.6
problèmes psychiques traités avec médic.	29.0	0.0	20.8	31.8	0.0	45.5	0.0	18.5	0.0	0.0
pensées suicidaires sérieuses	20.1	0.0	18.1	4.5	0.0	27.3	0.0	29.6	0.0	42.9
tentatives de suicide	11.9	0.0	19.4	9.1	33.3	27.3	0.0	18.5	0.0	14.3
autre(s) problème(s) psychique(s)	3.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
aucun	23.3	0.0	33.3	27.3	33.3	9.1	0.0	29.6	0.0	0.0
N**	403	1	72	22	3	11	0	27	1	7
<i>données manquantes</i>	682	3	115	64	12	10	2	99	51	3

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23c Problèmes psychiques au cours de la vie (2008), hommes & femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*										
dépressions sévères	36.6	25.0	39.5	32.7	45.5	45.0	100.0	27.9	33.3	54.5
états anxieux/tension nerv. importants	33.8	25.0	36.2	32.7	27.3	55.0	0.0	17.4	11.1	45.5
diffic. compréhension/mémoire/concentr.	12.9	25.0	17.8	15.3	9.1	35.0	0.0	18.6	11.1	27.3
hallucinations	3.3	25.0	4.3	7.1	0.0	25.0	0.0	10.5	11.1	9.1
diffic. à contrôler comportement violent	12.5	12.5	15.6	17.3	18.2	10.0	0.0	18.0	22.2	22.7
problèmes psychiques traités avec médic.	21.0	25.0	16.7	17.3	0.0	45.0	0.0	9.9	22.2	4.5
pensées suicidaires sérieuses	15.2	12.5	17.4	15.3	18.2	30.0	0.0	16.9	11.1	22.7
tentatives de suicide	8.6	0.0	13.0	10.2	18.2	15.0	0.0	5.8	11.1	9.1
autre(s) problème(s) psychique(s)	4.1	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	22.2	4.5
aucun	32.7	50.0	32.2	38.8	45.5	5.0	0.0	48.3	44.4	31.8
N**	1'345	8	276	98	11	20	1	172	9	22
<i>données manquantes</i>	<i>2'288</i>	<i>20</i>	<i>383</i>	<i>236</i>	<i>26</i>	<i>22</i>	<i>2</i>	<i>596</i>	<i>103</i>	<i>13</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24 Proches: Lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2008)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	
lien avec la tierce personne*				
mère/père	34.5	31.4	32.1	354
filles/fils	10.7	9.7	10.0	110
sœur/frère	3.4	4.8	4.4	49
conjoint-e/partenaire	31.0	43.7	40.7	449
autre proche/parent-e	3.4	3.3	3.4	37
collègue/ami-e	2.7	2.9	2.8	31
employeur/se, enseignant-e	7.7	0.8	2.4	27
tuteur/trice, curateur/trice	0.0	0.0	0.0	0
autre	6.5	3.4	4.2	46
N**	261	842	1'103	1'103
<i>données manquantes</i>	7	10	17	17

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T25 Proches: problème principal et autres problèmes de la tierce personne (2008)

Proches					
Total			Total		
	%	N		%	N
Problème principal de la tierce personne*			Autres problèmes de la tierce personne***		
alcool	65.2	678	alcool	29.6	115
cocktails (héroïne et cocaïne)	1.1	11	cocktails (héroïne et cocaïne)	0.8	3
héroïne	3.7	38	héroïne	4.4	17
méthadone	0.4	4	méthadone	2.1	8
autres opiacés (morphine, codéine, etc)	0.1	1	autres opiacés (morphine, codéine, etc)	0.5	2
cocaïne	5.0	52	cocaïne	7.5	29
crack, feebase	0.0	0	crack, feebase	0.0	0
amphétamines	0.6	6	amphétamines	0.3	1
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.7	7	MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.8	3
autres stimulants (khat, etc)	0.0	0	autres stimulants (khat, etc)	0.0	0
barbituriques	1.0	10	barbituriques	0.0	0
benzodiazépines	0.3	3	benzodiazépines	5.1	20
autres somnifères et tranquillisants	0.6	6	autres somnifères et tranquillisants	1.8	7
LSD	0.0	0	LSD	0.0	0
autres hallucinogènes	0.2	2	autres hallucinogènes	0.3	1
substances volatiles (solvants, etc)	0.1	1	substances volatiles (solvants, etc)	0.0	0
cannabis	13.7	142	cannabis	17.5	68
tabac	1.1	11	tabac	21.6	84
autre substance	0.5	5	autre substance	0.5	2
jeu pathologique	2.0	21	jeu pathologique	1.0	4
troubles alimentaires	1.1	11	troubles alimentaires	1.0	4
autre comportement de type addictif	3.0	31	autre comportement de type addictif	4.4	17
			aucun	31.4	122
N**	1'040	1'040	N**	389	389
<i>données manquantes</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>données manquantes</i>	<i>731</i>	<i>731</i>

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

*** Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T26 Proches: Propres problèmes des proches liés au problème de la tierce personne (2008)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	
propres problèmes*				
propres probl. de consom. de substances	7.9	8.6	8.5	33
propres comportements de type addictif	0.0	0.7	0.5	2
propres problèmes somatiques	4.5	7.6	6.9	27
propres problèmes psychiques	23.6	37.2	34.1	133
problèmes de couple	34.8	43.9	41.8	163
problèmes familiaux	41.6	53.5	50.8	198
problèmes financiers	5.6	13.0	11.3	44
problèmes liés à la profession/formation	4.5	3.3	3.6	14
problèmes de logement	2.2	7.0	5.9	23
problèmes de violence (victime)	1.1	11.6	9.2	36
problèmes à contrôler sa propre violence	2.2	1.7	1.8	7
problèmes juridiques	2.2	3.7	3.3	13
autre	2.2	2.3	2.3	9
aucun	27.0	11.6	15.1	59
N**	89	301	390	390
<i>données manquantes</i>	<i>179</i>	<i>551</i>	<i>730</i>	<i>730</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T27 Sexe et âge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2008)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sexe*																			
hommes	68.4			70.3			77.5			82.7			24.2			62.3			3'801
femmes	31.6			28.7			22.5			17.3			75.8			37.6			2'292
sexe pas connu	0.0			0.9			0.0			0.0			0.0			0.1			5
N**	2'173	1'002	3'175	382	156	543	213	62	275	555	116	671	248	775	1'023	3'801	2'292	6'098	6'098
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.0	3.4	1.2	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	32
15-19	2.3	3.0	2.5	1.1	4.5	2.1	2.8	17.7	6.2	63.9	52.6	61.9	8.2	2.7	4.0	12.2	6.8	10.2	618
20-24	4.1	2.2	3.5	15.3	18.6	16.3	20.8	25.8	21.9	14.1	11.2	13.6	5.7	5.2	5.3	8.1	6.3	7.5	454
25-29	7.3	5.7	6.8	20.3	16.7	19.3	24.1	21.0	23.4	8.3	10.3	8.7	6.5	6.7	6.7	9.9	8.0	9.2	557
30-34	9.2	7.4	8.6	15.0	20.5	16.6	21.2	8.1	18.2	4.9	7.8	5.4	6.1	7.9	7.5	9.8	8.8	9.5	575
35-39	12.2	10.6	11.7	22.4	18.6	21.3	16.0	11.3	15.0	2.9	2.6	2.8	12.2	10.9	11.2	11.9	10.6	11.5	696
40-44	14.1	14.5	14.2	15.0	12.2	14.2	7.1	9.7	7.7	1.1	3.4	1.5	9.0	15.7	14.1	11.4	13.5	12.2	740
45-49	15.1	16.9	15.7	7.1	6.4	6.9	5.7	3.2	5.1	1.3	4.3	1.8	17.1	16.2	16.4	11.7	14.3	12.7	773
50-54	12.1	13.5	12.5	1.8	2.6	2.1	2.4	1.6	2.2	0.4	0.9	0.4	11.4	13.5	13.0	8.5	11.2	9.5	579
55-59	10.1	10.8	10.3	1.3	0.0	0.9	0.0	1.6	0.4	0.4	0.0	0.3	8.6	8.7	8.7	6.9	8.3	7.4	451
60-64	7.5	7.8	7.6	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	5.3	5.5	4.8	5.6	5.1	310
65-69	3.5	5.8	4.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	3.5	3.9	2.5	4.0	3.0	185
70-74	1.7	1.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.3	2.2	1.1	1.5	1.3	77
75 et plus	0.8	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.8	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	31
N**	2'172	1'000	3'172	379	156	535	212	62	274	554	116	670	245	771	1'016	3'792	2'286	6'078	6'078
données manquantes	1	2	3	3	0	8	1	0	1	1	0	1	3	4	7	9	6	20	20
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	45.2	46.5	45.6	34.5	32.8	34.0	31.6	29.0	31.0	21.1	23.7	21.5	43.5	44.8	44.5	39.2	42.6	40.5	
écart-type	13.0	12.6	12.9	8.7	8.7	8.7	8.0	9.5	8.4	7.0	12.8	8.4	14.9	13.3	13.7	14.7	14.3	14.6	
1er quartile	36.0	38.7	36.8	27.3	25.7	26.7	25.6	21.6	24.2	17.0	16.8	17.0	31.9	35.9	35.5	27.1	31.7	28.9	
valeur médiane	45.2	46.6	45.8	34.6	33.1	34.0	30.6	26.5	29.8	18.3	18.8	18.3	45.6	45.1	45.2	38.9	43.3	40.7	
3e quartile	54.4	55.6	54.6	40.2	38.9	39.9	36.2	36.0	36.2	22.8	27.0	23.3	54.0	53.1	53.4	49.7	52.5	51.0	
N**	2'172	1'000	3'172	379	156	535	212	62	274	554	116	670	245	771	1'016	3'792	2'286	6'078	
données manquantes	1	2	3	3	0	8	1	0	1	1	0	1	3	4	7	9	6	20	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2008)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Etat civil*																			
célibataire	38.3	30.4	35.8	75.8	67.6	73.2	70.8	75.9	71.9	95.0	90.8	94.3	35.4	21.1	24.5	53.3	36.1	46.9	2'669
marié-e	34.4	31.0	33.3	10.1	10.8	10.2	15.8	8.6	14.2	3.5	5.5	3.9	51.6	54.9	54.1	27.0	34.9	29.9	1'705
séparé-e	5.4	6.5	5.7	2.5	3.4	3.0	3.0	3.4	3.1	0.4	1.8	0.6	2.2	4.0	3.5	3.9	4.9	4.3	245
divorcé-e	19.8	26.1	21.8	10.4	14.2	11.6	9.9	10.3	10.0	0.9	1.8	1.1	7.2	14.6	12.8	14.0	19.0	15.9	905
veuf/veuve	2.0	5.4	3.1	0.6	2.0	1.0	0.5	1.7	0.8	0.0	0.0	0.0	2.7	3.8	3.5	1.4	4.3	2.5	140
partenariat enregistré	0.2	0.5	0.3	0.6	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.9	1.7	1.5	0.3	0.9	0.6	32
N**	2'032	936	2'968	356	148	508	202	58	260	537	109	646	223	707	930	3'566	2'126	5'696	5'696
données manquantes	141	66	207	26	8	35	11	4	15	18	7	25	25	68	93	235	166	402	402
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	10.9	11.9	11.2	0.3	0.0	0.2	1.1	1.9	1.2	0.0	0.0	0.0	9.5	10.8	10.5	7.1	8.9	7.8	450
périphérie des grands centres	13.3	16.9	14.5	1.7	2.1	1.8	4.8	0.0	3.7	3.0	0.9	2.6	15.8	11.7	12.7	9.7	12.1	10.6	615
villes de moyenne importance	13.5	15.8	14.2	24.9	26.4	25.4	28.3	22.2	27.0	32.0	22.7	30.4	17.4	20.0	19.4	19.2	19.2	19.2	1'112
petites villes	35.7	30.5	34.0	51.3	48.6	50.5	44.4	50.0	45.6	30.1	43.6	32.4	31.5	30.8	31.0	36.9	33.1	35.5	2'055
campagne	26.7	24.9	26.1	21.8	22.9	22.1	21.4	25.9	22.4	35.0	32.7	34.6	25.7	26.6	26.4	27.1	26.7	26.9	1'559
N**	2'055	962	3'017	349	140	489	187	54	241	532	110	642	241	759	1'000	3'588	2'203	5'791	5'791
données manquantes	118	40	158	33	16	54	26	8	34	23	6	29	7	16	23	213	89	307	307

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2008)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de ménage*																			
seul-e en ménage	38.4	34.6	37.2	43.8	32.4	40.8	35.9	34.9	35.7	10.5	15.8	11.4	15.6	14.4	14.6	32.7	26.1	30.3	1'310
avec un ou les parents	6.6	4.9	6.1	13.5	9.0	12.1	19.0	23.3	19.9	71.2	44.6	66.4	22.2	6.1	9.5	20.3	9.9	16.5	711
avec enfant(s), sans partenaire	1.7	12.0	4.9	0.4	12.6	3.8	0.7	4.7	1.5	0.2	0.0	0.2	4.4	14.0	11.9	1.4	11.6	5.1	220
avec partenaire, sans enfant	26.7	29.3	27.5	13.9	20.7	16.1	15.7	18.6	16.3	4.1	10.9	5.4	17.0	25.3	23.5	20.2	25.2	22.0	953
avec partenaire et enfant(s)	20.1	13.0	17.9	10.3	9.9	10.1	11.8	2.3	9.7	2.4	3.0	2.5	38.5	38.3	38.3	16.6	20.2	17.9	772
avec d'autres proches	1.0	1.0	1.0	3.2	2.7	3.0	2.0	0.0	1.5	1.7	5.0	2.3	0.0	0.2	0.2	1.3	1.1	1.2	53
avec des amis (colocation)	1.7	2.0	1.8	3.9	1.8	3.3	3.9	4.7	4.1	1.7	3.0	2.0	1.5	1.0	1.1	2.1	1.8	2.0	86
autre	3.7	3.3	3.6	11.0	10.8	10.8	11.1	11.6	11.2	8.1	17.8	9.8	0.7	0.8	0.8	5.5	4.2	5.0	217
N**	1'548	694	2'242	281	111	397	153	43	196	459	101	560	135	494	629	2'739	1'578	4'322	4'322
données manquantes	625	308	933	101	45	146	60	19	79	96	15	111	113	281	394	1'062	714	1'776	1'776
Situation de domicile*																			
domicile fixe	94.5	95.1	94.7	82.9	79.5	82.1	85.3	83.3	84.8	92.1	86.0	91.1	97.4	97.0	97.1	92.7	93.9	93.2	4'081
sans domicile fixe	3.9	3.4	3.8	11.6	12.5	11.7	11.3	12.5	11.6	4.6	10.8	5.7	2.6	2.8	2.7	5.1	4.4	4.8	212
institution	1.6	1.4	1.5	5.5	8.0	6.1	3.3	4.2	3.5	3.2	3.2	3.2	0.0	0.2	0.1	2.2	1.7	2.0	87
N**	1'579	700	2'279	275	112	392	150	48	198	433	93	526	152	542	694	2'751	1'624	4'380	4'380
données manquantes	594	302	896	107	44	151	63	14	77	122	23	145	96	233	329	1'050	668	1'718	1'718
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	29.9	34.9	31.5	45.7	27.3	39.9	40.7	29.7	38.0	66.3	47.7	62.8	14.7	16.8	16.4	36.0	29.2	33.3	1'153
relations temporaires	4.7	4.8	4.7	8.1	13.6	10.2	8.0	21.6	11.3	9.1	9.2	9.1	3.7	2.5	2.7	5.6	5.3	5.5	192
partenaire fixe, vivant séparé	9.3	10.8	9.8	11.9	20.5	14.2	16.8	24.3	18.7	13.8	12.3	13.5	11.9	12.8	12.6	10.6	12.5	11.4	393
partenaire fixe, ménage commun	56.0	49.5	54.0	34.3	38.6	35.6	34.5	24.3	32.0	10.9	30.8	14.7	69.7	68.0	68.3	47.8	53.0	49.8	1'723
N**	1'290	584	1'874	210	88	303	113	37	150	276	65	341	109	447	556	2'125	1'331	3'461	3'461
données manquantes	883	418	1'301	172	68	240	100	25	125	279	51	330	139	328	467	1'676	961	2'637	2'637

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T30 Plus haute formation achevée, source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2008)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Plus haute formation achevée*																			
aucune form. achevée	7.5	8.2	7.7	7.5	11.1	8.4	4.0	0.0	3.2	21.2	22.3	21.4	10.5	5.5	6.8	10.0	8.9	9.6	376
scolarité obligatoire	13.9	20.2	15.7	32.1	43.4	35.1	18.7	45.0	24.2	54.1	53.2	54.0	14.3	12.3	12.8	24.1	23.4	23.9	932
scolarité complémentaire	3.5	5.9	4.2	4.1	2.0	3.5	4.0	0.0	3.2	6.1	6.4	6.1	1.5	5.5	4.5	3.9	5.4	4.4	173
apprentissage/école prof.	56.7	49.6	54.6	51.5	34.3	46.9	61.3	45.0	57.9	15.4	16.0	15.5	42.9	52.0	49.6	47.6	45.1	46.8	1'827
maturité/diplôme	3.1	3.2	3.1	1.9	7.1	3.3	2.7	5.0	3.2	1.9	2.1	2.0	5.3	6.0	5.8	2.9	4.6	3.5	137
école normale, pédagog.	0.3	2.4	0.9	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	3.0	3.4	3.3	0.4	2.6	1.2	45
form. profession. supérieure	7.0	6.1	6.7	0.7	1.0	0.8	6.0	5.0	5.8	0.6	0.0	0.5	11.3	8.1	8.9	5.2	5.7	5.4	210
école profession. supérieure	0.8	0.8	0.8	1.1	0.0	0.8	1.3	0.0	1.1	0.4	0.0	0.4	2.3	0.5	1.0	0.9	0.5	0.8	30
haute école spécialisée	2.5	0.8	2.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	2.3	3.1	2.9	1.7	1.3	1.5	60
université, haute école	4.7	2.9	4.2	1.1	0.0	0.8	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	6.8	3.4	4.3	3.3	2.4	3.0	117
N**	1'435	595	2'030	268	99	367	150	40	190	462	94	556	133	381	514	2'593	1'314	3'907	3'907
données manquantes	738	407	1'145	114	57	176	63	22	85	93	22	115	115	394	509	1'208	978	2'191	2'191
Source de revenu principale*																			
salaires	60.3	40.9	54.3	37.3	25.7	33.9	62.8	48.9	59.4	25.6	18.3	24.4	72.3	59.4	62.5	53.1	45.2	50.2	2'261
économies, épargne	1.1	1.0	1.1	0.4	0.9	0.5	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.8	0.8	0.8	36
rente (AVS, AI ou autre)	18.4	24.1	20.2	17.2	24.8	19.5	10.3	8.5	9.9	3.1	8.6	4.0	9.8	13.6	12.7	14.6	18.8	16.2	728
aide sociale	10.3	13.3	11.2	33.0	36.7	33.9	14.5	19.1	15.6	8.4	20.4	10.4	4.0	2.4	2.8	12.0	11.7	11.9	536
assurance-chômage	5.6	3.4	4.9	7.5	3.7	6.4	4.8	4.3	4.7	2.4	2.2	2.4	1.2	0.7	0.8	5.0	2.3	4.0	180
soutien du/de la partenaire	1.1	13.0	4.8	1.1	1.8	1.3	0.7	0.0	0.5	0.4	3.2	0.9	0.6	17.4	13.4	0.9	12.5	5.2	234
soutien parents/proches/amis	2.7	3.3	2.9	1.1	3.7	1.8	5.5	12.8	7.3	59.8	46.2	57.5	12.1	5.1	6.8	12.9	7.7	11.0	495
deal, combines	0.1	0.0	0.0	0.7	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	6
autres revenus illégaux	0.1	0.1	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
autre	0.4	0.8	0.6	1.1	1.8	1.3	0.0	6.4	1.6	0.2	0.0	0.2	0.0	0.6	0.4	0.5	0.8	0.6	27
N**	1'612	729	2'341	279	109	389	145	47	192	453	93	546	173	545	718	2'841	1'665	4'507	4'507
données manquantes	561	273	834	103	47	154	68	15	83	102	23	125	75	230	305	960	627	1'591	1'591
Taux d'activité principal*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	55.2	27.9	47.0	34.5	17.1	29.9	59.9	51.1	57.9	21.6	12.6	20.0	67.6	39.2	46.0	48.4	30.8	42.2	1'774
activité à temps partiel	5.4	18.6	9.4	7.6	14.3	9.4	3.3	4.4	3.6	2.2	2.1	2.2	3.6	28.9	22.9	4.8	19.4	9.9	417
plusieurs activités occas.	1.6	1.5	1.6	2.5	3.8	2.9	1.3	0.0	1.0	2.0	4.2	2.4	0.0	0.9	0.7	1.7	1.5	1.6	67
en formation	2.5	3.5	2.8	1.1	5.7	2.3	6.6	8.9	7.1	60.4	50.5	58.6	11.5	6.5	7.7	13.2	9.1	11.8	494
sans activité prof.	20.6	34.5	24.8	25.5	37.1	29.1	15.1	22.2	16.8	3.1	9.5	4.2	10.8	21.5	19.0	17.0	28.2	21.0	883
sans travail, en quête d'emploi	9.7	9.5	9.6	16.0	7.6	13.5	9.2	6.7	8.6	4.0	9.5	5.0	2.2	1.1	1.4	8.9	6.4	8.0	337
sans travail, futur emploi garanti	0.2	0.5	0.3	0.4	1.0	0.5	0.7	0.0	0.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	11
autre	4.7	4.1	4.5	12.4	13.3	12.5	3.9	6.7	4.6	6.5	11.6	7.4	4.3	1.6	2.2	5.7	4.3	5.2	220
N**	1'531	656	2'187	275	105	385	152	45	197	449	95	544	139	446	585	2'718	1'480	4'203	4'203
données manquantes	642	346	988	107	51	158	61	17	78	106	21	127	109	329	438	1'083	812	1'895	1'895

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2008)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	31.7	45.0	35.8	58.7	61.4	60.0	32.8	31.8	32.6	14.6	37.5	17.6	14.3	25.8	23.5	32.3	39.4	35.0	682
apprenti-e, stagiaire	1.8	1.1	1.6	0.0	1.8	0.5	4.7	13.6	7.0	33.0	6.3	29.4	0.0	2.2	1.8	4.4	2.2	3.6	70
manœuvre, aide	4.5	4.6	4.5	11.6	8.8	10.7	3.1	0.0	2.3	1.0	0.0	0.8	1.8	4.0	3.6	4.8	4.5	4.7	91
ouvrier/ère formé-e sur le tas	6.9	6.3	6.7	8.4	3.5	7.0	7.8	13.6	9.3	2.9	0.0	2.5	3.6	4.0	3.9	6.8	6.0	6.5	127
ouvrier/ère formé-e (CFC)	11.7	3.4	9.2	7.7	3.5	6.5	20.3	9.1	17.4	1.0	6.3	1.7	3.6	7.6	6.8	10.2	4.9	8.2	160
contremaître-sse	2.3	0.0	1.6	3.2	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	3.4	1.8	0.0	0.4	2.3	0.0	1.4	28
employé-e non qualifié-e	14.6	24.2	17.6	6.5	12.3	7.9	15.6	27.3	18.6	6.8	18.8	8.4	25.0	31.6	30.2	14.1	25.0	18.1	353
empl. qualifié-e, cadre moyen	11.7	6.6	10.1	1.9	5.3	2.8	7.8	4.5	7.0	2.9	0.0	2.5	21.4	13.3	14.9	10.0	8.2	9.3	182
employé-e, cadre supérieur	2.8	0.6	2.1	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	7.1	1.8	2.8	2.4	0.8	1.8	36
indépendant-e	9.8	6.6	8.8	1.3	1.8	1.4	1.6	0.0	1.2	2.9	0.0	2.5	16.1	7.1	8.9	8.0	5.7	7.1	139
écolier/ère, étudiant-e	0.9	1.1	1.0	0.0	1.8	0.5	3.1	0.0	2.3	29.1	31.3	29.4	3.6	2.2	2.5	3.7	2.7	3.3	65
autre statut	1.1	0.6	1.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.7	1.8	0.4	0.7	1.1	0.6	0.9	17
N**	792	351	1'143	155	57	215	64	22	86	103	16	119	56	225	281	1'231	716	1'950	1'950
données manquantes	1'381	651	2'032	227	99	328	149	40	189	452	100	552	192	550	742	2'570	1'576	4'148	4'148
Revenu mensuel net*																			
aucun revenu	28.5	33.3	29.7	31.0	27.8	30.3	39.5	33.3	37.7	39.5	71.4	44.3	7.7	19.4	17.3	30.1	33.2	31.0	362
moins de 1000 fr.	4.9	3.6	4.6	15.5	2.8	12.5	5.3	6.7	5.7	35.3	23.8	33.6	7.7	11.3	10.7	10.9	6.4	9.7	113
de 1001 à 2000 fr.	5.5	9.1	6.4	14.7	13.9	14.5	2.6	6.7	3.8	4.2	0.0	3.6	15.4	9.7	10.7	6.5	9.1	7.3	85
de 2001 à 3000 fr.	10.8	17.6	12.5	15.5	41.7	21.7	10.5	20.0	13.2	0.8	4.8	1.4	15.4	17.7	17.3	9.8	19.5	12.5	146
de 3001 à 4000 fr.	10.2	14.5	11.3	7.8	11.1	8.6	13.2	26.7	17.0	8.4	0.0	7.1	15.4	16.1	16.0	10.0	14.6	11.3	132
de 4001 à 5000 fr.	16.1	10.9	14.8	9.5	2.8	7.9	21.1	0.0	15.1	7.6	0.0	6.4	0.0	6.5	5.3	14.1	7.6	12.3	144
de 5001 à 6000 fr.	11.6	6.7	10.4	5.2	0.0	3.9	5.3	6.7	5.7	2.5	0.0	2.1	15.4	12.9	13.3	9.3	6.1	8.4	98
de 6001 à 8000 fr.	6.9	3.6	6.1	0.9	0.0	0.7	2.6	0.0	1.9	1.7	0.0	1.4	7.7	4.8	5.3	5.4	2.7	4.6	54
de 8001 à 10 000 fr.	3.9	0.6	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	1.6	4.0	2.7	0.6	2.1	25
de 10 001 à 15 000 fr.	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	6
plus de 15 000 fr.	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	4
N**	491	165	656	116	36	152	38	15	53	119	21	140	13	62	75	841	328	1'169	1'169
données manquantes	1'682	837	2'519	266	120	391	175	47	222	436	95	531	235	713	948	2'960	1'964	4'929	4'929

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2008)

Raison principale*	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
fin régulière sans transfert	47.5	48.7	47.9	23.9	23.5	24.1	33.7	42.1	35.5	67.7	51.4	64.9	67.5	68.0	67.8	49.4	54.1	51.2	3'005
fin régulière avec transfert	5.8	6.8	6.1	16.9	15.4	16.3	11.2	7.0	10.3	6.2	7.2	6.4	4.1	3.5	3.6	7.2	6.5	6.9	407
changement de domicile	2.7	1.9	2.4	6.7	12.8	8.4	6.8	3.5	6.1	0.9	10.8	2.6	0.4	0.5	0.5	2.8	2.6	2.7	161
hospitalisation	0.6	1.8	1.0	1.1	1.3	1.1	1.0	1.8	1.1	0.6	1.8	0.8	0.4	0.4	0.4	0.7	1.2	0.9	51
détention	0.1	0.1	0.1	1.9	0.0	1.3	1.0	0.0	0.8	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	15
perte de contact	24.9	25.9	25.2	29.3	24.8	27.8	27.3	31.6	28.2	14.3	14.4	14.3	16.5	17.8	17.4	22.9	21.7	22.4	1'316
rupture explicite	12.9	8.9	11.7	12.6	18.1	14.1	12.7	7.0	11.5	6.8	9.9	7.3	7.0	6.1	6.4	11.2	8.7	10.3	603
décès	2.9	2.0	2.6	3.8	1.3	3.4	2.4	1.8	2.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	2.2	1.1	1.9	109
autre raison	2.4	3.9	2.9	3.8	2.7	3.4	3.9	5.3	4.2	2.9	4.5	3.2	4.1	3.6	3.7	3.2	3.9	3.5	204
N**	2'095	948	3'043	372	149	526	205	57	262	545	111	656	243	749	992	3'679	2'187	5'871	5'871
données manquantes	78	54	132	10	7	17	8	5	13	10	5	15	5	26	31	122	105	227	227

T32b Destination des transferts, selon le problème principal¹ et chez les proches (2008)

Destination des transferts***	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties			N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
traitement résidentiel	40.9	26.7	36.2	46.3	36.8	43.8	55.0	100.0	62.5	33.3	42.9	35.5	22.2	26.3	25.0	42.2	31.1	38.5	120
prise en charge ambulatoire	51.6	62.2	55.1	38.9	52.6	42.5	40.0	0.0	33.3	50.0	28.6	45.2	55.6	63.2	60.7	47.1	57.5	50.6	158
appartement protégé	2.2	0.0	1.4	1.9	0.0	1.4	5.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.9	1.6	5
autre institution spécialisée	5.4	11.1	7.2	13.0	10.5	12.3	0.0	0.0	0.0	16.7	28.6	19.4	22.2	10.5	14.3	8.7	10.4	9.3	29
N**	93	45	138	54	19	73	20	4	24	24	7	31	9	19	28	206	106	312	312
données manquantes	29	19	48	9	4	13	3	0	3	10	1	11	1	7	8	59	36	95	95

T32c Cause de décès, selon le problème principal¹ et chez les proches (2008)

Cause de décès****	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties			N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
suicide	14.0	13.3	13.8	20.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	10.5	12.5	9
accident	9.3	13.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	10.5	8.3	6
maladie	69.8	60.0	67.2	60.0	100.0	66.7	33.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	66.0	63.2	65.3	47
surdose ou intoxication aiguë	7.0	6.7	6.9	20.0	0.0	16.7	66.7	100.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	10.5	11.1	8
autre cause de décès	0.0	6.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.3	2.8	2
N**	43	15	58	5	1	6	3	1	4	1	0	1	0	1	1	53	19	72	72
données manquantes	18	4	22	9	1	12	2	0	2	0	0	0	0	0	0	29	6	37	37

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s transféré-e-s. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s décédé-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2008)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
Durée de la prise en charge* (%)																			
1 semaine ou moins	4.5	4.7	4.5	3.4	2.6	3.1	2.8	3.2	2.9	5.8	2.6	5.2	11.3	10.2	10.5	5.5	6.3	5.8	354
> 1 semaine à 1 mois	3.0	3.8	3.3	1.8	3.2	2.2	2.8	4.8	3.3	7.2	5.2	6.9	4.8	4.1	4.3	3.7	4.0	3.8	231
> 1 à 2 mois	4.3	5.4	4.6	2.6	1.3	2.2	4.7	4.8	4.7	9.0	7.8	8.8	6.9	5.3	5.7	5.0	5.2	5.1	308
>2 à 3 mois	4.6	4.8	4.7	2.4	9.0	4.2	3.3	4.8	3.6	4.9	9.6	5.7	7.3	5.2	5.7	4.6	5.4	4.9	300
>3 à 6 mois	12.0	12.3	12.1	7.3	12.8	8.8	11.7	8.1	10.9	13.5	15.7	13.9	16.9	15.6	15.9	12.1	13.8	12.8	777
>6 mois à 1 an	28.0	26.8	27.6	27.2	23.7	26.0	28.2	27.4	28.0	35.3	36.5	35.5	31.9	35.1	34.3	29.7	30.6	30.0	1'830
>1 à 2 ans	23.7	25.3	24.2	25.1	22.4	24.1	29.6	35.5	30.9	18.0	13.0	17.2	13.3	16.8	15.9	22.2	21.3	21.9	1'331
>2 à 3 ans	8.5	7.8	8.3	12.6	10.9	12.0	12.7	6.5	11.3	4.3	4.3	4.3	6.0	4.8	5.1	8.1	6.7	7.5	459
>3 à 5 ans	6.7	5.7	6.4	8.1	7.1	7.7	3.3	3.2	3.3	1.6	3.5	1.9	1.2	2.2	2.0	5.2	4.2	4.9	296
>5 à 10 ans	4.1	2.9	3.7	6.3	3.8	6.1	0.9	1.6	1.1	0.2	1.7	0.4	0.4	0.8	0.7	3.1	2.0	2.7	165
plus de 10 ans	0.6	0.6	0.6	3.1	3.2	3.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.7	40
N**	2'168	1'001	3'169	382	156	543	213	62	275	555	115	670	248	775	1'023	3'796	2'290	6'091	6'091
<i>données manquantes</i>	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	2	7	7
Durée (en semaines)																			
moyenne	73.2	67.9	71.5	107.9	93.2	107.2	61.2	58.0	60.5	38.8	46.8	40.2	35.6	41.5	40.1	66.2	57.8	63.4	
écart-type	91.0	95.3	92.4	139.6	133.4	143.2	54.6	62.0	56.2	43.7	65.9	48.3	39.4	52.1	49.4	88.0	82.8	87.1	
1er quartile	20.6	18.0	19.9	30.6	19.9	28.1	24.0	24.0	24.0	10.7	11.9	11.0	9.0	12.1	11.1	18.4	15.3	17.1	
valeur médiane	44.0	42.1	43.4	60.6	45.7	56.7	49.1	43.6	48.1	29.1	28.4	29.1	25.7	28.3	28.0	39.1	35.0	37.9	
3e quartile	89.9	81.3	86.3	124.3	107.1	122.6	86.6	74.7	82.6	51.3	45.7	50.4	46.6	50.9	50.0	79.8	69.0	75.3	
N**	2'168	1'001	3'169	382	156	543	213	62	275	555	115	670	248	775	1'023	3'796	2'290	6'091	
<i>données manquantes</i>	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	2	7	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2008)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Substitution pendant la prise en charge*																
non	98.1	97.8	98.0	44.1	36.7	42.2	92.7	85.7	91.1	99.2	97.9	99.0	92.0	91.1	91.8	3'547
oui	1.9	2.2	2.0	55.9	63.3	57.8	7.3	14.3	8.9	0.8	2.1	1.0	8.0	8.9	8.2	318
N**	1'643	721	2'364	299	109	408	150	42	192	476	97	573	2'759	1'106	3'865	3'865
données manquantes	530	278	808	83	47	135	63	20	83	77	19	96	792	407	1'204	1'204
Type de substitution***																
héroïne	6.3	6.3	6.3	4.2	4.5	4.3	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0	33.3	4.6	5.3	4.8	15
méthadone	62.5	25.0	50.0	88.5	87.9	88.3	90.0	100.0	93.8	50.0	50.0	50.0	84.3	77.9	82.4	257
autres opiacés	0.0	6.3	2.1	5.5	6.1	5.6	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	16.7	4.6	5.3	4.8	15
autres substances	31.3	62.5	41.7	1.8	1.5	1.7	10.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.5	11.6	8.0	25
N**	32	16	48	165	66	231	10	6	16	4	2	6	217	95	312	312
données manquantes	0	0	0	2	3	5	1	0	1	0	0	0	3	3	6	6
Substitution après la prise en charge*																
non	99.5	99.1	99.4	67.5	61.8	66.0	93.2	92.9	93.1	99.6	97.9	99.3	96.0	95.4	95.8	3'516
oui	0.5	0.9	0.6	32.5	38.2	34.0	6.8	7.1	6.9	0.4	2.1	0.7	4.0	4.6	4.2	154
N**	1'578	687	2'265	252	89	341	147	42	189	466	94	560	2'627	1'043	3'670	3'670
données manquantes	595	312	907	130	67	202	66	20	86	87	22	109	924	470	1'399	1'399
Type de substitution***																
prescription d'héroïne	12.5	33.3	21.4	11.0	14.7	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	14.6	11.0	17
traitement de substitution	87.5	66.7	78.6	89.0	85.3	87.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	90.6	85.4	89.0	137
N**	8	6	14	82	34	116	10	3	13	2	2	4	106	48	154	154
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s substitué-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2008)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			N	
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total					
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Postcure prévue et mise en place*																	
non	88.6	85.2	87.6	69.3	72.1	70.0	84.6	87.5	85.2	89.3	84.2	88.3	86.2	82.8	85.3	2'019	
oui	11.4	14.8	12.4	30.7	27.9	30.0	15.4	12.5	14.8	10.7	15.8	11.7	13.8	17.2	14.7	349	
N**	1'131	474	1'605	205	68	273	91	24	115	168	38	206	1'701	667	2'368	2'368	
<i>données manquantes</i>	1'042	525	1'567	177	88	270	122	38	160	385	78	463	1'850	846	2'701	2'701	
Type de la postcure prévue***																	
appartement protégé de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
service de postcure de l'institution	0.9	1.6	1.1	8.5	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.9	2.5	8	
appartement protégé extérieur	2.6	1.6	2.2	6.8	11.1	7.8	7.7	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8	3.8	12	
service de postcure extérieur	9.6	6.3	8.4	22.0	27.8	23.4	7.7	33.3	12.5	25.0	0.0	19.0	14.1	13.2	13.8	44	
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	22.6	15.6	20.1	6.8	5.6	6.5	7.7	0.0	6.3	18.8	20.0	19.0	16.0	12.3	14.7	47	
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	5.2	1.6	3.9	23.7	22.2	23.4	15.4	0.0	12.5	6.3	0.0	4.8	11.7	4.7	9.4	30	
autre centre de consultation	15.7	20.3	17.3	10.2	16.7	11.7	7.7	66.7	18.8	18.8	0.0	14.3	14.6	19.8	16.3	52	
groupe d'entraide	7.0	6.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.8	4.1	13	
groupe d'ancien-ne-s client-e-s de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	1	
autre	40.9	54.7	45.8	28.8	16.7	26.0	46.2	33.3	43.8	31.3	80.0	42.9	36.6	47.2	40.1	128	
N**	115	64	179	59	18	77	13	3	16	16	5	21	213	106	319	319	
<i>données manquantes</i>	14	6	20	4	1	5	1	0	1	2	1	3	21	9	30	30	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pour lesquels une postcure est prévue. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2008)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Problèmes addictifs*																
alcool	56.9	61.3	58.3	20.9	26.6	22.4	22.0	27.0	23.1	5.7	11.6	6.7	38.7	45.2	40.6	1'348
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.1	0.3	0.2	6.8	2.1	5.6	1.6	5.4	2.5	0.2	1.2	0.4	1.0	0.7	0.9	31
héroïne	1.1	0.5	0.9	48.7	58.5	51.3	3.3	5.4	3.8	0.5	4.7	1.2	6.5	6.8	6.6	218
méthadone	0.3	0.3	0.3	18.6	14.9	17.6	4.9	0.0	3.8	0.2	2.3	0.6	2.6	2.1	2.4	80
autres opiacés	0.1	0.2	0.1	1.5	2.1	1.7	0.8	0.0	0.6	0.2	0.0	0.2	0.3	0.4	0.3	11
cocaïne	1.8	1.6	1.7	13.7	13.8	13.7	43.1	48.6	44.4	1.2	4.7	1.8	5.1	4.8	5.0	167
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.8	2.7	1.3	0.5	1.2	0.6	0.3	0.3	0.3	11
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.8	0.0	0.6	0.5	0.0	0.4	0.3	0.2	0.2	8
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
barbituriques	0.1	0.3	0.2	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	5
benzodizépines	1.4	3.8	2.1	12.9	14.9	13.4	1.6	0.0	1.3	0.2	2.3	0.6	2.6	4.4	3.2	105
autres somnifères et tranquillisants	0.4	1.1	0.6	0.8	3.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	0.6	21
LSD	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	2
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	2
cannabis	3.0	1.6	2.6	14.8	13.8	14.6	15.4	8.1	13.8	43.1	57.0	45.5	12.3	7.8	11.0	364
tabac	12.1	12.1	12.1	20.2	16.0	19.0	8.9	13.5	10.0	8.6	11.6	9.1	12.8	14.0	13.1	435
autres substances	0.2	0.2	0.2	0.4	2.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	0.4	0.4	0.5	0.4	14
jeu pathologique	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	1.0	33
troubles alimentaires	0.1	1.3	0.4	0.0	1.1	0.3	0.0	2.7	0.6	0.0	1.2	0.2	0.1	4.4	1.4	46
autres troubles assimilable à une addiction	0.1	0.5	0.2	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.5	16
aucun	39.5	35.8	38.4	27.4	13.8	23.8	40.7	35.1	39.4	52.1	34.9	49.2	41.0	33.3	38.7	1'285
N**	1'392	636	2'028	263	94	357	123	37	160	420	86	506	2'344	974	3'318	3'318
<i>données manquantes</i>	781	363	1'144	119	62	186	90	25	115	133	30	163	1'207	539	1'751	1'751

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T37 Fréquence des rechutes, substance ou comportement impliqué et durée des rechutes pendant la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2008)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence des rechutes*																
aucune	55.9	46.3	53.0	30.5	22.9	28.3	52.9	65.0	56.3	68.8	56.5	66.7	55.4	46.0	52.7	806
une fois	9.4	11.3	10.0	9.3	16.7	11.4	13.7	10.0	12.7	8.3	13.0	9.1	9.5	12.0	10.2	156
deux fois	8.7	9.4	8.9	8.5	10.4	9.0	5.9	0.0	4.2	4.6	0.0	3.8	8.0	8.4	8.1	124
trois ou quatre fois	9.4	13.8	10.7	11.9	22.9	15.1	11.8	10.0	11.3	9.2	21.7	11.4	9.4	14.3	10.8	165
cinq fois ou plus	16.6	19.4	17.4	39.8	27.1	36.1	15.7	15.0	15.5	9.2	8.7	9.1	17.7	19.3	18.2	278
N**	755	320	1'075	118	48	166	51	20	71	109	23	132	1'088	441	1'529	1'529
données manquantes	1'418	679	2'097	264	108	377	162	42	204	444	93	537	2'463	1'072	3'540	3'540
Substance/comportement addictif lors des rechutes***																
alcool	97.8	99.4	98.4	31.1	31.4	31.2	26.1	28.6	26.7	21.2	0.0	17.1	76.1	79.5	77.2	528
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.6	0.2	9.5	2.9	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.9	1.3	9
opiacés	2.8	1.2	2.3	82.4	88.6	84.4	8.7	42.9	16.7	0.0	12.5	2.4	15.9	17.0	16.2	111
cocaïne et dérivés	2.2	2.4	2.3	28.4	20.0	25.7	78.3	71.4	76.7	6.1	12.5	7.3	10.9	8.0	9.9	68
stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	12.5	9.8	0.7	0.4	0.6	4
médicaments	2.2	3.0	2.5	23.0	22.9	22.9	8.7	0.0	6.7	0.0	12.5	2.4	6.1	7.6	6.6	45
hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
cannabis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	1
tabac	2.2	1.2	1.9	23.0	20.0	22.0	8.7	0.0	6.7	84.8	87.5	85.4	11.7	7.6	10.4	71
substances volatiles	2.5	1.2	2.1	17.6	11.4	15.6	0.0	0.0	0.0	3.0	12.5	4.9	5.0	3.6	4.5	31
autres substances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	1
jeu pathologique	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	0.7	5
troubles alimentaires	0.0	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.9	6
autres troubles assimilables à une addiction	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	0.6	4
N**	321	164	485	74	35	109	23	7	30	33	8	41	460	224	684	684
données manquantes	12	8	20	8	2	10	1	0	1	1	2	3	25	14	39	39
Durée des rechutes****																
1 à 2 jours	30.0	31.5	30.5	25.0	20.0	23.3	45.5	40.0	43.8	40.0	50.0	41.7	31.3	30.9	31.1	84
3 à 6 jours	33.1	28.8	31.5	15.0	30.0	20.0	18.2	20.0	18.8	40.0	0.0	33.3	29.5	26.6	28.5	77
7 à 10 jours	12.3	11.0	11.8	20.0	10.0	16.7	0.0	20.0	6.3	20.0	0.0	16.7	13.1	12.8	13.0	35
>10 jours à 2 semaines	3.1	2.7	3.0	5.0	0.0	3.3	9.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	3.4	3.2	3.3	9
>2 à 4 semaines	6.9	9.6	7.9	10.0	0.0	6.7	9.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.8	7.4	7.0	19
>4 à 6 semaines	8.5	5.5	7.4	5.0	0.0	3.3	9.1	20.0	12.5	0.0	50.0	8.3	7.4	6.4	7.0	19
>6 à 8 semaines	1.5	5.5	3.0	5.0	30.0	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	7.4	3.7	10
>2 mois	4.6	5.5	4.9	15.0	10.0	13.3	9.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.8	5.3	6.3	17
N**	130	73	203	20	10	30	11	5	16	10	2	12	176	94	270	270
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Pourcentages par colonne, une seule catégorie possible

T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal¹ (selement patient-e-s) (2008)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	32.3	39.6	34.5	1.7	7.5	3.1	17.4	7.1	15.0	17.8	0.0	15.3	26.4	34.4	28.7	368
1 jour par semaine ou moins	1.2	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.9	3.4	1.1	0.8	1.0	13
2 à 3 jours par semaine	1.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.9	1.7	0.9	0.3	0.7	9
4 à 6 jours par semaine	1.3	0.8	1.2	0.0	2.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	0.9	12
une fois par jour	0.5	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	0.4	0.3	0.4	5
plusieurs fois par jour	63.6	58.5	62.0	98.3	90.0	96.2	82.6	92.9	85.0	77.2	88.2	78.8	70.3	63.1	68.3	875
N**	604	265	869	119	40	159	46	14	60	101	17	118	916	366	1'282	1'282
<i>données manquantes</i>	1'569	734	2'303	263	116	384	167	48	215	452	99	551	2'635	1'147	3'787	3'787
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10 cigarettes par jour	15.6	16.0	15.7	4.2	7.4	5.1	12.5	22.2	15.2	52.9	27.3	48.4	17.5	16.1	17.1	107
11 à 20 cigarettes par jour	45.5	46.2	45.7	43.1	40.7	42.4	54.2	66.7	57.6	29.4	36.4	30.6	44.3	44.8	44.5	278
21 à 30 cigarettes par jour	28.5	26.9	28.0	44.4	44.4	44.4	33.3	11.1	27.3	11.8	27.3	14.5	29.3	28.7	29.1	182
31 cigarettes par jour ou plus	10.4	10.9	10.6	8.3	7.4	8.1	0.0	0.0	0.0	5.9	9.1	6.5	8.9	10.3	9.3	58
N**	288	119	407	72	27	99	24	9	33	51	11	62	451	174	625	625
<i>données manquantes</i>	121	41	162	45	10	55	14	4	18	32	6	38	223	66	289	289

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème¹ (seulement patient-e-s) (2008)

	Patient-e-s: principale substance posant problème ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Objectif de consommation*																
abstinence définitive	34.7	40.3	36.4	61.4	60.7	61.2	74.0	70.8	73.2	46.8	29.4	43.6	40.5	43.0	41.2	843
abstinence limitée dans le temps	14.2	12.9	13.8	2.3	3.3	2.5	6.8	4.2	6.2	6.5	2.9	5.9	10.7	9.8	10.4	213
consommation contrôlée	35.1	34.7	35.0	13.1	11.5	13.2	9.6	12.5	10.3	32.5	38.2	33.5	32.3	30.8	31.9	652
aucune limitation envisagée	6.4	3.9	5.6	8.0	3.3	6.6	2.7	4.2	3.1	4.5	11.8	5.9	6.4	4.3	5.8	118
pas déterminé pour l'instant	8.4	6.8	7.9	14.8	19.7	15.7	6.8	8.3	7.2	9.1	17.6	10.6	9.1	9.5	9.2	188
autre	1.3	1.5	1.3	0.6	1.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1.0	2.7	1.5	30
N**	960	412	1'372	176	61	242	73	24	97	154	34	188	1'457	582	2'044	2'044
données manquantes	1'213	587	1'800	206	95	301	140	38	178	399	82	481	2'094	931	3'025	3'025
Pronostic*																
très bon pronostic	11.9	12.5	12.1	8.3	6.7	7.9	13.3	14.3	13.5	16.8	6.3	14.9	12.0	11.4	11.8	247
bon pronostic	46.3	44.5	45.7	33.1	35.0	33.6	45.3	52.4	46.9	56.4	50.0	55.2	46.3	45.5	46.1	965
plutôt mauvais pronostic	30.7	31.0	30.8	37.9	41.7	38.9	33.3	28.6	32.3	24.2	21.9	23.8	30.8	31.0	30.9	647
mauvais pronostic	11.2	12.0	11.4	20.7	16.7	19.7	8.0	4.8	7.3	2.7	21.9	6.1	10.9	12.2	11.3	236
N**	1'001	449	1'450	169	60	229	75	21	96	149	32	181	1'479	616	2'095	2'095
données manquantes	1'172	550	1'722	213	96	314	138	41	179	404	84	488	2'072	897	2'974	2'974

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu