

Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance

Résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2009

Recueil de tableaux statistiques

Luca Notari, Etienne Maffli, Mariana Astudillo

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du monitoring act-info. Nous remercions également les collaborateurs et collaboratrices des services de consultation qui ont effectué les tâches de logistique et de saisie. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance et coordonne l'ensemble du réseau act-info. Un grand merci également à Edith Bacher et Christiane Gmel pour la conception graphique et la mise en page de ce rapport ainsi qu'à Marina Delgrande Jordan pour sa précieuse collaboration dans le développement des syntaxes d'analyse.

Compléments d'information: Etienne Maffli, tél. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emaffli@addiction-info.ch

Réalisation: Luca Notari, Etienne Maffli & Mariana Astudillo,
Addiction Info Suisse

Diffusion: Librairie Addiction Info Suisse, case postale 870,
1001 Lausanne, tél. 021/321 29 35, fax 021 321 29 40,
e-mail librairie@addiction-info.ch

Prix: Fr. 10.–

Langue du texte original: allemand

Graphisme/mise en page: Addiction Info Suisse

Copyright: © Addiction Info Suisse, Lausanne 2010

Citation recommandée: Notari, L., Maffli, E. & Astudillo, M. (2010). Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance: résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2009 – Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Addiction Info Suisse.

Table des matières

act-info – addiction care and therapy information

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)

ADMISSION

- T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2009)
- T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2009)
- T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2009)
- T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2009)
- T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2009)
- T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2009)
- T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2009)
- T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2009)
- T9 Instance d'envoi principale et secondaire, selon le problème principal et chez les proches (2009)
- T10 Type d'aide attendue à l'admission et statut légal de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2009)
- T11 Traitements/prises en charge avant l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2009)
- T12 Substitution et autre traitement/prise en charge à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2009)
- T13a Admission suite à une cure de sevrage, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2009)
- T13b Fréquence des sevrages sans aide professionnelle avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2009)
- T14 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2009)
- T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2009), hommes
- T15.1b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2009), hommes

- T15.2a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2009), femmes
- T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2009), femmes
- T15.3a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2009), hommes & femmes
- T15.3b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2009), hommes & femmes
- T16.1a Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2009), hommes
- T16.1b Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2009), femmes
- T16.1c Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2009), hommes & femmes
- T16.2a Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2009), hommes
- T16.2b Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2009), femmes
- T16.2c Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2009), hommes & femmes
- T17 Mode d'administration de la principale substance posant problème au cours des 6 derniers mois avant l'admission (2009)
- T18 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 6 derniers mois avant l'admission des injections, échange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois avant l'admission et âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2009)
- T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2009), hommes
- T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2009), femmes
- T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2009), hommes & femmes
- T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2009), hommes
- T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2009), femmes
- T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2009), hommes & femmes
- T20 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2009)

- T21 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2009)
- T22a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2009), hommes
- T22b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2009), femmes
- T22c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2009), hommes & femmes
- T23a Problèmes psychiques au cours de la vie (2009), hommes
- T23b Problèmes psychiques au cours de la vie (2009), femmes
- T23c Problèmes psychiques au cours de la vie (2009), hommes & femmes
- T24 Proches: Lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2009)
- T25 Proches: problème principal et autres problèmes de la tierce personne (2009)
- T26 Proches: Propres problèmes des proches liés au problème de la tierce personne (2009)

SORTIE

- T27 Sexe et âge, selon le problème principal et chez les proches (2009)
- T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2009)
- T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2009)
- T30 Plus haute formation achevée, source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2009)
- T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2009)
- T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2009)
- T32b Destination des transferts, selon le problème principal et chez les proches (2009)
- T32c Cause de décès, selon le problème principal et chez les proches (2009)
- T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2009)
- T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2009)
- T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2009)
- T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2009)

- T37 Fréquence des rechutes, substance ou comportement impliqué et durée des rechutes pendant la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2009)
- T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2009)
- T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème (seulement patient-e-s) (2009)

act-info - addiction care and therapy information

Le Réseau de monitoring (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse:

- SAMBAD (Statistique du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance)
- Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HegeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Méthadone (Statistique nationale des traitements de substitution)

Ces cinq statistiques disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés. Les données communes sont intégrées dans une base de données centralisée, permettant ainsi de procéder à des analyses sur l'ensemble des secteurs. Avec l'adoption des standards européens (Treatment Demand Indicator), la comparabilité des données au plan international est également garantie.

act-info est financé et coordonné par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne (ISPM), Addiction Info Suisse à Lausanne et l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zürich (ISGF).

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)

Dès 2004, les instruments de monitoring *act-info* ont été introduits dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance et remplacent les anciens questionnaires en vigueur depuis 1994. Le monitoring dans ce secteur est confiée à Addiction Suisse Info à Lausanne.

La statistique *act-info* SAMBAD offre un aperçu de la clientèle et des activités de l'aide ambulatoire en matière de dépendance en Suisse. Les données sont récoltées au début et à la fin de la prise en charge. Les informations rassemblées à l'admission renseignent en particulier sur les caractéristiques socio-démographiques des client-e-s, sur leurs expériences de traitement ainsi que sur leurs modes de consommation et problèmes psychosociaux avant la prise en charge. Les informations récoltées à la sortie rendent principalement compte des caractéristiques socio-démographiques des client-e-s à ce moment, des mesures prises par les intervenant-e-s durant la prise en charge et des circonstances de la fin de celle-ci.

En 2009, 80 des 216 institutions recensées dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance ont participé au monitoring *act-info*. Il s'agit de services de consultation spécialisés pour les problèmes liés à l'alcool et/ou aux drogues illégales ainsi que de divers types de services polyvalents offrant également une aide pour les problèmes addictifs.

Explications concernant les tableaux

La présente statistique descriptive des données de l'enquête act-*info* auprès des client-e-s du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance repose sur deux types de tableaux:

- lorsque la question a des catégories de réponses prédéfinies ou recodées en tranches distinctes (par exemple "état civil" ou "âge"), le tableau indique les pourcentages des différentes catégories de réponses
- lorsque la question n'a pas de catégories prédéfinies, mais requiert une valeur numérique (par exemple "âge au début de la consommation problématique"), le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1^{er} quartile, 3^e quartile)

La plupart des tableaux présentent les résultats de façon distincte pour les sous-groupes de patients et patientes ayant mentionné l'**alcool**, un **opiacé** (héroïne notamment), la **cocaïne** (et dérivés) ou le **cannabis** comme problème principal au moment de leur admission. Les **proches** venant consulter pour les problèmes d'un tiers font également l'objet d'analyses séparées pour les aspects socio-démographiques. A l'exception des thèmes directement liés aux modes de consommation ou aux formes de comportements addictifs non liés aux substances, les résultats ne sont en revanche pas présentés séparément pour les client-e-s (peu nombreux) ayant mentionné d'autres substances (par exemple un stimulant ou les substances volatiles) ou un problème addictif non lié à une substance (par exemple jeu pathologique) comme problème principal. Ces personnes sont cependant incluses dans les analyses portant sur l'ensemble des prises en charge figurant dans les blocs à droite des tableaux respectifs. Toutes les analyses sont effectuées séparément pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour les deux sexes confondus (colonnes "Total" comprenant le cas échéant également les quelques personnes dont le sexe n'est pas connu).

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Le nombre de réponses valides **N** représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages ou autres paramètres. Il est indiqué pour chaque groupe ou sous-groupe considéré. Au dessous, le nombre correspondant de données manquantes figure également. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés particulièrement prudemment.

Des notes en bas de tableau renseignent sur les éventuelles particularités des groupes de référence ainsi que sur le type de question. Lorsque plusieurs réponses sont possibles (par exemple aux tableaux du thème T19, "autres problèmes addictifs") les pourcentages obtenus ne sont pas additifs.

T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2009)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sexe*																			
hommes	70.7			75.8			82.1			83.0			21.4			65.7		4'878	
femmes	29.3			24.2			17.9			17.0			78.6			34.3		2'549	
sexe pas connu	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		0	
N**	2'710	1'123	3'833	542	173	715	253	55	308	832	171	1'003	213	783	996	4'878	2'549	7'427	7'427
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	7.0	7.0	7.0	1.9	0.8	1.0	1.7	1.1	1.5	112
15-19	2.7	3.1	2.8	4.3	9.2	5.5	5.5	21.8	8.4	60.3	60.8	60.4	7.1	2.3	3.3	13.8	8.7	12.0	893
20-24	5.2	3.0	4.6	12.6	23.1	15.1	20.9	25.5	21.8	13.5	12.3	13.3	3.8	4.4	4.2	8.5	6.9	8.0	591
25-29	8.4	4.7	7.3	19.8	19.1	19.6	25.3	20.0	24.4	9.1	9.9	9.3	4.2	7.7	7.0	10.7	7.9	9.7	722
30-34	9.4	7.9	9.0	17.2	15.0	16.7	17.8	16.4	17.5	4.9	4.7	4.9	5.7	8.6	8.0	9.9	8.8	9.5	703
35-39	11.2	7.9	10.2	21.4	11.6	19.0	13.4	3.6	11.7	2.2	1.8	2.1	10.8	10.7	10.7	11.0	8.7	10.2	758
40-44	14.3	16.6	15.0	15.5	12.1	14.7	9.1	10.9	9.4	2.4	2.3	2.4	8.0	17.2	15.3	11.7	15.0	12.8	951
45-49	15.6	16.9	16.0	5.7	6.4	5.9	4.0	0.0	3.2	0.2	0.6	0.3	15.1	17.5	17.0	10.7	14.0	11.8	877
50-54	13.0	15.3	13.7	2.6	2.9	2.7	2.8	1.8	2.6	0.1	0.6	0.2	16.5	12.7	13.5	8.7	11.6	9.7	720
55-59	8.9	10.1	9.3	0.7	0.6	0.7	0.8	0.0	0.6	0.2	0.0	0.2	9.9	6.3	7.1	5.8	7.0	6.2	460
60-64	6.3	8.5	6.9	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	5.4	5.3	4.0	5.6	4.6	339
65-69	2.9	3.7	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.5	3.4	1.8	2.9	2.2	163
70-74	1.6	1.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	1.9	2.5	1.1	1.2	1.2	87
75 et plus	0.4	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1.0	1.7	0.4	0.7	0.5	37
N**	2'705	1'121	3'826	541	173	714	253	55	308	832	171	1'003	212	778	990	4'871	2'542	7'413	7'413
données manquantes	5	2	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	6	7	7	14	14
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	44.0	46.3	44.6	33.9	31.7	33.4	31.2	27.5	30.6	20.6	20.5	20.6	46.3	44.3	44.7	37.7	41.5	39.0	
écart-type	12.9	12.5	12.8	8.6	9.4	8.8	8.7	8.4	8.7	6.7	7.1	6.8	16.2	13.0	13.8	14.7	14.4	14.7	
1er quartile	34.6	39.4	35.6	27.5	24.1	26.5	24.7	20.9	24.2	16.5	16.3	16.4	36.3	36.2	36.2	25.4	30.3	27.0	
valeur médiane	44.6	46.8	45.3	33.7	29.4	32.7	29.5	25.9	29.0	17.7	17.3	17.7	47.8	44.5	45.1	37.6	42.9	39.6	
3e quartile	52.9	54.6	53.5	39.9	39.4	39.8	36.85	31.6	36.1	23.0	23.7	23.0	55.5	52.0	52.8	48.5	51.4	49.8	
N**	2'705	1'121	3'826	541	173	714	253	55	308	832	171	1'003	212	778	990	4'871	2'542	7'413	7'413
données manquantes	5	2	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	6	7	7	14	14

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2009)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Etat civil*																			
célibataire	41.5	29.8	38.1	72.3	69.3	71.5	75.2	71.7	74.6	95.0	92.0	94.5	27.4	23.1	24.0	56.2	38.2	50.1	3'564
marié-e	30.6	32.2	31.1	12.9	12.0	12.7	10.2	13.2	10.7	3.1	3.1	3.1	59.2	53.2	54.5	23.9	33.2	27.1	1'928
séparé-e	6.1	7.0	6.3	3.3	5.4	3.8	2.8	1.9	2.7	0.6	0.6	0.6	3.5	4.5	4.2	4.3	5.3	4.7	332
divorcé-e	20.2	25.1	21.6	10.2	9.0	9.9	11.0	11.3	11.0	1.1	3.1	1.5	9.0	15.2	13.9	14.3	18.7	15.8	1'124
veuf/veuve	1.3	5.4	2.5	0.6	2.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.7	2.2	0.9	3.7	1.8	130
partenariat enregistré	0.3	0.4	0.3	0.8	1.8	1.0	0.8	1.9	1.0	0.1	1.2	0.3	0.5	1.3	1.2	0.4	0.9	0.5	39
N**	2'604	1'083	3'687	519	166	685	246	53	299	799	163	962	201	741	942	4'682	2'435	7'117	7'117
données manquantes	106	40	146	23	7	30	7	2	9	33	8	41	12	42	54	196	114	310	310
Nationalité*																			
CH	80.1	87.5	82.3	67.2	86.3	71.9	68.7	76.9	70.2	86.1	92.0	87.1	83.6	86.7	86.1	79.0	87.0	81.8	5'687
EU	11.6	10.0	11.2	18.8	10.6	16.8	17.2	19.2	17.5	7.8	4.9	7.3	8.2	9.9	9.6	11.9	9.7	11.1	774
autre	8.2	2.6	6.6	14.0	3.1	11.3	14.2	3.8	12.3	6.1	3.1	5.6	8.2	3.3	4.4	9.1	3.3	7.1	495
N**	2'578	1'053	3'631	500	161	661	233	52	285	769	162	931	195	724	919	4'574	2'382	6'956	6'956
données manquantes	132	70	202	42	12	54	20	3	23	63	9	72	18	59	77	304	167	471	471

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2009)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	7.4	8.8	7.8	3.0	1.8	2.7	1.2	3.8	1.7	0.5	0.6	0.5	7.9	8.2	8.1	4.9	6.6	5.5	395
périphérie des grands centres	13.9	16.7	14.7	5.9	4.8	5.6	13.6	7.5	12.5	7.1	4.1	6.6	12.4	14.2	13.8	11.3	12.8	11.8	850
villes de moyenne importance	15.7	16.2	15.9	18.3	22.2	19.2	25.1	20.8	24.3	24.2	27.8	24.8	18.8	16.6	17.1	18.4	18.7	18.5	1'328
petites villes	34.2	32.5	33.7	46.9	43.1	46.0	34.2	39.6	35.1	37.5	40.2	37.9	34.2	29.9	30.8	36.8	33.9	35.8	2'574
campagne	28.8	25.9	28.0	25.9	28.1	26.4	25.9	28.3	26.4	30.7	27.2	30.1	26.7	31.2	30.2	28.5	28.0	28.3	2'036
N**	2'622	1'075	3'697	525	167	692	243	53	296	817	169	986	202	747	949	4'731	2'452	7'183	7'183
données manquantes	88	48	136	17	6	23	10	2	12	15	2	17	11	36	47	147	97	244	244
Type de ménage (30 derniers jours)*																			
seul-e en ménage	38.3	35.3	37.4	33.1	25.0	31.1	32.1	25.0	30.7	10.3	9.7	10.2	12.5	13.3	13.2	30.4	25.7	28.8	1'705
avec un ou les parents	8.6	5.1	7.6	18.5	18.8	18.6	22.0	16.7	21.0	69.7	59.0	68.0	9.0	5.1	5.9	23.0	12.1	19.4	1'146
avec enfant(s), sans partenaire	2.3	10.1	4.5	0.2	4.9	1.4	1.0	6.3	1.9	0.1	4.9	0.9	4.2	16.0	13.6	1.5	10.8	4.6	274
avec partenaire, sans enfant	23.1	27.0	24.2	16.2	26.4	18.8	16.7	25.0	18.3	5.7	4.9	5.5	27.8	26.1	26.5	18.7	24.4	20.6	1'219
avec partenaire et enfant(s)	18.4	15.5	17.6	9.0	13.2	10.1	11.0	2.1	9.3	2.2	0.0	1.8	38.2	37.2	37.4	14.6	19.6	16.3	963
avec d'autres proches	1.4	0.6	1.2	1.9	1.4	1.7	3.8	4.2	3.9	0.9	2.1	1.1	0.0	1.2	1.0	1.5	1.2	1.4	82
avec des amis (colocation)	2.6	1.6	2.4	4.2	5.6	4.5	5.7	4.2	5.4	3.5	3.5	3.5	2.8	0.5	1.0	3.1	1.8	2.7	159
autre	5.3	4.8	5.1	16.9	4.9	13.9	7.7	16.7	9.3	7.6	16.0	8.9	5.6	0.5	1.5	7.2	4.5	6.3	372
N**	2'152	863	3'015	432	144	576	209	48	257	740	144	884	144	570	714	3'948	1'972	5'920	5'920
données manquantes	558	260	818	110	29	139	44	7	51	92	27	119	69	213	282	930	577	1'507	1'507
Situation de domicile (30 dernier jours)*																			
domicile fixe	94.0	93.6	93.9	75.3	85.3	77.8	85.5	84.6	85.3	93.3	91.4	92.9	96.6	97.0	96.9	91.6	93.8	92.3	5'115
sans domicile fixe	4.0	4.8	4.2	17.1	14.0	16.3	11.2	10.3	11.0	4.6	4.3	4.6	3.4	3.0	3.1	5.9	5.0	5.6	310
institution	2.0	1.6	1.9	7.6	0.8	5.9	3.4	5.1	3.7	2.1	4.3	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	1.2	2.1	116
N**	2'056	795	2'851	381	129	510	179	39	218	667	139	806	147	561	708	3'682	1'859	5'541	5'541
données manquantes	654	328	982	161	44	205	74	16	90	165	32	197	66	222	288	1196	690	1886	1'886

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2009)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	33.9	35.2	34.2	45.6	22.7	39.5	37.4	27.6	35.9	63.2	47.4	60.5	13.4	14.1	13.9	38.9	28.6	35.4	1'573
relations temporaires	3.8	4.8	4.1	9.5	4.5	8.2	7.4	13.8	8.3	10.1	13.7	10.7	4.7	1.3	2.0	5.7	4.6	5.3	236
parten. fixe, vivant séparé	13.7	12.6	13.4	12.5	20.9	14.7	21.5	27.6	22.4	15.1	29.5	17.6	10.2	10.4	10.4	14.1	14.5	14.3	634
parten. fixe, mén. commun	48.6	47.5	48.3	32.5	51.8	37.6	33.7	31.0	33.3	11.6	9.5	11.2	71.7	74.2	73.7	41.3	52.3	45.1	2'003
N**	1'677	668	2'345	305	110	415	163	29	192	457	95	552	127	462	589	2'928	1'518	4'446	4'446
données manquantes	1'033	455	1'488	237	63	300	90	26	116	375	76	451	86	321	407	1'950	1'031	2'981	2'981
Nombre d'enfants propres*																			
aucun	42.8	37.5	41.2	63.9	55.4	61.6	65.0	71.4	66.0	94.7	91.9	94.2	32.1	22.7	24.7	55.9	41.2	50.7	2'849
1 enfant	18.0	18.4	18.1	24.6	25.9	25.0	18.1	11.4	17.0	3.0	5.9	3.5	15.7	19.3	18.5	15.7	17.4	16.3	917
2 enfants	26.1	30.7	27.5	9.2	15.1	10.7	11.3	14.3	11.8	1.8	2.2	1.8	32.7	39.6	38.1	18.9	28.4	22.3	1'250
3 enfants ou plus	13.1	13.4	13.2	2.4	3.6	2.7	5.6	2.9	5.2	0.5	0.0	0.4	19.5	18.4	18.6	9.5	13.0	10.7	601
N**	2'057	887	2'944	382	139	521	177	35	212	628	136	764	159	581	740	3'646	1'971	5'617	5'617
données manquantes	653	236	889	160	34	194	76	20	96	204	35	239	54	202	256	1'232	578	1'810	1'810
Nombre d'enfants dans le ménage*																			
aucun	74.1	67.5	72.1	81.7	70.4	78.7	78.4	75.9	78.0	61.9	57.7	61.1	57.6	40.1	43.7	72.1	59.9	67.8	3'350
1 enfant	10.7	15.2	12.0	10.3	16.8	12.0	9.2	6.9	8.8	9.9	13.1	10.5	17.3	22.5	21.4	10.7	16.5	12.8	630
2 enfants	11.2	12.5	11.6	6.3	12.0	7.8	9.2	17.2	10.4	19.1	19.2	19.1	18.0	29.2	26.8	12.3	17.5	14.1	696
3 enfants ou plus	4.0	4.7	4.2	1.7	0.8	1.5	3.3	0.0	2.7	9.0	10.0	9.2	7.2	8.2	8.0	4.9	6.1	5.3	263
N**	1'762	742	2'504	350	125	475	153	29	182	575	130	705	139	524	663	3'204	1'735	4'939	4'939
données manquantes	948	381	1'329	192	48	240	100	26	126	257	41	298	74	259	333	1'674	814	2'488	2'488

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2009)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Plus haute formation achevée*																			
aucune form. achevée	4.7	6.1	5.1	9.0	4.3	7.9	8.7	8.3	8.6	21.5	21.7	21.5	4.2	6.3	5.9	9.1	8.0	8.7	490
scolarité obligatoire	13.3	18.4	14.7	30.8	40.0	32.9	21.6	29.2	23.0	50.6	48.1	50.2	16.9	13.3	14.1	23.4	21.3	22.7	1'277
scolarité complémentaire	3.9	6.5	4.7	3.1	6.4	3.8	1.9	4.2	2.3	3.5	10.1	4.5	1.7	4.4	3.8	3.5	6.1	4.3	243
apprentissage/école prof.	59.5	51.1	57.1	48.0	44.3	47.2	52.4	52.1	52.3	20.2	18.6	20.0	41.5	51.9	49.7	48.9	47.5	48.4	2'720
maturité/diplôme	3.8	3.8	3.8	3.5	3.6	3.5	4.3	4.2	4.3	2.7	1.6	2.5	5.9	5.7	5.7	3.8	4.4	4.0	225
école normale, pédagog.	0.8	1.8	1.1	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2.5	2.8	2.8	0.7	1.9	1.1	59
form. profession. supérieure	6.3	6.3	6.3	2.4	1.4	2.2	4.3	0.0	3.5	1.1	0.0	1.0	12.7	8.1	9.0	4.9	5.7	5.2	290
école profession. supérieure	1.6	1.1	1.5	0.2	0.0	0.2	2.4	2.1	2.3	0.1	0.0	0.1	0.0	1.1	0.9	1.2	1.0	1.1	64
haute école spécialisée	1.5	1.1	1.4	0.4	0.0	0.3	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	3.4	1.8	2.1	1.1	1.1	1.1	64
université, haute école	4.6	3.8	4.4	1.7	0.0	1.3	2.9	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	11.0	4.6	5.9	3.4	3.0	3.3	184
N**	2'103	820	2'923	458	140	598	208	48	256	707	129	836	118	457	575	3'832	1'784	5'616	5'616
données manquantes	607	303	910	84	33	117	45	7	52	125	42	167	95	326	421	1'046	765	1'811	1'811
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	34.3	44.5	37.2	52.3	67.5	56.0	31.8	52.4	35.1	18.0	30.2	20.0	28.3	28.6	28.6	33.8	40.9	36.1	962
apprenti-e, stagiaire	2.6	1.2	2.2	4.6	5.2	4.7	3.6	0.0	3.1	28.4	25.6	27.9	8.7	1.3	2.5	6.4	3.3	5.4	143
manœuvre, aide	2.8	5.4	3.5	5.9	2.6	5.1	1.8	0.0	1.5	5.0	0.0	4.2	2.2	1.3	1.4	3.4	3.6	3.5	92
ouvrier/ère formé-e sur le tas	7.0	5.2	6.5	7.5	2.6	6.3	11.8	0.0	9.9	1.4	4.7	1.9	0.0	3.4	2.9	6.7	4.2	5.9	157
ouvrier/ère formé-e (CFC)	13.9	9.1	12.5	13.0	9.1	12.0	16.4	9.5	15.3	13.1	0.0	10.9	2.2	8.1	7.1	13.5	8.7	11.9	318
contremaître-sse	2.2	0.2	1.7	1.3	0.0	0.9	2.7	0.0	2.3	1.4	0.0	1.1	2.2	0.9	1.1	2.0	0.3	1.5	39
employé-e non qualifié-e	13.9	18.7	15.2	6.7	10.4	7.6	9.1	28.6	12.2	5.9	9.3	6.4	10.9	33.8	30.0	11.6	22.3	15.1	402
empl. qualifié-e, cadre moyen	8.9	6.8	8.3	2.9	0.0	2.2	10.0	0.0	8.4	2.3	4.7	2.6	15.2	12.0	12.5	7.4	7.1	7.3	194
employé-e, cadre supérieur	2.7	2.1	2.5	1.3	0.0	0.9	1.8	9.5	3.1	0.9	0.0	0.8	10.9	1.3	2.9	2.3	1.6	2.1	56
indépendant-e	9.7	5.2	8.4	1.7	1.3	1.6	7.3	0.0	6.1	0.9	0.0	0.8	17.4	7.7	9.3	7.3	4.9	6.5	173
écolier/ère, étudiant-e	1.0	1.2	1.1	0.8	1.3	0.9	2.7	0.0	2.3	22.5	23.3	22.6	2.2	1.3	1.4	4.6	2.6	3.9	105
autre statut	1.1	0.5	0.9	2.1	0.0	1.6	0.9	0.0	0.8	0.5	2.3	0.8	0.0	0.4	0.4	1.1	0.5	0.9	23
N**	1'083	427	1'510	239	77	316	110	21	131	222	43	265	46	234	280	1'804	860	2'664	2'664
données manquantes	1'627	696	2'323	303	96	399	143	34	177	610	128	738	167	549	716	3'074	1'689	4'763	4'763

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2009)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Source de revenu principale (au cours des 30 derniers jours)*																			
salaire	55.3	38.8	50.7	27.8	26.7	27.5	58.3	44.0	55.9	24.4	22.1	24.0	63.3	58.5	59.5	46.9	43.3	45.7	3'044
économies, épargne	1.5	1.3	1.4	1.6	1.8	1.7	1.3	4.0	1.7	1.2	0.0	1.0	1.2	1.0	1.0	1.4	1.1	1.3	86
rente (AVS, AI ou autre)	14.3	20.6	16.1	12.4	13.9	12.8	7.1	4.0	6.6	3.1	5.5	3.5	19.9	13.1	14.5	11.8	16.0	13.2	877
aide sociale	14.9	12.3	14.2	37.1	38.2	37.4	12.5	24.0	14.5	8.1	13.5	9.0	5.4	2.1	2.8	15.1	11.2	13.8	921
assurance-chômage	8.3	6.6	7.8	9.3	5.5	8.4	9.2	8.0	9.0	3.7	3.1	3.6	3.0	1.3	1.7	7.1	4.4	6.2	413
soutien du/de la partenaire	1.2	15.6	5.3	1.0	3.0	1.5	2.1	0.0	1.7	0.2	1.2	0.4	0.6	19.7	15.6	1.0	13.6	5.2	345
soutien parents/proches/amis	2.9	2.8	2.9	6.7	9.7	7.4	7.5	14.0	8.6	58.0	54.0	57.3	4.8	3.7	3.9	14.8	9.0	12.9	857
deal, combines	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.2	0.4	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	11
autres revenus illégaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
autre	1.5	1.9	1.6	2.4	1.2	2.1	0.8	2.0	1.0	0.9	0.6	0.8	1.8	0.6	0.9	1.5	1.4	1.5	99
N**	2'454	964	3'418	493	165	658	240	50	290	803	163	966	166	620	786	4'459	2'197	6'656	6'656
données manquantes	256	159	415	49	8	57	13	5	18	29	8	37	47	163	210	419	352	771	771
Taux d'activité principal (au cours des 30 derniers jours)*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	50.1	24.2	42.8	22.4	14.7	20.5	50.4	36.5	48.0	17.1	11.0	16.1	58.7	37.4	41.9	41.0	27.5	36.6	2'374
activité à temps partiel	3.9	18.6	8.0	4.8	10.4	6.1	4.5	5.8	4.7	2.3	6.1	2.9	3.3	28.3	23.0	3.7	18.2	8.4	544
plusieurs activités occas.	1.1	1.1	1.1	1.4	0.6	1.2	2.0	1.9	2.0	0.8	0.6	0.7	0.7	1.8	1.6	1.0	1.3	1.1	73
en formation	3.5	3.0	3.3	2.4	6.1	3.3	3.7	9.6	4.7	56.8	58.3	57.1	6.0	4.9	5.1	14.2	9.8	12.8	828
sans activité prof.	17.8	35.3	22.8	22.0	33.1	24.7	13.5	13.5	13.5	4.5	9.2	5.3	20.7	24.3	23.5	15.5	28.8	19.8	1'285
sans trav., en quête d'emploi	15.7	11.9	14.6	27.2	17.8	24.9	15.6	23.1	16.9	9.1	6.7	8.7	3.3	2.4	2.6	14.9	8.9	13.0	841
sans trav., futur empl. garanti	0.5	0.2	0.4	1.0	0.6	0.9	0.8	0.0	0.7	0.4	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.4	28
autre	7.5	5.7	7.0	18.8	16.6	18.3	9.4	9.6	9.5	9.0	6.7	8.6	7.3	0.9	2.3	9.1	5.2	7.8	507
N**	2'384	934	3'318	504	163	667	244	52	296	799	163	962	150	551	701	4'389	2'091	6'480	6'480
données manquantes	326	189	515	38	10	48	9	3	12	33	8	41	63	232	295	489	458	947	947

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2009)

	Patient-e-s: problème principale												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Revenu mensuel net (6 derniers mois)*																			
aucun revenu	24.5	34.5	27.1	29.9	30.2	30.0	28.1	45.5	30.7	37.3	58.3	40.1	23.5	21.4	21.7	27.1	32.3	28.7	461
moins de 1000 fr.	5.7	5.1	5.5	15.2	17.0	15.7	7.8	9.1	8.0	30.4	29.2	30.2	11.8	10.7	10.8	10.8	9.2	10.3	166
de 1001 à 2000 fr.	7.5	9.8	8.1	15.2	24.5	17.5	6.3	9.1	6.7	8.2	4.2	7.7	11.8	7.8	8.3	8.3	11.1	9.1	147
de 2001 à 3000 fr.	13.5	17.0	14.4	18.3	17.0	18.0	12.5	18.2	13.3	2.5	0.0	2.2	5.9	13.6	12.5	12.0	15.6	13.1	210
de 3001 à 4000 fr.	12.4	13.6	12.7	9.8	9.4	9.7	18.8	9.1	17.3	9.5	4.2	8.8	5.9	18.4	16.7	12.3	13.9	12.7	205
de 4001 à 5000 fr.	15.3	10.2	13.9	6.1	0.0	4.6	18.8	9.1	17.3	9.5	4.2	8.8	17.6	14.6	15.0	13.6	9.4	12.4	199
de 5001 à 6000 fr.	12.5	4.7	10.5	3.7	0.0	2.8	3.1	0.0	2.7	0.6	0.0	0.5	11.8	9.7	10.0	9.1	4.7	7.8	126
de 6001 à 8000 fr.	5.2	3.8	4.8	1.2	0.0	0.9	3.1	0.0	2.7	0.6	0.0	0.5	0.0	2.9	2.5	3.9	2.6	3.5	56
de 8001 à 10 000 fr.	1.8	0.0	1.3	0.6	0.0	0.5	1.6	0.0	1.3	1.3	0.0	1.1	11.8	1.0	2.5	1.9	0.2	1.4	23
de 10 001 à 15 000 fr.	1.5	0.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.4	0.8	13
plus de 15 000 fr.	0.2	0.4	0.2	0.0	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	3
N**	654	235	889	164	53	217	64	11	75	158	24	182	17	103	120	1'142	467	1'609	1'609
<i>données manquantes</i>	<i>2'056</i>	<i>888</i>	<i>2'944</i>	<i>378</i>	<i>120</i>	<i>498</i>	<i>189</i>	<i>44</i>	<i>233</i>	<i>674</i>	<i>147</i>	<i>821</i>	<i>196</i>	<i>680</i>	<i>876</i>	<i>3'736</i>	<i>2'082</i>	<i>5'818</i>	<i>5'818</i>
Dettes*																			
aucune dette	65.6	80.1	69.6	26.0	38.9	29.0	41.1	50.0	42.3	84.0	88.2	84.7	85.5	92.3	90.6	64.1	78.9	68.4	2'011
jusqu'à 5000 fr.	4.6	4.5	4.6	14.0	19.4	15.3	16.3	22.7	17.2	5.3	5.4	5.3	3.2	2.6	2.7	6.5	5.7	6.3	185
de 5001 à 10 000 fr.	8.7	5.0	7.7	12.3	18.1	13.7	9.9	13.6	10.4	2.8	1.1	2.6	3.2	1.5	2.0	7.5	5.5	6.9	203
de 10 001 à 25 000 fr.	8.5	3.7	7.2	20.4	12.5	18.6	17.0	9.1	16.0	3.2	3.2	3.2	3.2	1.0	1.6	9.2	4.2	7.7	227
de 25 001 à 50 000 fr.	5.5	3.1	4.8	15.3	8.3	13.7	4.3	4.5	4.3	2.6	1.1	2.4	3.2	2.6	2.7	6.1	3.3	5.3	155
de 50 001 à 100 000 fr.	3.0	1.8	2.7	8.9	2.8	7.5	6.4	0.0	5.5	1.0	0.0	0.9	1.6	0.0	0.4	3.5	1.3	2.9	84
plus de 100 000 fr.	4.1	1.8	3.5	3.0	0.0	2.3	5.0	0.0	4.3	1.0	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.1	2.5	73
N**	1'000	382	1'382	235	72	307	141	22	163	495	93	588	62	194	256	2'083	855	2'938	2'938
<i>données manquantes</i>	<i>1'710</i>	<i>741</i>	<i>2'451</i>	<i>307</i>	<i>101</i>	<i>408</i>	<i>112</i>	<i>33</i>	<i>145</i>	<i>337</i>	<i>78</i>	<i>415</i>	<i>151</i>	<i>589</i>	<i>740</i>	<i>2'795</i>	<i>1'694</i>	<i>4'489</i>	<i>4'489</i>

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2009)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Emprisonnement ou détention préventive*																
aucun-e	87.1	96.8	90.0	41.8	73.1	48.9	64.0	70.0	64.7	91.0	92.6	91.2	80.4	93.6	83.9	1'559
emprisonnement	7.1	2.2	5.6	24.3	13.5	21.8	14.7	10.0	14.1	3.4	3.7	3.4	9.2	3.4	7.6	142
détention préventive	3.6	1.1	2.8	11.3	7.7	10.5	10.7	10.0	10.6	3.4	3.7	3.4	5.1	2.0	4.3	80
emprisonnement et détention préventive	2.2	0.0	1.5	22.6	5.8	18.8	10.7	10.0	10.6	2.3	0.0	2.0	5.3	1.0	4.1	77
N**	863	372	1'235	177	52	229	75	10	85	177	27	204	1'360	498	1'858	1'858
<i>données manquantes</i>	1'847	751	2'598	365	121	486	178	45	223	655	144	799	3'305	1'268	4'573	4'573
Durée totale de détention***																
jusqu'à 1 mois	26.3	25.0	26.1	20.0	27.3	20.9	38.9	66.7	42.9	50.0	100.0	53.3	26.7	37.5	27.9	61
> 1 à 2 mois	8.8	12.5	9.1	13.3	18.2	14.0	0.0	33.3	4.8	7.1	0.0	6.7	10.8	16.7	11.4	25
> 2 à 6 mois	32.5	37.5	33.0	28.0	27.3	27.9	11.1	0.0	9.5	7.1	0.0	6.7	27.2	25.0	26.9	59
> 6 à 12 mois	17.5	0.0	15.9	12.0	18.2	12.8	11.1	0.0	9.5	21.4	0.0	20.0	14.4	8.3	13.7	29
plus de 1 an	15.0	25.0	15.9	26.7	9.1	24.4	38.9	0.0	33.3	14.3	0.0	13.3	21.0	12.5	20.1	44
N**	80	8	88	75	11	86	18	3	21	13	1	14	194	24	218	218
<i>données manquantes</i>	31	4	35	28	3	31	9	0	9	3	1	4	73	8	81	81

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de détention. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T9 Instance d'envoi principale et secondaire, selon le problème principal et chez les proches (2009)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Instance d'envoi principale*																			
initiative personnelle	31.3	37.8	33.2	43.9	57.7	47.3	40.2	36.0	39.4	19.4	17.3	19.0	66.3	74.3	72.6	32.9	49.3	38.5	2'602
conjoint-e/partenaire	5.8	3.1	5.1	3.8	2.6	3.5	3.6	2.0	3.3	0.8	0.6	0.7	1.1	2.7	2.4	4.3	2.7	3.8	255
famille	3.4	3.9	3.6	4.0	5.8	4.4	8.0	6.0	7.7	10.1	8.3	9.8	6.8	4.1	4.7	5.5	4.8	5.3	357
ami-e-s, collègues, connaiss.	1.4	3.1	1.9	2.1	2.6	2.2	3.6	10.0	4.7	0.9	3.0	1.3	2.1	4.7	4.1	1.5	4.0	2.4	162
instit. ambulatoire spécialisée	1.5	1.8	1.6	4.6	5.8	4.9	2.7	4.0	2.9	0.4	0.6	0.4	1.6	1.3	1.3	1.7	2.0	1.8	122
instit. résidentielle spécialisée	5.1	6.1	5.4	5.0	5.1	5.0	2.2	4.0	2.6	0.9	1.8	1.1	1.1	0.4	0.6	3.8	3.6	3.7	250
cabinet médical	7.7	10.3	8.4	7.9	8.3	8.0	8.5	4.0	7.7	2.5	3.0	2.6	4.7	3.6	3.8	6.6	7.2	6.8	462
hôpital, clinique	11.6	15.3	12.7	3.8	3.8	3.8	2.2	8.0	3.3	1.3	3.0	1.6	3.2	0.9	1.3	7.7	8.1	7.8	529
service sociaux	6.7	5.3	6.3	8.6	5.1	7.7	4.0	8.0	4.7	4.0	5.4	4.3	3.2	2.7	2.8	5.9	4.6	5.4	368
mes. pénale/administrative	17.5	6.1	14.3	9.8	1.3	7.7	21.0	12.0	19.3	52.1	41.7	50.2	4.7	1.0	1.8	21.6	6.4	16.4	1'108
employeur/se	3.8	2.9	3.5	1.7	0.6	1.4	0.9	0.0	0.7	1.6	1.2	1.5	3.2	0.4	1.0	3.1	1.9	2.7	180
enseignant-e	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.2	3.0	0.5	0.9	0.8	1.0	1.3	1.1	77
autre	3.6	3.9	3.7	4.8	1.3	3.9	3.1	6.0	3.6	3.4	10.1	4.6	1.6	3.1	2.8	4.3	4.1	4.2	286
N**	2'473	991	3'464	478	156	634	224	50	274	770	168	938	190	703	893	4'452	2'306	6'758	6'758
données manquantes	237	132	369	64	17	81	29	5	34	62	3	65	23	80	103	426	243	669	669
Instance d'envoi secondaire***																			
initiative personnelle	27.7	23.0	26.5	26.6	22.9	25.8	34.7	42.9	36.3	17.8	22.9	18.5	11.5	15.6	14.9	25.8	21.5	24.4	827
conjoint-e/partenaire	8.9	5.5	8.0	4.9	8.3	5.8	9.3	0.0	7.5	2.4	2.1	2.4	18.0	3.8	6.1	7.7	4.9	6.8	230
famille	4.3	6.1	4.8	4.3	8.3	5.3	9.3	7.1	8.9	16.4	12.5	15.8	4.9	4.8	4.8	6.0	6.2	6.1	206
ami-e-s, collègues, connaiss.	1.6	1.6	1.6	2.3	1.0	2.0	2.5	0.0	2.1	1.7	4.2	2.1	4.9	4.5	4.5	1.9	2.5	2.1	71
instit. ambulatoire spécialisée	0.6	1.6	0.8	4.6	3.1	4.3	2.5	3.6	2.7	0.0	0.0	0.0	4.9	2.9	3.2	1.2	2.0	1.4	49
instit. résidentielle spécialisée	1.8	2.0	1.9	3.9	2.1	3.5	1.7	0.0	1.4	1.0	0.0	0.9	3.3	0.3	0.8	2.0	1.2	1.8	60
cabinet médical	7.1	6.1	6.9	9.5	10.4	9.8	4.2	3.6	4.1	2.1	4.2	2.4	4.9	1.6	2.1	6.5	5.1	6.0	204
hôpital, clinique	6.0	10.6	7.2	3.0	4.2	3.3	4.2	7.1	4.8	3.5	4.2	3.6	4.9	0.0	0.8	5.0	6.2	5.3	181
service sociaux	2.1	2.6	2.2	3.9	3.1	3.8	0.8	14.3	3.4	1.4	2.1	1.5	1.6	1.6	1.6	2.2	2.5	2.3	79
mes. pénale/administrative	3.9	2.0	3.4	8.6	1.0	6.8	5.1	7.1	5.5	6.3	0.0	5.4	0.0	0.3	0.3	4.6	1.5	3.6	123
employeur/se	1.9	2.2	2.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.0	0.7	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.6	1.3	1.5	51
enseignant-e	0.5	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	19
autre	1.7	1.6	1.7	2.3	1.0	2.0	1.7	0.0	1.4	3.5	0.0	3.0	0.0	1.0	0.8	1.9	1.2	1.7	58
aucune	42.1	43.1	42.4	37.2	42.7	38.5	33.1	25.0	31.5	47.4	52.1	48.1	41.0	65.3	61.3	42.5	50.0	44.8	1'519
N**	1'414	508	1'922	304	96	400	118	28	146	287	48	335	61	314	375	2'320	1'067	3'387	3'387
données manquantes	1'296	615	1'911	238	77	315	135	27	162	545	123	668	152	469	621	2'558	1'482	4'040	4'040

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T10 Type d'aide attendue à l'admission et statut légal de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2009)

Type d'aide attendue*	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
problèmes addictifs	80.8	87.1	82.5	90.3	93.8	91.2	78.6	76.0	78.2	69.5	81.5	71.5	46.7	51.6	50.6	78.1	76.4	77.5	2'648
problèmes somatiques	3.6	3.7	3.6	7.3	4.1	6.5	3.4	0.0	2.8	0.8	1.9	0.9	2.7	0.9	1.3	3.6	2.8	3.3	113
problèmes psychiques	16.4	24.1	18.5	18.0	17.5	17.9	11.1	12.0	11.3	7.6	14.8	8.9	14.7	14.6	14.6	14.7	19.9	16.4	560
problèmes relationnels	12.8	19.0	14.5	12.1	12.4	12.2	16.2	16.0	16.2	4.6	7.4	5.1	33.3	45.3	43.1	12.4	24.8	16.4	561
problèmes familiaux	9.4	17.3	11.6	11.1	16.5	12.4	12.8	8.0	12.0	9.9	11.1	10.1	45.3	46.3	46.1	10.8	24.9	15.4	527
problèmes financiers	8.1	7.7	8.0	19.7	27.8	21.8	8.5	0.0	7.0	6.1	5.6	6.0	4.0	3.7	3.8	9.4	8.1	9.0	307
problèmes professionnels, de formatic	13.2	11.4	12.7	19.0	18.6	18.9	10.3	8.0	9.9	11.1	9.3	10.8	5.3	4.0	4.3	12.8	9.5	11.7	401
problèmes de logement	4.0	3.5	3.9	7.6	16.5	9.8	5.1	8.0	5.6	1.9	3.7	2.2	6.7	3.4	4.0	4.3	4.9	4.5	154
problèmes de violence	1.4	2.0	1.6	3.1	1.0	2.6	1.7	0.0	1.4	0.4	5.6	1.3	2.7	5.0	4.5	1.5	2.8	1.9	66
problèmes juridiques	10.2	4.2	8.6	7.3	7.2	7.3	15.4	16.0	15.5	14.1	9.3	13.3	9.3	4.0	5.0	10.1	5.0	8.4	288
autre(s)	2.5	2.0	2.3	1.0	1.0	1.0	2.6	4.0	2.8	4.2	1.9	3.8	1.3	0.6	0.8	3.9	2.4	3.4	116
aucune attente	12.2	6.3	10.6	5.5	0.0	4.1	7.7	8.0	7.7	18.3	5.6	16.1	2.7	2.2	2.3	11.4	4.6	9.2	313
N**	1'415	543	1'958	289	97	386	117	25	142	262	54	316	75	322	397	2'298	1'118	3'416	3'416
données manquantes	1'267	575	1'842	248	74	322	136	30	166	561	115	676	133	390	523	2'531	1'349	3'880	3'880
Statut légal du traitement/de la prise en charge*																			
suspension de la procédure, renoncement à infliger une peine, réprimande (art 19a ch. 2 Lstup)	0.3	0.2	0.3	0.8	0.0	0.6	3.0	0.0	2.5	6.6	2.3	5.9	0.0	0.0	0.0	1.2	0.2	0.9	26
abandon poursuite pénale si soumis à des mesures de protection contrôlées par un médecin (art 19a ch. 3 Lstup)	0.2	0.0	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	4
mesures concernant les délinquants anormaux (art 43 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
traitement des alcooliques et des toxicomanes (art 44 CPS)	2.9	1.5	2.6	2.0	0.0	1.5	2.0	0.0	1.7	1.7	2.3	1.8	0.0	0.4	0.3	2.4	1.0	2.0	59
irresponsabilité (art 10 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
responsabilité restreinte (art 11 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
exécution de mesures pr toxicomanes dans une maison d'éducation au travail (art 2a ord. 3 rel. au CPS RS 311.03)	0.5	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	7.4	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.1	0.8	25
autre	10.8	4.3	9.1	5.7	2.5	4.9	10.1	5.0	9.2	22.7	11.4	20.9	1.6	0.0	0.3	11.4	3.5	8.9	267
aucune mesure (traitement volontaire)	85.4	93.7	87.6	91.0	97.5	92.6	83.8	95.0	85.7	61.1	84.1	64.8	98.4	99.6	99.4	83.7	95.2	87.3	2'616
N**	1'301	460	1'761	245	81	326	99	20	119	229	44	273	64	266	330	2'060	936	2'996	2'996
données manquantes	1'409	663	2'072	297	92	389	154	35	189	603	127	730	149	517	666	2'818	1'613	4'431	4'431

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T11 Traitements/prises en charge avant l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2009)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Prises en charge antérieures*																			
non	46.2	38.1	43.9	15.5	20.0	16.6	47.6	60.9	50.0	79.9	75.7	79.2	70.3	66.2	67.0	51.7	50.8	51.4	3'139
oui	53.8	61.9	56.1	84.5	80.0	83.4	52.4	39.1	50.0	20.1	24.3	20.8	29.7	33.8	33.0	48.3	49.2	48.6	2'969
N**	2'256	910	3'166	444	140	584	208	46	254	730	144	874	158	597	755	4'063	2'045	6'108	6'108
<i>données manquantes</i>	454	213	667	98	33	131	45	9	54	102	27	129	55	186	241	815	504	1'319	1'319
Type de prise en charge***																			
traitement avec prescript. d'héroïne	1.2	1.7	1.4	4.9	5.6	5.1	2.6	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	5.3	0.9	2.0	2.0	2.1	2.0	48
substitution (méthadone, subutex)	4.8	4.8	4.8	76.3	72.2	75.3	15.8	27.3	17.2	3.0	5.0	3.3	7.9	1.8	3.3	18.2	12.4	16.3	388
autre tt médicam. des dépendances	12.2	10.5	11.7	7.1	6.7	7.0	5.3	0.0	4.6	1.0	0.0	0.8	0.0	2.6	2.0	9.9	7.8	9.2	219
prise en charge ambulatoire	64.9	66.5	65.4	59.7	57.8	59.2	77.6	72.7	77.0	84.2	75.0	82.6	73.7	84.2	81.6	66.1	69.4	67.2	1'598
traitement résidentiel	51.2	56.4	52.9	48.4	43.3	47.2	48.7	54.5	49.4	18.8	15.0	18.2	23.7	17.5	19.1	47.4	46.2	47.0	1'118
sevrage	43.2	49.3	45.1	59.4	62.2	60.1	35.5	36.4	35.6	12.9	10.0	12.4	5.3	7.0	6.6	42.7	41.2	42.2	1'004
groupe d'entraide ou d'auto-support	4.7	6.1	5.1	3.5	3.3	3.5	1.3	0.0	1.1	2.0	0.0	1.7	0.0	3.5	2.6	4.1	5.1	4.5	106
autre(s)	2.4	1.9	2.2	1.1	3.3	1.6	1.3	9.1	2.3	3.0	5.0	3.3	0.0	6.1	4.6	2.1	3.5	2.6	61
N**	1'046	477	1'523	283	90	373	76	11	87	101	20	121	38	114	152	1'599	780	2'379	2'379
<i>données manquantes</i>	168	86	254	92	22	114	33	7	40	46	15	61	9	88	97	363	227	590	590

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de prise en charge antérieure. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T12 Substitution et autre traitement/prise en charge à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2009)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution ou prescription d'héroïne*																
non	97.8	96.6	97.5	56.4	52.8	55.5	95.0	97.4	95.4	99.7	99.3	99.6	93.5	92.7	93.3	4'287
oui	2.2	3.4	2.5	43.6	47.2	44.5	5.0	2.6	4.6	0.3	0.7	0.4	6.5	7.3	6.7	309
N**	1'917	758	2'675	367	125	492	180	38	218	658	137	795	3'359	1'237	4'596	4'596
données manquantes	793	365	1'158	175	48	223	73	17	90	174	34	208	1'306	529	1'835	1'835
Type de substitution***																
héroïne	2.6	3.8	3.1	0.6	5.2	1.9	11.1	0.0	10.0	0.0	-	0.0	1.4	4.5	2.3	7
méthadone	76.9	73.1	75.4	90.5	87.9	89.8	66.7	100.0	70.0	50.0	-	50.0	86.9	84.1	86.1	260
autres opiacés	12.8	3.8	9.2	8.2	5.2	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	8.4	4.5	7.3	22
autres substances	7.7	19.2	12.3	0.6	1.7	0.9	22.2	0.0	20.0	50.0	-	50.0	3.3	6.8	4.3	13
N**	39	26	65	158	58	216	9	1	10	2	0	2	214	88	302	302
données manquantes	3	0	3	2	1	3	0	0	0	0	1	1	5	2	7	7
Autre prise en charge parallèle*																
non	89.9	86.8	89.1	79.3	83.1	80.2	84.2	90.5	85.2	92.4	95.7	93.0	89.0	87.6	88.6	2'379
oui	10.1	13.2	10.9	20.7	16.9	19.8	15.8	9.5	14.8	7.6	4.3	7.0	11.0	12.4	11.4	306
N**	1'282	476	1'758	251	83	334	101	21	122	238	46	284	1'992	693	2'685	2'685
données manquantes	1'428	647	2'075	291	90	381	152	34	186	594	125	719	2'673	1'073	3'746	3'746
Type de la prise en charge parallèle****																
prise en charge ambulatoire	67.8	53.3	63.0	65.4	85.7	69.7	53.3	50.0	52.9	83.3	0.0	75.0	66.8	56.6	63.9	188
traitement résidentiel	9.9	16.7	12.2	15.4	7.1	13.6	20.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	10.9	14.5	11.9	35
groupe d'entraide ou d'auto-support	3.3	6.7	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.8	3.1	9
autre(s)	23.1	26.7	24.3	21.2	7.1	18.2	26.7	50.0	29.4	16.7	100.0	25.0	22.7	26.5	23.8	70
N**	121	60	181	52	14	66	15	2	17	18	2	20	211	83	294	294
données manquantes	8	3	11	0	0	0	1	0	1	0	0	0	9	3	12	12

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de substitution. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pris-e-s en charge parallèlement. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T13a Admission suite à une cure de sevrage, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2009)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Admission suite à une cure de sevrage*																
non	78.6	73.6	77.2	87.3	87.5	87.4	90.8	85.0	89.8	93.8	93.0	93.7	83.2	78.4	82.0	2'098
sevrage dans la même institution	0.7	1.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	0.7	17
sevrage dans une autre institution	20.8	24.8	21.9	12.7	12.5	12.6	9.2	10.0	9.3	6.2	7.0	6.3	16.4	20.3	17.4	445
N**	1'223	447	1'670	245	80	325	98	20	118	225	43	268	1'906	654	2'560	2'560
données manquantes	1'487	676	2'163	297	93	390	155	35	190	607	128	735	2'759	1'112	3'871	3'871

T13b Fréquence des sevrages sans aide professionnelle avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2009)

Fréq. sevrages sans accompagnement*	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
jamais	60.9	60.7	60.8	21.2	22.6	21.6	56.5	30.0	52.8	73.9	75.0	74.1	58.4	56.5	57.9	801
une fois	8.0	9.4	8.4	14.4	22.6	16.8	19.4	30.0	20.8	11.6	20.0	12.7	9.7	11.8	10.3	142
deux ou trois fois	10.4	10.2	10.3	20.5	26.4	22.2	4.8	10.0	5.6	6.5	5.0	6.3	10.6	11.5	10.8	150
plus de trois fois	20.7	19.7	20.4	43.9	28.3	39.5	19.4	30.0	20.8	8.0	0.0	7.0	21.3	20.2	21.0	291
N**	637	244	881	132	53	185	62	10	72	138	20	158	1'028	356	1'384	1'384
données manquantes	2'073	879	2'952	410	120	530	191	45	236	694	151	845	3'637	1'410	5'047	5'047

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T14 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2009)

Tous patients et patientes										
Problème principal*	Hommes	Femmes	Total	N		Hommes	Femmes	Total	N	
	%	%	%			%	%	%		
alcool	58.1	63.6	59.6	3'833	alcool	58.1	63.6	59.6	3'833	
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.3	0.2	0.2	16	cocktails	0	0	0	16	
héroïne	10.1	8.1	9.5	612	opiacés	11.4	9.6	10.9	699	
méthadone	1.0	1.2	1.0	67						
autres opiacés	0.3	0.3	0.3	20						
cocaïne	5.4	3.1	4.8	308	cocaïne et dérivés	5.4	3.1	4.8	308	
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	0						
amphétamines	0.3	0.7	0.4	28	stimulants	0.5	1.0	0.6	40	
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.1	0.2	0.1	8						
autres stimulants	0.1	0.1	0.1	4						
barbituriques	0.0	0.1	0.0	2	médicaments	0.7	1.8	1.0	64	
benzodiazépines	0.6	1.3	0.8	49						
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.5	0.2	13						
LSD	0.0	0.0	0.0	1	hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	2	
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	1						
cannabis	17.8	9.7	15.6	1'003	cannabis	17.8	9.7	15.6	1'003	
tabac	2.0	4.8	2.7	176	tabac	2.0	4.8	2.7	176	
substances volatiles	0.0	0.2	0.1	5	autres substances	0.4	0.8	0.5	33	
autre substance	0.4	0.6	0.4	28						
jeu pathologique	2.3	1.3	2.0	128	troubles assimilables à une addiction	3.5	5.4	4.0	257	
troubles alimentaires	0.1	3.2	1.0	62						
autres troubles assimilables à une addiction	1.1	1.0	1.0	67						
N**	4'665	1'766	6'431	6'431		4'665	1'766	6'431	6'431	
<i>données manquantes</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2009), hommes

Patientes: principale substance posant problème										
Hommes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	28.0	20.0	25.5	41.0	27.3	31.6	0.0	27.9	3.5	40.0
1 jour par semaine ou moins	7.5	20.0	9.3	24.0	27.3	0.0	50.0	20.4	1.2	20.0
2 à 3 jours par semaine	13.5	20.0	11.7	20.5	27.3	5.3	50.0	17.0	4.7	40.0
4 à 6 jours par semaine	10.7	10.0	8.5	5.0	9.1	0.0	0.0	7.7	3.5	0.0
une fois par jour	11.0	20.0	24.1	5.0	0.0	36.8	0.0	9.9	4.7	0.0
plusieurs fois par jour	29.4	10.0	21.0	4.5	9.1	26.3	0.0	17.0	82.6	0.0
N**	1'856	10	377	200	11	19	2	705	86	5
données manquantes	854	2	153	53	11	13	0	127	6	14
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	8.3	10.0	14.8	23.0	27.3	10.0	0.0	7.7	2.3	8.3
1 jour par semaine ou moins	7.5	20.0	8.8	28.1	18.2	5.0	50.0	25.7	1.2	8.3
2 à 3 jours par semaine	16.7	20.0	12.9	23.0	27.3	10.0	50.0	21.2	5.8	33.3
4 à 6 jours par semaine	13.8	10.0	8.5	8.7	18.2	0.0	0.0	8.9	3.5	0.0
une fois par jour	12.6	20.0	29.1	7.1	0.0	40.0	0.0	12.1	5.8	0.0
plusieurs fois par jour	41.0	20.0	25.8	10.2	9.1	35.0	0.0	24.4	81.4	50.0
N**	1'863	10	364	196	11	20	2	685	86	12
données manquantes	847	2	166	57	11	12	0	147	6	7

T15.1b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2009), hommes

Patients: problème principal			
Hommes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	54.3	0.0	12.8
1 jour par semaine ou moins	15.7	0.0	5.1
2 à 3 jours par semaine	8.6	33.3	15.4
4 à 6 jours par semaine	10.0	0.0	15.4
1 fois par jour	2.9	0.0	12.8
plusieurs fois par jour	8.6	66.7	38.5
N**	70	3	39
données manquantes	35	3	11
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	27.3	0.0	2.6
1 jour par semaine ou moins	36.4	0.0	5.3
2 à 3 jours par semaine	14.5	0.0	13.2
4 à 6 jours par semaine	12.7	33.3	13.2
1 fois par jour	1.8	0.0	10.5
plusieurs fois par jour	7.3	66.7	55.3
N**	55	3	38
données manquantes	50	3	12

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.2a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2009), femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	25.4	0.0	20.0	40.5	33.3	22.7	-	29.0	2.6	0.0
1 jour par semaine ou moins	8.9	33.3	15.4	19.0	13.3	0.0	-	19.6	1.3	0.0
2 à 3 jours par semaine	12.5	33.3	6.9	11.9	40.0	13.6	-	14.5	2.6	25.0
4 à 6 jours par semaine	13.6	33.3	6.9	9.5	6.7	0.0	-	8.0	1.3	0.0
une fois par jour	10.9	0.0	27.7	11.9	6.7	18.2	-	10.9	3.9	25.0
plusieurs fois par jour	28.7	0.0	23.1	7.1	0.0	45.5	-	18.1	88.3	50.0
N**	743	3	130	42	15	22	0	138	77	4
données manquantes	380	1	39	13	3	10	0	33	7	10
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	7.5	0.0	9.6	20.5	12.5	0.0	-	6.5	2.6	12.5
1 jour par semaine ou moins	7.0	0.0	14.4	18.2	12.5	0.0	-	30.2	0.0	12.5
2 à 3 jours par semaine	16.7	33.3	9.6	20.5	50.0	0.0	-	13.7	3.9	12.5
4 à 6 jours par semaine	15.1	33.3	5.6	15.9	6.3	0.0	-	7.2	1.3	0.0
une fois par jour	12.4	0.0	31.2	9.1	12.5	30.4	-	9.4	3.9	12.5
plusieurs fois par jour	41.3	33.3	29.6	15.9	6.3	69.6	-	33.1	88.3	50.0
N**	724	3	125	44	16	23	0	139	77	8
données manquantes	399	1	44	11	2	9	0	32	7	6

T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2009), femmes

Patients: problème principal			
Femmes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	56.3	2.8	0.0
1 jour par semaine ou moins	18.8	5.6	16.7
2 à 3 jours par semaine	6.3	22.2	50.0
4 à 6 jours par semaine	12.5	2.8	0.0
1 fois par jour	0.0	13.9	0.0
plusieurs fois par jour	6.3	52.8	33.3
N**	16	36	6
données manquantes	7	20	11
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	44.4	2.9	0.0
1 jour par semaine ou moins	44.4	5.7	16.7
2 à 3 jours par semaine	11.1	22.9	50.0
4 à 6 jours par semaine	0.0	5.7	0.0
1 fois par jour	0.0	5.7	0.0
plusieurs fois par jour	0.0	57.1	33.3
N**	9	35	6
données manquantes	14	21	11

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.3a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2009), hommes & femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Hommes & femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	27.2	15.4	24.1	40.9	30.8	26.8	0.0	28.1	3.1	22.2
1 jour par semaine ou moins	7.9	23.1	10.8	23.1	19.2	0.0	50.0	20.3	1.2	11.1
2 à 3 jours par semaine	13.2	23.1	10.5	19.0	34.6	9.8	50.0	16.6	3.7	33.3
4 à 6 jours par semaine	11.5	15.4	8.1	5.8	7.7	0.0	0.0	7.7	2.5	0.0
une fois par jour	11.0	15.4	25.0	6.2	3.8	26.8	0.0	10.1	4.3	11.1
plusieurs fois par jour	29.2	7.7	21.5	5.0	3.8	36.6	0.0	17.2	85.3	22.2
N**	2'599	13	507	242	26	41	2	843	163	9
données manquantes	1'234	3	192	66	14	23	0	160	13	24
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	8.1	7.7	13.5	22.5	18.5	4.7	0.0	7.5	2.5	10.0
1 jour par semaine ou moins	7.3	15.4	10.2	26.3	14.8	2.3	50.0	26.5	0.6	10.0
2 à 3 jours par semaine	16.7	23.1	12.1	22.5	40.7	4.7	50.0	19.9	4.9	25.0
4 à 6 jours par semaine	14.2	15.4	7.8	10.0	11.1	0.0	0.0	8.6	2.5	0.0
une fois par jour	12.6	15.4	29.7	7.5	7.4	34.9	0.0	11.7	4.9	5.0
plusieurs fois par jour	41.1	23.1	26.8	11.3	7.4	53.5	0.0	25.8	84.7	50.0
N**	2'587	13	489	240	27	43	2	824	163	20
données manquantes	1'246	3	210	68	13	21	0	179	13	13

T15.3b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2009), hommes & femmes

Patients: problème principal			
Hommes & femmes	Jeux pathologiques	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	54.7	2.6	11.1
1 jour par semaine ou moins	16.3	5.1	6.7
2 à 3 jours par semaine	8.1	23.1	20.0
4 à 6 jours par semaine	10.5	2.6	13.3
1 fois par jour	2.3	12.8	11.1
plusieurs fois par jour	8.1	53.8	37.8
N**	86	39	45
données manquantes	42	23	22
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	29.7	2.6	2.3
1 jour par semaine ou moins	37.5	5.3	6.8
2 à 3 jours par semaine	14.1	21.1	18.2
4 à 6 jours par semaine	10.9	7.9	11.4
1 fois par jour	1.6	5.3	9.1
plusieurs fois par jour	6.3	57.9	52.3
N**	64	38	44
données manquantes	64	24	23

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T16.1a Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2009), hommes

Patients: principale substance posant problème										
Hommes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	16.1	21.6	21.0	22.4	20.1	33.1	20.0	14.9	14.2	20.2
écart-type	3.7	7.0	5.5	6.7	3.6	12.6	1.4	2.5	2.4	8.4
1er quartile	14.0	16.0	17.0	18.0	17.0	25.0	19.0	14.0	13.0	15.0
valeur médiane	16.0	22.0	20.0	20.0	19.0	28.0	20.0	15.0	14.0	17.0
3e quartile	18.0	24.0	23.0	25.0	22.0	38.0	21.0	16.0	16.0	25.0
N*	1'102	9	323	179	7	15	2	642	43	6
données manquantes	1'608	3	207	74	15	17	0	190	49	13
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	21.9	23.4	22.5	24.0	21.8	34.9	22.0	16.0	16.2	19.7
écart-type	7.2	6.2	5.8	6.7	4.9	12.8	-	2.9	5.1	5.0
1er quartile	18.0	19.0	18.0	19.0	17.0	27.0	22.0	15.0	14.0	15.0
valeur médiane	20.0	23.0	21.0	22.0	22.0	33.0	22.0	16.0	15.0	19.0
3e quartile	25.0	26.5	25.0	27.0	25.0	38.0	22.0	16.0	18.0	25.0
N*	1'055	8	275	141	5	13	1	504	38	3
données manquantes	1'655	4	255	112	17	19	1	328	54	16
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	31.4	26.4	23.7	25.1	27.0	34.9	22.0	16.7	17.5	22.8
écart-type	11.7	4.6	6.7	6.7	5.9	11.6	.	3.7	6.8	11.2
1er quartile	22.0	23.0	19.0	20.0	25.0	28.0	22.0	15.0	14.0	14.0
valeur médiane	30.0	24.0	22.0	24.0	28.0	33.0	22.0	16.0	16.0	21.0
3e quartile	40.0	28.0	27.0	28.5	31.0	34.0	22.0	17.0	18.0	31.5
N*	1'045	7	263	156	6	9	1	487	41	4
données manquantes	1'665	5	267	97	16	23	1	345	51	15
Période de latence (en années)**										
moyenne	24.3	1.6	6.6	6.4	9.1	9.0	8.4	4.7	8.2	4.5
écart-type	13.0	-	7.2	5.1	6.2	5.0	4.9	5.8	9.7	3.8
1er quartile	14.4	1.6	1.4	2.8	4.8	4.2	5.0	1.3	2.2	1.2
valeur médiane	24.2	1.6	4.1	5.5	10.7	8.7	8.4	2.5	3.0	4.4
3e quartile	33.7	1.6	8.5	7.9	13.3	14.2	11.8	5.3	11.9	7.8
N*	508	1	48	85	4	3	2	498	31	4
données manquantes	534	1	19	14	4	3	0	85	30	8

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1b Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2009), femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	17.4	16.0	19.4	20.5	18.7	30.1	-	14.7	15.1	28.9
écart-type	5.2	1.7	6.2	6.8	4.6	10.8	-	2.2	2.8	18.2
1er quartile	15.0	15.0	15.0	17.0	15.0	22.0	-	13.0	14.0	17.0
valeur médiane	16.0	15.0	18.0	19.0	18.0	31.5	-	15.0	15.0	19.0
3e quartile	19.0	18.0	21.0	22.0	20.5	38.0	-	16.0	17.0	41.0
N*	419	3	109	41	12	14	0	127	40	7
données manquantes	704	1	60	14	6	18	0	44	44	7
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	27.2	18.7	20.7	22.0	19.0	36.5	-	15.4	17.2	36.3
écart-type	11.2	2.3	6.5	8.0	4.0	7.8	-	2.4	3.4	18.4
1er quartile	18.0	16.0	16.0	17.0	16.0	29.0	-	14.0	15.0	19.0
valeur médiane	25.0	20.0	19.0	19.0	18.0	38.0	-	15.0	17.0	33.5
3e quartile	35.0	20.0	22.0	23.0	20.0	44.0	-	16.0	20.0	48.0
N*	420	3	91	33	14	11	0	99	39	6
données manquantes	703	1	78	22	4	21	0	72	45	8
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	35.1	18.7	21.2	22.8	20.9	33.4	-	16.5	19.3	33.7
écart-type	12.2	2.3	6.7	8.4	6.4	9.2	-	3.2	7.3	27.2
1er quartile	25.0	16.0	17.0	17.0	16.5	27.0	-	15.0	16.0	17.0
valeur médiane	35.0	20.0	19.0	19.0	19.0	32.5	-	16.0	17.5	19.0
3e quartile	43.0	20.0	23.0	25.0	23.5	39.0	-	17.0	20.0	65.0
N*	450	3	90	35	16	10	0	95	36	3
données manquantes	673	1	79	20	2	22	0	76	48	11
Période de latence (en années)**										
moyenne	26.0	-	5.7	7.5	4.5	28.1	-	3.9	15.5	3.8
écart-type	13.2	-	6.6	7.9	3.8	-	-	4.3	14.5	2.8
1er quartile	15.0	-	1.6	1.9	1.8	28.1	-	1.3	1.5	2.1
valeur médiane	27.4	-	2.4	3.5	3.5	28.1	-	2.6	15.5	3.4
3e quartile	36.1	-	6.8	9.3	6.4	28.1	-	4.4	27.4	5.5
N*	164	0	24	23	9	1	0	93	31	4
données manquantes	183	0	4	5	2	4	0	16	19	3

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1c Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2009), hommes & femmes

Patient-e-s: principale substance posant problème										
Hommes & femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	16.5	20.2	20.6	22.0	19.2	31.7	20.0	14.9	14.6	24.8
écart-type	4.2	6.5	5.7	6.7	4.2	11.6	1.4	2.4	2.6	14.7
1er quartile	14.0	15.0	17.0	18.0	17.0	25.0	19.0	14.0	13.0	17.0
valeur médiane	16.0	19.0	19.0	20.0	18.0	30.0	20.0	15.0	14.0	17.0
3e quartile	18.0	23.0	23.0	24.0	21.0	38.0	21.0	16.0	16.0	26.0
N*	1'521	12	432	220	19	29	2	769	83	13
données manquantes	2'312	4	267	88	21	35	0	234	93	20
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	23.4	22.1	22.1	23.6	19.7	35.6	22.0	15.9	16.7	30.8
écart-type	8.9	5.8	6.1	7.0	4.3	10.6	-	2.8	4.3	16.9
1er quartile	18.0	18.0	18.0	18.0	17.0	27.0	22.0	14.0	14.0	19.0
valeur médiane	20.0	20.0	21.0	22.0	18.0	34.0	22.0	16.0	16.0	25.0
3e quartile	26.0	25.0	25.0	27.0	22.0	42.5	22.0	16.0	18.0	41.0
N*	1'475	11	366	174	19	24	1	603	77	9
données manquantes	2'358	5	333	134	21	40	1	400	99	24
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	32.6	24.1	23.1	24.7	22.6	34.1	22.0	16.7	18.4	27.4
écart-type	11.9	5.4	6.7	7.1	6.7	10.2	-	3.6	7.1	18.5
1er quartile	23.0	20.0	18.0	19.0	17.0	27.0	22.0	15.0	15.0	16.0
valeur médiane	30.0	23.5	21.0	23.0	20.5	33.0	22.0	16.0	16.0	19.0
3e quartile	40.0	27.0	26.0	28.0	27.0	38.0	22.0	17.0	20.0	37.0
N*	1'495	10	353	191	22	19	1	582	77	7
données manquantes	2'338	6	346	117	18	45	1	421	99	26
Période de latence (en années)**										
moyenne	24.7	1.6	6.3	6.7	5.9	13.8	8.4	4.6	11.9	4.1
écart-type	13.0	-	7.0	5.8	4.9	10.4	4.9	5.6	12.8	3.1
1er quartile	14.5	1.6	1.5	2.5	1.8	6.5	5.0	1.3	2.1	1.2
valeur médiane	24.8	1.6	3.9	5.3	4.2	11.4	8.4	2.5	4.9	3.4
3e quartile	33.9	1.6	7.9	8.0	9.8	21.1	11.8	5.1	19.7	7.5
N*	672	1	72	108	13	4	2	591	62	8
données manquantes	717	1	23	19	6	7	0	101	49	11

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2a Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2009), hommes

Patients: problème principal			
Hommes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	28.3	18.0	19.0
écart-type	9.2	0.0	11.3
1er quartile	20.0	18.0	13.0
valeur médiane	28.0	18.0	16.0
3e quartile	35.0	18.0	18.0
N*	34	2	25
données manquantes	71	4	25
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	31.8	22.0	20.1
écart-type	13.4	6.9	11.3
1er quartile	20.0	18.0	14.0
valeur médiane	30.5	18.0	17.5
3e quartile	36.0	30.0	22.0
N*	30	3	26
données manquantes	75	3	24
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	34.9	22.0	21.4
écart-type	11.9	6.9	11.3
1er quartile	28.0	18.0	14.0
valeur médiane	32.0	18.0	18.0
3e quartile	39.0	30.0	24.0
N*	41	3	27
données manquantes	64	3	23
Période de latence (en années)**			
moyenne	13.4	1.5	8.0
écart-type	13.8	1.2	7.1
1er quartile	4.0	0.6	2.3
valeur médiane	5.7	1.5	5.5
3e quartile	18.1	2.4	11.4
N*	34	2	25
données manquantes	71	4	25

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2b Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2009), femmes

Patientes: problème principal			
Femmes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	22.8	16.9	19.0
écart-type	5.3	4.5	-
1er quartile	18.0	14.0	19.0
valeur médiane	22.0	17.0	19.0
3e quartile	25.0	20.0	19.0
N*	6	28	1
<i>données manquantes</i>	17	28	16
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	30.2	18.4	21.3
écart-type	13.9	4.1	3.2
1er quartile	19.0	15.0	19.0
valeur médiane	26.0	18.0	20.0
3e quartile	36.0	21.0	25.0
N*	6	27	3
<i>données manquantes</i>	17	29	14
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	34.1	19.6	22.0
écart-type	12.5	4.9	2.6
1er quartile	22.0	16.0	20.0
valeur médiane	36.0	18.0	21.0
3e quartile	42.0	22.0	25.0
N*	9	26	3
<i>données manquantes</i>	14	30	14
Période de latence (en années)**			
moyenne	10.1	9.3	5.6
écart-type	8.8	9.1	-
1er quartile	4.6	3.0	5.6
valeur médiane	5.5	4.6	5.6
3e quartile	19.5	15.6	5.6
N*	6	28	1
<i>données manquantes</i>	17	28	16

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2c Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2009), hommes & femmes

Patients: problème principal			
Hommes & femmes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	27.5	17.0	19.0
écart-type	8.9	4.3	11.0
1er quartile	20.0	14.0	13.0
valeur médiane	25.5	17.5	16.0
3e quartile	32.5	20.0	19.0
N*	40	30	26
données manquantes	88	32	41
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	31.5	18.7	20.2
écart-type	13.3	4.4	10.7
1er quartile	20.0	15.0	14.0
valeur médiane	30.0	18.0	18.0
3e quartile	36.0	21.0	22.0
N*	36	30	29
données manquantes	92	32	38
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	34.7	19.9	21.5
écart-type	11.9	5.0	10.8
1er quartile	26.0	16.0	15.0
valeur médiane	32.0	18.0	18.0
3e quartile	41.0	22.0	24.0
N*	50	29	30
données manquantes	78	33	37
Période de latence (en années)**			
moyenne	12.9	8.8	7.9
écart-type	13.1	9.0	7.0
1er quartile	4.0	2.7	2.3
valeur médiane	5.6	4.3	5.5
3e quartile	18.8	15.3	11.4
N*	40	30	26
données manquantes	88	32	41

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T17 Mode d'administration de la principale substance posant problème au cours des 6 derniers mois avant l'admission (2009)

Patient-e-s: principale substance posant problème															
	Héroïne			Cocaïne			Amphétamines			Cannabis			Benzodiazépines		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Mode d'administration*															
injection	31.9	26.8	30.5	9.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0
fumée/inhalation	44.9	45.1	45.0	16.5	6.7	14.7	50.0	50.0	50.0	98.3	97.5	98.2	0.0	0.0	0.0
ingestion (manger/boire)	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	50.0	30.0	35.7	0.8	1.7	1.0	100.0	100.0	100.0
sniff	23.1	28.0	24.5	73.7	93.3	77.3	0.0	20.0	14.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
autre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
N**	216	82	298	133	30	163	4	10	14	603	120	723	10	9	19
données manquantes	253	61	314	120	25	145	11	3	14	229	51	280	16	14	30

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T18 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 6 derniers mois avant l'admission des injections, échange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois avant l'admission et âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2009)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Injections au cours de la vie*																
oui	6.2	6.9	6.4	64.4	66.4	64.9	16.1	12.1	15.5	2.0	4.3	2.4	12.5	12.3	12.4	518
non	93.8	93.1	93.6	35.6	33.6	35.1	83.9	87.9	84.5	98.0	95.7	97.6	87.5	87.7	87.6	3'646
N**	1'639	700	2'339	348	119	467	174	33	207	664	138	802	3'024	1'140	4'164	4'164
données manquantes	1'071	423	1'494	194	54	248	79	22	101	168	33	201	1'641	626	2'267	2'267
Injections au cours des 6 derniers mois*																
oui	1.4	1.3	1.4	40.8	43.8	41.6	9.8	0.0	8.3	1.2	2.2	1.4	6.2	5.5	6.0	250
non	98.6	98.7	98.6	59.2	56.3	58.4	90.2	100.0	91.7	98.8	97.8	98.6	93.8	94.5	94.0	3'903
N**	1'650	700	2'350	333	112	445	173	33	206	665	138	803	3'019	1'134	4'153	4'153
données manquantes	1'060	423	1'483	209	61	270	80	22	102	167	33	200	1'646	632	2'278	2'278
Injections au cours des 30 derniers jours*																
oui	0.3	0.5	0.4	34.8	33.9	34.6	7.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	3.9	3.4	3.7	164
non	99.7	99.5	99.6	65.2	66.1	65.4	93.0	100.0	94.1	100.0	100.0	100.0	96.1	96.6	96.3	4'213
N**	1'805	750	2'555	296	109	405	171	32	203	664	139	803	3'167	1'210	4'377	4'377
données manquantes	905	373	1'278	246	64	310	82	23	105	168	32	200	1'498	556	2'054	2'054
Echange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois***																
oui	0.0	0.0	0.0	13.1	15.4	13.8	27.3	-	27.3	0.0	0.0	0.0	12.9	12.5	12.8	15
non	100.0	100.0	100.0	86.9	84.6	86.2	72.7	-	72.7	100.0	100.0	100.0	87.1	87.5	87.2	102
N**	7	2	9	61	26	87	11	0	11	4	3	7	85	32	117	117
données manquantes	12	5	17	56	21	77	4	0	4	4	0	4	77	26	103	103
Age lors de la première injection****																
jusqu'à 14 ans	4.7	0.0	3.5	3.6	13.0	5.9	0.0	33.3	5.0	0.0	0.0	0.0	3.3	10.3	5.0	14
de 15 à 16 ans	11.6	14.3	12.3	7.2	21.7	10.8	17.6	0.0	15.0	14.3	0.0	11.1	8.9	19.1	11.4	32
de 17 à 18 ans	23.3	42.9	28.1	17.3	19.6	17.8	23.5	33.3	25.0	28.6	0.0	22.2	19.2	25.0	20.6	58
de 19 à 20 ans	18.6	21.4	19.3	19.4	21.7	20.0	11.8	33.3	15.0	0.0	50.0	11.1	17.8	23.5	19.2	54
de 21 à 25 ans	30.2	14.3	26.3	36.0	13.0	30.3	17.6	0.0	15.0	57.1	50.0	55.6	34.3	13.2	29.2	82
de 26 à 30 ans	7.0	7.1	7.0	11.5	8.7	10.8	17.6	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	10.8	7.4	10.0	28
de 31 à 39 ans	2.3	0.0	1.8	3.6	2.2	3.2	11.8	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.5	3.2	9
dès 40 ans	2.3	0.0	1.8	1.4	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.4	4
N**	43	14	57	139	46	185	17	3	20	7	2	9	213	68	281	281
données manquantes	58	34	92	85	33	118	11	1	12	6	4	10	165	72	237	237

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 6 derniers mois. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2009), hommes

Hommes

Patients: principale substance posant problème										
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool	-	22.2	30.4	44.8	40.0	23.8	0.0	26.6	13.5	30.8
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.4	-	4.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
héroïne	2.3	11.1	4.5	12.8	10.0	23.8	0.0	2.2	0.0	0.0
méthadone	1.4	11.1	20.9	7.6	0.0	23.8	0.0	0.4	0.0	0.0
autres opiacés	0.7	0.0	2.6	0.6	10.0	4.8	0.0	0.6	0.0	0.0
cocaïne	6.4	22.2	30.2	0.0	30.0	23.8	0.0	9.9	1.9	0.0
crack, freebase	0.2	0.0	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	1.0	0.0	3.2	9.3	0.0	4.8	100.0	2.4	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.9	0.0	2.9	11.0	0.0	4.8	100.0	3.2	0.0	0.0
autres stimulants	0.1	0.0	0.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.1	0.0	1.9	1.2	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	2.4	44.4	18.5	5.2	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.7	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
LSD	0.5	0.0	2.6	5.8	10.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.5	0.0	1.9	4.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
substances volatiles	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
cannabis	11.2	11.1	36.0	38.4	30.0	9.5	0.0	-	9.6	7.7
tabac	30.6	33.3	34.4	32.6	30.0	23.8	0.0	32.2	-	7.7
autres substances	0.5	0.0	0.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.1	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.4	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	58.2	22.2	22.8	23.8	40.0	23.8	0.0	45.4	78.8	61.5
N**	1'687	9	378	172	10	21	1	537	52	13
<i>données manquantes</i>	1'023	3	152	81	12	11	1	295	40	6

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2009), femmes

Femmes

Patientes: principale substance posant problème										
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool	-	50.0	24.6	47.5	42.9	39.1	-	26.9	4.3	50.0
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.2	-	5.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
héroïne	2.1	0.0	9.3	10.0	0.0	4.3	-	3.8	0.0	0.0
méthadone	2.3	0.0	17.8	5.0	0.0	4.3	-	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.2	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
cocaïne	4.2	0.0	32.2	0.0	21.4	13.0	-	15.4	0.0	20.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	-	0.0	0.0	10.0
amphétamines	0.3	0.0	5.1	25.0	14.3	0.0	-	5.8	0.0	10.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.3	0.0	5.1	30.0	21.4	0.0	-	6.7	0.0	20.0
autres stimulants	0.2	0.0	0.0	0.0	21.4	4.3	-	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.6	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	10.0
benzodiazépines	8.4	50.0	26.3	7.5	0.0	8.7	-	0.0	0.0	20.0
autres somnifères et tranquillisants	2.1	0.0	0.8	0.0	0.0	4.3	-	0.0	0.0	10.0
LSD	0.0	0.0	1.7	5.0	7.1	0.0	-	1.0	0.0	10.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.8	7.5	0.0	0.0	-	1.9	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	-	1.0	0.0	0.0
cannabis	5.7	0.0	34.7	42.5	50.0	4.3	-	-	8.5	20.0
tabac	31.4	0.0	32.2	32.5	21.4	21.7	-	30.8	-	20.0
autres substances	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	-	1.0	0.0	0.0
troubles alimentaires	1.8	0.0	1.7	5.0	0.0	0.0	-	0.0	2.1	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.3	0.0	0.8	0.0	0.0	4.3	-	0.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	54.1	0.0	20.3	25.0	21.4	34.8	-	42.3	85.1	30.0
N**	663	2	118	40	14	23	0	104	47	10
<i>données manquantes</i>	460	2	51	15	4	9	0	67	37	4

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2009), hommes & femmes
Hommes & femmes

	Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool	-	27.3	29.0	45.3	41.7	31.8	0.0	26.7	9.1	39.1
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.3	-	4.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
héroïne	2.2	9.1	5.6	12.3	4.2	13.6	0.0	2.5	0.0	0.0
méthadone	1.7	9.1	20.2	7.1	0.0	13.6	0.0	0.3	0.0	0.0
autres opiacés	0.5	0.0	2.6	0.5	4.2	2.3	0.0	0.5	0.0	0.0
cocaïne	5.8	18.2	30.6	0.0	25.0	18.2	0.0	10.8	1.0	8.7
crack, freebase	0.1	0.0	0.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
amphétamines	0.8	0.0	3.6	12.3	8.3	2.3	100.0	3.0	0.0	4.3
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.7	0.0	3.4	14.6	12.5	2.3	100.0	3.7	0.0	8.7
autres stimulants	0.1	0.0	0.2	1.4	12.5	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.3	0.0	1.8	0.9	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	4.3
benzodiazépines	4.1	45.5	20.4	5.7	0.0	4.5	0.0	0.6	1.0	8.7
autres somnifères et tranquillisants	1.1	0.0	1.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.3	0.0	4.3
LSD	0.3	0.0	2.4	5.7	8.3	0.0	0.0	2.3	0.0	4.3
autres hallucinogènes	0.3	0.0	1.6	4.7	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
substances volatiles	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
cannabis	9.7	9.1	35.7	39.2	41.7	6.8	0.0	-	9.1	13.0
tabac	30.8	27.3	33.9	32.5	25.0	22.7	0.0	32.0	-	13.0
autres substances	0.6	0.0	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	0.3	0.0	0.0	0.5	0.0	2.3	0.0	0.2	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.6	0.0	0.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.4	0.0	0.2	0.9	0.0	2.3	0.0	0.8	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	57.0	18.2	22.2	24.1	29.2	29.5	0.0	44.9	81.8	47.8
N**	2'350	11	496	212	24	44	1	641	99	23
<i>données manquantes</i>	<i>1'483</i>	<i>5</i>	<i>203</i>	<i>96</i>	<i>16</i>	<i>20</i>	<i>1</i>	<i>362</i>	<i>77</i>	<i>10</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2009), hommes

Hommes

Patients: problème principal			
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	7.8	0.0	0.0
coktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	0.0	2.9
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	3.1	0.0	11.8
tabac	10.9	0.0	8.8
autres substances	1.6	0.0	0.0
jeu pathologique	-	0.0	2.9
troubles alimentaires	1.6	-	2.9
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	25.0	0.0
aucun autre problème addictif	78.1	75.0	79.4
N**	64	4	34
<i>données manquantes</i>	41	2	16

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2009), femmes

Femmes

Patientes: problème principal			
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	16.7	15.2	12.5
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	3.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	3.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	8.3	3.0	0.0
tabac	8.3	6.1	0.0
autres substances	8.3	0.0	0.0
jeu pathologique	-	0.0	12.5
troubles alimentaires	0.0	-	12.5
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	3.0	0.0
aucun autre problème addictif	66.7	72.7	62.5
N**	12	33	8
<i>données manquantes</i>	11	23	9

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2009), hommes & femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal		
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	9.2	13.5	2.4
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	2.7	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	2.7	2.4
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	3.9	2.7	9.5
tabac	10.5	5.4	7.1
autres substances	2.6	0.0	0.0
jeu pathologique	-	0.0	4.8
troubles alimentaires	1.3	-	4.8
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	5.4	0.0
aucun autre problème addictif	76.3	73.0	76.2
N**	76	37	42
<i>données manquantes</i>	52	25	25

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T20 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2009)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation d'alcool*																
jamais	12.4	10.7	11.9	17.6	19.8	18.1	10.3	14.3	10.9	14.7	13.6	14.5	13.9	14.0	13.9	520
1 fois par mois ou moins	3.6	4.3	3.8	13.7	23.5	16.0	13.5	21.4	14.8	25.4	32.0	26.5	10.1	10.5	10.2	380
2 à 4 fois par mois	5.9	6.3	6.0	21.4	25.9	22.4	25.2	17.9	24.0	38.2	36.9	38.0	15.3	12.2	14.5	542
2 à 3 fois par semaine	18.0	17.7	17.9	17.6	9.9	15.7	26.5	35.7	27.9	15.8	9.7	14.8	17.8	16.8	17.5	655
4 fois ou plus par semaine	60.2	61.0	60.4	29.8	21.0	27.7	24.5	10.7	22.4	6.0	7.8	6.3	42.9	46.5	43.9	1'638
N**	1'704	672	2'376	262	81	343	155	28	183	532	103	635	2'763	972	3'735	3'735
données manquantes	1'006	451	1'457	280	92	372	98	27	125	300	68	368	1'902	794	2'696	2'696
Nbre de boissons standards par jour***																
1 ou 2	7.6	6.2	7.2	46.2	50.8	47.2	41.0	26.3	39.0	57.1	53.8	56.6	23.5	18.2	22.1	658
3 ou 4	17.9	16.7	17.6	30.8	22.0	28.7	39.3	36.8	39.0	30.5	29.5	30.3	22.8	19.2	21.9	651
5 ou 6	20.9	25.8	22.3	9.2	20.3	11.8	7.4	21.1	9.2	8.1	10.3	8.5	16.4	23.1	18.1	540
7 à 9	19.3	23.2	20.4	4.6	5.1	4.7	8.2	5.3	7.8	2.5	3.8	2.8	13.8	18.2	14.9	444
10 ou plus	34.3	28.1	32.6	9.2	1.7	7.5	4.1	10.5	5.0	1.8	2.6	1.9	23.5	21.4	23.0	684
N**	1'418	569	1'987	195	59	254	122	19	141	394	78	472	2'201	776	2'977	2'977
données manquantes	1'292	554	1'846	347	114	461	131	36	167	438	93	531	2'464	990	3'454	3'454
Fréquence de fortes consom. d'alcool***																
jamais	15.3	14.8	15.2	42.7	53.1	45.1	34.6	31.8	34.2	51.8	61.8	53.4	27.5	27.6	27.6	902
moins d'une fois par mois	9.0	12.0	9.8	23.0	17.2	21.7	28.5	22.7	27.6	28.9	28.1	28.8	15.0	14.5	14.9	488
1 fois par mois	10.4	9.5	10.1	11.3	7.8	10.5	18.5	13.6	17.8	10.4	1.1	8.9	10.8	8.2	10.1	332
1 fois par semaine	23.7	22.0	23.2	11.3	9.4	10.8	13.1	31.8	15.8	8.0	6.7	7.8	18.5	18.7	18.6	608
presque chaque jour	41.7	41.7	41.7	11.7	12.5	11.9	5.4	0.0	4.6	0.9	2.2	1.1	28.1	30.9	28.8	943
N**	1'539	600	2'139	213	64	277	130	22	152	450	89	539	2'419	854	3'273	3'273
données manquantes	1'171	523	1'694	329	109	438	123	33	156	382	82	464	2'246	912	3'158	3'158

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation d'alcool. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T21 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2009)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	29.4	34.1	30.7	5.0	1.3	4.1	9.0	10.0	9.2	21.0	25.0	21.7	23.2	26.4	24.0	672
1 jour par semaine ou moins	0.9	1.0	0.9	0.5	0.0	0.3	1.6	0.0	1.4	4.8	2.9	4.4	1.8	1.1	1.6	45
2 à 3 jours par semaine	0.3	1.0	0.5	0.5	0.0	0.3	0.8	0.0	0.7	5.4	3.8	5.1	1.7	1.3	1.6	44
4 à 6 jours par semaine	0.7	0.7	0.7	0.0	1.3	0.3	0.8	0.0	0.7	3.0	1.0	2.6	1.2	0.8	1.1	31
1 fois par jour	1.0	1.2	1.1	0.9	1.3	1.0	0.8	0.0	0.7	4.0	1.9	3.6	1.8	1.1	1.6	44
plusieurs fois par jour	67.8	62.1	66.1	93.2	96.1	93.9	86.9	90.0	87.3	61.9	65.4	62.5	70.4	69.3	70.1	1'960
N**	1'049	419	1'468	219	76	295	122	20	142	504	104	608	2'047	749	2'796	2'796
<i>données manquantes</i>	1'661	704	2'365	323	97	420	131	35	166	328	67	395	2'618	1'017	3'635	3'635
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10	14.0	16.0	14.6	11.1	7.8	10.3	21.4	29.4	22.6	50.6	45.1	49.6	24.4	21.0	23.5	443
11 à 20	39.8	47.5	41.9	54.0	43.8	51.4	57.1	58.8	57.4	39.9	43.7	40.5	43.0	46.1	43.8	826
21 à 30	28.9	26.9	28.3	24.3	34.4	26.9	19.4	5.9	17.4	8.4	7.0	8.2	21.8	23.5	22.2	419
31 ou plus	17.3	9.7	15.2	10.6	14.1	11.5	2.0	5.9	2.6	1.1	4.2	1.6	10.8	9.5	10.5	197
N**	648	238	886	189	64	253	98	17	115	356	71	427	1'399	486	1'885	1'885
<i>données manquantes</i>	93	38	131	19	11	30	13	1	14	42	7	49	174	65	239	239

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T22a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2009), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème										
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Objectif de consommation*										
abstinence définitive	34.2	100.0	78.1	79.8	40.0	57.1	100.0	49.2	33.3	88.9
abstinence limitée dans le temps	22.3	0.0	3.1	6.1	20.0	7.1	0.0	9.1	11.1	0.0
consommation contrôlée	26.7	0.0	8.3	3.0	0.0	28.6	0.0	23.4	0.0	11.1
aucune limitation envisagée	2.8	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	22.2	0.0
pas déterminé pour l'instant	13.6	0.0	7.5	10.1	40.0	7.1	0.0	11.7	22.2	0.0
autre	0.4	0.0	1.8	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.1	0.0
N**	1'157	5	228	99	5	14	1	197	9	9
<i>données manquantes</i>	1'553	7	302	154	17	18	1	635	83	10

T22b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2009), femmes

Objectif de consommation*										
abstinence définitive	39.9	0.0	81.8	76.5	60.0	73.7	-	53.8	50.0	42.9
abstinence limitée dans le temps	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	12.8	0.0	0.0
consommation contrôlée	28.3	0.0	7.8	5.9	20.0	5.3	-	17.9	0.0	14.3
aucune limitation envisagée	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	50.0	14.3
pas déterminé pour l'instant	13.8	100.0	10.4	17.6	20.0	15.8	-	15.4	0.0	28.6
autre	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	-	0.0	0.0	0.0
N**	414	1	77	17	5	19	0	39	4	7
<i>données manquantes</i>	709	3	92	38	13	13	0	132	80	7

T22c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2009), hommes & femmes

Objectif de consommation*										
abstinence définitive	35.7	83.3	79.0	79.3	50.0	66.7	100.0	50.0	38.5	68.8
abstinence limitée dans le temps	20.7	0.0	2.3	5.2	10.0	3.0	0.0	9.7	7.7	0.0
consommation contrôlée	27.1	0.0	8.2	3.4	10.0	15.2	0.0	22.5	0.0	12.5
aucune limitation envisagée	2.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	30.8	6.3
pas déterminé pour l'instant	13.6	16.7	8.2	11.2	30.0	12.1	0.0	12.3	15.4	12.5
autres	0.4	0.0	1.3	0.9	0.0	3.0	0.0	1.7	7.7	0.0
N**	1'571	6	305	116	10	33	1	236	13	16
<i>données manquantes</i>	2'262	10	394	192	30	31	1	767	163	17

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23a Problèmes psychiques au cours de la vie (2009), hommes

Hommes

	Patients: problème principal									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*										
dépressions sévères	32.0	20.0	36.6	33.8	33.3	53.3	-	14.5	0.0	44.4
états anxieux/tension nerv. importants	27.6	20.0	29.0	31.2	33.3	60.0	-	15.6	0.0	55.6
diffic. compréhension/mémoire/concentr.	14.1	0.0	21.5	14.3	33.3	33.3	-	16.8	0.0	22.2
hallucinations	2.4	20.0	5.9	2.6	33.3	6.7	-	4.5	0.0	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	13.4	20.0	19.4	15.6	0.0	13.3	-	12.3	37.5	66.7
problèmes psychiques traités avec médic.	13.5	40.0	13.4	14.3	0.0	33.3	-	5.0	0.0	0.0
pensées suicidaires sérieuses	13.9	0.0	19.9	15.6	33.3	46.7	-	10.6	0.0	22.2
tentatives de suicide	6.6	0.0	12.9	9.1	0.0	33.3	-	5.0	0.0	22.2
autre(s) problème(s) psychique(s)	2.1	0.0	3.2	2.6	0.0	6.7	-	1.7	0.0	0.0
aucun	39.5	20.0	34.9	44.2	33.3	6.7	-	59.2	62.5	22.2
N**	957	5	186	77	3	15	0	179	8	9
<i>données manquantes</i>	<i>1'753</i>	<i>7</i>	<i>344</i>	<i>176</i>	<i>19</i>	<i>17</i>	<i>2</i>	<i>653</i>	<i>84</i>	<i>10</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23b Problèmes psychiques au cours de la vie (2009), femmes

Femmes

Patientes: problème principal										
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*										
dépressions sévères	47.0	100.0	38.6	43.8	0.0	71.4	-	45.9	25.0	66.7
états anxieux/tension nerv. importants	39.7	100.0	40.0	43.8	0.0	92.9	-	27.0	25.0	66.7
diffic. compréhension/mémoire/concentr.	14.6	0.0	10.0	31.3	20.0	35.7	-	21.6	25.0	33.3
hallucinations	3.0	0.0	2.9	18.8	0.0	7.1	-	13.5	0.0	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	8.9	0.0	11.4	6.3	20.0	21.4	-	16.2	0.0	0.0
problèmes psychiques traités avec médic.	21.4	0.0	28.6	31.3	20.0	28.6	-	13.5	25.0	0.0
pensées suicidaires sérieuses	19.7	0.0	17.1	6.3	20.0	57.1	-	27.0	25.0	50.0
tentatives de suicide	10.3	0.0	14.3	0.0	20.0	28.6	-	21.6	25.0	16.7
autre(s) problème(s) psychique(s)	3.2	0.0	4.3	6.3	0.0	0.0	-	5.4	0.0	0.0
aucun	23.0	0.0	34.3	37.5	60.0	0.0	-	35.1	50.0	33.3
N**	370	1	70	16	5	14	0	37	4	6
<i>données manquantes</i>	753	3	99	39	13	18	0	134	80	8

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23c Problèmes psychiques au cours de la vie (2009), hommes & femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*										
dépansions sévères	36.2	33.3	37.1	35.5	12.5	62.1	-	19.9	8.3	53.3
états anxieux/tension nerv. importants	31.0	33.3	32.0	33.3	12.5	75.9	-	17.6	8.3	60.0
diffic. compréhension/mémoire/concentr.	14.2	0.0	18.4	17.2	25.0	34.5	-	17.6	8.3	26.7
hallucinations	2.6	16.7	5.1	5.4	12.5	6.9	-	6.0	0.0	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	12.1	16.7	17.2	14.0	12.5	17.2	-	13.0	25.0	40.0
problèmes psychiques traités avec médic.	15.7	33.3	17.6	17.2	12.5	31.0	-	6.5	8.3	0.0
pensées suicidaires sérieuses	15.5	0.0	19.1	14.0	25.0	51.7	-	13.4	8.3	33.3
tentatives de suicide	7.6	0.0	13.3	7.5	12.5	31.0	-	7.9	8.3	20.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	2.4	0.0	3.5	3.2	0.0	3.4	-	2.3	0.0	0.0
aucun	34.9	16.7	34.8	43.0	50.0	3.4	-	55.1	58.3	26.7
N**	1'327	6	256	93	8	29	0	216	12	15
<i>données manquantes</i>	<i>2'506</i>	<i>10</i>	<i>443</i>	<i>215</i>	<i>32</i>	<i>35</i>	<i>2</i>	<i>787</i>	<i>164</i>	<i>18</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24 Proches: Lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2009)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	
lien avec la tierce personne*				
mère/père	26.5	27.0	26.9	255
filles/fils	10.8	14.2	13.5	128
sœur/frère	5.4	4.8	5.0	47
conjoint-e/partenaire	39.7	46.7	45.2	429
autre proche/parent-e	1.0	2.6	2.2	21
collègue/ami-e	2.0	2.1	2.1	20
employeur/se, enseignant-e	2.9	0.5	1.1	10
tuteur/trice, curateur/trice	0.0	0.0	0.0	0
autre	11.8	2.0	4.1	39
N**	204	745	949	949
<i>données manquantes</i>	9	38	47	47

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T25 Proches: problème principal et autres problèmes de la tierce personne (2009)

Proches					
Total			Total		
	%	N		%	N
Problème principal de la tierce personne*			Autres problèmes de la tierce personne***		
alcool	69.2	660	alcool	25.6	91
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.8	8	cocktails (héroïne et cocaïne)	1.4	5
héroïne	4.8	46	héroïne	3.4	12
méthadone	0.2	2	méthadone	3.4	12
autres opiacés (morphine, codéine, etc)	0.2	2	autres opiacés (morphine, codéine, etc)	1.1	4
cocaïne	2.8	27	cocaïne	8.4	30
crack, feebase	0.1	1	crack, feebase	0.3	1
amphétamines	0.5	5	amphétamines	1.4	5
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0	MDMA et substances similaires (ecstasy)	1.1	4
autres stimulants (khat, etc)	0.0	0	autres stimulants (khat, etc)	0.0	0
barbituriques	1.5	14	barbituriques	0.3	1
benzodiazépines	0.5	5	benzodiazépines	5.6	20
autres somnifères et tranquillisants	0.1	1	autres somnifères et tranquillisants	1.4	5
LSD	0.0	0	LSD	0.0	0
autres hallucinogènes	0.7	7	autres hallucinogènes	0.0	0
substances volatiles (solvants, etc)	0.0	0	substances volatiles (solvants, etc)	0.8	3
cannabis	10.7	102	cannabis	20.2	72
tabac	0.6	6	tabac	22.8	81
autre substance	0.5	5	autre substance	0.0	0
jeu pathologique	1.6	15	jeu pathologique	0.8	3
troubles alimentaires	1.5	14	troubles alimentaires	1.4	5
autre comportement de type addictif	3.6	34	autre comportement de type addictif	3.7	13
			aucun	31.5	112
N**	954	954	N**	356	356
<i>données manquantes</i>	<i>42</i>	<i>42</i>	<i>données manquantes</i>	<i>639</i>	<i>639</i>

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

*** Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T26 Proches: Propres problèmes des proches liés au problème de la tierce personne (2009)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	
propres problèmes*				
propres probl. de consom. de substances	3.5	9.7	8.7	32
propres comportements de type addictif	3.5	0.6	1.1	4
propres problèmes somatiques	7.0	5.8	6.0	22
propres problèmes psychiques	21.1	33.9	31.9	117
problèmes de couple	35.1	46.5	44.7	164
problèmes familiaux	45.6	54.8	53.4	196
problèmes financiers	12.3	11.9	12.0	44
problèmes liés à la profession/formation	1.8	3.5	3.3	12
problèmes de logement	8.8	4.2	4.9	18
problèmes de violence (victime)	8.8	10.0	9.8	36
problèmes à contrôler sa propre violence	1.8	1.3	1.4	5
problèmes juridiques	0.0	2.9	2.5	9
autre	0.0	0.6	0.5	2
aucun	24.6	15.5	16.9	62
N**	57	310	367	367
<i>données manquantes</i>	<i>156</i>	<i>473</i>	<i>629</i>	<i>629</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T27 Sexe et âge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2009)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sexe*																			
hommes			69.6			72.9			76.2			83.2			22.0			64.6	4'226
femmes			30.4			27.1			23.8			16.8			78.0			35.4	2'314
sexe pas connu			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	2'307	1'007	3'314	488	181	669	243	76	319	717	145	862	203	718	921	4'226	2'314	6'540	6'540
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.4	4.2	1.0	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	54
15-19	1.9	2.7	2.1	2.7	4.4	3.1	3.3	18.4	6.9	60.8	57.2	60.2	9.0	3.1	4.4	13.2	7.6	11.2	731
20-24	4.4	3.3	4.1	12.7	16.6	13.8	16.5	19.7	17.2	14.9	20.7	15.9	3.5	4.3	4.1	8.3	7.2	7.9	516
25-29	6.3	5.8	6.2	18.0	21.5	19.0	23.5	23.7	23.5	8.9	8.3	8.8	3.0	6.4	5.7	9.5	8.6	9.2	598
30-34	8.8	6.4	8.1	16.6	18.2	17.0	20.6	18.4	20.1	5.3	4.1	5.1	2.5	9.2	7.8	9.5	8.5	9.2	600
35-39	12.7	7.8	11.2	20.7	15.5	19.3	17.7	6.6	15.0	2.0	2.8	2.1	9.0	10.8	10.4	11.9	9.4	11.0	719
40-44	15.2	16.5	15.6	16.2	15.5	16.0	8.2	7.9	8.2	2.1	2.1	2.1	8.0	15.7	14.0	12.2	14.4	13.0	847
45-49	14.8	17.6	15.6	8.8	6.6	8.2	7.0	1.3	5.6	1.3	1.4	1.3	18.4	17.1	17.4	11.3	14.5	12.4	810
50-54	12.9	16.4	14.0	3.5	1.1	2.8	1.6	2.6	1.9	0.1	0.0	0.1	14.9	10.8	11.7	8.6	11.2	9.5	620
55-59	10.3	10.2	10.3	0.4	0.6	0.4	1.6	0.0	1.3	0.3	0.0	0.2	10.0	10.2	10.2	6.5	8.3	7.1	465
60-64	6.5	7.0	6.6	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	4.9	5.7	4.2	4.7	4.4	288
65-69	3.3	3.7	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	6.0	3.1	3.7	2.2	2.6	2.4	154
70-74	1.9	1.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.1	2.3	1.2	1.3	1.2	79
75 et plus	0.9	1.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	1.7	2.1	0.6	1.0	0.8	49
N**	2'303	1'006	3'309	488	181	669	243	76	319	717	145	862	201	715	916	4'220	2'310	6'530	6'530
données manquantes	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	4	10	10
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	45.2	46.4	45.6	34.9	32.9	34.4	32.6	28.9	31.7	21.1	21.1	21.1	47.4	44.8	45.4	38.7	41.8	39.8	
écart-type	12.7	12.6	12.6	8.8	8.6	8.8	8.6	9.5	8.9	7.0	6.9	7.0	16.1	13.4	14.0	14.7	14.3	14.6	
1er quartile	36.7	39.1	37.3	28.2	26.0	27.6	25.6	21.8	25.0	16.9	16.7	16.9	39.0	35.8	36.5	26.5	30.7	27.8	
valeur médiane	45.4	47.4	45.9	35.0	32.1	34.3	31.2	26.5	30.6	18.2	18.0	18.2	48.7	44.9	46.0	38.7	42.8	40.3	
3e quartile	54.2	54.2	54.2	41.2	39.9	40.7	37.8	34.3	37.1	23.2	23.4	23.2	57.2	54.0	54.5	49.3	51.5	50.1	
N**	2'303	1'006	3'309	488	181	669	243	76	319	717	145	862	201	715	916	4'220	2'310	6'530	
données manquantes	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	4	10	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2009)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N	
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Etat civil*																				
célibataire	41.0	32.5	38.4	76.9	76.1	76.7	72.9	69.8	72.2	95.2	92.4	94.6	18.9	23.9	22.8	54.9	39.6	49.3	2'821	
marié-e	31.7	30.7	31.4	10.7	8.2	10.1	12.5	9.4	11.8	2.9	4.5	3.2	62.2	53.9	55.7	25.1	33.4	28.1	1'608	
séparé-e	5.8	6.8	6.1	3.9	3.7	3.8	2.1	3.8	2.4	0.9	0.0	0.7	3.9	3.7	3.7	4.4	4.7	4.5	260	
divorcé-e	19.8	25.6	21.6	7.4	9.0	7.8	10.9	15.1	11.8	1.0	2.3	1.3	12.2	14.7	14.2	14.2	18.5	15.7	900	
veuf/veuve	1.5	4.1	2.3	0.3	1.5	0.6	0.0	1.9	0.4	0.0	0.0	0.0	2.2	2.7	2.6	1.0	2.9	1.7	97	
partenariat enregistré	0.2	0.3	0.3	0.8	1.5	1.0	1.6	0.0	1.2	0.0	0.8	0.1	0.6	1.2	1.1	0.4	0.8	0.5	31	
N**	2'095	906	3'001	363	134	497	192	53	245	578	132	710	180	675	855	3'646	2'071	5'717	5'717	
données manquantes	212	101	313	125	47	172	51	23	74	139	13	152	23	43	66	580	243	823	823	
Degré d'urbanisation*																				
grands centres urbains	9.3	9.7	9.4	1.5	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	9.7	8.9	5.8	7.6	6.4	382	
périphérie des grands centres	14.9	17.0	15.6	4.1	2.2	3.6	7.5	7.1	7.5	3.5	1.5	3.1	16.7	13.9	14.5	11.1	12.7	11.6	692	
villes de moyenne importance	13.3	14.3	13.6	22.9	23.9	23.2	29.1	30.4	29.4	26.8	23.7	26.2	19.9	19.0	19.2	18.5	18.2	18.4	1'095	
petites villes	33.8	32.6	33.5	49.9	39.9	47.3	39.2	39.3	39.2	37.7	36.3	37.4	27.4	29.8	29.3	36.5	33.7	35.5	2'110	
campagne	28.6	26.4	27.9	21.6	33.3	24.7	24.1	23.2	23.9	32.1	38.5	33.2	30.1	27.6	28.1	28.1	27.9	28.0	1'666	
N**	2'157	946	3'103	393	138	531	199	56	255	608	135	743	186	699	885	3'790	2'155	5'945	5'945	
données manquantes	150	61	211	95	43	138	44	20	64	109	10	119	17	19	36	436	159	595	595	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2009)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de ménage*																			
seul-e en ménage	39.0	36.8	38.3	43.5	34.5	41.1	48.8	25.0	43.6	10.7	16.1	11.7	14.0	15.3	15.0	32.8	27.7	31.0	1'274
avec un ou les parents	7.2	4.0	6.2	16.7	11.5	15.3	12.6	19.4	14.1	72.2	55.4	69.0	6.1	4.2	4.6	21.3	10.2	17.3	713
avec enfant(s), sans partenaire	1.5	13.2	5.0	1.2	3.4	1.8	1.6	5.6	2.5	0.6	1.8	0.8	8.8	17.6	15.9	1.6	12.6	5.5	227
avec partenaire, sans enfant	23.9	24.6	24.1	13.4	29.9	17.7	11.8	16.7	12.9	2.3	7.1	3.2	29.8	24.8	25.8	18.6	22.9	20.2	829
avec partenaire et enfant(s)	19.9	14.6	18.3	11.0	9.2	10.5	15.0	8.3	13.5	2.9	0.9	2.5	38.6	34.4	35.2	16.3	18.8	17.2	707
avec d'autres proches	1.0	0.5	0.8	0.8	0.0	0.6	0.8	5.6	1.8	1.9	1.8	1.8	0.0	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	46
avec des amis (colocation)	2.5	2.9	2.6	3.7	2.3	3.3	3.9	0.0	3.1	2.5	3.6	2.7	1.8	1.1	1.2	2.6	2.3	2.5	103
autre	5.1	3.6	4.6	9.8	9.2	9.6	5.5	19.4	8.6	7.0	13.4	8.2	0.9	1.1	1.0	5.6	4.4	5.2	213
N**	1'503	631	2'134	246	87	333	127	36	163	485	112	597	114	471	585	2'650	1'462	4'112	4'112
données manquantes	804	376	1'180	242	94	336	116	40	156	232	33	265	89	247	336	1'576	852	2'428	2'428
Situation de domicile*																			
domicile fixe	92.6	92.8	92.6	77.4	78.1	77.6	86.4	75.0	83.8	90.9	89.9	90.8	98.4	97.0	97.3	90.9	92.5	91.4	4'061
sans domicile fixe	5.3	5.3	5.3	19.2	19.0	19.1	10.4	15.9	11.6	5.7	7.3	6.0	0.8	3.0	2.6	6.8	6.1	6.5	290
institution	2.1	1.9	2.0	3.4	2.9	3.3	3.2	9.1	4.5	3.3	2.8	3.2	0.8	0.0	0.2	2.4	1.5	2.0	91
N**	1'612	683	2'295	292	105	397	154	44	198	508	109	617	127	495	622	2'878	1'564	4'442	4'442
données manquantes	695	324	1'019	196	76	272	89	32	121	209	36	245	76	223	299	1'348	750	2'098	2'098
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	29.9	35.0	31.4	48.7	35.1	44.9	40.4	26.1	37.6	68.2	52.2	64.9	14.7	21.2	19.8	36.3	31.4	34.5	1'095
relations temporaires	5.0	5.4	5.1	4.2	9.5	5.7	7.4	8.7	7.7	8.6	13.0	9.5	2.9	1.0	1.4	5.3	4.6	5.0	160
partenaire fixe, vivant séparé	11.7	13.0	12.1	12.2	10.8	11.8	13.8	30.4	17.1	12.4	18.8	13.7	5.9	9.8	9.0	11.6	13.1	12.2	387
partenaire fixe, ménage commun	53.4	46.6	51.4	34.9	44.6	37.6	38.3	34.8	37.6	10.9	15.9	11.9	76.5	68.0	69.7	46.7	50.9	48.3	1'531
N**	1'228	517	1'745	189	74	263	94	23	117	267	69	336	102	397	499	2'001	1'172	3'173	3'173
données manquantes	1'079	490	1'569	299	107	406	149	53	202	450	76	526	101	321	422	2'225	1'142	3'367	3'367

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T30 Plus haute formation achevée, source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2009)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Plus haute formation achevée*																			
aucune form. achevée	5.2	8.5	6.2	10.8	14.7	11.8	8.7	5.6	8.1	22.3	21.3	22.1	8.2	6.5	6.8	9.9	9.8	9.9	389
scolarité obligatoire	12.5	16.0	13.5	31.5	38.9	33.4	15.4	50.0	22.2	52.1	46.3	51.1	8.2	13.5	12.4	22.8	20.6	22.1	866
scolarité complémentaire	3.3	3.3	3.3	1.8	4.2	2.4	4.7	5.6	4.9	3.3	5.6	3.7	4.1	3.0	3.2	3.3	3.7	3.4	134
apprentissage/école prof.	59.5	53.7	57.8	49.5	36.8	46.3	54.4	30.6	49.7	19.3	20.4	19.5	49.0	56.6	55.0	48.9	48.6	48.8	1'916
maturité/diplôme	2.9	5.4	3.6	3.2	2.1	2.9	5.4	5.6	5.4	2.0	1.9	1.9	6.1	5.1	5.3	3.3	5.1	3.9	154
école normale, pédagog.	1.1	1.6	1.2	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.3	3.1	3.8	3.6	0.8	2.1	1.2	48
form. profession. supérieure	6.9	5.6	6.6	1.1	1.1	1.1	7.4	2.8	6.5	0.4	1.9	0.6	13.3	4.3	6.2	5.3	4.7	5.1	199
école profession. supérieure	1.7	0.7	1.4	0.4	1.1	0.5	2.0	0.0	1.6	0.4	0.9	0.5	2.0	0.3	0.6	1.3	0.5	1.1	42
haute école spécialisée	3.0	1.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.0	2.4	2.3	1.8	1.5	1.7	66
université, haute école	3.8	4.0	3.8	1.1	1.1	1.1	1.3	0.0	1.1	0.2	0.0	0.2	4.1	4.6	4.5	2.7	3.3	2.9	113
N**	1'439	574	2'013	279	95	374	149	36	185	512	108	620	98	371	469	2'637	1'290	3'927	3'927
données manquantes	868	433	1'301	209	86	295	94	40	134	205	37	242	105	347	452	1'589	1'024	2'613	2'613
Source de revenu principale*																			
salaires	54.9	42.7	51.3	30.5	26.3	29.4	70.7	33.3	62.0	22.4	23.1	22.5	67.6	57.8	59.9	48.0	45.1	47.0	2'229
économies, épargne	1.3	0.3	1.0	1.0	0.0	0.7	1.9	0.0	1.5	0.2	0.9	0.3	0.0	0.6	0.5	1.0	0.4	0.8	39
rente (AVS, AI ou autre)	17.7	17.9	17.8	14.6	20.2	16.1	7.6	14.6	9.3	2.9	2.6	2.9	20.4	12.3	14.1	14.0	14.9	14.3	678
aide sociale	14.1	13.7	14.0	38.1	36.8	37.8	11.5	27.1	15.1	6.2	15.4	7.9	3.5	2.1	2.4	14.1	11.4	13.2	624
assurance-chômage	7.1	5.9	6.7	7.6	7.0	7.5	3.8	6.3	4.4	3.1	2.6	3.0	2.8	0.8	1.2	6.0	4.0	5.3	250
soutien du/dé la partenaire	0.9	14.0	4.8	1.3	0.9	1.2	0.6	4.2	1.5	0.4	0.9	0.5	0.7	21.4	16.9	0.9	13.6	5.4	255
soutien parents/proches/amis	2.3	3.2	2.5	2.2	2.6	2.3	2.5	12.5	4.9	63.5	51.3	61.3	3.5	3.9	3.8	14.1	8.1	12.0	570
deal, combines	0.1	0.0	0.0	1.3	2.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	9
autres revenus illégaux	0.1	0.0	0.1	0.3	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autre	1.5	2.3	1.8	3.2	2.6	3.0	1.3	2.1	1.5	1.1	3.4	1.5	1.4	1.2	1.2	1.6	2.2	1.8	86
N**	1'708	728	2'436	315	114	429	157	48	205	545	117	662	142	519	661	3'068	1'676	4'744	4'744
données manquantes	599	279	878	173	67	240	86	28	114	172	28	200	61	199	260	1'158	638	1'796	1'796
Taux d'activité principal*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	52.0	29.1	45.2	28.4	14.9	24.9	63.2	23.3	55.8	17.8	14.9	17.3	61.0	42.3	46.4	44.2	32.1	40.0	1'638
activité à temps partiel	5.0	18.1	8.9	4.4	8.0	5.3	8.3	6.7	8.0	2.8	4.4	3.1	4.2	27.0	22.1	4.6	18.0	9.3	380
plusieurs activités occas.	1.2	1.4	1.3	2.4	2.3	2.4	0.8	3.3	1.2	0.6	2.6	1.0	0.8	1.2	1.1	1.1	1.5	1.2	51
en formation	2.2	3.0	2.5	2.4	3.4	2.7	4.5	13.3	6.1	63.0	56.1	61.7	4.2	4.7	4.6	14.9	9.6	13.0	534
sans activité prof.	22.2	30.8	24.8	20.4	31.0	23.1	10.5	23.3	12.9	4.0	7.9	4.8	20.3	20.5	20.4	17.3	24.4	19.8	810
sans travail, en quête d'emploi	11.3	11.6	11.4	20.4	19.5	20.2	7.5	16.7	9.2	6.3	5.3	6.1	4.2	1.6	2.2	10.5	8.3	9.7	398
sans travail, futur emploi garanti	0.3	0.3	0.3	1.6	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	14
autre	5.8	5.6	5.7	20.0	20.7	20.2	5.3	13.3	6.7	5.5	8.8	6.1	5.1	2.6	3.1	6.9	5.8	6.5	267
N**	1'486	623	2'109	250	87	337	133	30	163	494	114	608	118	430	548	2'667	1'425	4'092	4'092
données manquantes	821	384	1'205	238	94	332	110	46	156	223	31	254	85	288	373	1'559	889	2'448	2'448

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2009)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	34.3	45.4	37.5	53.2	73.3	57.8	19.4	46.2	24.0	15.3	25.0	16.8	19.6	23.4	22.7	33.0	38.5	34.9	622
apprenti-e, stagiaire	1.4	0.7	1.2	4.5	4.4	4.5	1.6	0.0	1.3	35.1	25.0	33.5	4.3	1.5	2.0	6.1	2.8	4.9	88
manœuvre, aide	3.7	4.1	3.8	7.1	2.2	6.0	6.5	7.7	6.7	3.8	8.3	4.5	0.0	2.4	2.0	4.0	3.7	3.9	70
ouvrier/ère formé-e sur le tas	4.4	5.4	4.7	8.4	4.4	7.5	8.1	7.7	8.0	1.5	4.2	1.9	0.0	3.9	3.2	5.4	4.9	5.2	93
ouvrier/ère formé-e (CFC)	10.3	3.7	8.4	15.6	4.4	13.1	17.7	0.0	14.7	8.4	4.2	7.7	6.5	11.2	10.4	10.9	6.1	9.3	165
contremaître-sse	3.8	0.3	2.8	0.6	0.0	0.5	4.8	0.0	4.0	0.8	0.0	0.6	2.2	0.0	0.4	2.9	0.2	2.0	35
employé-e non qualifié-e	17.3	27.8	20.4	7.1	8.9	7.5	16.1	15.4	16.0	5.3	4.2	5.2	8.7	27.3	23.9	14.2	24.9	17.9	319
empl. qualifié-e, cadre moyen	10.2	4.4	8.5	2.6	2.2	2.5	11.3	7.7	10.7	0.0	4.2	0.6	8.7	12.7	12.0	7.7	7.1	7.5	134
employé-e, cadre supérieur	3.5	1.0	2.8	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.7	0.8	0.0	0.6	8.7	3.4	4.4	2.7	1.6	2.4	42
indépendant-e	9.4	5.4	8.3	0.6	0.0	0.5	9.7	7.7	9.3	2.3	0.0	1.9	34.8	8.8	13.5	8.2	5.8	7.4	132
écolier/ère, étudiant-e	0.7	1.4	0.9	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	26.0	25.0	25.8	6.5	2.4	3.2	4.1	2.9	3.7	66
autre statut	1.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.3	0.8	0.0	0.6	0.0	2.9	2.4	0.7	1.5	1.0	17
N**	709	295	1'004	154	45	199	62	13	75	131	24	155	46	205	251	1'165	618	1'783	1'783
données manquantes	1'598	712	2'310	334	136	470	181	63	244	586	121	707	157	513	670	3'061	1'696	4'757	4'757
Revenu mensuel net*																			
aucun revenu	26.0	38.9	29.4	19.4	14.8	18.4	18.4	25.0	19.6	42.6	41.2	42.4	17.6	11.7	12.8	26.4	29.6	27.3	308
moins de 1000 fr.	3.7	6.9	4.6	19.4	22.2	20.0	10.5	25.0	13.0	33.3	35.3	33.6	11.8	7.8	8.5	10.8	9.8	10.5	118
de 1001 à 2000 fr.	6.0	9.7	7.0	17.3	14.8	16.8	13.2	12.5	13.0	7.4	11.8	8.0	0.0	9.1	7.4	7.4	10.7	8.3	94
de 2001 à 3000 fr.	15.4	22.3	17.2	22.4	33.3	24.8	13.2	25.0	15.2	2.8	0.0	2.4	0.0	9.1	7.4	13.8	18.6	15.2	171
de 3001 à 4000 fr.	13.5	8.6	12.2	12.2	7.4	11.2	13.2	0.0	10.9	5.6	0.0	4.8	5.9	22.1	19.1	12.9	12.2	12.7	143
de 4001 à 5000 fr.	12.5	7.4	11.1	6.1	7.4	6.4	21.1	12.5	19.6	8.3	11.8	8.8	23.5	18.2	19.1	12.1	10.1	11.5	130
de 5001 à 6000 fr.	13.1	2.9	10.4	3.1	0.0	2.4	7.9	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	5.9	15.6	13.8	9.4	5.8	8.3	94
de 6001 à 8000 fr.	7.1	3.4	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	6.5	9.6	5.0	3.4	4.5	51
de 8001 à 10 000 fr.	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	8
de 10 001 à 15 000 fr.	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	1.1	1.0	0.0	0.7	8
plus de 15 000 fr.	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	1.1	0.3	0.0	0.2	2
N**	481	175	656	98	27	125	38	8	46	108	17	125	17	77	94	799	328	1'127	1'127
données manquantes	1'826	832	2'658	390	154	544	205	68	273	609	128	737	186	641	827	3'427	1'986	5'413	5'413

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2009)

Raison principale*	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
fin régulière sans transfert	45.1	46.8	45.6	23.7	23.8	23.7	35.6	23.7	32.7	63.2	58.3	62.4	59.9	68.0	66.2	46.3	52.5	48.5	3'144
fin régulière avec transfert	9.0	8.6	8.9	17.0	13.3	16.0	12.6	13.2	12.7	5.5	7.6	5.8	5.4	3.5	3.9	9.4	7.2	8.6	559
changement de domicile	2.9	3.0	2.9	5.4	6.6	5.7	2.1	6.6	3.2	1.4	2.8	1.6	0.5	0.6	0.5	2.6	2.6	2.6	170
hospitalisation	0.8	1.0	0.9	1.0	1.7	1.2	0.4	2.6	1.0	0.1	0.7	0.2	0.0	0.1	0.1	0.6	0.8	0.7	46
détention	0.3	0.1	0.3	2.3	0.6	1.8	0.8	0.0	0.6	1.0	0.0	0.8	0.5	0.0	0.1	0.7	0.1	0.5	32
perte de contact	26.3	25.1	25.9	32.4	36.5	33.5	31.8	39.5	33.7	16.8	21.5	17.6	22.8	20.0	20.6	25.3	24.4	25.0	1'619
rupture explicite	11.5	11.0	11.4	12.9	11.0	12.4	13.8	9.2	12.7	9.7	6.9	9.2	8.9	5.2	6.0	11.1	8.5	10.2	658
décès	1.9	2.2	2.0	3.7	4.4	3.9	1.3	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	1.5	98
autre raison	2.1	2.1	2.1	1.7	2.2	1.8	1.7	3.9	2.2	2.4	2.1	2.3	2.0	2.7	2.5	2.3	2.5	2.4	155
N**	2'287	989	3'276	482	181	663	239	76	315	714	144	858	202	716	918	4'190	2'291	6'481	6'481
données manquantes	20	18	38	6	0	6	4	0	4	3	1	4	1	2	3	36	23	59	59

T32b Destination des transferts, selon le problème principal¹ et chez les proches (2009)

Destination des transferts***	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
traitement résidentiel	26.8	30.8	27.8	34.5	28.6	33.3	57.1	12.5	40.9	31.6	20.0	29.2	14.3	11.1	12.5	31.4	24.1	29.4	88
prise en charge ambulatoire	50.0	53.8	51.0	34.5	28.6	33.3	35.7	50.0	40.9	52.6	40.0	50.0	71.4	55.6	62.5	46.8	50.6	47.8	143
appartement protégé	5.4	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	4.5	5.3	20.0	8.3	0.0	0.0	0.0	3.2	2.5	3.0	9
autre institution spécialisée	17.9	15.4	17.2	30.9	42.9	33.3	7.1	25.0	13.6	10.5	20.0	12.5	14.3	33.3	25.0	18.6	22.8	19.7	59
N**	112	39	151	55	14	69	14	8	22	19	5	24	7	9	16	220	79	299	299
données manquantes	94	46	140	27	10	37	16	2	18	20	6	26	4	16	20	174	86	260	260

T32c Cause de décès, selon le problème principal¹ et chez les proches (2009)

Cause de décès****	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
suicide	12.5	0.0	8.6	33.3	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	17.1	0.0	11.3	6
accident	8.3	9.1	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	5.7	5.6	5.7	3
maladie	70.8	72.7	71.4	11.1	40.0	21.4	50.0	0.0	33.3	-	-	-	-	-	-	54.3	61.1	56.6	30
surdose ou intoxication aiguë	8.3	18.2	11.4	55.6	40.0	50.0	0.0	100.0	33.3	-	-	-	-	-	-	20.0	27.8	22.6	12
autre cause de décès	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	7.1	50.0	0.0	33.3	-	-	-	-	-	-	2.9	5.6	3.8	2
N**	24	11	35	9	5	14	2	1	3	0	0	0	0	0	0	35	18	53	53
données manquantes	20	11	31	9	3	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	31	14	45	45

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s transféré-e-s. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s décédé-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2009)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
Durée de la prise en charge* (%)																			
1 semaine ou moins	4.6	4.6	4.6	1.2	0.6	1.0	0.8	0.0	0.6	4.5	1.4	3.9	7.4	6.8	7.0	4.5	5.2	4.7	308
> 1 semaine à 1 mois	3.7	2.3	3.2	3.7	1.7	3.1	1.2	1.3	1.3	11.0	14.5	11.6	4.9	2.2	2.8	4.9	3.0	4.2	274
> 1 à 2 mois	3.8	4.1	3.9	5.1	1.7	4.2	0.4	5.3	1.6	9.6	9.7	9.6	5.4	4.0	4.3	5.0	4.2	4.7	307
>2 à 3 mois	3.3	4.8	3.7	2.7	3.4	2.8	4.5	0.0	3.4	4.3	7.6	4.9	4.9	4.7	4.8	3.6	4.7	4.0	260
>3 à 6 mois	11.7	13.7	12.3	8.8	6.1	8.1	7.4	9.2	7.8	14.2	11.7	13.8	16.3	16.3	16.3	12.0	13.8	12.6	824
>6 mois à 1 an	29.2	27.4	28.6	29.7	29.6	29.7	32.9	36.8	33.9	31.5	35.9	32.3	27.6	37.7	35.4	30.2	32.2	30.9	2'015
>1 à 2 ans	25.2	25.4	25.2	21.1	26.3	22.5	29.2	26.3	28.5	18.4	13.1	17.5	22.7	18.7	19.6	23.0	21.9	22.6	1'475
>2 à 3 ans	8.7	8.7	8.7	10.0	7.3	9.3	11.9	14.5	12.5	3.9	2.8	3.7	7.4	5.4	5.9	7.9	7.0	7.6	496
>3 à 5 ans	6.9	5.6	6.5	12.9	14.0	13.2	8.6	5.3	7.8	2.1	1.4	2.0	3.0	2.5	2.6	6.4	4.9	5.9	384
>5 à 10 ans	2.4	3.2	2.6	3.9	7.8	4.9	2.9	1.3	2.5	0.4	2.1	0.7	0.5	1.4	1.2	2.1	2.7	2.3	151
plus de 10 ans	0.6	0.3	0.5	0.8	1.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	24
N**	2'294	1'001	3'295	488	179	667	243	76	319	717	145	862	203	717	920	4'213	2'305	6'518	6'518
<i>données manquantes</i>	13	6	19	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	9	22	22
Durée (en semaines)																			
moyenne	68.6	66.2	67.9	85.5	110.0	92.0	76.8	70.5	75.3	38.3	40.0	38.6	47.0	47.8	47.6	63.2	60.8	62.3	
écart-type	84.4	76.0	82.0	94.3	142.5	109.8	69.6	71.8	70.1	40.7	58.8	44.2	46.1	59.0	56.4	77.2	78.2	77.6	
1er quartile	22.3	20.0	21.6	27.6	33.6	29.4	31.6	31.4	31.6	8.0	7.3	8.0	13.0	18.1	16.4	19.1	19.4	19.1	
valeur médiane	46.0	42.9	44.9	50.5	61.3	53.4	57.0	49.4	54.4	29.4	26.9	29.0	32.6	32.6	32.6	40.9	37.3	39.9	
3e quartile	85.3	85.1	85.3	114.2	136.7	118.7	98.0	88.4	96.7	52.0	46.3	51.0	65.7	56.1	58.1	78.0	72.7	76.4	
N**	2'294	1'001	3'295	488	179	667	243	76	319	717	145	862	203	717	920	4'213	2'305	6'518	
<i>données manquantes</i>	13	6	19	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	9	22	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2009)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Substitution pendant la prise en charge*																
non	97.4	97.5	97.4	35.8	30.3	34.3	88.1	86.3	87.7	99.3	97.4	99.0	89.8	89.4	89.6	3'730
oui	2.6	2.5	2.6	64.2	69.7	65.7	11.9	13.7	12.3	0.7	2.6	1.0	10.2	10.6	10.4	431
N**	1'721	709	2'430	355	132	487	177	51	228	556	115	671	3'015	1'146	4'161	4'161
données manquantes	584	298	882	133	47	180	65	24	89	157	28	185	1'001	446	1'447	1'447
Type de substitution***																
héroïne	2.4	11.8	5.2	2.5	1.4	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.0	2.4	8
méthadone	63.4	47.1	58.6	90.7	93.1	91.5	94.4	100.0	95.8	100.0	66.7	83.3	86.7	85.0	86.2	287
autres opiacés	2.4	5.9	3.4	4.9	4.2	4.7	5.6	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.3	4.0	4.2	14
autres substances	31.7	35.3	32.8	1.9	1.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	16.7	6.9	8.0	7.2	24
N**	41	17	58	162	72	234	18	6	24	3	3	6	233	100	333	333
données manquantes	4	1	5	66	20	86	3	1	4	1	0	1	76	22	98	98
Substitution après la prise en charge*																
non	99.0	98.3	98.8	64.0	66.3	64.7	96.4	86.1	94.3	100.0	100.0	100.0	95.7	95.3	95.6	3'464
oui	1.0	1.7	1.2	36.0	33.7	35.3	3.6	13.9	5.7	0.0	0.0	0.0	4.3	4.7	4.4	161
N**	1'548	645	2'193	239	92	331	138	36	174	495	113	608	2'605	1'020	3'625	3'625
données manquantes	757	362	1'119	249	87	336	104	39	143	218	30	248	1'411	572	1'983	1'983
Type de substitution***																
prescription d'héroïne	12.5	36.4	22.2	3.5	6.5	4.3	0.0	40.0	20.0	-	-	-	4.4	16.7	8.1	13
traitement de substitution	87.5	63.6	77.8	96.5	93.5	95.7	100.0	60.0	80.0	-	-	-	95.6	83.3	91.9	148
N**	16	11	27	86	31	117	5	5	10	0	0	0	113	48	161	161
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s substitué-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2009)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Postcure prévue et mise en place*																
non	87.2	79.5	85.0	76.3	72.7	75.4	84.9	58.8	80.6	85.2	86.1	85.4	85.5	79.4	83.9	1'806
oui	12.8	20.5	15.0	23.7	27.3	24.6	15.1	41.2	19.4	14.8	13.9	14.6	14.5	20.6	16.1	346
N**	1'028	395	1'423	190	66	256	86	17	103	183	36	219	1'590	562	2'152	2'152
<i>données manquantes</i>	1'277	612	1'889	298	113	411	156	58	214	530	107	637	2'426	1'030	3'456	3'456
Type de la postcure prévue***																
appartement protégé de l'institution	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.6	2
service de postcure de l'institution	8.9	1.4	6.2	0.0	5.6	1.7	0.0	20.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.1	2.9	4.4	14
appartement protégé extérieur	5.6	1.4	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	20.0	6.9	3.7	2.0	3.2	10
service de postcure extérieur	7.3	13.0	9.3	24.4	16.7	22.0	46.2	20.0	38.9	8.3	0.0	6.9	13.1	12.7	13.0	41
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	23.4	15.9	20.7	12.2	0.0	8.5	0.0	20.0	5.6	4.2	0.0	3.4	16.4	11.8	14.9	47
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	6.5	4.3	5.7	29.3	16.7	25.4	23.1	0.0	16.7	8.3	20.0	10.3	13.1	6.9	11.1	35
autre centre de consultation	16.9	23.2	19.2	14.6	22.2	16.9	38.5	0.0	27.8	20.8	0.0	17.2	18.2	21.6	19.3	61
groupe d'entraide	5.6	2.9	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.0	2.8	9
groupe d'ancien-ne-s client-e-s de l'institution	0.0	2.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.6	2
autre	33.9	43.5	37.3	31.7	38.9	33.9	15.4	20.0	16.7	54.2	60.0	55.2	35.5	43.1	38.0	120
N**	124	69	193	41	18	59	13	5	18	24	5	29	214	102	316	316
<i>données manquantes</i>	8	12	20	4	0	4	0	2	2	3	0	3	16	14	30	30

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pour lesquels une postcure est prévue. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2009)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Problèmes addictifs*																
alcool	54.9	61.1	56.8	20.6	23.5	21.3	21.2	34.4	24.0	8.6	15.7	9.9	37.1	44.1	39.1	1'272
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.1	0.0	0.1	3.6	1.2	3.0	1.7	6.3	2.7	0.2	0.0	0.2	0.6	0.3	0.6	18
héroïne	0.8	0.5	0.7	60.3	56.8	59.5	5.9	18.8	8.7	0.9	1.0	0.9	7.5	6.1	7.1	230
méthadone	0.7	0.9	0.8	18.6	34.6	22.6	4.2	15.6	6.7	0.0	0.0	0.0	2.8	4.1	3.2	103
autres opiacés	0.0	0.3	0.1	2.0	2.5	2.1	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	10
cocaïne	1.9	1.2	1.7	10.1	22.2	13.1	48.3	62.5	51.3	1.1	5.9	2.0	4.9	5.7	5.1	167
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	3.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
amphétamines	0.1	0.2	0.2	0.8	0.0	0.6	2.5	9.4	4.0	0.2	1.0	0.4	0.5	0.8	0.6	18
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.5	0.2	0.8	0.0	0.6	2.5	9.4	4.0	0.2	1.0	0.4	0.3	1.0	0.5	15
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
barbituriques	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
benzodizépines	1.7	2.3	1.9	16.2	14.8	15.9	4.2	12.5	6.0	0.2	0.0	0.2	3.3	3.6	3.3	109
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.9	0.4	1.2	1.2	1.2	0.8	0.0	0.7	0.2	0.0	0.2	0.3	0.7	0.4	14
LSD	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.4	0.1	0.1	0.1	3
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	3.1	0.7	0.2	1.0	0.4	0.1	0.2	0.2	5
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	0.5	0.1	0.1	0.1	3
cannabis	3.2	3.1	3.2	14.2	17.3	14.9	10.2	25.0	13.3	51.2	47.1	50.5	14.1	10.1	13.0	423
tabac	13.5	11.8	13.0	18.6	12.3	17.1	9.3	21.9	12.0	12.6	16.7	13.3	14.0	15.0	14.3	465
autres substances	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	0.5	0.3	0.5	0.4	13
jeu pathologique	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	1.4	1.3	1.4	45
troubles alimentaires	0.0	0.3	0.1	0.4	2.5	0.9	0.0	6.3	1.3	0.0	1.0	0.2	0.2	4.3	1.4	45
autres troubles assimilable à une addiction	0.1	0.3	0.2	0.4	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.6	20
aucun	39.7	35.5	38.4	19.0	18.5	18.9	38.1	15.6	33.3	41.3	47.1	42.3	38.0	33.3	36.7	1'194
N**	1'344	574	1'918	247	81	328	118	32	150	453	102	555	2'335	920	3'255	3'255
données manquantes	961	433	1'394	241	98	339	124	43	167	260	41	301	1'681	672	2'353	2'353

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T37 Fréquence des rechutes, substance ou comportement impliqué et durée des rechutes pendant la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2009)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence des rechutes*																
aucune	61.2	47.5	57.5	33.7	31.6	33.1	49.2	46.7	48.6	76.3	55.6	73.0	59.2	46.0	55.8	754
une fois	9.8	13.1	10.7	7.6	13.2	9.2	10.2	0.0	8.1	5.4	22.2	8.1	9.4	13.4	10.4	141
deux fois	5.3	8.1	6.0	14.1	10.5	13.1	10.2	0.0	8.1	4.3	11.1	5.4	6.0	8.0	6.5	88
trois ou quatre fois	12.4	15.4	13.2	15.2	13.2	14.6	8.5	13.3	9.5	6.5	5.6	6.3	12.1	14.8	12.8	173
cinq fois ou plus	11.3	15.8	12.5	29.3	31.6	30.0	22.0	40.0	25.7	7.5	5.6	7.2	13.3	17.9	14.5	196
N**	701	259	960	92	38	130	59	15	74	93	18	111	1'000	352	1'352	1'352
données manquantes	1'604	748	2'352	396	141	537	183	60	243	620	125	745	3'016	1'240	4'256	4'256
Substance/comportement addictif lors des rechutes***																
alcool	95.8	98.5	96.7	27.1	24.0	26.2	28.6	62.5	36.1	20.0	0.0	14.3	72.1	77.3	73.7	424
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	2.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	2.8	5.0	0.0	3.6	0.3	2.2	0.9	5
opiacés	5.0	2.3	4.1	84.7	92.0	86.9	32.1	37.5	33.3	5.0	0.0	3.6	19.0	16.2	18.1	104
cocaïne et dérivés	4.6	1.5	3.6	23.7	40.0	28.6	89.3	75.0	86.1	5.0	12.5	7.1	13.8	10.8	12.9	74
stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	2.8	5.0	0.0	3.6	0.5	0.5	0.5	3
médicaments	1.9	2.3	2.0	22.0	16.0	20.2	17.9	37.5	22.2	5.0	0.0	3.6	6.7	6.5	6.6	38
hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	2
cannabis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1
tabac	5.0	2.3	4.1	22.0	8.0	17.9	21.4	37.5	25.0	80.0	87.5	82.1	12.8	8.1	11.3	65
substances volatiles	1.1	0.8	1.0	0.0	4.0	1.2	0.0	12.5	2.8	5.0	0.0	3.6	1.8	2.2	1.9	11
autres substances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.5	1.7	10
troubles alimentaires	0.4	0.8	0.5	0.0	4.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.8	1.4	8
autres troubles assimilables à une addiction	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.7	4
N**	262	132	394	59	25	84	28	8	36	20	8	28	390	185	575	575
données manquantes	10	4	14	2	1	3	2	0	2	2	0	2	18	5	23	23
Durée des rechutes****																
1 à 2 jours	24.8	22.6	24.1	40.0	50.0	42.3	45.5	0.0	38.5	25.0	100.0	50.0	29.1	33.8	30.6	70
3 à 6 jours	31.9	24.5	29.5	10.0	16.7	11.5	0.0	50.0	7.7	12.5	0.0	8.3	25.9	21.1	24.5	56
7 à 10 jours	10.6	15.1	12.0	10.0	0.0	7.7	27.3	0.0	23.1	12.5	0.0	8.3	11.4	11.3	11.4	26
>10 jours à 2 semaines	2.7	7.5	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.6	3.1	7
>2 à 4 semaines	10.6	17.0	12.7	5.0	16.7	7.7	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	25.0	10.1	14.1	11.4	26
>4 à 6 semaines	13.3	5.7	10.8	10.0	0.0	7.7	9.1	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	11.4	4.2	9.2	21
>6 à 8 semaines	2.7	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.3	3
>2 mois	3.5	7.5	4.8	25.0	16.7	23.1	18.2	50.0	23.1	12.5	0.0	8.3	8.2	9.9	8.7	20
N**	113	53	166	20	6	26	11	2	13	8	4	12	158	71	229	229
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Pourcentages par colonne, une seule catégorie possible

T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal¹ (selement patient-e-s) (2009)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	26.0	36.2	28.9	1.6	0.0	1.3	25.0	27.3	25.5	14.0	9.1	13.0	21.7	31.7	24.5	297
1 jour par semaine ou moins	0.5	0.9	0.6	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	7
2 à 3 jours par semaine	1.0	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	2.8	1.1	0.6	1.0	12
4 à 6 jours par semaine	1.0	0.4	0.8	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	0.7	9
une fois par jour	0.3	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	4
plusieurs fois par jour	71.1	60.9	68.2	97.5	100.0	98.1	72.5	72.7	72.5	82.6	90.9	84.3	75.5	65.9	72.9	884
N**	589	235	824	122	38	160	40	11	51	86	22	108	879	334	1'213	1'213
<i>données manquantes</i>	<i>1'716</i>	<i>772</i>	<i>2'488</i>	<i>366</i>	<i>141</i>	<i>507</i>	<i>202</i>	<i>64</i>	<i>266</i>	<i>627</i>	<i>121</i>	<i>748</i>	<i>3'137</i>	<i>1'258</i>	<i>4'395</i>	<i>4'395</i>
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10 cigarettes par jour	15.4	13.8	15.0	8.1	4.0	7.2	21.1	0.0	16.7	31.4	33.3	31.7	15.9	13.8	15.4	102
11 à 20 cigarettes par jour	47.5	56.0	49.6	60.5	72.0	63.1	57.9	60.0	58.3	47.1	33.3	44.4	49.6	56.0	51.1	339
21 à 30 cigarettes par jour	27.6	22.9	26.5	30.2	24.0	28.8	21.1	20.0	20.8	15.7	33.3	19.0	27.2	23.3	26.2	174
31 cigarettes par jour ou plus	9.5	7.3	9.0	1.2	0.0	0.9	0.0	20.0	4.2	5.9	0.0	4.8	7.3	6.9	7.2	48
N**	337	109	446	86	25	111	19	5	24	51	12	63	504	159	663	663
<i>données manquantes</i>	<i>99</i>	<i>41</i>	<i>140</i>	<i>34</i>	<i>13</i>	<i>47</i>	<i>11</i>	<i>3</i>	<i>14</i>	<i>23</i>	<i>8</i>	<i>31</i>	<i>184</i>	<i>69</i>	<i>253</i>	<i>253</i>

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème¹ (seulement patient-e-s) (2009)

	Patient-e-s: principale substance posant problème ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Objectif de consommation*																
abstinence définitive	36.0	44.1	38.1	68.3	52.1	64.2	56.5	56.3	56.4	38.4	30.0	36.9	40.8	44.3	41.7	728
abstinence limitée dans le temps	13.9	10.5	13.0	2.1	6.3	3.1	1.6	0.0	1.3	5.8	10.0	6.5	10.5	8.9	10.1	176
consommation contrôlée	35.2	32.6	34.5	9.0	12.5	9.8	27.4	25.0	26.9	29.0	40.0	31.0	31.9	30.3	31.5	550
aucune limitation envisagée	5.5	4.5	5.2	6.2	6.3	6.2	3.2	0.0	2.6	13.0	6.7	11.9	6.1	5.1	5.8	102
pas déterminé pour l'instant	8.6	7.7	8.4	13.1	20.8	15.0	9.7	18.8	11.5	12.3	13.3	12.5	9.7	10.0	9.8	171
autre	0.8	0.6	0.8	1.4	2.1	1.6	1.6	0.0	1.3	1.4	0.0	1.2	0.9	1.3	1.0	18
N**	870	313	1'183	145	48	193	62	16	78	138	30	168	1'296	449	1'745	1'745
données manquantes	1'435	694	2'129	343	131	474	180	59	239	575	113	688	2'720	1'143	3'863	3'863
Pronostic*																
très bon pronostic	12.6	10.4	12.0	7.7	3.8	6.7	12.5	12.5	12.5	17.6	11.8	16.6	12.6	10.5	12.0	225
bon pronostic	49.5	51.2	49.9	31.4	40.4	33.7	43.1	6.3	36.4	43.1	58.8	46.0	46.4	49.1	47.1	880
plutôt mauvais pronostic	25.5	27.4	26.0	46.8	32.7	43.3	34.7	62.5	39.8	34.0	23.5	32.1	29.5	28.3	29.2	545
mauvais pronostic	12.5	11.0	12.1	14.1	23.1	16.3	9.7	18.8	11.4	5.2	5.9	5.3	11.6	12.2	11.7	219
N**	922	336	1'258	156	52	208	72	16	88	153	34	187	1'392	477	1'869	1'869
données manquantes	1'383	671	2'054	332	127	459	170	59	229	560	109	669	2'624	1'115	3'739	3'739

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu