



Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance

Résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2017

Recueil de tableaux statistiques

Etienne Maffli & Mariana Astudillo



Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du monitoring act-info. Nous remercions également les collaborateurs et collaboratrices des services de consultation qui ont effectué les tâches de logistique et de saisie. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-info. Un grand merci également à Edith Bacher pour la conception graphique de ce rapport ainsi qu'à Marina Delgrande Jordan pour sa précieuse collaboration dans le développement des syntaxes d'analyse.

Compléments d'information: Etienne Maffli, tél. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emaffli@addictionsuisse.ch

Réalisation: Etienne Maffli, Mariana Astudillo
Addiction Suisse

Diffusion: Recherche, Addiction Suisse, case postale 870,
1001 Lausanne, tél. 021/321 29 46, fax 021 321 29 40,
e-mail cgmail@addictionsuisse.ch

Prix: Fr. 10.–

Langue du texte original: allemand

Graphisme/mise en page: Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse, Lausanne 2019

Citation recommandée: Maffli, E. & Astudillo, M. (2019). Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance: résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2017 – Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info – addiction care and therapy information.....	7
act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD).....	7

ADMISSION

T1	Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2017)
T2	État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2017)
T3	Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2017)
T4	Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2017)
T5	Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2017)
T6	Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2017)
T7	Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2017)
T8	Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)
T9	Instance d'envoi principale, selon le problème principal et chez les proches (2017)
T10	Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire et type de mesure, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)
T11	Traitements/prises en charge avant l'admission et type de prises en charge antérieures, selon le problème principal et chez les proches (2017)
T12	Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)
T13	Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2017)
T14	Usage de substances multiples et combinaisons de substances (2017)
T15.1a	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2017), hommes
T15.1b	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2017), femmes
T15.1c	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2017), hommes

- T15.2a Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2017), hommes
- T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2017), femmes
- T15.2c Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2017), hommes et femmes
- T16.1a Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2017), hommes
- T16.1b Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2017), femmes
- T16.1c Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2017), hommes et femmes
- T16.2a Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2017), hommes
- T16.2b Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2017), femmes
- T16.2c Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2017), hommes et femmes
- T17 Mode d'administration prédominant de la principale substance posant problème avant l'admission (2017)
- T18.1 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 12 derniers mois avant l'admission des injections et échange de matériel d'injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)
- T18.2 Âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)
- T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2017), hommes
- T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2017), femmes
- T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2017), hommes et femmes
- T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2017), hommes
- T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2017), femmes
- T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2017), hommes et femmes

- T20.1a Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)
- T20.1b Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)
- T21 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)
- T22 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)
- T23a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2017), hommes
- T23b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2017), femmes
- T23c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2017), hommes et femmes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2017), hommes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2017), femmes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2017), hommes et femmes
- T25 Proches: lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2017)
- T26 Proches: problème principal de la tierce personne (2017)

SORTIE

- T27 Sexe et âge, selon le problème principal et chez les proches (2017)
- T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2017)
- T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2017)
- T30 Source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2017)
- T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2017)
- T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2017)
- T32b Destination des transferts, selon le problème principal et chez les proches (2017)
- T32c Cause de décès, selon le problème principal et chez les proches (2017)
- T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2017)
- T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)

- T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)
- T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)
- T37 Fréquence des rechutes et substance ou comportement impliqué pendant la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)
- T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)
- T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème (seulement patient-e-s) (2017)

act-info - addiction care and therapy information

Le Réseau de monitoring (act-info) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse:

- SAMBAD (Statistique du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance)
- Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Substitution (Statistique nationale des traitements de substitution)

Ces cinq statistiques disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés. Les données communes sont intégrées dans une base de données centralisée, permettant ainsi de procéder à des analyses sur l'ensemble des secteurs. Avec l'adoption des standards européens (Treatment Demand Indicator), la comparabilité des données au plan international est également garantie.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement a été confiée à Addiction Suisse à Lausanne et pour l'année 2017 en partie encore à l'Institut suisse de recherche sur les addictions et la santé à Zürich (ISGF).

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)

Dès 2004, les instruments de monitoring act-info ont été introduits dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance et ont remplacé les anciens questionnaires en vigueur depuis 1994. Après plusieurs années d'utilisation, une révision de ces instruments a eu lieu et les nouveaux questionnaires ont été introduits le 1^{er} janvier 2013. Ce processus a été harmonisé avec la révision des normes européennes. De façon à répondre aux différents besoins, une version raccourcie est également disponible dans le domaine ambulatoire. Cela explique en partie pourquoi il y a un nombre relativement élevé de valeurs manquantes pour certaines questions. Le monitoring dans ce secteur est confié à Addiction Suisse à Lausanne.

La statistique act-info SAMBAD offre un aperçu de la clientèle de l'aide ambulatoire en matière de dépendance en Suisse. Les données sont récoltées au début et à la fin de la prise en charge. Les informations rassemblées à l'admission renseignent en particulier sur les caractéristiques sociodémographiques des client-e-s, sur leurs expériences de traitement ainsi que sur leurs modes de consommation et problèmes psychosociaux avant la prise en charge. Les informations récoltées à la sortie rendent principalement compte des circonstances de la fin de la prise en charge et des caractéristiques sociodémographiques des client-e-s à ce moment.

En 2017, 69 institutions du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance ont participé au monitoring act-info. Il s'agit de services de consultation spécialisés pour les problèmes liés à l'alcool et/ou aux drogues illégales ainsi que de divers types de services polyvalents offrant également une aide pour les problèmes addictifs.

Explications concernant les tableaux

La présente statistique descriptive des données de l'enquête *act-info* auprès des client-e-s du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance repose sur deux types de tableaux:

- lorsque la question a des catégories de réponses prédéfinies ou recodées en tranches distinctes (par exemple "état civil" ou "âge"), le tableau indique les pourcentages des différentes catégories de réponses
- lorsque la question n'a pas de catégories prédéfinies, mais requiert une valeur numérique (par exemple "âge au début de la consommation problématique"), le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1er quartile, 3e quartile)

La plupart des tableaux présentent les résultats de façon distincte pour les sous-groupes de patients et patientes ayant mentionné l'**alcool**, un **opioïde** (héroïne notamment), la **cocaïne** (et dérivés) ou le **cannabis** comme problème principal au moment de leur admission. Les **proches** venant consulter pour les problèmes d'un tiers font également l'objet d'analyses séparées pour les aspects socio-démographiques. A l'exception des thèmes directement liés aux modes de consommation ou aux formes de comportements addictifs non liés aux substances, les résultats ne sont en revanche pas présentés séparément pour les client-e-s (peu nombreux) ayant mentionné d'autres substances (par exemple un stimulant ou les substances volatiles) ou un problème addictif non lié à une substance (par exemple jeu pathologique) comme problème principal. Ces personnes sont cependant incluses dans les analyses portant sur l'ensemble des prises en charge figurant dans les blocs à droite des tableaux respectifs. Toutes les analyses sont effectuées séparément pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour les deux sexes confondus (colonnes "Total" comprenant le cas échéant également les quelques personnes dont le sexe n'est pas connu).

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Le nombre de réponses valides **N** représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages ou autres paramètres. Il est indiqué pour chaque groupe ou sous-groupe considéré. Au dessous, le nombre correspondant de données manquantes figure également. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés particulièrement prudemment.

Des notes en bas de tableau renseignent sur les éventuelles particularités des groupes de référence ainsi que sur le type de question. Lorsque plusieurs réponses sont possibles (par exemple aux tableaux du thème T19, "autres problèmes addictifs") les pourcentages obtenus ne sont pas additifs.

Les institutions ne participant pas au monitoring *act-info* ont été investiguées dans le cadre d'une vaste enquête portant sur l'estimation de la demande en matière de traitement dans le domaine de l'aide concernant les problèmes de dépendance. Les résultats de cette enquête seront publiés dans le rapport global *act-info* (rapport annuel 2017) qui sera publié au printemps 2019.

T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2017)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge					
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								%	%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Sexe*																					
hommes	70.2			77.1			80.2			81.5			24.1			65.3			4 133		
femmes	29.8			22.9			19.8			18.5			75.9			34.7			2 201		
sexe pas connu	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0		
N**	2 023	857	2 880	199	59	258	272	67	339	989	224	1 213	229	723	952	4 133	2 201	6 334	6 334		
Age (en années)*																					
jusqu'à 14	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	4.0	3.6	2.2	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	95		
15-19	2.3	1.2	1.9	3.5	1.7	3.1	3.7	11.9	5.3	58.3	63.4	59.3	4.4	3.6	3.8	17.7	10.8	15.3	965		
20-24	3.8	2.1	3.3	6.0	6.8	6.2	15.4	14.9	15.3	14.0	12.1	13.6	7.1	4.3	5.0	8.0	5.7	7.2	455		
25-29	8.0	6.3	7.5	11.6	15.3	12.4	21.0	19.4	20.6	8.2	8.5	8.2	4.0	6.8	6.2	9.4	7.9	8.9	562		
30-34	11.7	8.1	10.6	20.1	20.3	20.2	20.2	23.9	20.9	5.9	3.6	5.4	9.3	9.5	9.4	11.3	9.1	10.5	664		
35-39	11.7	10.0	11.2	14.6	10.2	13.6	20.2	13.4	18.9	4.0	3.6	4.0	6.7	7.8	7.5	10.1	8.3	9.5	601		
40-44	11.9	11.1	11.6	17.6	13.6	16.7	9.2	6.0	8.6	3.3	2.2	3.1	8.4	12.8	11.8	9.4	10.1	9.6	608		
45-49	12.9	15.3	13.6	14.1	20.3	15.5	4.8	6.0	5.0	1.6	0.4	1.4	11.6	17.4	16.0	9.2	13.7	10.7	679		
50-54	13.5	16.6	14.4	6.5	11.9	7.8	4.4	3.0	4.1	0.7	1.3	0.8	13.8	14.1	14.0	8.7	12.5	10.0	635		
55-59	10.7	11.8	11.0	4.0	0.0	3.1	1.1	1.5	1.2	0.3	0.9	0.4	13.8	10.0	10.9	6.6	8.8	7.4	466		
60-64	6.6	7.1	6.8	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	5.3	6.2	4.0	4.8	4.3	270		
65-69	3.5	6.0	4.2	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	5.3	3.1	3.6	2.2	3.7	2.7	173		
70-74	2.1	3.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.4	1.5	1.2	1.9	1.4	89		
75 et plus	1.3	0.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.5	2.5	0.8	1.2	1.0	61		
N**	2 023	856	2 879	199	59	258	272	67	339	989	224	1 213	225	717	942	4 129	2 194	6 323	6 323		
données manquantes	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10	4	7	11	11		
Age (valeurs centrales)																					
moyenne	45.1	48.0	46.0	38.2	38.1	38.2	33.0	31.5	32.7	22.0	21.2	21.9	46.2	45.9	46.0	37.2	42.2	38.9			
écart-type	13.5	12.9	13.4	10.3	9.5	10.1	8.7	9.5	8.9	8.5	8.2	8.4	16.0	24.9	23.1	15.6	19.6	17.2			
1er quartile	34.7	39.0	35.8	30.8	31.1	30.8	26.6	24.8	26.3	16.7	16.5	16.7	34.7	34.7	34.7	23.5	29.5	25.6			
valeur médiane	45.3	48.6	46.5	38.5	37.4	38.4	32.0	30.3	31.7	17.9	17.7	17.8	49.1	46.4	47.0	35.9	43.5	38.5			
3e quartile	54.6	56.7	55.3	45.4	47.3	45.7	38.53	37.3	38.4	24.6	23.1	24.1	57.3	53.6	54.9	49.2	53.0	50.8			
N**	2 023	856	2 879	199	59	258	272	67	339	989	224	1 213	225	717	942	4 129	2 194	6 323			
données manquantes	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10	4	7	11			

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2017)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Etat civil*																			
célibataire	45.6	36.0	42.8	73.3	66.1	71.6	73.7	73.4	73.7	92.7	93.2	92.8	28.3	27.9	28.0	61.4	44.6	55.6	3 309
marié-e	31.9	28.0	30.7	11.1	14.3	11.9	14.9	14.1	14.7	4.4	1.4	3.9	49.1	51.4	50.8	23.0	30.7	25.6	1 525
séparé-e	4.1	5.0	4.3	2.2	3.6	2.5	4.7	1.6	4.1	0.6	1.0	0.7	6.1	2.8	3.6	3.1	3.6	3.3	194
divorcé-e	16.8	25.0	19.3	12.8	16.1	13.6	5.1	9.4	6.0	1.8	3.9	2.2	13.7	15.2	14.8	11.2	17.3	13.3	793
veuf/veuve	1.3	5.3	2.5	0.6	0.0	0.4	0.4	1.6	0.6	0.4	0.5	0.4	1.4	2.1	1.9	0.9	3.3	1.7	103
partenariat enregistré	0.3	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.4	0.6	0.8	0.4	0.5	0.4	24
N**	1 892	813	2 705	180	57	237	260	63	323	943	216	1 159	209	669	878	3 884	2 085	5 969	5 948
données manquantes	131	44	175	19	2	21	12	4	16	46	8	54	20	54	74	249	116	365	386
Nationalité*																			
CH	78.3	85.9	80.6	65.6	82.5	69.6	72.7	84.1	74.9	83.7	86.6	84.2	81.3	85.4	84.4	78.1	85.9	80.8	4 824
UE	14.7	10.5	13.5	21.1	17.5	20.3	20.4	7.9	18.0	7.7	6.0	7.4	11.5	10.3	10.6	13.7	9.7	12.3	735
autre	7.0	3.7	6.0	13.3	0.0	10.1	6.9	7.9	7.1	8.6	7.4	8.4	7.2	4.3	5.0	8.2	4.5	6.9	410
N**	1 892	813	2 705	180	57	237	260	63	323	943	216	1 159	209	669	878	3 884	2 085	5 969	5 969
données manquantes	131	44	175	19	2	21	12	4	16	46	8	54	20	54	74	249	116	365	365

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2017)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N	
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Degré d'urbanisation*																				
grands centres urbains	9.5	10.1	9.7	5.3	3.4	4.8	1.1	3.1	1.5	0.8	0.9	0.8	10.2	9.8	9.9	5.9	7.4	6.4	391	
périphérie des grands centres	16.7	18.6	17.3	14.7	15.5	14.9	22.2	10.8	19.9	11.4	9.1	11.0	20.8	18.2	18.8	15.2	15.6	15.3	931	
villes de moyenne importance	12.3	14.2	12.9	7.4	3.4	6.5	15.8	15.4	15.7	27.9	27.4	27.8	18.1	15.8	16.4	17.3	17.2	17.3	1 048	
petites villes	32.0	30.4	31.5	46.3	39.7	44.8	36.1	47.7	38.4	29.6	29.7	29.6	28.2	29.5	29.2	33.0	31.1	32.3	1 964	
campagne	29.4	26.7	28.6	26.3	37.9	29.0	24.8	23.1	24.5	30.3	32.9	30.8	22.7	26.7	25.7	28.7	28.5	28.7	1 741	
N**	1 911	832	2 743	190	58	248	266	65	331	961	219	1 180	216	682	898	3 952	2 123	6 075	6 075	
données manquantes	112	25	137	9	1	10	6	2	8	28	5	33	13	41	54	181	78	259	259	
Type de ménage (30 derniers jours)*																				
seul-e en ménage	37.1	35.6	36.6	36.8	20.4	32.8	30.9	31.5	31.0	14.3	14.1	14.3	10.7	10.2	10.3	28.5	25.7	27.6	1 390	
avec famille d'origine	7.5	4.2	6.5	9.2	12.2	10.0	22.0	14.8	20.7	63.2	59.1	62.4	16.1	11.1	12.4	25.7	16.8	22.9	1 153	
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	45.3	51.4	47.2	21.1	36.7	24.9	34.3	46.3	36.6	9.2	11.6	9.7	67.0	76.8	74.2	33.8	48.2	38.4	1 931	
avec des amis ou d'autres personnes	3.6	2.7	3.4	4.6	8.2	5.5	5.1	5.6	5.2	2.8	3.0	2.8	1.8	1.6	1.6	3.4	3.1	3.3	168	
en prison	0.3	0.1	0.2	11.2	4.1	9.5	1.7	0.0	1.4	0.6	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.3	0.8	42	
institution/foyer	1.3	2.0	1.6	5.9	4.1	5.5	1.3	1.9	1.4	3.1	4.0	3.3	0.9	0.0	0.2	1.9	1.8	1.9	95	
hôpital/clinique	2.2	1.9	2.1	5.3	6.1	5.5	3.0	0.0	2.4	0.2	0.5	0.3	0.9	0.0	0.2	1.7	1.4	1.6	80	
autre	2.6	1.9	2.4	5.9	8.2	6.5	1.7	0.0	1.4	6.6	7.1	6.7	2.7	0.3	0.9	3.8	2.8	3.4	173	
N**	1 710	733	2 443	152	49	201	236	54	290	867	198	1 065	112	315	427	3 438	1 594	5 032	5 032	
données manquantes	313	124	437	47	10	57	36	13	49	122	26	148	117	408	525	695	607	1 302	1 302	
Situation de domicile (30 dernier jours)*																				
logement stable	92.6	94.2	93.1	73.6	77.6	74.6	88.4	94.3	89.5	90.6	86.8	89.9	92.1	95.8	94.8	91.0	92.9	91.6	4 722	
logement instable/SDF	3.8	2.4	3.4	9.5	8.2	9.1	5.2	5.7	5.3	4.2	8.6	5.0	5.6	3.9	4.4	4.3	3.9	4.2	214	
en prison	0.1	0.0	0.1	1.4	2.0	1.5	0.9	0.0	0.7	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.3	13	
institution/foyer/hôpital/autre	3.5	3.4	3.5	15.5	12.2	14.7	5.6	0.0	4.6	4.7	4.1	4.6	2.4	0.3	0.8	4.4	3.1	4.0	206	
N**	1 769	755	2 524	148	49	197	232	53	285	866	197	1 063	126	355	481	3 500	1 655	5 155	5 155	
données manquantes	254	102	356	51	10	61	40	14	54	123	27	150	103	368	471	633	546	1 179	1 179	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2017)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	37.8	39.1	38.2	67.2	57.1	65.3	39.3	41.4	39.7	71.8	59.6	69.2	23.4	21.4	21.8	48.4	39.9	45.4	1 498
relations temporaires	2.0	3.3	2.4	3.4	7.1	4.2	4.1	10.3	5.3	3.6	4.4	3.8	2.6	1.1	1.5	2.4	3.1	2.6	87
partenaire fixe, vivant séparé	11.6	14.2	12.4	3.4	14.3	5.6	18.0	24.1	19.2	15.4	24.3	17.3	10.4	8.4	8.8	12.3	14.7	13.1	433
partenaire fixe, ménage commun	48.6	43.4	47.0	25.9	21.4	25.0	38.5	24.1	35.8	9.2	11.8	9.7	63.6	69.1	67.8	36.9	42.3	38.8	1 278
N**	1 158	514	1 672	58	14	72	122	29	151	500	136	636	77	262	339	2 154	1 142	3 296	3 296
données manquantes	865	343	1 208	141	45	186	150	38	188	489	88	577	152	461	613	1 979	1 059	3 038	3 038
Nombre d'enfants propres*																			
aucun	40.4	33.6	38.3	37.5	21.1	33.3	53.3	65.4	55.9	87.1	85.9	86.8	34.2	31.8	32.4	53.8	44.3	50.4	1 620
1 enfant	21.1	21.8	21.3	33.9	52.6	38.7	25.0	19.2	23.7	7.1	5.2	6.7	14.0	16.4	15.8	17.2	17.2	17.2	553
2 enfants	26.9	31.7	28.4	19.6	21.1	20.0	14.1	7.7	12.7	4.6	5.9	4.9	29.8	33.3	32.4	20.0	26.3	22.3	718
3 enfants ou plus	11.6	12.8	12.0	8.9	5.3	8.0	7.6	7.7	7.6	1.3	3.0	1.6	21.9	18.5	19.3	9.0	12.1	10.1	326
N**	1 095	476	1 571	56	19	75	92	26	118	479	135	614	114	336	450	2 039	1 178	3 217	3 217
données manquantes	928	381	1 309	143	40	183	180	41	221	510	89	599	115	387	502	2 094	1 023	3 117	3 117
Nombre d'enfants dans le ménage*																			
aucun	73.6	65.4	71.1	93.3	55.6	87.0	79.8	87.0	81.1	81.8	77.5	80.9	50.0	50.3	50.3	75.3	64.0	71.2	2 156
1 enfant	12.1	17.0	13.6	2.2	22.2	5.6	9.6	4.3	8.7	5.5	7.0	5.8	22.3	20.0	20.6	10.2	15.6	12.1	367
2 enfants	10.7	13.3	11.5	2.2	11.1	3.7	7.7	8.7	7.9	8.2	10.9	8.7	18.1	22.0	21.1	10.4	15.1	12.1	366
3 enfants ou plus	3.6	4.3	3.8	2.2	11.1	3.7	2.9	0.0	2.4	4.6	4.7	4.6	9.6	7.7	8.1	4.1	5.3	4.5	137
N**	1 029	442	1 471	45	9	54	104	23	127	477	129	606	94	300	394	1 943	1 083	3 026	3 026
données manquantes	994	415	1 409	154	50	204	168	44	212	512	95	607	135	423	558	2 190	1 118	3 308	3 308

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2017)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Plus haute formation achevée*																			
aucune formation achevée	4.2	3.0	3.8	6.1	4.8	5.8	1.9	4.3	2.3	14.4	17.4	15.0	5.8	2.6	3.5	7.5	5.9	7.0	341
école obligatoire	12.2	10.8	11.8	28.2	26.2	27.7	15.4	23.4	16.9	56.9	59.0	57.3	15.5	6.2	8.7	26.5	18.1	23.8	1 157
formation de transition	3.0	3.6	3.2	2.3	7.1	3.5	2.8	0.0	2.3	2.8	4.1	3.0	0.6	3.3	2.6	2.7	3.5	3.0	144
formation générale sans maturité	0.8	1.1	0.9	0.8	0.0	0.6	1.4	0.0	1.1	0.2	0.0	0.2	0.6	1.0	0.9	0.7	0.8	0.7	35
formation prof. de base et apprentissage	56.9	55.5	56.5	54.2	47.6	52.6	60.7	59.6	60.5	21.3	12.8	19.8	38.7	51.4	48.0	45.2	46.5	45.6	2 212
maturité ou école normale	4.8	4.7	4.8	0.8	11.9	3.5	4.2	10.6	5.4	2.3	3.1	2.4	3.2	10.0	8.2	3.8	7.3	4.9	239
formation prof. supérieure	9.4	10.1	9.6	5.3	2.4	4.6	7.9	2.1	6.9	1.0	1.0	1.0	12.9	12.1	12.3	6.9	8.3	7.3	355
haute école spécialisée et université	8.4	10.5	9.0	2.3	0.0	1.7	5.6	0.0	4.6	1.0	2.6	1.3	22.6	13.3	15.8	6.5	9.3	7.4	360
doctorat ou habilitation	0.3	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	10
N**	1 577	641	2 218	131	42	173	214	47	261	867	195	1 062	155	420	575	3 299	1 554	4 853	4 853
<i>données manquantes</i>	446	216	662	68	17	85	58	20	78	122	29	151	74	303	377	834	647	1 481	1 481
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	17.8	25.8	20.0	34.6	48.1	37.4	17.2	31.3	19.4	19.7	23.2	20.2	10.7	21.6	17.7	19.1	26.4	21.0	588
apprenti-e, stagiaire	2.2	1.1	1.9	1.0	7.4	2.3	6.3	3.1	5.8	29.6	20.7	28.2	7.1	5.9	6.3	9.4	4.2	8.1	226
manœuvre, aide	4.4	3.0	4.0	2.9	7.4	3.8	2.3	3.1	2.4	1.1	2.4	1.3	3.6	0.0	1.3	3.2	3.0	3.2	89
ouvrier/ère formé-e sur le tas	6.1	3.2	5.3	13.5	0.0	10.7	5.2	0.0	4.4	1.8	3.7	2.1	0.0	0.0	0.0	5.1	2.8	4.5	126
ouvrier/ère formé-e (CFC)	14.3	7.5	12.4	13.5	11.1	13.0	25.3	18.8	24.3	11.3	7.3	10.7	0.0	2.0	1.3	14.6	7.3	12.8	358
contremaître-sse	2.1	0.0	1.5	1.0	0.0	0.8	1.7	0.0	1.5	0.7	1.2	0.8	0.0	0.0	0.0	1.7	0.1	1.3	37
employé-e non qualifié-e	23.5	29.7	25.2	17.3	22.2	18.3	20.7	25.0	21.4	8.8	7.3	8.6	25.0	49.0	40.5	19.1	27.7	21.3	596
empl. qualifié-e, cadre moyen	12.6	11.9	12.4	4.8	0.0	3.8	9.8	12.5	10.2	2.7	3.7	2.9	10.7	11.8	11.4	9.5	10.0	9.6	269
employé-e, cadre supérieur	5.3	3.9	4.9	1.9	0.0	1.5	3.4	0.0	2.9	0.9	0.0	0.8	17.9	2.0	7.6	3.8	2.7	3.5	99
indépendant-e	10.0	10.3	10.1	7.7	3.7	6.9	5.2	3.1	4.9	2.5	0.0	2.1	21.4	3.9	10.1	7.6	7.5	7.6	213
écolier/ère, étudiant-e	0.8	1.1	0.9	1.9	0.0	1.5	2.3	3.1	2.4	19.9	28.0	21.2	3.6	2.0	2.5	5.9	6.0	6.0	167
autre statut	1.1	2.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.9	2.4	1.1	0.0	2.0	1.3	1.0	2.3	1.3	36
N**	1 138	438	1 576	104	27	131	174	32	206	442	82	524	28	51	79	2 093	711	2 804	2 804
<i>données manquantes</i>	885	419	1 304	95	32	127	98	35	133	547	142	689	201	672	873	2 040	1 490	3 530	3 530

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2017)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Source de revenu principale (au cours des 30 derniers jours)*																			
salaire	53.8	46.3	51.6	24.5	16.0	22.5	52.6	40.7	50.2	27.1	23.6	26.4	63.7	68.2	67.0	44.9	45.3	45.0	2 370
économies, épargne	2.1	1.4	1.9	0.6	4.0	1.4	5.2	0.0	4.1	0.9	0.5	0.8	0.0	0.9	0.7	1.9	1.3	1.7	88
rente (AVS, AI ou autre)	15.0	21.1	16.8	18.9	20.0	19.1	5.6	11.9	6.9	3.6	4.4	3.8	10.5	8.9	9.3	11.1	16.1	12.7	668
aide sociale	16.1	12.2	15.0	39.6	40.0	39.7	12.9	20.3	14.4	11.0	12.8	11.3	8.1	1.8	3.5	14.9	10.4	13.4	707
assurance-chômage	5.8	4.2	5.3	6.3	4.0	5.7	9.5	6.8	8.9	3.5	1.5	3.1	2.4	0.3	0.9	5.4	2.7	4.5	239
soutien du/de la partenaire	1.9	9.4	4.1	1.3	4.0	1.9	0.9	6.8	2.1	1.2	1.5	1.3	0.8	10.4	7.8	1.6	8.1	3.7	193
soutien parents/proches/amis	2.3	2.5	2.3	3.1	10.0	4.8	9.1	11.9	9.6	51.2	53.7	51.6	12.9	8.3	9.5	17.4	13.8	16.3	858
deal, petit trafic	0.1	0.0	0.0	1.3	0.0	1.0	1.3	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2	0.8	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	11
autres revenus illégaux	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
prostitution	0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	9
assurance d'indemnités journalières	1.6	1.2	1.5	1.9	2.0	1.9	0.9	0.0	0.7	0.4	0.0	0.4	0.0	0.3	0.2	1.2	0.7	1.0	55
autre	1.2	1.3	1.2	1.9	0.0	1.4	1.3	1.7	1.4	0.8	2.0	1.0	0.8	0.9	0.9	1.1	1.4	1.2	61
N**	1 804	764	2 568	159	50	209	232	59	291	909	203	1 112	124	337	461	3 601	1 661	5 262	5 262
données manquantes	219	93	312	40	9	49	40	8	48	80	21	101	105	386	491	532	540	1 072	1 072
Taux d'activité principal (au cours des 30 derniers jours)*																			
activité à plein temps (dès 70%)	49.3	31.3	44.0	20.0	13.7	18.5	48.2	31.0	44.9	16.0	9.8	14.9	57.3	40.0	44.8	38.3	28.2	35.2	1 791
activité à temps partiel	5.8	19.8	10.0	1.9	9.8	3.8	4.5	12.1	5.9	2.2	4.9	2.7	4.5	31.9	24.3	4.5	18.5	8.8	446
jobs occasionnels	1.5	1.4	1.5	1.3	2.0	1.4	1.2	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	1.2	1.2	1.2	59
en formation	3.2	1.9	2.9	2.5	3.9	2.8	7.8	6.9	7.6	60.0	61.5	60.3	12.7	10.5	11.1	20.9	16.2	19.5	989
sans travail, en quête d'emploi	13.2	10.7	12.4	23.8	17.6	22.3	22.9	12.1	20.8	8.2	6.3	7.9	7.3	1.1	2.8	12.5	7.9	11.1	563
sans travail, sans recherche d'emploi	7.3	5.3	6.7	27.5	21.6	26.1	7.3	19.0	9.6	4.6	3.4	4.4	6.4	1.8	3.0	7.3	5.3	6.7	339
rentier/rentière	7.1	12.3	8.6	1.3	0.0	0.9	0.4	1.7	0.7	0.2	1.5	0.4	4.5	7.0	6.3	4.0	8.2	5.3	271
incapacité de travail	6.6	7.4	6.8	10.6	2.0	8.5	4.1	6.9	4.6	1.6	3.4	2.0	0.9	1.8	1.5	5.0	5.4	5.1	260
femme/homme au foyer	0.2	3.6	1.2	0.0	5.9	1.4	0.0	5.2	1.0	0.2	0.0	0.2	0.9	1.8	1.5	0.2	2.6	0.9	48
autre	5.8	6.2	5.9	11.3	23.5	14.2	3.7	5.2	4.0	5.9	8.3	6.4	4.5	3.2	3.5	6.1	6.4	6.2	317
N**	1 730	721	2 451	160	51	211	245	58	303	912	205	1 117	110	285	395	3 531	1 552	5 083	5 083
données manquantes	293	136	429	39	8	47	27	9	36	77	19	96	119	438	557	602	649	1 251	1 251

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2017)

	Patient-e-s: problème principale												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Revenu mensuel net (6 derniers mois)*																			
aucun revenu	52.0	54.0	52.6	73.3	75.0	73.5	55.6	33.3	52.4	59.0	59.1	59.0	91.7	86.3	87.6	57.5	65.1	59.6	752
moins de 1000 fr.	3.7	3.4	3.6	6.7	12.5	7.4	3.7	0.0	3.2	22.4	15.9	21.1	0.0	0.0	0.0	8.0	4.5	7.1	89
de 1001 à 2000 fr.	4.1	5.1	4.4	0.0	0.0	0.0	5.6	11.1	6.3	3.3	11.4	4.8	4.2	0.0	1.0	3.9	4.5	4.0	51
de 2001 à 3000 fr.	4.5	7.4	5.3	10.0	0.0	8.8	3.7	22.2	6.3	2.2	0.0	1.8	0.0	2.7	2.1	4.0	5.1	4.3	54
de 3001 à 4000 fr.	8.2	13.6	9.6	5.0	0.0	4.4	11.1	22.2	12.7	4.9	6.8	5.3	4.2	5.5	5.2	6.7	9.4	7.5	94
de 4001 à 5000 fr.	8.8	8.5	8.7	3.3	12.5	4.4	14.8	0.0	12.7	7.1	6.8	7.0	0.0	1.4	1.0	7.9	6.3	7.5	94
de 5001 à 6000 fr.	7.6	4.0	6.6	0.0	0.0	0.0	1.9	11.1	3.2	0.5	0.0	0.4	0.0	2.7	2.1	4.7	2.8	4.2	53
de 6001 à 8000 fr.	7.1	2.8	6.0	1.7	0.0	1.5	3.7	0.0	3.2	0.5	0.0	0.4	0.0	1.4	1.0	4.8	1.7	4.0	50
de 8001 à 10 000 fr.	2.4	0.6	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.3	1.1	14
de 10 001 à 15 000 fr.	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	6
plus de 15 000 fr.	0.4	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	4
N**	490	176	666	60	8	68	54	9	63	183	44	227	24	73	97	909	352	1 261	1 261
données manquantes	1 533	681	2 214	139	51	190	218	58	276	806	180	986	205	650	855	3 224	1 849	5 073	5 073
Dettes*																			
aucune dette	77.5	88.7	81.0	37.1	50.0	40.4	47.4	53.3	48.4	83.4	88.9	84.5	84.4	93.5	91.3	74.5	88.8	79.3	1 399
jusqu'à 5000 fr.	3.7	1.7	3.0	2.9	0.0	2.1	6.4	13.3	7.5	5.1	8.9	5.8	0.0	0.7	0.5	4.3	2.7	3.8	67
de 5001 à 10 000 fr.	3.1	1.7	2.6	14.3	33.3	19.1	7.7	0.0	6.5	4.2	0.0	3.4	4.4	1.4	2.2	4.3	1.9	3.5	62
de 10 001 à 25 000 fr.	5.6	0.8	4.1	14.3	0.0	10.6	10.3	0.0	8.6	2.5	1.1	2.2	2.2	2.2	2.2	5.6	1.2	4.1	73
de 25 001 à 50 000 fr.	1.9	3.8	2.5	5.7	8.3	6.4	12.8	0.0	10.8	1.7	0.0	1.3	2.2	1.4	1.6	3.3	2.2	2.9	52
de 50 001 à 100 000 fr.	3.3	1.7	2.8	0.0	8.3	2.1	6.4	6.7	6.5	1.4	0.0	1.1	0.0	0.7	0.5	2.9	1.4	2.4	42
plus de 100 000 fr.	1.3	0.0	0.9	5.7	0.0	4.3	1.3	0.0	1.1	0.3	0.0	0.2	6.7	0.0	1.6	1.8	0.0	1.2	21
montant inconnu	3.7	1.7	3.0	20.0	0.0	14.9	7.7	26.7	10.8	1.4	1.1	1.3	0.0	0.0	0.0	3.2	1.9	2.7	48
N**	519	239	758	35	12	47	78	15	93	356	90	446	45	138	183	1 173	591	1 764	1 764
données manquantes	1 504	618	2 122	164	47	211	194	52	246	633	134	767	184	585	769	2 960	1 610	4 570	4 570

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Emprisonnement ou détention préventive*																
aucun-e	91.0	97.7	93.0	47.4	100.0	52.4	71.8	80.0	72.7	88.9	93.8	89.9	87.6	96.9	90.3	810
emprisonnement	2.3	1.4	2.0	15.8	0.0	14.3	7.7	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	3.0	1.2	2.5	22
détention préventive	3.1	0.5	2.3	10.5	0.0	9.5	10.3	20.0	11.4	9.5	6.3	8.9	4.2	1.6	3.5	31
emprisonnement et détention préventive	3.7	0.5	2.7	26.3	0.0	23.8	10.3	0.0	9.1	1.6	0.0	1.3	5.2	0.4	3.8	34
N**	487	215	702	19	2	21	39	5	44	63	16	79	639	258	897	897
<i>données manquantes</i>	1 536	642	2 178	180	57	237	233	62	295	926	208	1 134	3 265	1 220	4 485	4 485
Durée totale de détention***																
jusqu'à 1 mois	26.3	100.0	30.0	33.3	-	33.3	14.3	-	14.3	50.0	-	50.0	25.0	100.0	27.0	10
> 1 à 2 mois	10.5	0.0	10.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	50.0	-	50.0	11.1	0.0	10.8	4
> 2 à 6 mois	15.8	0.0	15.0	66.7	-	66.7	57.1	-	57.1	0.0	-	0.0	30.6	0.0	29.7	11
> 6 à 12 mois	10.5	0.0	10.0	0.0	-	0.0	14.3	-	14.3	0.0	-	0.0	11.1	0.0	10.8	4
plus de 1 an	36.8	0.0	35.0	0.0	-	0.0	14.3	-	14.3	0.0	-	0.0	22.2	0.0	21.6	8
N**	19	1	20	3	0	3	7	0	7	2	0	2	36	1	37	37
<i>données manquantes</i>	25	4	29	7	0	7	4	1	5	5	1	6	43	7	50	50

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de détention. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T9 Instance d'envoi principale, selon le problème principal et chez les proches (2017)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Instance d'envoi principale*																			
condamnation/mesure/justice/police	16.3	6.2	13.3	17.6	7.0	15.0	11.5	15.0	12.1	52.7	40.7	50.5	2.8	1.5	1.8	23.5	8.0	18.2	1 067
cabinet médical	8.8	12.3	9.8	9.7	5.3	8.6	7.1	6.7	7.0	2.0	3.7	2.3	1.9	2.6	2.4	6.3	7.6	6.7	395
institution spécialisée dans les addictions	5.4	7.5	6.0	6.3	8.8	6.9	4.0	8.3	4.8	1.0	1.9	1.1	1.4	3.2	2.8	3.8	4.9	4.2	245
autre service médical/social/de santé	18.4	18.7	18.5	12.5	33.3	17.6	11.1	13.3	11.5	7.8	9.8	8.2	7.6	3.7	4.6	13.7	12.6	13.3	782
institution formatrice/éducative	0.5	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.8	6.7	1.9	4.0	5.6	4.3	0.5	1.2	1.0	1.9	1.9	1.9	112
employeur/employeuse	3.9	2.5	3.5	1.1	1.8	1.3	1.6	1.7	1.6	2.4	2.3	2.4	1.9	0.6	0.9	3.0	1.7	2.5	149
initiative personnelle/famille/amis	45.1	50.9	46.8	51.1	42.1	48.9	62.5	46.7	59.4	28.1	31.8	28.8	81.5	85.6	84.6	46.1	61.4	51.4	3 020
autre	1.5	1.3	1.4	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	1.9	4.2	2.3	2.4	1.5	1.7	1.8	1.9	1.8	108
N**	1 876	790	2 666	176	57	233	253	60	313	939	214	1 153	211	654	865	3 846	2 032	5 878	5 878
données manquantes	147	67	214	23	2	25	19	7	26	50	10	60	18	69	87	287	169	456	456

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T10 Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire et type de mesure, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)

	Patient-e-s: problème principal												Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire*																
non, pas de mesure	88.7	95.6	90.6	93.5	92.3	93.2	92.8	81.8	91.0	75.5	87.8	77.6	87.1	94.3	88.9	2 516
suspension/ renonciation/ réprimande (art 19a ch2 LStup)	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	1.4	0.3	0.3	0.3	9
oui, consécutive à une mesure	11.2	4.4	9.3	6.5	7.7	6.8	7.2	18.2	9.0	23.0	11.0	21.0	12.5	5.4	10.8	305
N**	1 237	478	1 715	107	26	133	166	33	199	417	82	499	2 130	700	2 830	2 830
données manquantes	786	379	1 165	92	33	125	106	34	140	572	142	714	1 774	778	2 552	2 552
Type de mesure judiciaire***																
mes. protect. méd. (art 19a ch3 LStup)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
mes. thérapeutiques institutionnelles (art 59 CP)	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.9	1.2	0.0	1.1	2
traitement résidentiel (art 60 CP)	1.9	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	5.7	3.0	0.0	2.6	5
prise en charge ambulatoire	29.8	23.1	29.1	33.3	0.0	33.3	50.0	50.0	50.0	53.2	66.7	54.7	39.9	38.1	39.7	75
placement dans institution pour jeunes adultes	1.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1
en attente d'un jugement	3.8	7.7	4.3	33.3	0.0	33.3	25.0	0.0	16.7	17.0	0.0	15.1	10.1	4.8	9.5	18
autre	63.5	69.2	64.1	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0	33.3	25.5	33.3	26.4	47.0	57.1	48.1	91
N**	104	13	117	3	0	3	4	2	6	47	6	53	168	21	189	189
données manquantes	36	8	44	4	2	6	8	4	12	55	4	59	106	19	125	125

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s dont le traitement est consécutif à une mesure judiciaire. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); Pourcentages par colonne

T11 Traitements/prises en charge avant l'admission et type de prises en charge antérieures, selon le problème principal et chez les proches (2017)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Prises en charge antérieures*																			
non	49.1	42.8	47.2	16.4	15.8	16.3	49.5	51.9	50.0	79.2	73.9	78.2	70.1	71.4	71.1	57.3	52.9	55.9	2 607
oui	50.9	57.2	52.8	83.6	84.2	83.7	50.5	48.1	50.0	20.8	26.1	21.8	29.9	28.6	28.9	42.7	47.1	44.1	2 055
N**	1 667	717	2 384	128	38	166	214	54	268	793	188	981	67	227	294	3 207	1 455	4 662	4 662
données manquantes	356	140	496	71	21	92	58	13	71	196	36	232	162	496	658	926	746	1 672	1 672
Type de prise en charge***																			
traitement avec prescription d'héroïne	0.5	0.3	0.5	4.8	7.7	5.3	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	0.6	9
substitution (méthadone, subutex)	4.8	2.4	4.0	54.8	69.2	57.3	9.1	21.4	11.6	0.9	6.1	2.1	0.0	3.1	2.4	8.3	4.9	7.1	100
autre traitement médicamenteux	6.1	5.2	5.8	11.3	15.4	12.0	5.5	0.0	4.3	2.7	0.0	2.1	5.0	1.6	2.4	5.9	3.9	5.2	73
prise en charge ambulatoire	74.1	71.7	73.3	62.9	61.5	62.7	72.7	78.6	73.9	90.0	75.8	86.7	80.0	89.1	86.9	75.8	76.7	76.1	1 076
structure/clinique de jour	1.2	3.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.2	1.3	18
traitement résidentiel	45.7	52.4	47.9	48.4	46.2	48.0	32.7	50.0	36.2	16.4	27.3	18.9	35.0	23.4	26.2	39.4	42.2	40.4	571
sevrage	39.7	44.1	41.1	43.5	46.2	44.0	38.2	14.3	33.3	12.7	12.1	12.6	25.0	10.9	14.3	34.6	31.4	33.5	474
groupe d'entraide ou d'auto-support	3.7	6.6	4.7	1.6	0.0	1.3	1.8	0.0	1.4	3.6	3.0	3.5	10.0	0.0	2.4	3.9	4.7	4.2	59
autre(s)	1.9	0.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.5	2.4	1.8	26
N**	587	286	873	62	13	75	55	14	69	110	33	143	20	64	84	921	493	1 414	1 414
données manquantes	271	126	397	45	19	64	53	12	65	56	17	73	0	1	1	460	204	664	664

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de prise en charge antérieure. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T12 Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission*																
non	98.1	99.1	98.4	48.3	44.4	47.4	95.7	91.3	94.8	100.0	99.2	99.8	97.7	98.1	97.8	2 444
oui	1.9	0.9	1.6	51.7	55.6	52.6	4.3	8.7	5.2	0.0	0.8	0.2	2.3	1.9	2.2	54
N**	963	442	1 405	29	9	38	93	23	116	484	125	609	1 743	755	2 498	2 498
données manquantes	1 060	415	1 475	170	50	220	179	44	223	505	99	604	2 161	723	2 884	2 884
Type de substitution/prescription***																
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
méthadone	68.8	75.0	70.0	80.0	60.0	75.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	73.7	75.0	74.0	37
autres opiacés	25.0	0.0	20.0	20.0	40.0	25.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	23.7	16.7	22.0	11
autres substances	6.3	25.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	2.6	8.3	4.0	2
N**	16	4	20	15	5	20	4	2	6	0	1	1	38	12	50	50
données manquantes	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4
Traitement de substitution dans la vie?*																
non	96.4	95.9	96.2	38.5	32.4	37.0	91.7	77.8	89.2	99.4	96.8	98.9	93.5	92.8	93.3	2 866
oui	3.6	4.1	3.8	61.5	67.6	63.0	8.3	22.2	10.8	0.6	3.2	1.1	6.5	7.2	6.7	205
N**	1 244	532	1 776	117	37	154	168	36	204	463	94	557	2 226	845	3 071	3 071
données manquantes	779	325	1 104	82	22	104	104	31	135	526	130	656	1 678	633	2 311	2 311
Age lors du premier traitement de substitution****																
Moyenne	29.3	27.1	28.6	29.4	24.7	28.4	26.2	25.0	26.1	-	-	-	28.6	26.1	28.0	
Ecart-type	6.9	8.0	7.2	7.3	6.3	7.3	3.8	-	3.6	-	-	-	6.7	6.7	6.8	
25 centile	25.0	22.0	25.0	24.0	20.0	23.0	24.0	25.0	24.0	-	-	-	24.0	22.0	24.0	
Médiane	28.0	27.0	27.5	29.0	25.0	27.0	27.0	25.0	26.0	-	-	-	27.0	25.0	27.0	
75 centile	28.0	34.0	29.0	35.0	26.0	35.0	28.0	25.0	28.0	-	-	-	32.0	28.0	32.0	
N**	13	7	20	34	9	43	9	1	10	0	0	0	59	18	77	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant signalé un traitement de substitution ou de prescription d'héroïne à l'admission. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant eu une expérience de substitution au cours de leur vie

T13 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2017)

Tous patients et patientes									
Problème principal*	Hommes	Femmes	Total			Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	N		%	%	%	N
alcool	51.8	58.0	53.5	2 880	alcool	51.8	58.0	53.5	2 880
héroïne	4.5	2.7	4.0	214					
méthadone	0.4	0.5	0.4	23					
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	1	opioïdes	5.1	4.0	4.8	258
fentanyl	0.0	0.0	0.0	1					
autres opioïdes	0.2	0.8	0.4	19					
cocaïne en poudre	6.5	4.3	5.9	319					
crack	0.3	0.2	0.3	16	cocaïne ou dérivés	7.0	4.5	6.3	339
autre forme de cocaïne	0.1	0.0	0.1	4					
amphétamines	0.5	0.6	0.5	29					
méthamphétamines	0.1	0.1	0.1	5					
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.2	0.5	0.3	16	stimulants	0.9	1.2	1.0	52
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0					
autres stimulants	0.0	0.1	0.0	2					
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0					
benzodiazépines	0.8	1.5	1.0	52	hypnotiques/sédatifs	0.8	1.8	1.1	59
GHB/GBL	0.0	0.1	0.0	1					
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.2	0.1	6					
LSD	0.1	0.1	0.1	3					
kétamine	0.0	0.0	0.0	0	hallucinogènes	0.1	0.1	0.1	4
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	1					
cannabis	25.3	15.2	22.5	1 213	cannabis	25.3	15.2	22.5	1 213
tabac	2.3	4.8	3.0	161	tabac	2.3	4.8	3.0	161
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0					
autre substance	0.2	0.2	0.2	11	autres substances	0.2	0.2	0.2	11
jeu pathologique	2.8	0.7	2.2	119					
dépendances aux ordinateurs/Internet	2.1	0.7	1.7	92	comportement de type addictif	6.5	10.3	7.5	405
troubles alimentaires	0.3	6.8	2.1	113					
autre comportement de type addictif	1.3	2.2	1.5	81					
N**	3 904	1 478	5 382	5 382		3 904	1 478	5 382	5 382
données manquantes	0	0	0	0		0	0	0	0

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T14 Usage de substances multiples et combinaisons de substances (2017)

Tous patients et patientes			
	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%
Trouble lié à l'usage de substances multiples selon la CIM 10*			
oui	10.0	9.4	9.8
non	90.0	90.6	90.2
N**	1 481	499	1 980
<i>données manquantes</i>	2 423	979	3 402
Combinaisons de substances les plus fréquentes***			
tab/alc	11.8	17.1	13.0
coc/alc	11.0	2.9	9.3
can/alc	10.2	5.7	9.3
can/coc/alc	8.7	5.7	8.0
can/coc	4.7	5.7	4.9
tab/can/alc	3.1	5.7	3.7
tab/can/alc/op	4.7	0.0	3.7
tab/can/alc/coc	3.9	2.9	3.7
med/alc	2.4	5.7	3.1
can/stim/coc/alc	3.9	0.0	3.1
coc/op	2.4	2.9	2.5
can/coc/op	3.1	0.0	2.5
tab/coc/alc	2.4	2.9	2.5
can/op/alc	2.4	0.0	1.9
tab/op/alc	1.6	2.9	1.9
tab/can/coc	1.6	2.9	1.9
alc/op	0.0	5.7	1.2
med/op	0.8	2.9	1.2
med/coc/op	0.8	2.9	1.2
can/stim/coc	1.6	0.0	1.2
tab/can	0.8	2.9	1.2
autres combinaisons	18.2	23.5	19.4
N**	127	34	161
<i>données manquantes</i>	21	13	34

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant un trouble lié à l'usage de substances multiples. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2017), hommes

	Patient-e-s: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	41.5	49.2	13.7	6.9	68.4	0.0	31.9	85.1	100.0
4 à 6 jours par semaine	13.2	7.9	16.8	17.2	0.0	0.0	7.9	1.4	0.0
2 à 3 jours par semaine	13.2	12.7	22.8	20.7	5.3	0.0	16.4	2.7	0.0
1 jour par semaine ou moins	7.7	7.9	26.4	27.6	0.0	0.0	19.1	5.4	0.0
aucune consommation	24.5	22.2	20.3	27.6	26.3	100.0	24.7	5.4	0.0
N**	1 640	126	197	29	19	2	839	74	2
<i>données manquantes</i>	383	73	75	5	14	1	150	16	6

T15.1b Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2017), femmes

Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	41.0	50.0	6.4	28.6	68.2	0.0	40.8	93.4	-
4 à 6 jours par semaine	13.6	2.4	12.8	0.0	4.5	0.0	7.1	0.0	-
2 à 3 jours par semaine	14.0	11.9	25.5	7.1	9.1	0.0	12.2	3.3	-
1 jour par semaine ou moins	9.0	14.3	34.0	35.7	9.1	100.0	15.8	3.3	-
aucune consommation	22.3	21.4	21.3	28.6	9.1	0.0	24.0	0.0	-
N**	698	42	47	14	22	1	196	61	0
<i>données manquantes</i>	159	17	20	4	4	0	28	10	3

T15.1c Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2017), hommes et femmes

Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	41.3	49.4	12.3	14.0	68.3	0.0	33.6	88.9	100.0
4 à 6 jours par semaine	13.3	6.5	16.0	11.6	2.4	0.0	7.7	0.7	0.0
2 à 3 jours par semaine	13.5	12.5	23.4	16.3	7.3	0.0	15.7	3.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	8.1	9.5	27.9	30.2	4.9	33.3	18.5	4.4	0.0
aucune consommation	23.8	22.0	20.5	27.9	17.1	66.7	24.5	3.0	0.0
N**	2 338	168	244	43	41	3	1 035	135	2
<i>données manquantes</i>	542	90	95	9	18	1	178	26	9

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.2a Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2017), hommes

	Patient-e-s: problème principal			
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	27.0	75.0	90.9	63.4
4 à 6 jours par semaine	12.2	8.3	0.0	12.2
2 à 3 jours par semaine	10.8	8.3	9.1	9.8
1 jour par semaine ou moins	23.0	2.8	0.0	9.8
aucune manifestation	27.0	5.6	0.0	4.9
N**	74	36	11	41
<i>données manquantes</i>	35	46	2	8

T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2017), femmes

Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	0.0	50.0	46.9	34.8
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	14.8	8.7
2 à 3 jours par semaine	40.0	50.0	25.9	21.7
1 jour par semaine ou moins	60.0	0.0	7.4	17.4
aucune manifestation	0.0	0.0	4.9	17.4
N**	5	2	81	23
<i>données manquantes</i>	5	8	19	9

T15.2c Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2017), hommes et femmes

Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	25.3	73.7	52.2	53.1
4 à 6 jours par semaine	11.4	7.9	13.0	10.9
2 à 3 jours par semaine	12.7	10.5	23.9	14.1
1 jour par semaine ou moins	25.3	2.6	6.5	12.5
aucune manifestation	25.3	5.3	4.3	9.4
N**	79	38	92	64
<i>données manquantes</i>	40	54	21	17

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T16.1a Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2017), hommes

Patients: principale substance posant problème									
Hommes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation									
moyenne	16.3	21.9	21.7	19.7	24.6	19.0	15.2	16.3	19.7
écart-type	4.0	7.5	6.1	5.0	7.2	-	2.1	4.5	7.4
1er quartile	15.0	18.0	18.0	16.0	18.5	19.0	14.0	14.0	14.0
valeur médiane	16.0	20.0	20.0	18.5	22.5	19.0	15.0	15.0	17.0
3e quartile	17.0	24.0	25.0	23.5	31.5	19.0	16.0	17.0	28.0
N*	1 031	87	176	24	12	1	660	46	3
données manquantes	992	112	96	10	21	2	329	44	5
Age lors du début de la consommation régulière									
moyenne	22.9	24.4	22.8	20.6	26.5	19.0	16.2	19.9	16.0
écart-type	8.8	8.3	6.2	5.0	10.8	-	2.3	7.5	1.4
1er quartile	18.0	19.0	20.0	17.0	18.0	19.0	15.0	16.0	15.0
valeur médiane	20.0	22.0	21.0	19.5	26.0	19.0	16.0	18.0	16.0
3e quartile	25.0	29.0	25.0	24.0	30.0	19.0	17.0	20.0	17.0
N*	747	43	92	14	6	1	395	41	2
données manquantes	1 276	156	180	20	27	2	594	49	6
Age lors du début de la consommation problématique									
moyenne	31.7	24.7	25.9	21.9	30.5	19.5	17.4	24.1	20.0
écart-type	12.5	8.1	7.8	7.4	9.1	0.7	4.5	9.9	4.9
1er quartile	21.0	20.0	20.0	17.0	23.5	19.0	15.0	16.0	18.0
valeur médiane	30.0	23.0	24.0	20.0	31.0	19.5	16.0	20.0	18.0
3e quartile	40.0	29.0	30.0	25.0	34.5	20.0	18.0	29.0	21.0
N*	1 099	90	176	22	12	2	645	58	5
données manquantes	924	109	96	12	21	1	344	32	3
Période de latence (en années)**									
moyenne	25.5	15.3	8.2	8.7	14.8	-	4.7	19.8	1.5
écart-type	13.7	9.2	6.7	8.5	7.7	-	6.6	15.6	0.9
1er quartile	14.6	6.9	2.3	1.5	6.0	-	1.2	5.0	0.9
valeur médiane	24.1	16.3	7.0	6.0	18.2	-	2.1	17.8	1.5
3e quartile	36.1	20.2	11.7	16.3	20.3	-	4.7	30.5	2.2
N*	459	10	73	8	3	0	464	28	2
données manquantes	359	10	33	3	5	2	163	27	3

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1b Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2017), femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Femmes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances	
Age lors de la première consommation										
moyenne	17.6	22.8	20.0	17.1	30.9	-	15.1	17.1	-	
écart-type	6.3	7.8	5.6	2.5	11.4	-	2.7	4.4	-	
1er quartile	15.0	18.0	16.0	16.0	23.0	-	14.0	15.0	-	
valeur médiane	16.0	20.0	18.0	16.5	28.0	-	15.0	16.0	-	
3e quartile	18.0	26.0	21.0	18.0	38.0	-	16.0	18.0	-	
N*	402	30	30	12	13	0	157	38	0	
données manquantes	455	29	37	6	13	1	67	33	3	
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	27.7	23.6	20.8	22.2	34.1	-	16.0	19.5	-	
écart-type	11.1	6.8	4.4	11.7	9.4	-	2.6	6.8	-	
1er quartile	20.0	18.0	17.0	18.0	29.0	-	15.0	16.0	-	
valeur médiane	25.0	22.0	20.0	18.0	32.0	-	16.0	18.0	-	
3e quartile	35.0	27.0	24.0	20.0	40.0	-	16.0	20.0	-	
N*	326	10	13	10	7	0	109	34	0	
données manquantes	531	49	54	8	19	1	115	37	3	
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	36.2	24.6	23.8	20.6	33.0	-	16.9	21.2	-	
écart-type	13.2	7.8	6.8	10.2	11.1	-	4.3	8.0	-	
1er quartile	25.0	18.5	18.0	16.0	23.0	-	15.0	16.0	-	
valeur médiane	36.0	22.5	23.0	18.0	32.0	-	16.0	18.0	-	
3e quartile	45.0	28.5	30.0	20.0	44.0	-	17.0	24.0	-	
N*	480	28	27	14	15	0	156	42	0	
données manquantes	377	31	40	4	11	1	68	29	3	
Période de latence (en années)**										
moyenne	27.6	8.3	5.2	9.2	-	-	4.0	25.3	-	
écart-type	13.5	9.0	4.7	7.7	-	-	6.0	15.4	-	
1er quartile	17.8	3.2	2.1	4.1	-	-	1.3	13.0	-	
valeur médiane	27.2	4.6	3.8	4.9	-	-	2.0	26.0	-	
3e quartile	37.0	8.1	5.7	15.6	-	-	3.5	36.6	-	
N*	162	6	14	9	0	0	110	17	0	
données manquantes	144	0	14	3	4	0	29	18	0	

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1c Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2017), hommes et femmes

Patient-e-s: principale substance posant problème										
Hommes & femmes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances	
Age lors de la première consommation										
moyenne	16.7	22.1	21.5	18.8	27.9	19.0	15.2	16.7	19.7	
écart-type	4.8	7.6	6.0	4.5	10.0	-	2.3	4.5	7.4	
1er quartile	15.0	18.0	18.0	16.0	19.0	19.0	14.0	14.0	14.0	
valeur médiane	16.0	20.0	20.0	17.0	25.0	19.0	15.0	16.0	17.0	
3e quartile	18.0	24.0	24.0	21.5	34.0	19.0	16.0	18.0	28.0	
N*	1 433	117	206	36	25	1	817	84	3	
données manquantes	1 447	141	133	16	34	3	396	77	8	
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	24.4	24.2	22.6	21.3	30.6	19.0	16.2	19.7	16.0	
écart-type	9.8	8.0	6.0	8.3	10.4	-	2.4	7.2	1.4	
1er quartile	18.0	18.0	19.0	17.5	25.0	19.0	15.0	16.0	15.0	
valeur médiane	20.0	22.0	21.0	18.5	30.0	19.0	16.0	18.0	16.0	
3e quartile	29.0	29.0	25.0	23.5	39.0	19.0	17.0	20.0	17.0	
N*	1 073	53	105	24	13	1	504	75	2	
données manquantes	1 807	205	234	28	46	3	709	86	9	
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	33.1	24.7	25.6	21.4	31.9	19.5	17.3	22.9	20.0	
écart-type	12.9	8.0	7.7	8.5	10.1	0.7	4.5	9.3	4.9	
1er quartile	22.0	19.0	20.0	17.0	23.0	19.0	15.0	16.0	18.0	
valeur médiane	30.0	23.0	24.0	19.0	32.0	19.5	16.0	19.0	18.0	
3e quartile	42.0	29.0	30.0	24.0	38.0	20.0	17.0	27.0	21.0	
N*	1 579	118	203	36	27	2	801	100	5	
données manquantes	1 301	140	136	16	32	2	412	61	6	
Période de latence (en années)**										
moyenne	26.0	12.7	7.8	8.9	14.8	-	4.6	21.9	1.5	
écart-type	13.7	9.4	6.5	7.8	7.7	-	6.5	15.6	0.9	
1er quartile	15.0	3.6	2.3	1.8	6.0	-	1.2	11.7	0.9	
valeur médiane	24.9	10.6	6.2	4.9	18.2	-	2.1	21.5	1.5	
3e quartile	36.1	19.8	11.7	15.6	20.3	-	4.2	32.4	2.2	
N*	621	16	87	17	3	0	574	45	2	
données manquantes	503	10	47	6	9	2	192	45	3	

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2a Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2017), hommes

Patients: problème principal				
Hommes	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Age lors de la première apparition				
moyenne	24.2	15.4	17.3	19.2
écart-type	10.0	6.8	10.5	14.4
1er quartile	16.0	13.0	10.0	12.5
valeur médiane	21.0	15.0	14.0	14.0
3e quartile	28.5	16.0	26.0	20.0
N*	48	27	7	20
<i>données manquantes</i>	61	55	6	29
Age lors du début de l'apparition régulière				
moyenne	28.7	14.8	18.9	23.4
écart-type	9.8	3.1	9.0	16.1
1er quartile	20.0	13.0	14.5	13.0
valeur médiane	26.5	14.0	16.5	16.0
3e quartile	37.0	16.0	21.5	30.0
N*	20	22	8	19
<i>données manquantes</i>	89	60	5	30
Age lors du début de l'apparition problématique				
moyenne	28.2	18.9	25.5	23.3
écart-type	10.4	9.7	11.5	13.2
1er quartile	20.0	14.0	15.0	15.0
valeur médiane	25.0	16.0	23.0	19.0
3e quartile	35.0	20.0	39.0	30.0
N*	55	33	10	27
<i>données manquantes</i>	54	49	3	22
Période de latence (en années)**				
moyenne	10.7	6.2	5.0	11.7
écart-type	8.4	7.9	1.2	12.2
1er quartile	5.0	1.7	3.6	2.8
valeur médiane	8.1	2.8	5.6	8.4
3e quartile	14.1	8.0	5.7	16.8
N*	29	22	3	15
<i>données manquantes</i>	20	27	3	17

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2b Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2017), femmes

Patientes: problème principal					
Femmes	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif	
Age lors de la première apparition					
moyenne	32.0	12.8	17.8	25.4	
écart-type	14.0	1.1	8.6	17.7	
1er quartile	18.0	12.0	14.0	13.0	
valeur médiane	32.0	12.0	16.0	16.0	
3e quartile	46.0	14.0	18.5	38.0	
N*	3	5	64	9	
données manquantes	7	5	36	23	
Age lors du début de l'apparition régulière					
moyenne	30.0	17.6	17.9	17.2	
écart-type	-	8.7	7.5	6.3	
1er quartile	30.0	14.0	14.0	14.0	
valeur médiane	30.0	14.0	16.0	15.0	
3e quartile	30.0	15.0	19.0	17.0	
N*	1	5	54	5	
données manquantes	9	5	46	27	
Age lors du début de l'apparition problématique					
moyenne	44.0	13.6	19.5	25.1	
écart-type	7.8	1.1	8.4	14.3	
1er quartile	40.0	13.0	15.0	15.0	
valeur médiane	45.0	14.0	18.0	18.0	
3e quartile	46.0	14.0	20.0	30.0	
N*	5	5	71	14	
données manquantes	5	5	29	18	
Période de latence (en années)**					
moyenne	13.4	1.7	7.6	2.7	
écart-type	19.0	1.3	8.8	2.5	
1er quartile	0.0	0.6	1.9	0.9	
valeur médiane	13.4	1.6	4.0	1.7	
3e quartile	26.9	2.9	11.0	3.5	
N*	2	4	31	5	
données manquantes	2	2	18	11	

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2c Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2017), hommes et femmes

Patient-e-s: problème principal					
<i>Hommes et femmes</i>	Jeux pathologiques	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif	
Âge lors de la première apparition					
moyenne	24.6	15.0	17.7	21.1	
écart-type	10.2	6.3	8.7	15.5	
1er quartile	16.0	12.5	13.0	13.0	
valeur médiane	21.0	14.0	15.0	14.0	
3e quartile	30.0	15.5	19.0	25.0	
N*	51	32	71	29	
<i>données manquantes</i>	68	60	42	52	
Âge lors du début de l'apparition régulière					
moyenne	28.7	15.3	18.0	22.1	
écart-type	9.5	4.5	7.7	14.7	
1er quartile	20.0	13.0	14.0	13.5	
valeur médiane	28.0	14.0	16.0	15.5	
3e quartile	37.0	16.0	19.0	28.0	
N*	21	27	62	24	
<i>données manquantes</i>	98	65	51	57	
Âge lors du début de l'apparition problématique					
moyenne	29.6	18.2	20.3	23.9	
écart-type	11.1	9.2	9.0	13.4	
1er quartile	20.5	14.0	15.0	15.0	
valeur médiane	25.5	16.0	18.0	19.0	
3e quartile	37.5	18.0	21.0	30.0	
N*	60	38	81	41	
<i>données manquantes</i>	59	54	32	40	
Période de latence (en années)**					
moyenne	10.9	5.5	7.3	9.4	
écart-type	8.9	7.4	8.4	11.3	
1er quartile	4.9	1.4	2.0	1.7	
valeur médiane	8.1	2.7	4.2	3.7	
3e quartile	15.0	6.6	8.8	11.6	
N*	31	26	34	20	
<i>données manquantes</i>	22	29	21	28	

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T17 Mode d'administration prédominant de la principale substance posant problème avant l'admission (2017)

Patient-e-s: principale substance posant problème															
Mode d'administration*	Héroïne			Cocaïne			Amphétamines			Cannabis			Benzodiazépines		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
injection	26.8	20.0	25.4	3.2	4.9	3.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	4.8	2.3
fumée/inhalation	43.3	40.0	42.6	9.7	19.5	11.5	8.3	20.0	11.8	98.5	98.9	98.6	0.0	0.0	0.0
ingestion (manger/boire)	5.2	0.0	4.1	2.7	2.4	2.7	16.7	0.0	11.8	0.8	1.1	0.8	100.0	95.2	97.7
sniff	24.7	40.0	27.9	83.8	73.2	81.9	75.0	60.0	70.6	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
autre	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	20.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	97	25	122	185	41	226	12	5	17	796	174	970	23	21	44
<i>données manquantes</i>	77	15	92	70	23	93	8	4	12	193	50	243	7	1	8

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T18.1 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 12 derniers mois avant l'admission des injections et échange de matériel d'injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Injections au cours de la vie*																
oui	3.3	3.5	3.3	36.8	52.4	41.0	7.2	13.9	8.4	1.1	1.1	1.1	4.0	4.9	4.3	168
non	95.8	95.9	95.9	60.5	42.9	55.8	92.2	86.1	91.1	98.1	98.4	98.2	95.0	94.4	94.9	3 732
ne veut pas répondre	0.9	0.6	0.8	2.6	4.8	3.2	0.6	0.0	0.5	0.8	0.5	0.7	0.9	0.7	0.9	34
N**	1 445	630	2 075	114	42	156	167	36	203	790	184	974	2 822	1 112	3 934	3 934
données manquantes	578	227	805	85	17	102	105	31	136	199	40	239	1 082	366	1 448	1 448
Injections au cours des 12 derniers mois*																
oui	1.0	0.0	0.7	17.7	16.7	17.6	17.5	25.0	18.2	0.0	0.0	0.0	3.4	1.6	3.0	24
non	99.0	100.0	99.3	82.3	83.3	82.4	82.5	75.0	81.8	100.0	100.0	100.0	96.6	98.4	97.0	782
N**	302	101	403	62	12	74	40	4	44	133	30	163	621	185	806	806
données manquantes	1 721	756	2 477	137	47	184	232	63	295	856	194	1 050	3 283	1 293	4 576	4 576
Injections au cours des 30 derniers jours*																
oui	0.7	0.0	0.5	14.8	7.1	13.3	10.0	16.7	10.9	0.0	0.0	0.0	2.4	1.1	2.1	17
non	99.3	100.0	99.5	85.2	92.9	86.7	90.0	83.3	89.1	100.0	100.0	100.0	97.6	98.9	97.9	787
N**	303	100	403	61	14	75	40	6	46	133	29	162	619	185	804	804
données manquantes	1 720	757	2 477	138	45	183	232	61	293	856	195	1 051	3 285	1 293	4 578	4 578
Echange de matériel d'injection au cours de la vie***																
oui	25.0	25.0	25.0	33.3	33.3	33.3	100.0	0.0	33.3	33.3	0.0	25.0	31.8	27.3	30.3	10
non	75.0	50.0	66.7	66.7	66.7	66.7	0.0	100.0	66.7	66.7	100.0	75.0	68.2	63.6	66.7	22
ne veut pas répondre	0.0	25.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	9.1	3.0	1
N**	8	4	12	9	3	12	1	2	3	3	1	4	22	11	33	33
données manquantes	39	18	57	33	19	52	11	3	14	6	1	7	92	43	135	135
Echange de matériel d'injection au cours des 12 derniers mois****																
oui	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	5.7	0.0	3.6	2
non	100.0	100.0	100.0	66.7	100.0	83.3	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	94.3	100.0	96.4	53
N**	20	11	31	6	6	12	5	2	7	4	0	4	35	20	55	55
données manquantes	27	11	38	36	16	52	7	3	10	5	2	7	79	34	113	113
Echange de matériel d'injection au cours des 30 derniers jours*****																
oui	-	-	-	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	100.0	1
non	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0
N**	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
données manquantes	47	22	69	41	22	63	12	5	17	9	2	11	113	54	167	167

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 12 derniers mois. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

***** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 30 derniers jours. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T18.2 Âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Age lors de la première injection*																
jusqu'à 14 ans	5.6	7.7	6.5	7.1	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	5.1	4.8	5.0	3
de 15 à 16 ans	0.0	0.0	0.0	7.1	16.7	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	2.6	4.8	3.3	2
de 17 à 18 ans	16.7	30.8	22.6	28.6	16.7	25.0	0.0	50.0	20.0	33.3	-	33.3	20.5	28.6	23.3	14
de 19 à 20 ans	22.2	30.8	25.8	28.6	16.7	25.0	0.0	0.0	0.0	33.3	-	33.3	23.1	23.8	23.3	14
de 21 à 25 ans	33.3	15.4	25.8	28.6	33.3	30.0	66.7	0.0	40.0	33.3	-	33.3	35.9	19.0	30.0	18
de 26 à 30 ans	16.7	0.0	9.7	0.0	16.7	5.0	33.3	0.0	20.0	0.0	-	0.0	10.3	4.8	8.3	5
de 31 à 39 ans	5.6	15.4	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	20.0	0.0	-	0.0	2.6	14.3	6.7	4
dès 40 ans	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	18	13	31	14	6	20	3	2	5	3	0	3	39	21	60	60
<i>données manquantes</i>	29	9	38	28	16	44	9	3	12	6	2	8	75	33	108	108

* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2017), hommes

Hommes

	Patients: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	19.2	11.3	13.3	21.7	0.0	12.7	12.9	0.0
héroïne	0.6	1.9	3.2	0.0	8.7	0.0	0.9	0.0	0.0
méthadone	0.1	1.9	3.2	6.7	4.3	0.0	0.5	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	3.0	23.1	4.8	6.7	21.7	0.0	1.9	1.4	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.5	3.8	4.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0
méthamphétamines	0.1	0.0	1.6	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1.0	1.9	4.8	6.7	8.7	0.0	3.8	1.4	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.1	1.9	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	1.3	23.1	1.6	6.7	4.3	0.0	0.9	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.1	1.9	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.5	3.8	0.0	13.3	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
kétamine	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	4.1	23.1	11.3	26.7	13.0	0.0	-	10.0	0.0
tabac	10.4	26.9	9.7	20.0	26.1	0.0	9.9	-	0.0
autre substance	0.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.7	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
troubles alimentaires	1.3	1.9	0.0	6.7	4.3	0.0	1.9	0.0	0.0
autre comportement de type addictif	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	85.3	55.8	74.2	66.7	52.2	100.0	79.2	74.3	100.0
N**	1 831	177	253	32	27	3	917	87	8
<i>données manquantes</i>	<i>192</i>	<i>22</i>	<i>19</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>72</i>	<i>3</i>	<i>0</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2017), femmes

Femmes

Patientes: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	20.0	11.3	13.3	21.7	0.0	12.8	12.9	0.0
héroïne	0.7	2.0	3.2	0.0	8.7	0.0	0.9	0.0	0.0
méthadone	0.1	2.0	3.2	6.7	4.3	0.0	0.5	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	3.0	22.0	4.8	6.7	21.7	0.0	1.9	1.4	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.5	4.0	4.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0
méthamphétamines	0.1	0.0	1.6	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1.0	2.0	4.8	6.7	8.7	0.0	3.8	1.4	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.1	2.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	1.3	24.0	1.6	6.7	4.3	0.0	0.9	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.1	2.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.5	4.0	0.0	13.3	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
kétamine	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	4.2	24.0	11.3	26.7	13.0	0.0	-	10.0	0.0
tabac	10.3	28.0	9.7	20.0	26.1	0.0	10.0	-	0.0
autre substance	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.7	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
troubles alimentaires	1.3	2.0	0.0	6.7	4.3	0.0	1.4	0.0	0.0
autre comportement de type addictif	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	85.4	56.0	74.2	66.7	52.2	100.0	79.6	74.3	100.0
N**	776	52	62	15	23	1	212	70	3
<i>données manquantes</i>	<i>81</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>1</i>	<i>0</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2017), hommes et femmes

Hommes et femmes

	Patient-e-s: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	19.7	24.8	17.0	28.0	0.0	10.2	21.7	0.0
héroïne	1.3	1.3	4.1	0.0	6.0	0.0	0.8	2.5	0.0
méthadone	0.2	10.0	1.6	2.1	2.0	0.0	0.1	1.3	0.0
buprénorphine	0.0	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.2	2.2	0.0	0.0	2.0	0.0	0.3	0.0	0.0
cocaïne en poudre	4.4	34.1	1.3	12.8	20.0	25.0	6.0	1.3	9.1
crack	0.3	2.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.2	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	1.0	3.9	5.7	2.1	2.0	25.0	2.3	0.0	18.2
méthamphétamines	0.2	1.3	3.5	2.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.8	3.9	7.3	8.5	4.0	25.0	3.5	1.3	9.1
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.1	0.4	0.0	0.0	2.0	0.0	0.1	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	1.1	21.8	1.6	4.3	4.0	0.0	0.7	0.6	0.0
GHB/GBL	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.4	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.6	3.1	2.5	10.6	2.0	0.0	2.2	0.6	9.1
kétamine	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.1	0.9	1.0	4.3	2.0	0.0	1.2	0.6	0.0
substances volatiles	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
cannabis	6.8	28.4	18.7	19.1	12.0	25.0	-	15.9	27.3
tabac	10.8	26.6	14.3	14.9	28.0	25.0	10.1	-	0.0
autre substance	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	0.0
jeu pathologique	0.1	0.4	2.2	0.0	0.0	0.0	0.3	2.5	9.1
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.1	0.4	0.6	0.0	2.0	0.0	1.1	1.3	0.0
troubles alimentaires	0.5	0.4	0.0	2.1	2.0	0.0	0.5	0.0	0.0
autre comportement de type addictif	0.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	82.9	44.5	58.4	68.1	42.0	75.0	81.7	63.1	63.6
N**	2 607	229	315	47	50	4	1 129	157	11
<i>données manquantes</i>	273	29	24	5	9	0	84	4	0

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2017), hommes

Hommes

Patients: problème principal				
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	3.9	0.0	0.0	4.7
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	1.9	0.0	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1.0	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	1.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	1.9	2.8	0.0	4.7
tabac	10.7	2.8	0.0	2.3
autre substance	1.0	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	-	0.0	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	8.7	-	0.0	2.3
troubles alimentaires	0.0	1.4	-	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	35.2	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	79.6	59.2	100.0	93.0
N**	103	71	11	43
données manquantes	6	11	2	6

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2017), femmes

Femmes

Patientes: problème principal				
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	0.0	10.0	2.4	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	0.0	0.0	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	0.0	0.0	1.2	0.0
tabac	0.0	10.0	2.4	0.0
autre substance	0.0	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	-	0.0	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	12.5	-	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0	0.0	-	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	80.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	87.5	10.0	95.3	100.0
N**	8	10	85	26
<i>données manquantes</i>	2	0	15	6

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2017), hommes et femmes
Hommes et femmes

	Patient-e-s: problème principal			
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	3.6	1.2	2.1	2.9
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	1.8	0.0	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.9	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.9	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	1.8	2.5	1.0	2.9
tabac	9.9	3.7	2.1	1.4
autre substance	0.9	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	-	0.0	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	9.0	-	0.0	1.4
troubles alimentaires	0.0	1.2	-	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	40.7	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	80.2	53.1	95.8	95.7
N**	111	81	96	69
<i>données manquantes</i>	<i>8</i>	<i>11</i>	<i>17</i>	<i>12</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T20a Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)

	Patient-e-s: problème principal												Tous problèmes principaux						
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Alcool*	Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	40.7	83.3	48.5	25.0	40.0	26.2	10.7	20.0	13.0	62.5	20.0	46.2	0.0	33.3	11.1	22.8	34.5	25.3	66
4 à 6 jours par semaine	14.8	0.0	12.1	16.7	0.0	15.4	10.7	8.0	10.0	0.0	20.0	7.7	16.7	33.3	22.2	12.6	7.3	11.5	30
2 à 3 jours par semaine	11.1	16.7	12.1	38.3	0.0	35.4	20.0	20.0	20.0	12.5	0.0	7.7	33.3	33.3	33.3	22.8	12.7	20.7	54
1 jour par semaine ou moins	11.1	0.0	9.1	11.7	60.0	15.4	36.0	32.0	35.0	12.5	20.0	15.4	50.0	0.0	33.3	23.3	30.9	24.9	65
aucune consomm.	22.2	0.0	18.2	8.3	0.0	7.7	22.7	20.0	22.0	12.5	40.0	23.1	0.0	0.0	0.0	18.4	14.5	17.6	46
N**	27	6	33	60	5	65	75	25	100	8	5	13	6	3	9	206	55	261	261
données manquantes	172	53	225	212	62	274	914	199	1 113	25	21	46	247	149	396	3 927	2 146	6 073	6 073
Opioides*	Alcool			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	16.7	0.0	14.8	44.4	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	33.3	-	-	-	23.3	16.7	22.4	11
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	10.0	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	-	-	-	7.0	0.0	6.1	3
1 jour par semaine ou moins	16.7	33.3	18.5	11.1	0.0	10.0	16.7	0.0	16.7	100.0	0.0	33.3	-	-	-	16.3	16.7	16.3	8
aucune consomm.	66.7	66.7	66.7	33.3	100.0	40.0	66.7	0.0	66.7	0.0	50.0	33.3	-	-	-	53.5	66.7	55.1	27
N**	24	3	27	9	1	10	6	0	6	1	2	3	0	0	0	43	6	49	49
données manquantes	1 999	854	2 853	263	66	329	983	224	1 207	32	24	56	253	152	405	4 090	2 195	6 285	6 285
Cocaïne et dérivés*	Alcool			Opioides			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	1.3	6.3	2.2	13.6	22.2	15.1	3.8	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	4.8	8.6	5.4	12
4 à 6 jours par semaine	6.5	6.3	6.5	6.8	0.0	5.7	5.8	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	50.0	-	50.0	7.0	5.7	6.8	15
2 à 3 jours par semaine	10.4	6.3	9.7	29.5	11.1	26.4	9.6	0.0	8.9	20.0	0.0	11.1	0.0	-	0.0	14.4	5.7	13.1	29
1 jour par semaine ou moins	35.1	12.5	31.2	22.7	44.4	26.4	19.2	25.0	19.6	20.0	50.0	33.3	0.0	-	0.0	27.8	25.7	27.5	61
aucune consomm.	46.8	68.8	50.5	27.3	22.2	26.4	61.5	75.0	62.5	60.0	50.0	55.6	50.0	-	50.0	46.0	54.3	47.3	105
N**	77	16	93	44	9	53	52	4	56	5	4	9	2	0	2	187	35	222	222
données manquantes	1 946	841	2 787	155	50	205	937	220	1 157	28	22	50	251	152	403	3 946	2 166	6 112	6 112
Cannabis*	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	37.6	36.0	37.3	38.2	50.0	40.9	40.9	40.0	40.8	50.0	33.3	40.0	50.0	0.0	42.9	38.7	38.9	38.8	112
4 à 6 jours par semaine	6.4	4.0	6.0	8.8	0.0	6.8	6.8	0.0	6.1	0.0	33.3	20.0	0.0	0.0	0.0	6.0	3.7	5.5	16
2 à 3 jours par semaine	12.0	4.0	10.7	17.6	10.0	15.9	20.5	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	16.7	100.0	28.6	14.9	9.3	13.8	40
1 jour par semaine ou moins	8.0	20.0	10.0	17.6	20.0	18.2	13.6	20.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	18.5	12.8	37
aucune consomm.	36.0	36.0	36.0	17.6	20.0	18.2	18.2	40.0	20.4	50.0	33.3	40.0	33.3	0.0	28.6	28.9	29.6	29.1	84
N**	125	25	150	34	10	44	44	5	49	2	3	5	6	1	7	235	54	289	289
données manquantes	1 898	832	2 730	165	49	214	228	62	290	31	23	54	247	151	398	3 898	2 147	6 045	6 045

* En tant que problème secondaire; pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T20b Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)

	Patient-e-s: problème principal															Tous problèmes principaux			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			comportement de type addictif			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Autres stimulants*																			
chaque jour	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	1.9	0.0	1.5	1
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	1.9	0.0	1.5	1
2 à 3 jours par semaine	12.5	33.3	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	13.6	-	-	-	9.3	8.3	9.1	6
1 jour par semaine ou moins	6.3	0.0	5.3	40.0	0.0	28.6	28.6	0.0	26.7	12.5	33.3	18.2	-	-	-	16.7	16.7	16.7	11
aucune consomm.	81.3	66.7	78.9	20.0	100.0	42.9	71.4	100.0	73.3	68.8	66.7	68.2	-	-	-	70.4	75.0	71.2	47
N**	16	3	19	5	2	7	14	1	15	16	6	22	0	0	0	54	12	66	66
données manquantes	2 007	854	2 861	194	57	251	258	66	324	973	218	1 191	253	152	405	4 079	2 189	6 268	6 268
Hypnotiques/sédatifs*																			
chaque jour	-	-	-	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	-	-	0.0	-	-	-	100.0	-	100.0	2
4 à 6 jours par semaine	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
1 jour par semaine ou moins	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
aucune consomm.	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
N**	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
données manquantes	2 023	857	2 880	198	59	257	271	67	338	989	224	1 213	253	152	405	4 131	2 201	6 332	6 332
Hallucinogènes*																			
chaque jour	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	14.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	2.4	0.0	1.8	1
2 à 3 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
1 jour par semaine ou moins	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	-	42.9	26.7	0.0	20.0	-	-	-	19.0	0.0	14.5	8
aucune consomm.	100.0	100.0	100.0	80.0	100.0	85.7	57.1	-	57.1	73.3	100.0	80.0	-	-	-	78.6	100.0	83.6	46
N**	10	4	14	5	2	7	7	0	7	15	5	20	0	0	0	42	13	55	55
données manquantes	2 013	853	2 866	194	57	251	265	67	332	974	219	1 193	253	152	405	4 091	2 188	6 279	6 279
Autres substances*																			
chaque jour	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
4 à 6 jours par semaine	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
1 jour par semaine ou moins	0.0	-	0.0	50.0	-	50.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	20.0	-	20.0	1
aucune consomm.	100.0	-	100.0	50.0	-	50.0	-	-	-	100.0	0.0	100.0	-	-	-	80.0	-	80.0	4
N**	1	0	1	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	5	0	5	5
données manquantes	2 022	857	2 879	197	59	256	272	67	339	987	224	1 211	253	152	405	4 128	2 201	6 329	6 329

* En tant que problème secondaire; pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T21 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation d'alcool*																
jamais	10.4	9.4	10.1	24.4	10.0	21.6	3.4	10.0	4.7	15.6	18.3	16.2	13.5	15.6	14.1	378
1 fois par mois ou moins	3.0	3.9	3.2	12.2	20.0	13.7	8.0	15.0	9.3	26.9	26.7	26.9	10.5	11.4	10.8	289
2 à 4 fois par mois	7.0	6.8	7.0	12.2	50.0	19.6	20.7	20.0	20.6	39.3	38.3	39.1	16.6	14.7	16.0	429
2 à 3 fois par semaine	18.9	17.0	18.4	14.6	10.0	13.7	41.4	25.0	38.3	11.9	13.3	12.2	18.3	16.0	17.6	472
4 fois ou plus par semaine	60.6	62.8	61.3	36.6	10.0	31.4	26.4	30.0	27.1	6.3	3.3	5.7	41.0	42.3	41.4	1 108
N**	1 151	487	1 638	41	10	51	87	20	107	461	120	581	1 906	770	2 676	2 676
données manquantes	872	370	1 242	158	49	207	185	47	232	528	104	632	1 998	708	2 706	2 706
Nbre de boissons standards par jour***																
1 ou 2	8.0	5.3	7.2	31.0	75.0	40.5	35.2	25.0	33.3	59.5	67.4	61.1	25.0	22.7	24.3	537
3 ou 4	18.4	19.9	18.8	34.5	25.0	32.4	33.8	37.5	34.5	29.1	25.3	28.3	22.8	21.9	22.5	497
5 ou 6	21.6	27.5	23.4	20.7	0.0	16.2	15.5	25.0	17.2	7.4	5.3	7.0	16.9	20.9	18.0	398
7 à 9	20.6	26.6	22.4	6.9	0.0	5.4	8.5	12.5	9.2	2.4	0.0	1.9	14.5	18.9	15.8	348
10 ou plus	31.4	20.6	28.1	6.9	0.0	5.4	7.0	0.0	5.7	1.6	2.1	1.7	20.9	15.7	19.4	428
N**	990	432	1 422	29	8	37	71	16	87	378	95	473	1 577	631	2 208	2 208
données manquantes	1 033	425	1 458	170	51	221	201	51	252	611	129	740	2 327	847	3 174	3 174
Fréquence de fortes consom. d'alcool***																
jamais	12.1	13.8	12.6	44.7	75.0	50.0	20.0	26.7	21.2	56.3	68.0	58.6	27.9	34.4	29.8	703
moins d'une fois par mois	11.3	8.7	10.6	21.1	25.0	21.7	25.7	33.3	27.1	30.8	22.3	29.0	17.2	11.7	15.6	368
1 fois par mois	13.2	11.0	12.6	7.9	0.0	6.5	18.6	6.7	16.5	8.0	5.8	7.6	11.9	9.1	11.1	262
1 fois par semaine	26.5	31.3	27.9	13.2	0.0	10.9	25.7	13.3	23.5	4.5	3.9	4.4	19.4	21.1	19.8	469
presque chaque jour	36.9	35.2	36.4	13.2	0.0	10.9	10.0	20.0	11.8	0.5	0.0	0.4	23.7	23.8	23.7	561
N**	1 023	435	1 458	38	8	46	70	15	85	400	103	503	1 679	684	2 363	2 363
données manquantes	1 000	422	1 422	161	51	212	202	52	254	589	121	710	2 225	794	3 019	3 019

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation d'alcool. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T22 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2017)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opiïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	38.1	47.3	41.0	10.5	18.2	12.2	22.1	27.3	23.1	27.9	29.9	28.3	34.6	42.9	37.1	879
1 jour par semaine ou moins	0.8	1.6	1.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.9	4.0	5.5	4.3	1.9	2.1	1.9	46
2 à 3 jours par semaine	1.0	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.9	5.5	3.9	5.1	2.2	1.5	2.0	48
4 à 6 jours par semaine	0.9	1.0	1.0	2.6	0.0	2.0	1.2	0.0	0.9	2.5	1.6	2.3	1.3	0.8	1.2	28
1 fois par jour	2.7	1.6	2.4	5.3	0.0	4.1	1.2	0.0	0.9	4.6	4.7	4.6	3.3	1.8	2.9	68
plusieurs fois par jour	56.4	48.1	53.8	81.6	81.8	81.6	72.1	72.7	72.2	55.6	54.3	55.3	56.7	50.8	54.9	1 302
N**	873	387	1 260	38	11	49	86	22	108	477	127	604	1 658	713	2 371	2 371
<i>données manquantes</i>	1 150	470	1 620	161	48	209	186	45	231	512	97	609	2 246	765	3 011	3 011
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10	19.3	26.3	21.1	16.1	44.4	22.5	28.1	30.8	28.6	61.7	70.6	63.5	34.0	38.9	35.4	479
11 à 20	47.4	50.8	48.3	54.8	44.4	52.5	50.9	46.2	50.0	30.8	23.5	29.3	42.0	41.9	42.0	569
21 à 30	22.6	16.8	21.0	22.6	0.0	17.5	19.3	23.1	20.0	5.0	3.5	4.7	16.5	13.5	15.7	213
31 ou plus	10.8	6.1	9.5	6.5	11.1	7.5	1.8	0.0	1.4	2.5	2.4	2.5	7.4	5.7	6.9	94
N**	483	179	662	31	9	40	57	13	70	321	85	406	985	370	1 355	1 355
<i>données manquantes</i>	57	25	82	3	0	3	10	3	13	23	4	27	100	37	137	137

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T23a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2017), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Objectif de consommation*									
abstinence définitive	30.6	68.3	78.1	66.7	55.6	100.0	56.1	42.4	66.7
abstinence limitée dans le temps	24.5	2.4	3.1	0.0	22.2	0.0	13.0	21.2	33.3
consommation contrôlée	30.8	4.9	3.1	33.3	11.1	0.0	14.6	24.2	0.0
aucune limitation envisagée	1.9	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	11.4	17.1	10.9	0.0	11.1	0.0	12.2	6.1	0.0
autre	0.8	7.3	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	6.1	0.0
N**	640	41	64	3	9	1	123	33	3
données manquantes	1 383	158	208	31	24	2	866	57	5

T23b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2017), femmes

Objectif de consommation*									
abstinence définitive	33.8	75.0	50.0	50.0	100.0	-	64.3	41.2	50.0
abstinence limitée dans le temps	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	7.1	5.9	0.0
consommation contrôlée	36.8	0.0	30.0	25.0	0.0	-	10.7	29.4	0.0
aucune limitation envisagée	1.1	0.0	10.0	0.0	0.0	-	3.6	0.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	12.0	25.0	10.0	25.0	0.0	-	14.3	23.5	50.0
autre	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
N**	266	4	10	4	4	0	28	17	2
données manquantes	591	55	57	14	22	1	196	54	1

T23c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2017), hommes et femmes

Objectif de consommation*									
abstinence définitive	31.6	68.9	74.3	57.1	69.2	100.0	57.6	42.0	60.0
abstinence limitée dans le temps	21.7	2.2	2.7	0.0	15.4	0.0	11.9	16.0	20.0
consommation contrôlée	32.6	4.4	6.8	28.6	7.7	0.0	13.9	26.0	0.0
aucune limitation envisagée	1.7	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	11.6	17.8	10.8	14.3	7.7	0.0	12.6	12.0	20.0
autres	0.9	6.7	1.4	0.0	0.0	0.0	1.3	4.0	0.0
N**	906	45	74	7	13	1	151	50	5
données manquantes	1 974	213	265	45	46	3	1 062	111	6

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2017), hommes

Hommes

Patients: problème principal									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	27.3	22.0	31.4	50.0	57.1	0.0	20.2	18.8	40.0
états anxieux/tension nerv. importants	26.1	36.6	29.4	50.0	85.7	0.0	21.1	28.1	60.0
diffic. compréhension/mémoire	9.2	22.0	15.7	0.0	0.0	0.0	13.2	12.5	40.0
altération de l'attention ou hyperactivité	9.2	24.4	15.7	0.0	0.0	0.0	19.3	12.5	40.0
pensées obsessionnelles/actions compulsives	0.6	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
réaction aiguë au stress sévère/troubles adaptation	6.1	7.3	7.8	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
hallucinations	2.7	2.4	7.8	50.0	0.0	0.0	5.3	3.1	20.0
diffic. à contrôler comportement violent	7.8	17.1	19.6	0.0	28.6	0.0	11.4	9.4	20.0
problèmes psychiques traités avec médic.	21.4	34.1	17.6	0.0	57.1	0.0	12.3	21.9	40.0
pensées suicidaires sérieuses	8.0	7.3	5.9	0.0	14.3	0.0	9.6	0.0	40.0
tentatives de suicide	2.9	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.9	0.0	20.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	1.8	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
aucun	45.7	34.1	31.4	0.0	14.3	100.0	54.4	56.3	20.0
N**	490	41	51	2	7	1	114	32	5
<i>données manquantes</i>	1 533	158	221	32	26	2	875	58	3

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24b Problèmes psychiques au cours de la vie (2017), femmes
Femmes

Patientes: problème principal									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	43.1	40.0	42.9	0.0	75.0	-	53.3	41.2	50.0
états anxieux/tension nerv. importants	33.5	20.0	71.4	0.0	100.0	-	36.7	58.8	0.0
diffic. compréhension/mémoire	11.2	20.0	0.0	0.0	25.0	-	23.3	23.5	0.0
altération de l'attention ou hyperactivité	9.6	20.0	0.0	0.0	25.0	-	16.7	23.5	0.0
pensées obsessionnelles/actions compulsives	1.6	0.0	14.3	0.0	25.0	-	6.7	0.0	0.0
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	6.7	0.0	0.0
hallucinations	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-	6.7	0.0	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	7.4	20.0	28.6	0.0	0.0	-	23.3	5.9	0.0
problèmes psychiques traités avec médic.	38.3	20.0	57.1	50.0	75.0	-	30.0	29.4	50.0
pensées suicidaires sérieuses	9.0	40.0	14.3	0.0	50.0	-	16.7	23.5	0.0
tentatives de suicide	3.7	20.0	14.3	0.0	25.0	-	10.0	5.9	0.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-	3.3	0.0	0.0
aucun	22.9	20.0	14.3	50.0	0.0	-	23.3	35.3	0.0
N**	188	5	7	4	4	0	30	17	2
<i>données manquantes</i>	<i>669</i>	<i>54</i>	<i>60</i>	<i>14</i>	<i>22</i>	<i>1</i>	<i>194</i>	<i>54</i>	<i>1</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24c Problèmes psychiques au cours de la vie (2017), hommes et femmes
Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	31.7	23.9	32.8	16.7	63.6	0.0	27.1	26.5	42.9
états anxieux/tension nerv. importants	28.2	34.8	34.5	16.7	90.9	0.0	24.3	38.8	42.9
diffic. compréhension/mémoire	9.7	21.7	13.8	0.0	9.1	0.0	15.3	16.3	28.6
altération de l'attention ou hyperactivité	9.3	23.9	13.8	0.0	9.1	0.0	18.8	16.3	28.6
pensées obsessionnelles/actions compulsives	0.9	0.0	8.6	0.0	9.1	0.0	2.1	0.0	0.0
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	6.2	6.5	6.9	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0
hallucinations	2.7	2.2	6.9	16.7	0.0	0.0	5.6	2.0	14.3
diffic. à contrôler comportement violent	7.7	17.4	20.7	0.0	18.2	0.0	13.9	8.2	14.3
problèmes psychiques traités avec médic.	26.1	32.6	22.4	33.3	63.6	0.0	16.0	24.5	42.9
pensées suicidaires sérieuses	8.3	10.9	6.9	0.0	27.3	0.0	11.1	8.2	28.6
tentatives de suicide	3.1	2.2	1.7	0.0	18.2	0.0	2.8	2.0	14.3
autre(s) problème(s) psychique(s)	2.7	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0
aucun	39.4	32.6	29.3	33.3	9.1	100.0	47.9	49.0	14.3
N**	678	46	58	6	11	1	144	49	7
<i>données manquantes</i>	2 202	212	281	46	48	3	1 069	112	4

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T25 Proches: lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2017)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	N
Lien avec la tierce personne*				
mère/père	35.8	32.1	33.0	289
filles/fils	20.4	14.2	15.6	137
sœur/frère	6.0	4.3	4.7	41
conjoint-e/partenaire	26.9	43.5	39.7	348
autre proche/parent-e	2.5	1.3	1.6	14
collègue/ami-e	3.0	2.7	2.7	24
employeur/se, enseignant-e	1.5	0.4	0.7	6
tuteur/trice, curateur/trice	0.0	0.1	0.1	1
autre	4.0	1.3	1.9	17
N**	201	676	877	877
<i>données manquantes</i>	28	47	75	75

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T26 Proches: problème principal de la tierce personne (2017)

Proches		
	Total	
	%	N
Problème principal de la tierce personne*		
alcool	58.2	262
héroïne	1.8	8
méthadone	0.2	1
buprénorphine	0.2	1
fentanyl	0.0	0
autres opioïdes	0.2	1
cocaïne en poudre	7.1	32
crack	0.4	2
autre forme de cocaïne	0.0	0
amphétamines	0.7	3
méthamphétamines	0.0	0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.2	1
cathinones synthétiques	0.0	0
autres stimulants	0.0	0
barbituriques	0.0	0
benzodiazépines	1.3	6
GHB/GBL	0.0	0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0
LSD	0.0	0
kétamine	0.0	0
autres hallucinogènes	0.0	0
substances volatiles	0.0	0
cannabis	20.0	90
tabac	1.1	5
autre substance	0.0	0
jeu pathologique	4.2	19
dépendances aux ordinateurs/Internet	2.4	11
troubles alimentaires	0.9	4
autre comportement de type addictif	0.9	4
N**	450	450
<i>données manquantes</i>	502	502

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T27 Sexe et âge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2017)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sexe*																			
hommes	69.8			76.8			81.5			81.6			22.8			64.4			4 240
femmes	30.2			23.2			18.5			18.4			77.2			35.6			2 344
sexe pas connu	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0
N**	2 165	935	3 100	265	80	345	242	55	297	876	197	1 073	224	757	981	4 240	2 344	6 584	6 584
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.0	2.0	1.8	1.7	1.7	0.7	1.1	0.9	57
15-19	1.2	1.1	1.1	1.9	1.3	1.7	2.5	9.1	3.7	53.3	54.8	53.6	5.9	2.4	3.2	13.9	8.5	12.0	782
20-24	2.7	2.7	2.7	2.6	3.8	2.9	12.8	21.8	14.5	15.4	14.2	15.2	4.5	2.5	3.0	6.9	5.2	6.3	412
25-29	6.7	5.0	6.2	9.8	12.5	10.4	19.4	20.0	19.5	11.0	10.7	10.9	2.7	5.6	4.9	8.8	7.3	8.3	542
30-34	10.6	7.4	9.7	14.7	17.5	15.4	18.6	21.8	19.2	8.1	3.0	7.2	8.6	9.9	9.6	10.8	8.9	10.1	663
35-39	12.5	9.8	11.7	10.6	15.0	11.6	22.3	7.3	19.5	4.2	6.1	4.6	6.8	9.7	9.1	10.8	9.0	10.2	666
40-44	11.1	10.9	11.1	20.0	5.0	16.5	9.9	5.5	9.1	2.9	3.6	3.0	10.4	11.7	11.4	9.5	9.7	9.6	625
45-49	12.7	14.8	13.3	19.2	18.8	19.1	8.7	9.1	8.8	1.3	1.0	1.2	11.8	18.1	16.7	10.0	14.2	11.5	753
50-54	14.2	16.3	14.9	12.5	17.5	13.6	4.1	3.6	4.0	1.3	2.0	1.4	12.7	15.0	14.5	10.1	13.3	11.2	734
55-59	11.9	13.7	12.5	7.2	5.0	6.7	0.8	1.8	1.0	0.7	1.0	0.7	16.7	10.4	11.8	8.1	9.9	8.8	573
60-64	7.3	7.6	7.4	0.4	3.8	1.2	0.4	0.0	0.3	0.1	0.5	0.2	6.8	5.2	5.6	4.5	5.3	4.8	314
65-69	4.4	5.4	4.7	1.1	0.0	0.9	0.4	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	5.4	2.9	3.5	2.9	3.6	3.1	206
70-74	3.0	3.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.3	2.1	1.7	2.4	1.9	125
75 et plus	1.7	1.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.5	3.0	1.2	1.6	1.4	90
N**	2 164	933	3 097	265	80	345	242	55	297	876	197	1 073	221	751	972	4 213	2 329	6 542	6 542
données manquantes	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	27	15	42	42
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	46.8	48.6	47.4	41.6	41.2	41.5	34.7	31.4	34.1	23.1	23.3	23.1	47.2	45.8	46.2	39.8	43.3	41.0	
écart-type	13.3	12.9	13.2	10.0	11.1	10.2	9.0	10.1	9.3	8.8	9.6	9.0	16.3	13.8	14.4	15.7	15.3	15.7	
1er quartile	36.5	39.3	37.3	33.5	32.5	33.2	28.3	23.5	27.6	17.1	17.1	17.1	36.0	36.3	36.2	27.2	31.7	28.7	
valeur médiane	47.1	49.4	47.9	42.8	40.4	42.6	34.1	29.5	33.1	18.9	18.6	18.8	49.4	46.9	47.1	39.0	45.0	41.1	
3e quartile	56.3	57.1	56.5	48.9	50.8	49.1	39.8	38.5	39.7	27.0	25.9	26.7	57.6	54.2	55.2	51.7	54.2	52.7	
N**	2 164	933	3 097	265	80	345	242	55	297	876	197	1 073	221	751	972	4 213	2 329	6 542	
données manquantes	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	27	15	42	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2017)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Etat civil*																			
célibataire	44.9	35.6	42.1	63.3	61.9	63.0	72.2	69.2	71.6	92.6	89.8	92.1	37.0	26.0	28.5	59.3	44.1	54.0	2 034
marié-e	32.7	24.9	30.4	21.4	9.5	19.3	19.4	11.5	17.9	3.7	3.1	3.6	43.0	49.1	47.7	24.6	27.5	25.6	963
séparé-e	3.1	4.7	3.6	4.1	0.0	3.4	2.8	7.7	3.7	1.2	0.8	1.2	5.0	3.8	4.1	2.7	3.7	3.1	115
divorcé-e	16.9	31.2	21.2	9.2	23.8	11.8	5.6	11.5	6.7	2.3	6.3	3.0	13.0	17.5	16.5	11.9	21.4	15.2	572
veuf/veuve	2.0	3.3	2.4	2.0	4.8	2.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	1.0	2.9	2.5	1.3	3.0	1.9	72
partenariat enregistré	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.6	0.7	0.2	0.3	0.3	10
N**	1 332	571	1 903	98	21	119	108	26	134	567	128	695	100	342	442	2 456	1 310	3 766	3 766
<i>données manquantes</i>	833	364	1 197	167	59	226	134	29	163	309	69	378	124	415	539	1 784	1 034	2 818	2 818
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	11.6	12.2	11.8	0.0	0.0	0.0	0.9	3.8	1.5	0.2	0.0	0.1	16.5	13.5	14.2	7.3	9.1	7.9	325
périphérie des grands centres	13.4	16.0	14.2	2.9	9.5	4.0	14.5	7.7	13.2	3.4	1.5	3.1	2.5	1.8	2.0	9.3	8.1	8.9	364
villes de moyenne importance	14.4	16.8	15.1	13.6	23.8	15.3	23.6	23.1	23.5	29.2	32.8	29.9	28.1	24.2	25.1	19.1	22.4	20.2	831
petites villes	32.3	28.2	31.1	62.1	19.0	54.8	43.6	38.5	42.6	35.7	35.0	35.6	28.1	31.9	31.0	35.7	32.2	34.5	1 415
campagne	28.4	26.9	27.9	21.4	47.6	25.8	17.3	26.9	19.1	31.6	30.7	31.4	24.8	28.6	27.7	28.7	28.2	28.5	1 169
N**	1 462	614	2 076	103	21	124	110	26	136	583	137	720	121	385	506	2 673	1 431	4 104	4 104
<i>données manquantes</i>	703	321	1 024	162	59	221	132	29	161	293	60	353	103	372	475	1 567	913	2 480	2 480

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2017)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de ménage*																			
seul-e en ménage	40.0	39.4	39.9	42.0	32.6	39.5	31.2	25.0	29.9	11.9	12.6	12.0	15.3	15.4	15.3	30.9	28.5	30.1	1 280
avec famille d'origine	5.7	4.9	5.5	8.4	6.5	7.9	16.8	15.6	16.6	65.0	55.2	63.3	19.4	10.5	12.6	23.2	14.8	20.4	868
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	46.9	49.1	47.6	33.6	45.7	36.7	41.6	43.8	42.0	9.9	14.7	10.7	63.3	73.5	71.2	36.1	49.2	40.5	1 721
avec des amis ou d'autres personnes	2.1	2.4	2.2	3.8	2.2	3.4	3.2	3.1	3.2	2.5	1.4	2.3	1.0	0.6	0.7	2.4	2.5	2.4	104
en prison	0.1	0.0	0.0	2.3	0.0	1.7	0.8	0.0	0.6	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	9
institution/foyer	2.3	2.0	2.2	5.3	4.3	5.1	3.2	12.5	5.1	3.8	9.1	4.7	0.0	0.0	0.0	3.0	2.4	2.8	120
hôpital/clinique	0.6	0.3	0.5	1.5	2.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.4	15
autre	2.3	1.9	2.2	3.1	6.5	4.0	3.2	0.0	2.5	6.2	7.0	6.3	1.0	0.0	0.2	3.6	2.3	3.2	134
N**	1 506	637	2 143	131	46	177	125	32	157	680	143	823	98	332	430	2 831	1 420	4 251	4 251
données manquantes	659	298	957	134	34	168	117	23	140	196	54	250	126	425	551	1 409	924	2 333	2 333
Situation de domicile*																			
logement stable	93.8	96.6	94.6	85.8	89.1	86.7	91.7	90.3	91.5	92.5	86.3	91.4	98.1	96.6	97.0	93.1	95.2	93.8	4 051
logement instable/SDF	3.2	1.8	2.8	6.7	2.2	5.6	3.8	3.2	3.7	3.5	4.8	3.8	1.9	3.4	3.0	3.4	2.6	3.1	136
en prison	0.1	0.0	0.1	1.5	2.2	1.7	0.8	0.0	0.6	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.3	11
institution/foyer/hôpital/autre	2.9	1.5	2.5	6.0	6.5	6.1	3.8	6.5	4.3	3.4	8.9	4.4	0.0	0.0	0.0	3.1	2.2	2.8	121
N**	1 547	653	2 200	134	46	180	133	31	164	679	146	825	108	356	464	2 879	1 440	4 319	4 319
données manquantes	618	282	900	131	34	165	109	24	133	197	51	248	116	401	517	1 361	904	2 265	2 265
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	38.8	41.5	39.6	50.7	47.1	50.0	42.9	44.4	43.2	72.7	57.3	69.9	29.3	25.0	26.0	48.2	40.2	45.4	1 288
relations temporaires	1.7	4.1	2.4	1.4	0.0	1.1	8.6	11.1	9.1	2.7	5.6	3.3	0.0	1.8	1.4	2.4	3.5	2.8	79
partenaire fixe, vivant séparé	8.7	12.2	9.8	5.6	11.8	6.8	10.0	5.6	9.1	11.7	21.3	13.4	6.1	8.3	7.8	9.0	11.4	9.8	279
partenaire fixe, ménage commun	50.8	42.2	48.2	42.3	41.2	42.0	38.6	38.9	38.6	12.9	15.7	13.4	64.6	64.9	64.8	40.4	44.8	41.9	1 189
N**	1 042	443	1 485	71	17	88	70	18	88	403	89	492	82	276	358	1 848	987	2 835	2 835
données manquantes	1 123	492	1 615	194	63	257	172	37	209	473	108	581	142	481	623	2 392	1 357	3 749	3 749

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T30 Source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2017)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Source de revenu principale*																			
salaire	58.8	48.5	55.8	38.1	26.3	35.9	62.7	43.5	58.5	30.7	21.4	29.0	67.6	67.0	67.2	50.8	49.5	50.3	1 721
économies, épargne	1.2	1.0	1.2	1.2	5.3	1.9	7.2	0.0	5.7	0.6	0.0	0.5	0.9	0.9	0.9	1.4	1.3	1.3	46
rente (AVS, AI ou autre)	15.9	18.9	16.8	17.9	21.1	18.4	12.0	17.4	13.2	3.6	6.8	4.2	12.0	14.0	13.6	12.3	15.7	13.5	462
aide sociale	15.3	13.6	14.8	31.0	31.6	31.1	9.6	21.7	12.3	9.8	17.1	11.1	2.8	1.4	1.8	13.4	9.7	12.1	414
assurance-chômage	4.5	2.6	3.9	2.4	5.3	2.9	4.8	0.0	3.8	1.7	1.7	1.7	0.9	0.6	0.7	3.4	1.8	2.9	98
soutien du/de la partenaire	1.2	10.1	3.8	0.0	10.5	1.9	1.2	8.7	2.8	0.6	0.0	0.5	3.7	8.0	7.0	1.2	7.6	3.5	118
soutien parents/proches/amis	1.7	3.0	2.0	2.4	0.0	1.9	1.2	8.7	2.8	52.6	51.3	52.4	12.0	7.4	8.5	16.2	12.8	15.0	513
deal, petit trafic	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
autres revenus illégaux	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
prostitution	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	2
assurance indemnités journalières	0.5	0.8	0.6	1.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	15
autre	1.0	1.2	1.1	2.4	0.0	1.9	1.2	0.0	0.9	0.0	0.9	0.2	0.0	0.3	0.2	0.7	0.8	0.8	26
N**	1 205	507	1 712	84	19	103	83	23	106	521	117	638	108	349	457	2 212	1 207	3 419	3 419
données manquantes	960	428	1 388	181	61	242	159	32	191	355	80	435	116	408	524	2 028	1 137	3 165	3 165
Taux d'activité principal*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	55.9	38.4	50.8	34.6	21.1	32.0	53.2	28.6	48.0	16.7	14.2	16.2	63.9	40.4	46.0	43.8	34.3	40.5	1 270
activité à temps partiel	6.2	21.3	10.7	5.1	5.3	5.2	10.1	14.3	11.0	3.1	1.8	2.9	8.2	30.0	24.8	5.8	20.3	10.8	338
jobs occasionnels	2.0	1.3	1.8	2.6	0.0	2.1	2.5	4.8	3.0	1.4	0.9	1.3	0.0	1.3	1.0	1.7	1.2	1.5	47.0
en formation	2.3	2.2	2.3	3.8	10.5	5.2	6.3	14.3	8.0	60.4	62.8	60.8	11.3	9.4	9.9	19.9	15.8	18.5	579
sans travail, en quête d'emploi	9.8	7.1	9.0	12.8	5.3	11.3	15.2	9.5	14.0	5.5	5.3	5.5	2.1	0.7	1.0	8.3	4.7	7.1	222
sans travail, sans recherche d'emploi	2.9	4.4	3.3	10.3	26.3	13.4	2.5	9.5	4.0	3.3	1.8	3.0	1.0	0.3	0.5	3.5	2.9	3.3	103
rentier/rentière	9.0	11.8	9.8	1.3	5.3	2.1	2.5	0.0	2.0	0.4	1.8	0.6	10.3	12.1	11.6	5.6	9.4	6.9	217
incapacité de travail	4.9	4.9	4.9	12.8	0.0	10.3	3.8	14.3	6.0	1.8	2.7	1.9	2.1	2.3	2.2	4.5	4.1	4.4	137
femme/homme au foyer	0.1	3.1	1.0	0.0	10.5	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.7	0.1	2.2	0.8	26.0
autre	6.8	5.5	6.4	16.7	15.8	16.5	3.8	4.8	4.0	7.5	8.8	7.7	0.0	1.6	1.2	6.8	5.2	6.2	195
N**	1 076	451	1 527	78	19	97	79	21	100	510	113	623	97	307	404	2 048	1 086	3 134	3 134
données manquantes	1 089	484	1 573	187	61	248	163	34	197	366	84	450	127	450	577	2 192	1 258	3 450	3 450

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2017)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	26.8	35.4	29.4	44.4	63.6	48.2	27.3	35.7	29.0	15.1	24.2	16.6	12.5	26.9	23.5	25.0	35.3	27.8	386
apprenti-e, stagiaire	1.7	1.8	1.8	11.1	9.1	10.7	9.1	0.0	7.2	36.6	27.3	35.1	0.0	3.8	2.9	9.2	4.7	7.9	110
manœuvre, aide	3.3	4.1	3.5	0.0	9.1	1.8	5.5	7.1	5.8	3.5	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	3.0	3.4	3.1	43
ouvrier/ère formé-e sur le tas	5.0	4.1	4.7	6.7	0.0	5.4	5.5	0.0	4.3	1.2	6.1	2.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.4	4.2	58
ouvrier/ère formé-e (CFC)	15.3	5.5	12.4	20.0	9.1	17.9	25.5	7.1	21.7	9.9	9.1	9.8	0.0	0.0	0.0	15.3	5.5	12.6	175
contremaître-sse	2.2	0.4	1.6	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	2.9	2.3	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.3	1.6	22
employé-e non qualifié-e	16.7	24.0	18.9	2.2	0.0	1.8	5.5	14.3	7.2	5.2	3.0	4.9	37.5	11.5	17.6	12.9	19.6	14.8	205
empl. qualifié-e, cadre moyen	12.3	15.1	13.2	11.1	9.1	10.7	12.7	21.4	14.5	2.3	6.1	2.9	25.0	26.9	26.5	10.8	15.4	12.1	168
employé-e, cadre supérieur	4.4	1.1	3.4	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	4.3	2.9	0.0	2.4	0.0	3.8	2.9	3.8	1.0	3.0	42
indépendant-e	10.5	5.2	8.9	2.2	0.0	1.8	0.0	7.1	1.4	1.7	3.0	2.0	12.5	11.5	11.8	7.6	5.0	6.8	95
écolier/ère, étudiant-e	0.6	1.1	0.8	2.2	0.0	1.8	0.0	7.1	1.4	18.0	21.2	18.5	12.5	15.4	14.7	4.8	4.5	4.7	65
autre statut	1.2	2.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.8	1.3	18
N**	641	271	912	45	11	56	55	14	69	172	33	205	8	26	34	1 005	382	1 387	1 387
données manquantes	1 524	664	2 188	220	69	289	187	41	228	704	164	868	216	731	947	3 235	1 962	5 197	5 197

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2017)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Raison principale*																			
fin régulière sans transfert	52.9	49.5	51.8	32.8	32.9	32.8	34.7	31.5	34.1	67.2	61.4	66.2	63.4	66.9	66.1	54.6	57.1	55.5	3 648
fin régulière avec transfert	6.2	10.0	7.3	14.0	13.9	14.0	5.8	14.8	7.4	3.2	3.0	3.2	3.1	3.0	3.1	5.7	7.2	6.3	412
changement de domicile	2.2	1.8	2.1	2.6	3.8	2.9	3.3	0.0	2.7	2.3	3.6	2.5	0.9	0.4	0.5	2.2	1.3	1.9	125
hospitalisation	0.7	0.4	0.6	0.4	1.3	0.6	0.0	1.9	0.3	0.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	26
détention	0.1	0.0	0.1	2.6	0.0	2.0	1.7	0.0	1.4	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	16
perte de contact	25.9	24.8	25.6	22.3	16.5	20.9	35.1	31.5	34.5	16.1	19.8	16.8	22.3	21.2	21.5	23.7	22.0	23.1	1 518
rupture explicite	9.0	10.4	9.4	14.7	20.3	16.0	17.8	18.5	17.9	9.7	9.6	9.7	6.7	4.2	4.8	10.1	8.4	9.5	623
décès	1.7	1.4	1.6	8.7	10.1	9.0	0.8	0.0	0.7	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	1.6	1.1	1.4	91
autre raison	1.3	1.7	1.4	1.9	1.3	1.7	0.8	1.9	1.0	0.9	2.0	1.1	3.6	4.1	4.0	1.3	2.4	1.7	113
N**	2 160	934	3 094	265	79	344	242	54	296	876	197	1 073	224	755	979	4 233	2 339	6 572	6 572
données manquantes	5	1	6	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	7	5	12	12

T32b Destination des transferts, selon le problème principal¹ et chez les proches (2017)

Destination des transferts***	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%							
traitement résidentiel	23.7	33.3	27.7	23.8	22.2	23.3	0.0	16.7	5.6	31.6	0.0	28.6	0.0	11.1	8.3	21.2	28.4	24.1	69
structure/clinique de jour	3.1	1.4	2.4	4.8	11.1	6.7	16.7	0.0	11.1	5.3	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.1	1.7	3.1	9
prise en charge ambulatoire	58.8	55.1	57.2	66.7	66.7	66.7	75.0	66.7	72.2	52.6	50.0	52.4	66.7	66.7	66.7	61.2	57.8	59.8	171
appartement protégé	2.1	1.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.7	1.4	4
autre institution spécialisée	12.4	8.7	10.8	4.8	0.0	3.3	8.3	0.0	5.6	10.5	50.0	14.3	33.3	22.2	25.0	12.4	10.3	11.5	33
N**	97	69	166	21	9	30	12	6	18	19	2	21	3	9	12	170	116	286	286
données manquantes	37	24	61	16	2	18	2	2	4	9	4	13	4	14	18	73	53	126	126

T32c Cause de décès, selon le problème principal¹ et chez les proches (2017)

Cause de décès****	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%							
suicide	7.7	33.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	5.6	11.1	6.7	3
accident	7.7	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	5.6	0.0	4.4	2
maladie	65.4	66.7	65.5	62.5	50.0	58.3	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	66.7	55.6	64.4	29
surdose ou intoxication aiguë	11.5	0.0	10.3	25.0	0.0	16.7	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	13.9	11.1	13.3	6
autre cause de décès	7.7	0.0	6.9	12.5	50.0	25.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	8.3	22.2	11.1	5
N**	26	3	29	8	4	12	1	0	1	1	0	1	0	0	0	36	9	45	45
données manquantes	11	10	21	15	4	19	1	0	1	1	0	1	0	1	1	30	16	46	46

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s transféré-e-s. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s décédé-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2017)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
Durée de la prise en charge* (%)																			
1 semaine ou moins	6.3	5.3	6.0	1.9	2.5	2.0	3.7	3.6	3.7	4.0	4.1	4.0	18.8	9.1	11.3	5.9	6.2	6.0	396
> 1 semaine à 1 mois	3.4	4.3	3.7	2.7	1.3	2.3	1.2	5.5	2.0	10.4	11.2	10.5	2.7	4.8	4.3	4.7	4.5	4.7	307
> 1 à 2 mois	3.7	2.6	3.4	2.7	2.5	2.6	5.0	3.6	4.7	12.7	7.1	11.6	3.6	5.9	5.4	5.8	4.0	5.2	339
>2 à 3 mois	4.3	2.9	3.9	5.7	3.8	5.2	5.4	10.9	6.4	6.5	8.1	6.8	3.6	4.8	4.5	4.9	4.5	4.8	315
>3 à 6 mois	10.4	11.0	10.6	6.5	10.0	7.3	17.8	3.6	15.2	13.8	11.2	13.3	12.1	15.2	14.5	11.6	12.4	11.9	783
>6 mois à 1 an	24.6	23.7	24.4	20.9	12.5	19.0	25.6	27.3	25.9	27.1	32.5	28.1	30.4	30.8	30.7	25.3	27.7	26.1	1 721
>1 à 2 ans	22.2	24.3	22.8	19.0	18.8	19.0	20.7	25.5	21.5	17.8	16.8	17.6	21.4	18.9	19.5	20.4	20.9	20.6	1 355
>2 à 3 ans	9.7	8.4	9.4	19.0	17.5	18.7	9.5	10.9	9.8	4.0	6.6	4.5	4.9	5.2	5.1	8.5	7.3	8.1	532
>3 à 5 ans	7.9	8.9	8.2	8.7	12.5	9.6	6.2	1.8	5.4	2.6	2.0	2.5	1.8	4.0	3.5	6.2	6.4	6.3	413
>5 à 10 ans	6.5	7.2	6.7	6.8	12.5	8.2	3.3	7.3	4.0	0.8	0.5	0.7	0.4	1.3	1.1	5.2	5.2	5.2	342
plus de 10 ans	0.9	1.4	1.0	6.1	6.3	6.1	1.7	0.0	1.3	0.3	0.0	0.3	0.4	0.1	0.2	1.3	1.0	1.2	79
N**	2 165	935	3 100	263	80	343	242	55	297	876	197	1 073	224	757	981	4 238	2 344	6 582	6 582
<i>données manquantes</i>	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
Durée (en semaines)																			
moyenne	86.1	91.5	87.8	140.4	166.0	146.4	76.6	72.3	75.8	42.3	41.0	42.0	43.7	49.0	47.8	79.1	75.8	77.9	
écart-type	111.8	115.6	113.0	209.4	203.0	207.9	114.3	93.2	110.6	63.9	47.4	61.2	60.2	65.7	64.5	119.1	106.8	114.9	
1er quartile	20.0	22.0	21.1	28.7	35.6	28.7	17.1	12.3	17.1	7.3	9.1	7.7	8.2	12.9	11.4	15.7	17.3	16.4	
valeur médiane	48.7	52.1	49.9	70.0	96.5	76.0	41.5	43.0	41.9	26.1	28.9	26.9	30.5	32.3	32.3	41.8	41.1	41.4	
3e quartile	104.0	106.9	105.0	137.1	219.7	152.6	85.3	77.3	84.9	52.4	53.1	52.9	57.4	57.4	57.4	88.3	84.1	86.7	
N**	2 165	935	3 100	263	80	343	242	55	297	876	197	1 073	224	757	981	4 238	2 344	6 582	
<i>données manquantes</i>	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2017)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution pendant la prise en charge*																
non	99.3	98.0	98.9	66.3	57.9	64.7	95.5	88.9	94.4	99.6	100.0	99.7	97.8	97.3	97.7	2 915
oui	0.7	2.0	1.1	33.7	42.1	35.3	4.5	11.1	5.6	0.4	0.0	0.3	2.2	2.7	2.3	70
N**	1 226	494	1 720	83	19	102	89	18	107	519	120	639	2 138	847	2 985	2 985
données manquantes	939	441	1 380	182	61	243	153	37	190	357	77	434	1 878	740	2 618	2 618
Type de substitution***																
héroïne	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	2.2	0.0	1.5	1
méthadone	66.7	87.5	76.5	81.5	87.5	82.9	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	80.4	90.5	83.6	56
autres opioïdes	22.2	0.0	11.8	11.1	12.5	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	13.0	4.8	10.4	7
autres substances	11.1	12.5	11.8	3.7	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	4.3	4.8	4.5	3
N**	9	8	17	27	8	35	4	2	6	2	0	2	46	21	67	67
données manquantes	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3
Substitution après la prise en charge*																
non	99.4	98.9	99.3	71.2	68.8	70.8	98.8	94.4	98.1	99.6	100.0	99.7	98.3	98.4	98.3	2 855
oui	0.6	1.1	0.7	28.8	31.3	29.2	1.2	5.6	1.9	0.4	0.0	0.3	1.7	1.6	1.7	49
N**	1 199	476	1 675	73	16	89	85	18	103	507	118	625	2 085	819	2 904	2 904
données manquantes	966	459	1 425	192	64	256	157	37	194	369	79	448	1 931	768	2 699	2 699
Type de substitution***																
prescription d'héroïne	28.6	0.0	16.7	14.3	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	13.9	7.7	12.2	6
traitement de substitution	71.4	100.0	83.3	85.7	100.0	88.5	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	86.1	92.3	87.8	43
N**	7	5	12	21	5	26	1	1	2	2	0	2	36	13	49	49
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s substitué-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2017)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Postcure prévue et mise en place*																
non	92.5	81.7	89.4	85.5	84.6	85.3	84.1	75.0	82.7	97.0	90.0	95.9	92.5	82.8	90.0	1 410
oui	7.5	18.3	10.6	14.5	15.4	14.7	15.9	25.0	17.3	3.0	10.0	4.1	7.5	17.3	10.0	156
N**	732	295	1 027	62	13	75	69	12	81	201	40	241	1 166	400	1 566	1 566
<i>données manquantes</i>	1 433	640	2 073	203	67	270	173	43	216	675	157	832	2 850	1 187	4 037	4 037
Type de la postcure prévue***																
appartement protégé de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
service de postcure de l'institution	2.2	2.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.7	1.5	2
appartement protégé extérieur	4.4	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	7.7	0.0	25.0	10.0	2.6	3.3	2.9	4
service de postcure extérieur	17.8	4.3	10.9	12.5	0.0	10.0	18.2	50.0	23.1	0.0	0.0	0.0	15.8	6.7	11.8	16
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	11.1	14.9	13.0	37.5	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	13.3	13.2	18
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	2.2	4.3	3.3	0.0	50.0	10.0	9.1	0.0	7.7	0.0	50.0	20.0	2.6	8.3	5.1	7
autre centre de consultation	11.1	12.8	12.0	0.0	50.0	10.0	18.2	0.0	15.4	33.3	0.0	20.0	14.5	11.7	13.2	18
groupe d'entraide	6.7	0.0	3.3	12.5	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	2.9	4
groupe d'ancien-ne-s client-e-s de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autre	44.4	61.7	53.3	37.5	0.0	30.0	54.5	0.0	46.2	66.7	25.0	50.0	44.7	55.0	49.3	67
N**	45	47	92	8	2	10	11	2	13	6	4	10	76	60	136	136
<i>données manquantes</i>	10	7	17	1	0	1	0	1	1	0	0	0	11	9	20	20

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pour lesquels une postcure est prévue. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2017)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Problèmes addictifs à la sortie*																
alcool	71.0	77.0	72.8	29.0	23.8	27.8	20.5	5.7	17.7	10.4	8.7	10.1	44.9	49.7	46.3	1 760
héroïne	0.6	0.5	0.6	57.2	52.4	56.1	3.4	5.7	3.9	0.7	0.0	0.6	4.0	2.8	3.7	139
méthadone	0.3	0.6	0.4	7.6	11.9	8.6	1.4	0.0	1.1	0.1	0.0	0.1	0.9	0.8	0.8	32
buprénorphine	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autres opioïdes	0.1	0.6	0.3	5.5	9.5	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.5	18
cocaïne en poudre	2.5	1.4	2.1	18.6	19.0	18.7	65.8	65.7	65.7	3.0	2.0	2.8	7.1	4.4	6.3	239
crack	0.1	0.2	0.1	2.8	2.4	2.7	1.4	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	10
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
amphétamines	0.4	0.2	0.3	0.7	0.0	0.5	1.4	2.9	1.7	1.3	1.3	1.3	1.0	0.8	0.9	35
méthamphétamines	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	4
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.3	0.0	0.2	2.8	0.0	2.1	1.4	0.0	1.1	0.4	0.0	0.4	0.6	0.2	0.5	19
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
barbituriques	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
benzodiazépines	0.7	1.1	0.8	7.6	9.5	8.0	0.7	0.0	0.6	0.1	0.7	0.2	1.2	2.5	1.6	61
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
autres somnifères et tranquillisants	0.3	0.2	0.2	0.7	2.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	9
LSD	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.9	0.0	0.7	0.3	0.2	0.3	11
kétamine	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	3
autres hallucinogènes	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	2
cannabis	4.8	3.4	4.4	15.9	11.9	15.0	6.8	5.7	6.6	65.9	68.7	66.4	21.4	12.9	18.9	719
tabac	9.8	10.6	10.0	13.8	7.1	12.3	3.4	5.7	3.9	13.4	14.0	13.5	11.5	12.5	11.8	449
autre substance	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.1	0.3	0.1	5
jeu pathologique	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.3	0.0	0.2	1.5	0.5	1.2	46
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1.5	0.3	1.2	44
troubles alimentaires	0.1	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.2	0.4	8.3	2.7	102
autre comportement de type addictif	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	1.5	2.2	1.7	65
aucun	24.9	19.2	23.1	15.9	19.0	16.6	23.3	31.4	24.9	28.3	26.0	27.9	25.1	20.2	23.7	902
N**	1 446	652	2 098	145	42	187	146	35	181	693	150	843	2 702	1 102	3 804	3 804
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T37 Fréquence des rechutes et substance ou comportement impliqué pendant la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2017)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Fréquence des rechutes*																
aucune	63.7	44.1	58.3	40.0	37.5	39.5	57.1	50.0	56.0	68.5	60.0	67.5	63.0	43.8	58.1	586
une fois	5.3	6.4	5.6	2.9	0.0	2.3	4.8	0.0	4.0	3.7	6.7	4.1	5.1	7.0	5.6	56
deux fois	6.0	4.4	5.6	8.6	12.5	9.3	2.4	0.0	2.0	3.7	0.0	3.3	5.6	5.0	5.5	55
trois ou quatre fois	13.2	21.1	15.4	14.3	0.0	11.6	16.7	12.5	16.0	7.4	6.7	7.3	12.4	17.8	13.8	139
cinq fois ou plus	11.7	24.0	15.1	34.3	50.0	37.2	19.0	37.5	22.0	16.7	26.7	17.9	14.0	26.4	17.1	173
N**	529	204	733	35	8	43	42	8	50	108	15	123	751	258	1 009	1 009
<i>données manquantes</i>	1 636	731	2 367	230	72	302	200	47	247	768	182	950	3 265	1 329	4 594	4 594
Substance/comportement addictif lors des rechutes***																
alcool	98.9	98.2	98.6	52.4	20.0	46.2	29.4	50.0	33.3	26.7	80.0	34.3	80.1	89.8	83.4	332
opioïdes	0.5	1.8	1.0	71.4	40.0	65.4	5.9	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	6.9	2.9	5.5	22
cocaïne et dérivés	6.5	3.6	5.4	33.3	60.0	38.5	94.1	100.0	95.2	6.7	0.0	5.7	14.6	9.5	12.8	51
autres stimulants	1.1	0.0	0.7	4.8	0.0	3.8	0.0	25.0	4.8	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	6
somnifères/tranquillisants	0.5	3.6	1.7	4.8	20.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.6	3.3	13
hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
cannabis	3.8	3.6	3.7	23.8	40.0	26.9	5.9	25.0	9.5	90.0	100.0	91.4	15.7	11.7	14.3	57
tabac	3.3	1.8	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	20.0	8.6	3.1	2.9	3.0	12
autres substances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
jeu pathologique	0.0	1.8	0.7	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	1.0	4
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.8	3
troubles alimentaires	0.0	2.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	5.7	0.8	4.4	2.0	8
autre comportement de type addictif	0.0	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	1
N**	184	111	295	21	5	26	17	4	21	30	5	35	261	137	398	398
<i>données manquantes</i>	8	3	11	0	0	0	1	0	1	4	1	5	17	8	25	25

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2017)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	42.7	47.0	43.9	14.3	16.7	14.6	29.6	16.7	27.3	24.0	15.8	22.9	36.4	41.2	37.6	341
1 jour par semaine ou moins	1.6	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.1	1.6	0.0	1.2	11
2 à 3 jours par semaine	1.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	3.6	1.6	0.4	1.3	12
4 à 6 jours par semaine	0.9	0.0	0.6	2.9	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.4	1.0	0.0	0.8	7
une fois par jour	4.1	2.8	3.7	2.9	0.0	2.4	3.7	16.7	6.1	8.3	5.3	7.9	4.9	3.9	4.6	42
plusieurs fois par jour	49.7	50.3	49.8	80.0	83.3	80.5	66.7	66.7	66.7	59.5	78.9	62.1	54.4	54.5	54.4	493
N**	443	181	624	35	6	41	27	6	33	121	19	140	673	233	906	906
<i>données manquantes</i>	1 722	754	2 476	230	74	304	215	49	264	755	178	933	3 343	1 354	4 697	4 697
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10 cigarettes par jour	22.2	19.0	21.4	18.2	0.0	14.8	35.7	33.3	35.3	37.2	50.0	39.1	25.3	22.7	24.6	119
11 à 20 cigarettes par jour	46.2	53.6	48.2	40.9	80.0	48.1	64.3	66.7	64.7	43.6	28.6	41.3	45.6	51.3	47.0	227
21 à 30 cigarettes par jour	21.8	21.4	21.7	31.8	20.0	29.6	0.0	0.0	0.0	11.5	21.4	13.0	19.8	19.3	19.7	95
31 cigarettes par jour ou plus	9.8	6.0	8.7	9.1	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	6.5	9.3	6.7	8.7	42
N**	225	84	309	22	5	27	14	3	17	78	14	92	364	119	483	483
<i>données manquantes</i>	29	12	41	8	0	8	5	2	7	14	2	16	64	18	82	82

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème¹ (seulement patient-e-s) (2017)

	Patient-e-s: principale substance posant problème ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Objectif de consommation*																
abstinence définitive	31.1	33.6	31.8	56.8	75.0	60.0	70.5	62.5	69.2	46.6	30.4	44.2	37.2	37.2	37.2	419
abstinence limitée dans le temps	21.8	11.9	19.0	5.4	0.0	4.4	6.8	0.0	5.8	11.3	13.0	11.5	17.5	10.4	15.7	177
consommation contrôlée	34.5	42.5	36.8	13.5	25.0	15.6	11.4	12.5	11.5	23.3	30.4	24.4	30.9	38.5	32.9	370
aucune limitation envisagée	3.1	1.3	2.6	2.7	0.0	2.2	2.3	12.5	3.8	9.0	8.7	9.0	3.8	2.4	3.5	39
pas déterminé pour l'instant	8.5	10.6	9.1	18.9	0.0	15.6	9.1	12.5	9.6	8.3	13.0	9.0	9.3	10.8	9.7	109
autre	1.0	0.0	0.7	2.7	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	1.5	4.3	1.9	1.2	0.7	1.1	12
N**	579	226	805	37	8	45	44	8	52	133	23	156	838	288	1 126	1 126
<i>données manquantes</i>	<i>1 586</i>	<i>709</i>	<i>2 295</i>	<i>228</i>	<i>72</i>	<i>300</i>	<i>198</i>	<i>47</i>	<i>245</i>	<i>743</i>	<i>174</i>	<i>917</i>	<i>3 178</i>	<i>1 299</i>	<i>4 477</i>	<i>4 477</i>
Pronostic*																
très bon pronostic	22.1	14.2	19.9	18.9	33.3	21.7	9.4	25.0	11.5	26.0	8.3	23.1	22.2	15.1	20.4	228
bon pronostic	49.2	46.2	48.4	40.5	22.2	37.0	35.8	50.0	37.7	52.8	70.8	55.8	48.3	47.6	48.1	539
plutôt mauvais pronostic	19.1	31.1	22.5	29.7	33.3	30.4	43.4	0.0	37.7	18.7	20.8	19.0	21.1	29.5	23.3	261
mauvais pronostic	9.6	8.4	9.2	10.8	11.1	10.9	11.3	25.0	13.1	2.4	0.0	2.0	8.3	7.9	8.2	92
N**	565	225	790	37	9	46	53	8	61	123	24	147	828	292	1 120	1 120
<i>données manquantes</i>	<i>1 600</i>	<i>710</i>	<i>2 310</i>	<i>228</i>	<i>71</i>	<i>299</i>	<i>189</i>	<i>47</i>	<i>236</i>	<i>753</i>	<i>173</i>	<i>926</i>	<i>3 188</i>	<i>1 295</i>	<i>4 483</i>	<i>4 483</i>

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu