

Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance

Résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2011

Recueil de tableaux statistiques

Luca Notari, Etienne Maffli, Mariana Astudillo

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du monitoring act-info. Nous remercions également les collaborateurs et collaboratrices des services de consultation qui ont effectué les tâches de logistique et de saisie. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-info. Un grand merci également à Edith Bacher et Christiane Gmel pour la conception graphique et la mise en page de ce rapport ainsi qu'à Marina Delgrande Jordan pour sa précieuse collaboration dans le développement des syntaxes d'analyse.

Compléments d'information: Etienne Maffli, tél. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emaffli@addictionsuisse.ch

Réalisation: Luca Notari, Etienne Maffli & Mariana Astudillo,
Addiction Suisse

Diffusion: Recherche, Addiction Suisse, case postale 870,
1001 Lausanne, tél. 021/321 29 46, fax 021 321 29 40,
e-mail ebacher@addictionsuisse.ch

Prix: Fr. 10.–

Langue du texte original: allemand

Graphisme/mise en page: Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse, Lausanne 2013

Citation recommandée: Notari, L., Maffli, E. & Astudillo, M. (2013). Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance: résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2011 – Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info – addiction care and therapy information.....	7
act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD).....	7

ADMISSION

T1	Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2011)
T2	État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2011)
T3	Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2011)
T4	Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2011)
T5	Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2011)
T6	Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2011)
T7	Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2011)
T8	Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2011)
T9	Instance d'envoi principale et secondaire, selon le problème principal et chez les proches (2011)
T10	Type d'aide attendue à l'admission et statut légal de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2011)
T11	Traitements/prises en charge avant l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2011)
T12	Substitution et autre traitement/prise en charge à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2011)
T13a	Admission suite à une cure de sevrage, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2011)
T13b	Fréquence des sevrages sans aide professionnelle avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2011)
T14	Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2011)
T15.1a	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2011), hommes
T15.1b	Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2011), hommes

- T15.2a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2011), femmes
- T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2011), femmes
- T15.3a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2011), hommes & femmes
- T15.3b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2011), hommes & femmes
- T16.1a Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2011), hommes
- T16.1b Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2011), femmes
- T16.1c Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2011), hommes & femmes
- T16.2a Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2011), hommes
- T16.2b Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2011), femmes
- T16.2c Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2011), hommes & femmes
- T17 Mode d'administration de la principale substance posant problème au cours des 6 derniers mois avant l'admission (2011)
- T18 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 6 derniers mois avant l'admission des injections, échange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois avant l'admission et âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2011)
- T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2011), hommes
- T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2011), femmes
- T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2011), hommes & femmes
- T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2011), hommes
- T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2011), femmes
- T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2011), hommes & femmes
- T20 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2011)

- T21 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2011)
- T22a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2011), hommes
- T22b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2011), femmes
- T22c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2011), hommes & femmes
- T23a Problèmes psychiques au cours de la vie (2011), hommes
- T23b Problèmes psychiques au cours de la vie (2011), femmes
- T23c Problèmes psychiques au cours de la vie (2011), hommes & femmes
- T24 Proches: Lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2011)
- T25 Proches: problème principal et autres problèmes de la tierce personne (2011)
- T26 Proches: Propres problèmes des proches liés au problème de la tierce personne (2011)

SORTIE

- T27 Sexe et âge, selon le problème principal et chez les proches (2011)
- T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2011)
- T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2011)
- T30 Plus haute formation achevée, source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2011)
- T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2011)
- T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2011)
- T32b Destination des transferts, selon le problème principal et chez les proches (2011)
- T32c Cause de décès, selon le problème principal et chez les proches (2011)
- T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2011)
- T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2011)
- T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2011)
- T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2011)

- T37 Fréquence des rechutes, substance ou comportement impliqué et durée des rechutes pendant la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2011)
- T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2011)
- T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème (seulement patient-e-s) (2011)

Annexe

Données de base d'institutions ne participant pas au monitoring *act-info*

- A1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal (2011)
- A2 Problème principal à l'admission (2011)

act-info - addiction care and therapy information

Le Réseau de monitoring (act-info) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse:

- SAMBAD (Statistique du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance)
- Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Méthadone (Statistique nationale des traitements de substitution)

Ces cinq statistiques disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés. Les données communes sont intégrées dans une base de données centralisée, permettant ainsi de procéder à des analyses sur l'ensemble des secteurs. Avec l'adoption des standards européens (Treatment Demand Indicator), la comparabilité des données au plan international est également garantie.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à Addiction Info Suisse à Lausanne et à l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zürich (ISGF).

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)

Dès 2004, les instruments de monitoring act-info ont été introduits dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance et ont remplacé les anciens questionnaires en vigueur depuis 1994. Le monitoring dans ce secteur est confié à Addiction Suisse Info à Lausanne.

La statistique act-info SAMBAD offre un aperçu de la clientèle et des activités de l'aide ambulatoire en matière de dépendance en Suisse. Les données sont récoltées au début et à la fin de la prise en charge. Les informations rassemblées à l'admission renseignent en particulier sur les caractéristiques socio-démographiques des client-e-s, sur leurs expériences de traitement ainsi que sur leurs modes de consommation et problèmes psychosociaux avant la prise en charge. Les informations récoltées à la sortie rendent principalement compte des caractéristiques socio-démographiques des client-e-s à ce moment, des mesures prises par les intervenant-e-s durant la prise en charge et des circonstances de la fin de celle-ci.

En 2011, 79 des 198 institutions recensées dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance ont participé au monitoring act-info. Il s'agit de services de consultation spécialisés pour les problèmes liés à l'alcool et/ou aux drogues illégales ainsi que de divers types de services polyvalents offrant également une aide pour les problèmes addictifs.

Explications concernant les tableaux

La présente statistique descriptive des données de l'enquête *act-info* auprès des client-e-s du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance repose sur deux types de tableaux:

- lorsque la question a des catégories de réponses prédéfinies ou recodées en tranches distinctes (par exemple "état civil" ou "âge"), le tableau indique les pourcentages des différentes catégories de réponses
- lorsque la question n'a pas de catégories prédéfinies, mais requiert une valeur numérique (par exemple "âge au début de la consommation problématique"), le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1er quartile, 3e quartile)

La plupart des tableaux présentent les résultats de façon distincte pour les sous-groupes de patients et patientes ayant mentionné l'**alcool**, un **opiacé** (héroïne notamment), la **cocaïne** (et dérivés) ou le **cannabis** comme problème principal au moment de leur admission. Les **proches** venant consulter pour les problèmes d'un tiers font également l'objet d'analyses séparées pour les aspects socio-démographiques. A l'exception des thèmes directement liés aux modes de consommation ou aux formes de comportements addictifs non liés aux substances, les résultats ne sont en revanche pas présentés séparément pour les client-e-s (peu nombreux) ayant mentionné d'autres substances (par exemple un stimulant ou les substances volatiles) ou un problème addictif non lié à une substance (par exemple jeu pathologique) comme problème principal. Ces personnes sont cependant incluses dans les analyses portant sur l'ensemble des prises en charge figurant dans les blocs à droite des tableaux respectifs. Toutes les analyses sont effectuées séparément pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour les deux sexes confondus (colonnes "Total" comprenant le cas échéant également les quelques personnes dont le sexe n'est pas connu).

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Le nombre de réponses valides **N** représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages ou autres paramètres. Il est indiqué pour chaque groupe ou sous-groupe considéré. Au dessous, le nombre correspondant de données manquantes figure également. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés particulièrement prudemment.

Des notes en bas de tableau renseignent sur les éventuelles particularités des groupes de référence ainsi que sur le type de question. Lorsque plusieurs réponses sont possibles (par exemple aux tableaux du thème T19, "autres problèmes addictifs") les pourcentages obtenus ne sont pas additifs.

Les institutions ne participant pas au monitoring *act-info* ont été invitées à fournir des données de base (âge, sexe et problème principal à l'admission). Parmi ces institutions, 17 ont répondu et les données de 12 d'entre elles se sont révélées compatibles avec la définition du problème principal. Les données de ces 12 institutions ont été analysées séparément et les résultats sont présentés en annexe.

T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2011)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sexe*																			
hommes	69.9			72.2			80.1			82.2			20.1			64.3		4'599	
femmes	30.1			27.8			19.9			17.8			79.9			35.7		2'548	
sexe pas connu	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		0	
N**	2'612	1'125	3'737	346	133	479	241	60	301	834	181	1'015	201	801	1'002	4'599	2'548	7'147	7'147
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	7.7	7.4	4.5	1.0	1.7	2.0	1.4	1.8	127
15-19	2.6	2.0	2.4	1.7	8.3	3.6	4.1	20.0	7.3	56.9	58.6	57.2	5.6	3.6	4.0	13.6	8.6	11.8	840
20-24	4.1	2.7	3.7	11.0	19.5	13.4	9.5	31.7	14.0	13.0	14.4	13.2	4.0	4.7	4.6	7.1	6.9	7.0	501
25-29	9.1	5.3	7.9	20.6	21.8	20.9	31.5	23.3	29.9	10.4	8.3	10.1	3.5	7.5	6.7	11.4	8.2	10.3	729
30-34	9.3	6.5	8.4	15.1	19.5	16.3	23.2	13.3	21.3	6.0	4.4	5.7	6.6	8.1	7.8	10.1	7.9	9.3	663
35-39	10.3	8.8	9.9	21.4	9.8	18.2	12.9	6.7	11.6	2.6	2.2	2.6	8.6	8.6	8.6	9.9	8.5	9.4	668
40-44	15.3	15.8	15.4	16.8	11.3	15.3	13.3	3.3	11.3	1.6	2.8	1.8	15.2	15.5	15.4	12.2	13.5	12.7	901
45-49	14.5	18.2	15.6	7.2	5.3	6.7	3.3	0.0	2.7	1.6	0.6	1.4	15.2	17.9	17.4	10.5	14.8	12.0	854
50-54	13.1	13.8	13.3	4.6	3.8	4.4	0.8	1.7	1.0	0.1	1.1	0.3	11.1	14.6	13.9	8.9	11.8	9.9	705
55-59	9.8	10.7	10.0	1.4	0.8	1.3	1.2	0.0	1.0	0.1	0.0	0.1	8.1	6.7	7.0	6.4	7.3	6.7	476
60-64	5.7	8.2	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	5.5	5.5	3.6	5.5	4.3	303
65-69	3.7	4.4	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	6.6	2.9	3.7	2.6	3.0	2.8	196
70-74	1.6	2.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.9	2.0	1.2	1.7	1.3	95
75 et plus	0.7	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	3.0	1.4	1.7	0.6	0.9	0.7	50
N**	2'600	1'122	3'722	345	133	478	241	60	301	833	181	1'014	198	787	985	4'579	2'529	7'108	7'108
données manquantes	12	3	15	1	0	1	0	0	0	1	0	1	3	14	17	20	19	39	39
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	44.5	47.2	45.3	35.2	31.6	34.2	32.4	26.4	31.2	21.2	20.8	21.2	44.9	44.2	44.3	38.1	41.8	39.4	
écart-type	13.0	12.7	13.0	8.7	9.3	9.0	7.8	7.5	8.1	8.0	7.5	7.9	16.1	13.5	14.0	15.0	14.8	15.0	
1er quartile	34.9	39.7	36.4	28.3	24.2	27.3	27.0	20.8	25.6	16.5	16.5	16.5	35.6	35.0	35.1	26.1	30.0	27.2	
valeur médiane	44.6	47.4	45.7	35.6	30.0	33.3	31.3	24.7	29.7	17.7	17.7	17.7	45.4	45.2	45.3	37.9	43.4	40.2	
3e quartile	53.6	55.6	54.3	41.3	37.5	40.9	37.16	29.6	36.2	23.8	22.8	23.7	56.0	52.1	52.8	49.2	51.7	50.3	
N**	2'600	1'122	3'722	345	133	478	241	60	301	833	181	1'014	198	787	985	4'579	2'529	7'108	
données manquantes	12	3	15	1	0	1	0	0	0	1	0	1	3	14	17	20	19	39	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2011)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Etat civil*																			
célibataire	42.8	30.4	39.1	72.4	77.6	73.8	69.5	82.8	72.1	93.6	93.6	93.6	25.9	24.1	24.5	56.4	39.8	50.5	3'433
marié-e	31.0	27.1	29.8	13.1	11.2	12.6	19.1	6.9	16.7	4.2	2.9	3.9	60.5	53.6	55.0	25.2	31.4	27.4	1'864
séparé-e	5.3	6.2	5.6	3.0	2.4	2.8	5.9	5.2	5.8	0.6	0.0	0.5	1.1	3.2	2.8	3.8	4.3	4.0	272
divorcé-e	18.7	30.5	22.2	9.2	8.0	8.9	4.7	3.4	4.4	1.5	2.9	1.8	9.2	15.3	14.1	12.8	20.4	15.5	1'052
veuf/veuve	1.9	5.3	2.9	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	1.6	3.1	2.8	1.2	3.5	2.0	137
partenariat enregistré	0.4	0.5	0.4	1.8	0.8	1.5	0.8	1.7	1.0	0.1	0.0	0.1	1.6	0.7	0.9	0.5	0.6	0.6	38
N**	2'491	1'078	3'569	337	125	462	236	58	294	791	173	964	185	750	935	4'376	2'420	6'796	6'796
données manquantes	121	47	168	9	8	17	5	2	7	43	8	51	16	51	67	223	128	351	351
Nationalité*																			
CH	79.2	85.6	81.2	66.9	86.3	72.5	69.2	85.4	72.3	86.2	88.5	86.6	86.6	87.9	87.6	79.5	86.2	81.9	5'297
EU	14.1	10.5	13.0	21.4	12.0	18.7	16.3	4.2	14.1	7.3	5.5	7.0	10.2	7.8	8.3	13.1	9.1	11.7	754
autre	6.6	3.9	5.8	11.7	1.7	8.8	14.4	10.4	13.7	6.5	6.1	6.4	3.2	4.3	4.1	7.4	4.7	6.4	416
N**	2'390	1'037	3'427	290	117	407	208	48	256	739	165	904	186	718	904	4'149	2'318	6'467	6'467
données manquantes	222	88	310	56	16	72	33	12	45	95	16	111	15	83	98	450	230	680	680

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2011)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	8.2	9.7	8.6	4.2	3.8	4.1	1.3	0.0	1.0	0.1	0.0	0.1	11.1	8.4	8.9	5.5	7.2	6.1	414
périphérie des grands centres	14.4	14.1	14.3	7.2	4.6	6.5	14.2	13.6	14.0	8.8	6.2	8.4	15.3	14.6	14.7	11.9	12.1	12.0	814
villes de moyenne importance	13.5	15.2	14.0	17.4	24.6	19.4	23.8	16.9	22.4	24.1	31.5	25.5	15.8	15.2	15.3	16.9	17.9	17.3	1'173
petites villes	34.2	33.8	34.1	44.1	35.4	41.7	39.2	49.2	41.1	34.8	41.0	35.9	28.9	34.4	33.3	36.1	35.4	35.8	2'432
campagne	29.7	27.3	29.0	27.0	31.5	28.3	21.7	20.3	21.4	32.1	21.3	30.2	28.9	27.5	27.8	29.6	27.4	28.8	1'955
N**	2'445	1'060	3'505	333	130	463	240	59	299	816	178	994	190	742	932	4'378	2'410	6'788	6'788
données manquantes	167	65	232	13	3	16	1	1	2	18	3	21	11	59	70	221	138	359	359
Type de ménage (30 derniers jours)*																			
seul-e en ménage	36.8	33.8	35.9	30.9	27.4	29.9	35.7	29.4	34.4	13.0	12.0	12.8	7.7	11.5	10.8	29.2	24.0	27.4	1'515
avec un ou les parents	7.6	3.9	6.5	15.8	17.9	16.5	13.1	31.4	16.8	63.9	56.3	62.6	13.8	7.3	8.5	21.8	12.4	18.5	1'022
avec enfant(s), sans partenaire	1.6	13.4	5.2	0.7	8.5	3.0	0.0	2.0	0.4	0.3	1.9	0.6	3.8	11.9	10.4	1.3	11.2	4.8	265
avec partenaire, sans enfant	24.2	23.6	24.0	15.8	22.2	17.7	17.1	19.6	17.6	4.2	8.9	5.0	26.9	27.0	27.0	18.5	22.8	20.0	1'108
avec partenaire et enfant(s)	19.3	15.6	18.2	11.5	7.7	10.4	18.1	2.0	14.8	3.8	3.2	3.7	46.9	39.6	41.0	16.6	20.2	17.9	989
avec d'autres proches	1.3	1.1	1.2	4.0	4.3	4.1	4.5	2.0	4.0	1.8	0.0	1.5	0.8	0.9	0.9	1.8	1.2	1.6	87
avec des amis (colocation)	3.1	2.0	2.8	3.6	2.6	3.3	6.0	7.8	6.4	3.1	0.6	2.6	0.0	1.2	1.0	3.2	2.2	2.9	158
autre	6.1	6.8	6.3	17.6	9.4	15.2	5.5	5.9	5.6	10.0	17.1	11.3	0.0	0.5	0.4	7.7	6.0	7.1	392
N**	1'944	853	2'797	278	117	395	199	51	250	718	158	876	130	563	693	3'576	1'960	5'536	5'536
données manquantes	668	272	940	68	16	84	42	9	51	116	23	139	71	238	309	1'023	588	1'611	1'611
Situation de domicile (30 dernier jours)*																			
domicile fixe	93.5	93.4	93.5	82.6	78.8	81.5	90.1	75.0	87.3	90.7	85.6	89.8	97.9	97.8	97.8	92.3	92.8	92.5	4'808
sans domicile fixe	4.2	3.5	4.0	12.4	19.2	14.5	8.1	20.0	10.4	4.4	9.6	5.4	2.1	2.2	2.2	4.9	5.1	5.0	259
institution	2.3	3.1	2.6	5.0	1.9	4.0	1.7	5.0	2.4	4.9	4.8	4.9	0.0	0.0	0.0	2.8	2.0	2.6	133
N**	1'857	809	2'666	242	104	346	172	40	212	636	146	782	140	547	687	3'342	1'858	5'200	5'200
données manquantes	755	316	1071	104	29	133	69	20	89	198	35	233	61	254	315	1257	690	1947	1'947

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2011)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	34.7	36.5	35.2	40.5	27.1	36.1	35.4	34.3	35.2	68.2	49.2	64.3	12.1	15.5	14.9	39.7	30.6	36.4	1'641
relations temporaires	3.7	4.8	4.0	3.0	10.4	5.4	8.1	14.3	9.2	4.5	9.3	5.4	0.9	1.4	1.3	3.9	4.8	4.3	192
parten. fixe, vivant séparé	12.2	15.4	13.2	19.5	25.0	21.3	19.3	25.7	20.4	16.3	22.9	17.7	7.8	8.5	8.4	13.6	14.7	14.0	634
parten. fixe, mén. commun	49.5	43.3	47.6	37.0	37.5	37.2	37.3	25.7	35.2	11.0	18.6	12.6	79.3	74.6	75.4	42.7	49.9	45.3	2'047
N**	1'664	748	2'412	200	96	296	161	35	196	471	118	589	116	503	619	2'838	1'676	4'514	4'514
données manquantes	948	377	1'325	146	37	183	80	25	105	363	63	426	85	298	383	1'761	872	2'633	2'633
Nombre d'enfants propres*																			
aucun	44.2	34.7	41.2	62.2	50.9	59.0	59.1	78.3	63.1	89.7	90.8	89.9	32.1	24.0	25.5	55.0	40.0	49.5	2'599
1 enfant	17.1	22.3	18.7	20.6	29.2	23.1	26.3	13.0	23.5	6.3	5.3	6.1	20.9	16.5	17.3	16.1	19.1	17.2	901
2 enfants	26.8	28.8	27.4	13.7	16.0	14.4	12.3	6.5	11.1	3.0	3.1	3.0	31.3	38.8	37.4	20.2	27.1	22.7	1'193
3 enfants ou plus	11.9	14.2	12.6	3.4	3.8	3.5	2.3	2.2	2.3	1.0	0.8	1.0	15.7	20.7	19.8	8.7	13.8	10.6	557
N**	1'905	873	2'778	262	106	368	171	46	217	575	131	706	134	588	722	3'314	1'936	5'250	5'250
données manquantes	707	252	959	84	27	111	70	14	84	259	50	309	67	213	280	1'285	612	1'897	1'897
Nombre d'enfants dans le ménage*																			
aucun	72.4	64.3	69.8	76.6	69.8	74.7	75.4	75.8	75.4	58.6	65.8	59.9	42.4	39.2	39.8	68.5	57.4	64.3	2'923
1 enfant	12.0	18.0	13.9	13.8	18.6	15.1	14.2	9.1	13.2	11.5	8.1	10.9	22.4	21.3	21.5	12.9	18.2	14.9	676
2 enfants	11.2	13.5	11.9	6.9	9.3	7.6	8.2	12.1	9.0	18.6	16.2	18.2	21.6	28.8	27.4	12.7	17.9	14.6	665
3 enfants ou plus	4.5	4.1	4.4	2.8	2.3	2.6	2.2	3.0	2.4	11.3	9.9	11.0	13.6	10.7	11.3	6.0	6.4	6.2	280
N**	1'630	754	2'384	218	86	304	134	33	167	505	111	616	125	531	656	2'850	1'694	4'544	4'544
données manquantes	982	371	1'353	128	47	175	107	27	134	329	70	399	76	270	346	1'749	854	2'603	2'603

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2011)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Plus haute formation achevée*																			
aucune form. achevée	3.4	5.3	4.0	8.1	5.9	7.5	3.8	7.0	4.4	21.3	18.5	20.8	9.3	4.2	5.2	8.4	6.8	7.9	390
scolarité obligatoire	12.7	14.9	13.4	32.6	38.2	34.2	18.1	44.2	23.1	54.9	59.9	55.8	5.6	12.8	11.3	24.4	21.9	23.6	1'170
scolarité complémentaire	3.1	5.6	3.9	3.1	9.8	5.0	4.9	2.3	4.4	2.7	5.1	3.2	1.9	3.5	3.2	3.2	5.3	3.9	194
apprentissage/école prof.	59.1	54.8	57.8	47.7	37.3	44.7	67.6	39.5	62.2	17.5	12.7	16.6	40.7	54.0	51.3	47.7	47.2	47.5	2'358
maturité/diplôme	5.1	3.9	4.7	3.1	7.8	4.4	3.3	7.0	4.0	1.7	3.2	2.0	7.4	5.1	5.6	4.3	5.2	4.6	228
école normale, pédagog.	0.6	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3.7	3.3	3.3	0.6	1.9	1.0	50
form. profession. supérieure	6.4	6.4	6.4	1.2	1.0	1.1	1.1	0.0	0.9	1.0	0.0	0.8	13.9	7.2	8.6	4.6	5.1	4.7	235
école profession. supérieure	1.9	1.5	1.8	1.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.9	1.4	1.3	1.3	1.1	1.3	63
haute école spécialisée	2.0	1.2	1.8	1.9	0.0	1.4	0.5	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	1.9	3.5	3.2	1.5	1.7	1.6	77
université, haute école	5.6	4.5	5.3	1.2	0.0	0.8	0.5	0.0	0.4	0.4	0.6	0.5	14.8	5.1	7.1	4.0	3.8	4.0	197
N**	1'778	752	2'530	258	102	360	182	43	225	696	157	853	108	430	538	3'293	1'669	4'962	4'962
données manquantes	834	373	1'207	88	31	119	59	17	76	138	24	162	93	371	464	1'306	879	2'185	2'185
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	31.3	44.1	35.3	58.2	76.4	63.0	26.7	72.2	33.3	19.4	20.0	19.5	22.4	29.2	27.9	30.6	40.9	34.0	817
apprenti-e, stagiaire	1.9	1.2	1.7	0.7	1.8	1.0	2.9	5.6	3.3	27.5	22.2	26.7	4.1	1.5	2.0	7.0	3.0	5.7	137
manœuvre, aide	3.6	3.1	3.4	4.6	5.5	4.8	2.9	0.0	2.4	3.5	4.4	3.6	0.0	2.5	2.0	3.4	3.3	3.4	81
ouvrier/ère formé-e sur le tas	6.1	5.5	6.0	8.5	7.3	8.2	10.5	0.0	8.9	5.3	6.7	5.5	2.0	3.0	2.8	6.6	5.3	6.2	149
ouvrier/ère formé-e (CFC)	15.3	8.2	13.1	15.0	5.5	12.5	23.8	0.0	20.3	8.1	6.7	7.9	8.2	7.4	7.6	14.2	7.7	12.1	290
contremaître-sse	3.1	0.7	2.4	2.0	0.0	1.4	3.8	0.0	3.3	0.7	0.0	0.6	0.0	0.5	0.4	2.5	0.5	1.8	44
employé-e non qualifié-e	14.9	17.8	15.8	5.2	1.8	4.3	16.2	5.6	14.6	5.6	11.1	6.4	18.4	29.7	27.5	12.5	18.8	14.6	351
empl. qualifié-e, cadre moyen	8.7	9.9	9.1	2.6	0.0	1.9	3.8	0.0	3.3	2.5	2.2	2.4	16.3	9.4	10.8	6.9	7.7	7.2	172
employé-e, cadre supérieur	3.6	1.2	2.8	1.3	0.0	1.0	1.9	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	8.2	2.0	3.2	2.6	1.1	2.1	51
indépendant-e	8.8	6.3	8.0	0.0	1.8	0.5	5.7	0.0	4.9	1.1	0.0	0.9	10.2	7.4	8.0	6.0	5.3	5.8	139
écolier/ère, étudiant-e	1.9	1.2	1.7	0.7	0.0	0.5	1.0	16.7	3.3	24.6	26.7	24.9	10.2	7.4	8.0	6.5	5.9	6.3	151
autre statut	0.8	0.7	0.7	1.3	0.0	1.0	1.0	0.0	0.8	1.8	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	0.8	20
N**	929	415	1'344	153	55	208	105	18	123	284	45	329	49	202	251	1'610	792	2'402	2'402
données manquantes	1'683	710	2'393	193	78	271	136	42	178	550	136	686	152	599	751	2'989	1'756	4'745	4'745

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2011)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Source de revenu principale (au cours des 30 derniers jours)*																			
salaires	54.1	37.9	49.2	30.4	19.0	27.2	62.4	31.6	56.3	30.1	24.9	29.1	68.8	60.1	61.8	48.1	42.2	46.0	2'878
économies, épargne	1.6	1.6	1.6	0.6	3.2	1.3	3.1	1.8	2.8	0.5	1.2	0.6	0.6	0.3	0.4	1.4	1.3	1.4	86
rente (AVS, AI ou autre)	16.7	22.8	18.6	12.7	13.5	12.9	7.9	17.5	9.8	4.0	6.4	4.4	15.3	11.4	12.2	13.1	17.0	14.4	903
aide sociale	15.4	15.4	15.4	37.9	38.1	37.9	11.8	22.8	14.0	8.4	13.9	9.4	3.2	2.6	2.7	15.0	12.5	14.1	882
assurance-chômage	6.6	4.9	6.1	8.7	6.3	8.0	4.8	1.8	4.2	2.3	1.7	2.2	0.6	1.6	1.4	5.4	3.5	4.7	295
soutien du/de la partenaire	0.9	13.1	4.6	2.2	5.6	3.1	0.0	5.3	1.0	0.8	0.6	0.7	1.9	17.9	14.6	1.0	12.3	4.9	308
soutien parents/proches/amis	2.8	1.9	2.6	5.0	11.9	6.9	5.7	19.3	8.4	52.8	49.1	52.1	8.9	4.7	5.6	14.4	9.3	12.6	788
deal, combines	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.7	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	9
autres revenus illégaux	0.2	0.0	0.1	0.6	0.8	0.7	0.9	0.0	0.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	10
prostitution	0.0	0.2	0.1	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3
autre	1.5	2.0	1.7	1.2	0.0	0.9	2.2	0.0	1.7	1.0	2.3	1.3	0.6	1.5	1.3	1.3	1.6	1.4	89
N**	2'251	976	3'227	322	126	448	229	57	286	775	173	948	157	616	773	4'073	2'178	6'251	6'251
données manquantes	361	149	510	24	7	31	12	3	15	59	8	67	44	185	229	526	370	896	896
Taux d'activité principal (au cours des 30 derniers jours)*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	48.5	24.1	41.2	24.6	12.3	21.2	54.9	26.3	49.1	20.7	12.9	19.3	68.7	34.0	40.8	41.6	25.8	36.2	2'188
activité à temps partiel	5.7	17.8	9.3	5.0	6.6	5.4	4.4	3.5	4.2	2.1	5.9	2.8	3.0	29.8	24.5	4.8	18.5	9.5	572
plusieurs activités occas.	1.1	1.6	1.2	0.9	0.8	0.9	0.4	1.8	0.7	0.9	0.6	0.8	1.5	0.9	1.0	1.0	1.2	1.0	63
en formation	2.5	2.1	2.4	1.6	4.9	2.5	4.4	14.0	6.4	54.1	57.6	54.7	10.4	7.1	7.8	14.1	10.6	12.9	779
sans activité prof.	19.9	33.2	23.9	25.9	31.1	27.3	12.8	28.1	15.9	6.6	7.6	6.8	14.2	21.8	20.3	16.9	26.7	20.3	1'225
sans trav., en quête d'emploi	14.3	12.3	13.7	25.9	27.0	26.2	13.7	14.0	13.8	8.8	7.6	8.6	1.5	3.5	3.1	13.2	9.6	12.0	725
sans trav., futur empl. garanti	0.6	0.3	0.5	0.3	0.0	0.2	1.3	0.0	1.1	0.1	0.6	0.2	0.0	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	29
autre	7.5	8.5	7.8	15.9	17.2	16.3	8.0	12.3	8.8	6.7	7.1	6.8	0.7	2.6	2.2	7.9	7.2	7.6	461
N**	2'201	933	3'134	321	122	443	226	57	283	773	170	943	134	547	681	3'978	2'064	6'042	6'042
données manquantes	411	192	603	25	11	36	15	3	18	61	11	72	67	254	321	621	484	1'105	1'105

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2011)

	Patient-e-s: problème principale									Proches			Toutes prises en charge						
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Revenu mensuel net (6 derniers mois)*																			
aucun revenu	22.1	34.7	25.4	33.1	38.6	34.5	17.8	60.0	28.3	44.0	59.4	46.1	27.8	30.2	29.8	28.6	37.8	31.2	484
moins de 1000 fr.	4.8	4.5	4.8	11.5	15.9	12.6	6.7	6.7	6.7	22.0	18.8	21.6	11.1	9.4	9.6	9.6	8.4	9.2	143
de 1001 à 2000 fr.	6.1	14.4	8.3	14.6	11.4	13.8	13.3	20.0	15.0	10.0	9.4	10.0	11.1	20.8	19.3	8.0	14.9	10.0	155
de 2001 à 3000 fr.	8.7	16.7	10.8	13.1	15.9	13.8	11.1	6.7	10.0	4.8	6.3	5.0	0.0	4.2	3.5	8.3	12.4	9.5	147
de 3001 à 4000 fr.	13.4	14.0	13.5	14.6	11.4	13.8	17.8	0.0	13.3	8.1	6.3	7.9	11.1	15.6	14.9	12.3	13.1	12.5	194
de 4001 à 5000 fr.	19.4	4.5	15.4	9.2	4.5	8.0	22.2	6.7	18.3	6.7	0.0	5.8	5.6	7.3	7.0	15.4	4.8	12.4	192
de 5001 à 6000 fr.	13.4	5.9	11.4	1.5	2.3	1.7	4.4	0.0	3.3	2.9	0.0	2.5	16.7	6.3	7.9	9.4	4.5	8.0	124
de 6001 à 8000 fr.	7.7	4.5	6.9	2.3	0.0	1.7	2.2	0.0	1.7	1.0	0.0	0.8	11.1	5.2	6.1	5.4	3.4	4.8	75
de 8001 à 10 000 fr.	3.2	0.9	2.6	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.9	2.1	0.5	1.6	25
de 10 001 à 15 000 fr.	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.7	0.5	0.0	0.4	0.0	1.0	0.9	0.7	0.2	0.6	9
plus de 15 000 fr.	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1
N**	620	222	842	130	44	174	45	15	60	209	32	241	18	96	114	1'107	442	1'549	1'549
données manquantes	1'992	903	2'895	216	89	305	196	45	241	625	149	774	183	705	888	3'492	2'106	5'598	5'598
Dettes*																			
aucune dette	69.1	81.6	72.7	39.5	35.8	38.6	45.8	56.0	47.6	83.9	89.7	84.8	93.6	92.4	92.6	68.5	81.2	72.4	1'976
jusqu'à 5000 fr.	4.8	5.6	5.0	11.5	18.9	13.3	10.0	28.0	13.1	6.9	6.2	6.8	0.0	2.0	1.6	6.1	6.4	6.2	170
de 5001 à 10 000 fr.	7.0	5.3	6.5	12.1	7.5	11.0	12.5	4.0	11.0	3.4	2.1	3.1	4.3	1.5	2.0	6.6	4.0	5.8	159
de 10 001 à 25 000 fr.	6.2	4.0	5.5	15.9	17.0	16.2	10.8	0.0	9.0	3.1	0.0	2.6	0.0	1.5	1.2	6.6	4.0	5.8	159
de 25 001 à 50 000 fr.	6.2	1.6	4.8	13.4	11.3	12.9	10.0	4.0	9.0	1.0	2.1	1.2	0.0	0.5	0.4	5.8	2.1	4.7	128
de 50 001 à 100 000 fr.	2.1	0.5	1.6	4.5	3.8	4.3	5.8	4.0	5.5	1.3	0.0	1.0	0.0	0.5	0.4	2.9	0.7	2.2	60
plus de 100 000 fr.	4.8	1.3	3.8	3.2	5.7	3.8	5.0	4.0	4.8	0.4	0.0	0.3	2.1	1.5	1.6	3.4	1.4	2.8	77
N**	926	376	1'302	157	53	210	120	25	145	477	97	574	47	197	244	1'889	840	2'729	2'729
données manquantes	1'686	749	2'435	189	80	269	121	35	156	357	84	441	154	604	758	2'710	1'708	4'418	4'418

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2011)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Emprisonnement ou détention préventive*																
aucun-e	89.5	97.6	91.9	42.9	66.7	48.9	63.3	90.9	67.6	92.5	89.5	92.1	83.8	94.1	86.5	1'549
emprisonnement	6.1	0.9	4.5	29.3	11.1	24.7	16.7	9.1	15.5	3.1	2.6	3.0	8.7	2.1	7.0	125
détention préventive	3.2	0.6	2.4	6.8	13.3	8.4	11.7	0.0	9.9	3.1	5.3	3.4	4.0	2.1	3.5	62
emprisonnement et détention préventive	1.2	0.9	1.1	21.1	8.9	18.0	8.3	0.0	7.0	1.3	2.6	1.5	3.5	1.7	3.0	54
N**	806	338	1'144	133	45	178	60	11	71	227	38	265	1'316	474	1'790	1'790
données manquantes	1'806	787	2'593	213	88	301	181	49	230	607	143	750	3'082	1'273	4'355	4'355
Durée totale de détention***																
jusqu'à 1 mois	40.3	16.7	38.4	14.8	22.2	15.7	33.3	.	33.3	23.1	66.7	31.3	28.0	27.8	28.0	51
> 1 à 2 mois	14.9	16.7	15.1	6.6	33.3	10.0	13.3	.	13.3	15.4	0.0	12.5	11.3	22.2	12.4	23
> 2 à 6 mois	31.3	50.0	32.9	16.4	44.4	20.0	26.7	.	26.7	23.1	33.3	25.0	24.4	44.4	26.3	49
> 6 à 12 mois	4.5	16.7	5.5	18.0	0.0	15.7	6.7	.	6.7	7.7	0.0	6.3	9.5	5.6	9.1	17
plus de 1 an	9.0	0.0	8.2	44.3	0.0	38.6	20.0	.	20.0	30.8	0.0	25.0	26.8	0.0	24.2	45
N**	66	6	72	61	9	70	15	0	15	13	3	16	167	18	185	185
données manquantes	19	2	21	15	6	21	7	1	8	4	1	5	46	10	56	56

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de détention. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T9 Instance d'envoi principale et secondaire, selon le problème principal et chez les proches (2011)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Instance d'envoi principale*																			
initiative personnelle	34.5	39.7	36.1	49.4	45.9	48.4	40.9	45.6	41.9	20.3	22.3	20.7	70.9	77.4	76.2	35.6	51.6	41.3	2'738
conjoint-e/partenaire	4.4	2.6	3.9	2.6	3.0	2.7	5.2	0.0	4.2	1.1	0.6	1.0	5.6	1.7	2.4	3.8	2.0	3.1	208
famille	3.8	5.9	4.4	3.5	3.8	3.6	7.8	10.5	8.3	8.3	6.7	8.0	4.5	4.0	4.1	5.3	5.7	5.4	361
ami-e-s, collègues, conaiss.	2.0	2.3	2.1	2.4	3.8	2.7	3.4	7.0	4.2	0.7	1.1	0.8	2.2	4.0	3.6	1.9	3.3	2.4	156
instit. ambulatoire spécialisée	1.6	2.4	1.9	3.2	4.5	3.6	0.4	1.8	0.7	0.6	1.1	0.7	0.6	1.7	1.4	1.4	2.1	1.6	109
instit. résidentielle spécialisée	6.0	5.9	6.0	3.5	4.5	3.8	6.5	3.5	5.9	0.5	1.1	0.6	0.0	0.4	0.3	4.2	3.2	3.8	255
cabinet médical	8.6	9.9	9.0	10.0	17.3	12.1	2.6	7.0	3.5	3.5	2.2	3.3	3.9	3.7	3.8	7.0	7.4	7.1	471
hôpital, clinique	11.8	14.5	12.6	3.8	6.0	4.4	5.2	12.3	6.6	1.5	1.7	1.5	1.7	0.6	0.8	8.2	8.0	8.1	538
service sociaux	6.2	5.1	5.9	5.9	4.5	5.5	3.4	1.8	3.1	4.2	5.0	4.4	2.8	1.7	1.9	5.7	4.0	5.1	336
mes. pénale/administrative	13.2	5.2	10.8	12.9	4.5	10.6	17.2	5.3	14.9	46.9	41.9	46.0	2.2	1.0	1.2	18.6	6.3	14.2	943
employeur/se	3.5	2.3	3.1	0.3	0.8	0.4	2.2	0.0	1.7	2.1	3.9	2.4	1.1	0.7	0.8	2.6	1.7	2.3	152
enseignant-e	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.6	1.2	2.2	0.6	0.9	0.7	0.6	0.7	44
autre	4.3	3.9	4.2	2.4	1.5	2.1	5.2	5.3	5.2	8.7	11.7	9.3	2.2	2.8	2.6	5.2	4.2	4.9	322
N**	2'372	1'029	3'401	340	133	473	232	57	289	803	179	982	179	727	906	4'270	2'363	6'633	6'633
données manquantes	240	96	336	6	0	6	9	3	12	31	2	33	22	74	96	329	185	514	514
Instance d'envoi secondaire***																			
initiative personnelle	28.4	23.5	27.0	19.1	28.6	21.8	32.7	36.8	33.3	19.7	28.6	20.9	11.5	13.2	12.9	25.5	21.3	24.1	699
conjoint-e/partenaire	11.6	7.2	10.3	9.0	8.6	8.9	9.3	0.0	7.9	6.0	6.1	6.0	16.4	2.4	4.8	10.7	5.8	9.1	263
famille	5.0	5.9	5.2	4.5	10.0	6.0	6.5	15.8	7.9	12.0	14.3	12.3	6.6	5.1	5.3	6.2	6.6	6.4	185
ami-e-s, collègues, conaiss.	1.4	2.2	1.6	2.8	1.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	1.6	3.4	3.1	1.3	2.3	1.7	48
instit. ambulatoire spécialisée	0.7	0.9	0.7	3.4	2.9	3.2	0.9	0.0	0.8	0.3	0.0	0.3	1.6	2.4	2.2	1.0	1.3	1.1	32
instit. résidentielle spécialisée	3.3	3.3	3.3	1.7	4.3	2.4	0.9	5.3	1.6	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	2.2	64
cabinet médical	4.4	7.2	5.2	7.9	7.1	7.7	1.9	0.0	1.6	1.3	2.0	1.4	3.3	2.0	2.2	4.0	4.8	4.3	124
hôpital, clinique	4.0	3.5	3.9	3.9	4.3	4.0	3.7	0.0	3.2	0.3	2.0	0.6	1.6	0.0	0.3	3.2	2.2	2.9	84
service sociaux	2.0	2.0	2.0	5.1	11.4	6.9	2.8	15.8	4.8	1.7	0.0	1.4	1.6	0.3	0.6	2.4	2.2	2.3	67
mes. pénale/administrative	2.2	1.3	1.9	3.9	5.7	4.4	3.7	0.0	3.2	3.7	6.1	4.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.3	2.2	64
employeur/se	2.2	1.1	1.9	0.6	1.4	0.8	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	0.3	0.3	1.7	0.9	1.4	41
enseignant-e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	0.6	3.3	0.3	0.8	0.2	0.2	0.2	5
autre	2.7	3.5	2.9	1.7	2.9	2.0	3.7	0.0	3.2	3.0	4.1	3.2	3.3	1.7	2.0	2.8	2.9	2.9	83
aucune	40.6	46.2	42.2	47.8	40.0	45.6	41.1	36.8	40.5	54.0	49.0	53.3	55.7	69.6	67.2	44.0	53.4	47.1	1368.0
N**	1'146	459	1'605	178	70	248	107	19	126	300	49	349	61	296	357	1'939	964	2'903	2'903
données manquantes	1'466	666	2'132	168	63	231	134	41	175	534	132	666	140	505	645	2'660	1'584	4'244	4'244

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T10 Type d'aide attendue à l'admission et statut légal de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2011)

Type d'aide attendue*	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
problèmes addictifs	84.3	89.0	85.7	91.3	93.3	91.8	80.3	87.5	81.6	72.6	75.9	73.0	66.7	58.2	59.7	81.7	79.3	80.9	2'602
problèmes somatiques	2.2	2.6	2.3	7.3	6.7	7.1	2.6	0.0	2.1	0.9	1.7	1.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.2	2.3	73
problèmes psychiques	13.6	21.4	15.9	20.9	22.7	21.4	14.5	8.3	13.5	7.1	6.9	7.1	6.1	15.0	13.3	13.0	18.8	14.9	478
problèmes relationnels	12.3	16.6	13.6	9.7	14.7	11.0	9.4	16.7	10.6	4.1	6.9	4.5	24.2	36.7	34.4	10.6	21.6	14.2	458
problèmes familiaux	7.5	11.7	8.7	10.7	17.3	12.5	7.7	12.5	8.5	10.0	8.6	9.8	53.0	45.2	46.7	9.6	21.7	13.6	437
problèmes financiers	6.5	5.5	6.2	19.9	24.0	21.0	14.5	8.3	13.5	7.1	1.7	6.3	4.5	4.4	4.4	8.8	6.8	8.1	262
problèmes professionnels, de formatio	11.3	7.8	10.3	12.1	14.7	12.8	12.0	16.7	12.8	9.7	10.3	9.8	6.1	2.7	3.3	11.2	7.3	9.9	319
problèmes de logement	3.5	2.5	3.2	8.7	10.7	9.3	4.3	4.2	4.3	2.4	5.2	2.8	1.5	5.4	4.7	3.9	4.5	4.1	132
problèmes de violence	1.0	0.9	1.0	1.9	0.0	1.4	0.9	0.0	0.7	1.5	0.0	1.3	1.5	3.4	3.1	1.1	1.4	1.2	39
problèmes juridiques	8.2	1.7	6.3	7.3	2.7	6.0	17.9	0.0	14.9	14.2	6.9	13.1	1.5	3.4	3.1	9.1	2.7	7.0	224
autre(s)	2.4	1.7	2.2	1.9	1.3	1.8	1.7	0.0	1.4	2.4	1.7	2.3	1.5	1.0	1.1	2.7	1.9	2.4	78
aucune attente	7.5	6.6	7.3	1.0	2.7	1.4	7.7	4.2	7.1	16.2	19.0	16.6	0.0	1.0	0.8	8.1	5.3	7.2	231
N**	1'272	529	1'801	206	75	281	117	24	141	339	58	397	66	294	360	2'160	1'056	3'216	3'216
données manquantes	1'340	596	1'936	140	58	198	124	36	160	495	123	618	135	507	642	2'439	1'492	3'931	3'931
Statut légal du traitement/de la prise en charge*																			
suspension de la procédure, renoncement à infliger une peine, réprimande (art 19a ch. 2 Lstup)	0.5	0.4	0.5	1.1	3.0	1.7	2.0	0.0	1.6	9.5	6.5	9.1	3.1	1.3	1.7	2.2	1.1	1.8	51
abandon poursuite pénale si soumis à des mesures de protection contrôlées par un médecin (art 19a ch. 3 Lstup)	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
mesures concernant les délinquants anormaux (art 43 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
traitement des alcooliques et des toxicomanes (art 44 CPS)	1.6	1.1	1.5	0.6	0.0	0.4	2.0	0.0	1.6	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.4	0.6	1.2	32
irresponsabilité (art 10 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
responsabilité restreinte (art 11 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
exécution de mesures pr toxicomanes dans une maison d'éducation au travail (art 2a ord. 3 rel. au CPS RS 311.03)	0.4	0.0	0.3	1.7	0.0	1.2	1.0	4.8	1.6	4.6	2.2	4.3	0.0	0.0	0.0	1.2	0.2	0.9	24
autre	11.5	3.9	9.2	9.1	4.5	7.9	12.9	9.5	12.3	26.1	26.1	26.1	0.0	0.4	0.3	12.9	4.6	10.2	284
aucune mesure (traitement volontaire)	86.0	94.6	88.6	86.9	92.4	88.4	83.2	85.7	83.6	58.0	65.2	59.0	96.9	98.3	98.0	82.3	93.5	85.9	2'390
N**	1'117	465	1'582	175	66	241	101	21	122	283	46	329	65	237	302	1'878	904	2'782	2'782
données manquantes	1'495	660	2'155	171	67	238	140	39	179	551	135	686	136	564	700	2'721	1'644	4'365	4'365

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T11 Traitements/prises en charge avant l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2011)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge				N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Prises en charge antérieures*																				
non	45.5	41.6	44.4	17.7	16.0	17.2	48.6	57.4	50.4	76.5	78.5	76.9	71.8	66.3	67.3	52.3	52.2	52.2	3'081	
oui	54.5	58.4	55.6	82.3	84.0	82.8	51.4	42.6	49.6	23.5	21.5	23.1	28.2	33.7	32.7	47.7	47.8	47.8	2'816	
N**	2'137	910	3'047	294	119	413	208	54	262	732	158	890	142	614	756	3'825	2'072	5'897	5'897	
<i>données manquantes</i>	475	215	690	52	14	66	33	6	39	102	23	125	59	187	246	774	476	1'250	1'250	
Type de prise en charge***																				
traitement avec prescript. d'héroïne	1.7	1.1	1.5	4.1	3.9	4.1	2.5	5.6	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	1.8	1.3	1.7	37	
substitution (méthadone, subutex)	4.4	4.7	4.5	74.1	75.0	74.3	13.6	33.3	17.2	3.7	7.7	4.4	0.0	0.9	0.8	14.5	12.2	13.7	306	
autre tt médicam. des dépendances	6.9	8.0	7.3	8.3	9.2	8.6	4.9	0.0	4.0	4.5	11.5	5.6	0.0	0.9	0.8	6.6	6.9	6.7	149	
prise en charge ambulatoire	68.1	70.1	68.8	66.3	67.1	66.5	76.5	72.2	75.8	79.9	73.1	78.8	87.5	89.8	89.4	70.5	73.0	71.4	1'591	
traitement résidentiel	50.3	59.6	53.2	44.0	42.1	43.5	40.7	38.9	40.4	18.7	30.8	20.6	12.5	13.0	12.9	44.5	47.1	45.4	1'011	
sevrage	42.3	47.8	44.0	51.3	52.6	51.7	46.9	33.3	44.4	16.4	23.1	17.5	8.3	8.3	8.3	40.1	38.1	39.4	879	
groupe d'entraide ou d'auto-support	5.8	7.4	6.3	2.6	2.6	2.6	3.7	0.0	3.0	1.5	7.7	2.5	4.2	0.9	1.5	4.6	5.6	4.9	110	
autre(s)	2.7	1.8	2.4	1.6	0.0	1.1	1.2	5.6	2.0	5.2	3.8	5.0	12.5	6.5	7.6	2.9	3.0	3.0	66	
N**	967	448	1'415	193	76	269	81	18	99	134	26	160	24	108	132	1'473	756	2'229	2'229	
<i>données manquantes</i>	197	83	280	49	24	73	26	5	31	38	8	46	16	99	115	353	234	587	587	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de prise en charge antérieure. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T12 Substitution et autre traitement/prise en charge à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2011)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution ou prescription d'héroïne*																
non	97.9	97.2	97.6	48.6	46.0	47.8	91.8	87.5	91.0	99.7	98.6	99.5	93.9	93.1	93.7	4'051
oui	2.1	2.8	2.4	51.4	54.0	52.2	8.2	12.5	9.0	0.3	1.4	0.5	6.1	6.9	6.3	274
N**	1'771	775	2'546	243	100	343	170	40	210	623	148	771	3'076	1'249	4'325	4'325
données manquantes	841	350	1'191	103	33	136	71	20	91	211	33	244	1'322	498	1'820	1'820
Type de substitution***																
héroïne	5.4	0.0	3.6	1.6	1.9	1.7	7.1	20.0	10.5	0.0	0.0	0.0	2.7	2.4	2.6	7
méthadone	73.0	89.5	78.6	83.9	88.7	85.3	78.6	80.0	78.9	100.0	100.0	100.0	82.1	87.8	83.8	223
autres opiacés	13.5	10.5	12.5	13.7	7.5	11.9	14.3	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	13.0	8.5	11.7	31
autres substances	8.1	0.0	5.4	0.8	1.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.2	1.9	5
N**	37	19	56	124	53	177	14	5	19	2	2	4	184	82	266	266
données manquantes	1	3	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4	4	8	8
Autre prise en charge parallèle*																
non	92.1	88.6	91.1	86.4	77.9	84.1	84.0	95.2	85.8	93.6	88.0	92.8	91.7	88.3	90.8	2'353
oui	7.9	11.4	8.9	13.6	22.1	15.9	16.0	4.8	14.2	6.4	12.0	7.2	8.3	11.7	9.2	238
N**	1'168	483	1'651	177	68	245	106	21	127	299	50	349	1'896	695	2'591	2'591
données manquantes	1'444	642	2'086	169	65	234	135	39	174	535	131	666	2'502	1'052	3'554	3'554
Type de la prise en charge parallèle****																
prise en charge ambulatoire	60.9	46.3	55.3	65.2	71.4	67.6	41.2	100.0	44.4	52.6	50.0	52.0	57.6	53.2	56.1	129
traitement résidentiel	12.6	13.0	12.8	13.0	7.1	10.8	17.6	0.0	16.7	5.3	0.0	4.0	11.9	11.4	11.7	27
groupe d'entraide ou d'auto-support	6.9	3.7	5.7	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	4.6	2.5	3.9	9
autre(s)	25.3	38.9	30.5	21.7	21.4	21.6	41.2	0.0	38.9	42.1	50.0	44.0	29.8	34.2	31.3	72
N**	87	54	141	23	14	37	17	1	18	19	6	25	151	79	230	230
données manquantes	5	1	6	1	1	2	0	0	0	0	0	0	6	2	8	8

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de substitution. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pris-e-s en charge parallèlement. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T13a Admission suite à une cure de sevrage, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2011)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Admission suite à une cure de sevrage*																
non	77.9	76.0	77.3	86.2	89.2	87.0	86.2	81.0	85.4	96.5	94.3	96.2	82.7	80.4	82.1	2'213
sevrage dans la même institution	0.7	1.4	0.9	1.6	0.0	1.1	0.9	4.8	1.5	0.9	1.9	1.1	0.8	1.4	1.0	26
sevrage dans une autre institution	21.5	22.6	21.8	12.2	10.8	11.8	12.9	14.3	13.1	2.5	3.8	2.7	16.5	18.3	17.0	457
N**	1'201	517	1'718	188	74	262	116	21	137	317	53	370	1'957	739	2'696	2'696
données manquantes	1'411	608	2'019	158	59	217	125	39	164	517	128	645	2'441	1'008	3'449	3'449

T13b Fréquence des sevrages sans aide professionnelle avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2011)

Fréq. sevrages sans accompagnement*	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
jamais	64.5	58.6	62.8	15.4	28.6	18.5	52.3	75.0	55.8	68.0	67.7	68.0	60.1	59.2	59.9	802
une fois	8.6	7.8	8.4	11.0	3.6	9.2	9.2	8.3	9.1	14.9	9.7	14.2	10.0	7.9	9.5	127
deux ou trois fois	9.0	12.3	9.9	13.2	17.9	14.3	12.3	8.3	11.7	8.2	12.9	8.9	9.2	11.7	9.9	132
plus de trois fois	17.9	21.3	18.9	60.4	50.0	58.0	26.2	8.3	23.4	8.8	9.7	8.9	20.7	21.3	20.8	279
N**	591	244	835	91	28	119	65	12	77	194	31	225	997	343	1'340	1'340
données manquantes	2'021	881	2'902	255	105	360	176	48	224	640	150	790	3'401	1'404	4'805	4'805

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T14 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2011)

Tous patients et patientes									
Problème principal*	Hommes	Femmes	Total	N		Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%			%	%	%	
alcool	59.4	64.4	60.8	3'737	alcool	59.4	64.4	60.8	3'737
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.3	0.3	0.3	16	cocktails	0.3	0.3	0.3	16
héroïne	6.0	6.2	6.1	374	opiacés	7.6	7.3	7.5	463
méthadone	1.2	0.9	1.1	68					
autres opiacés	0.4	0.3	0.3	21					
cocaïne	5.5	3.4	4.9	301	cocaïne et dérivés	5.5	3.4	4.9	301
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	0					
amphétamines	0.5	1.0	0.7	40	stimulants	0.8	1.5	1.0	62
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.3	0.6	0.3	21					
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	1					
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0	médicaments	0.6	1.2	0.8	49
benzodiazépines	0.6	1.0	0.7	42					
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.2	0.1	7					
LSD	0.0	0.0	0.0	2	hallucinogènes	0.1	0.0	0.0	3
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	1					
cannabis	19.0	10.4	16.5	1'015	cannabis	19.0	10.4	16.5	1'015
tabac	1.8	4.1	2.5	152	tabac	1.8	4.1	2.5	152
substances volatiles	0.1	0.1	0.1	4	autres substances	1.0	0.9	1.0	59
autre substance	0.9	0.8	0.9	55					
jeu pathologique	1.9	0.9	1.6	101	troubles assimilables à une addiction	4.0	6.5	4.7	288
troubles alimentaires	0.1	3.5	1.1	68					
autres troubles assimilables à une addiction	1.9	2.0	1.9	119					
N**	4'398	1'747	6'145	6'145		4'398	1'747	6'145	6'145
<i>données manquantes</i>	0	0	0	0		0	0	0	0

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2011), hommes

Patients: principale substance posant problème										
Hommes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	30.2	50.0	26.3	41.3	26.1	40.0	100.0	26.0	6.0	60.0
1 jour par semaine ou moins	8.3	0.0	12.9	20.0	26.1	0.0	0.0	21.4	1.5	20.0
2 à 3 jours par semaine	13.5	12.5	6.9	18.1	21.7	0.0	0.0	18.2	3.0	0.0
4 à 6 jours par semaine	10.7	0.0	9.2	9.0	4.3	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0
une fois par jour	8.7	25.0	21.2	3.2	0.0	5.0	0.0	7.1	6.0	0.0
plusieurs fois par jour	28.7	12.5	23.5	8.4	21.7	55.0	0.0	20.0	83.6	20.0
N**	1'660	8	217	155	23	20	2	631	67	5
<i>données manquantes</i>	952	3	118	86	12	8	1	203	13	39
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	8.2	28.6	13.1	11.9	12.5	9.1	0.0	6.9	0.0	12.5
1 jour par semaine ou moins	8.0	14.3	10.7	27.7	25.0	9.1	100.0	25.8	1.4	16.7
2 à 3 jours par semaine	15.9	14.3	10.3	27.7	29.2	9.1	0.0	18.3	4.2	8.3
4 à 6 jours par semaine	13.2	14.3	12.1	15.7	4.2	0.0	0.0	10.9	1.4	4.2
une fois par jour	12.3	14.3	25.2	4.4	0.0	18.2	0.0	9.3	5.6	8.3
plusieurs fois par jour	42.4	14.3	28.5	12.6	29.2	54.5	0.0	28.8	87.5	50.0
N**	1'663	7	214	159	24	22	1	605	72	24
<i>données manquantes</i>	949	4	121	82	11	6	2	229	8	20

T15.1b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2011), hommes

Patients: problème principal			
Hommes	Jeux pathologiques	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	49.1	0.0	16.1
1 jour par semaine ou moins	18.9	20.0	7.1
2 à 3 jours par semaine	7.5	20.0	12.5
4 à 6 jours par semaine	9.4	40.0	1.8
1 fois par jour	5.7	0.0	21.4
plusieurs fois par jour	9.4	20.0	41.1
N**	53	5	56
<i>données manquantes</i>	32	1	28
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	12.8	0.0	7.0
1 jour par semaine ou moins	30.8	0.0	5.3
2 à 3 jours par semaine	12.8	25.0	8.8
4 à 6 jours par semaine	20.5	50.0	7.0
1 fois par jour	12.8	0.0	21.1
plusieurs fois par jour	10.3	25.0	50.9
N**	39	4	57
<i>données manquantes</i>	46	2	27

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.2a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2011), femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	24.4	20.0	22.0	20.0	21.4	37.5	.	28.5	1.5	0.0
1 jour par semaine ou moins	10.7	60.0	14.3	20.0	28.6	6.3	.	23.4	0.0	0.0
2 à 3 jours par semaine	14.0	0.0	11.0	25.7	50.0	0.0	.	12.4	1.5	40.0
4 à 6 jours par semaine	14.0	0.0	8.8	14.3	0.0	0.0	.	7.3	3.0	20.0
une fois par jour	7.9	0.0	17.6	8.6	0.0	12.5	.	5.8	4.5	20.0
plusieurs fois par jour	29.0	20.0	26.4	11.4	0.0	43.8	.	22.6	89.6	20.0
N**	721	5	91	35	14	16	0	137	67	5
données manquantes	404	0	37	25	13	5	0	44	5	10
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	6.1	0.0	10.5	8.1	0.0	6.7	.	3.0	3.0	9.1
1 jour par semaine ou moins	9.0	25.0	14.0	18.9	31.3	13.3	.	32.6	0.0	0.0
2 à 3 jours par semaine	14.6	50.0	14.0	29.7	50.0	0.0	.	15.6	1.5	27.3
4 à 6 jours par semaine	16.4	0.0	11.6	16.2	6.3	0.0	.	8.1	1.5	9.1
une fois par jour	11.4	0.0	19.8	10.8	6.3	6.7	.	7.4	4.5	27.3
plusieurs fois par jour	42.6	25.0	30.2	16.2	6.3	73.3	.	33.3	89.4	27.3
N**	721	4	86	37	16	15	0	135	66	11
données manquantes	404	1	42	23	11	6	0	46	6	4

T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2011), femmes

Patients: problème principal			
Femmes	Jeux pathologiques	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	70.0	5.0	15.0
1 jour par semaine ou moins	10.0	2.5	20.0
2 à 3 jours par semaine	10.0	7.5	20.0
4 à 6 jours par semaine	10.0	10.0	0.0
1 fois par jour	0.0	7.5	5.0
plusieurs fois par jour	0.0	67.5	40.0
N**	10	40	20
données manquantes	6	22	15
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	57.1	2.6	10.0
1 jour par semaine ou moins	14.3	5.1	20.0
2 à 3 jours par semaine	14.3	5.1	15.0
4 à 6 jours par semaine	14.3	12.8	5.0
1 fois par jour	0.0	5.1	5.0
plusieurs fois par jour	0.0	69.2	45.0
N**	7	39	20
données manquantes	9	23	15

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.3a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2011), hommes & femmes

Patientes: principale substance posant problème										
<i>Hommes & femmes</i>	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	28.4	38.5	25.0	37.4	24.3	38.9	100.0	26.4	3.7	30.0
1 jour par semaine ou moins	9.0	23.1	13.3	20.0	27.0	2.8	0.0	21.7	0.7	10.0
2 à 3 jours par semaine	13.6	7.7	8.1	19.5	32.4	0.0	0.0	17.2	2.2	20.0
4 à 6 jours par semaine	11.7	0.0	9.1	10.0	2.7	0.0	0.0	7.3	1.5	10.0
une fois par jour	8.4	15.4	20.1	4.2	0.0	8.3	0.0	6.9	5.2	10.0
plusieurs fois par jour	28.8	15.4	24.4	8.9	13.5	50.0	0.0	20.4	86.6	20.0
N**	2'381	13	308	190	37	36	2	768	134	10
<i>données manquantes</i>	1'356	3	155	111	25	13	1	247	18	49
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	7.6	18.2	12.3	11.2	7.5	8.1	0.0	6.2	1.4	11.4
1 jour par semaine ou moins	8.3	18.2	11.7	26.0	27.5	10.8	100.0	27.0	0.7	11.4
2 à 3 jours par semaine	15.5	27.3	11.3	28.1	37.5	5.4	0.0	17.8	2.9	14.3
4 à 6 jours par semaine	14.2	9.1	12.0	15.8	5.0	0.0	0.0	10.4	1.4	5.7
une fois par jour	12.0	9.1	23.7	5.6	2.5	13.5	0.0	8.9	5.1	14.3
plusieurs fois par jour	42.4	18.2	29.0	13.3	20.0	62.2	0.0	29.6	88.4	42.9
N**	2'384	11	300	196	40	37	1	740	138	35
<i>données manquantes</i>	1'353	5	163	105	22	12	2	275	14	24

T15.3b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2011), hommes & femmes

Patientes: problème principal			
<i>Hommes & femmes</i>	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	52.4	4.4	15.8
1 jour par semaine ou moins	17.5	4.4	10.5
2 à 3 jours par semaine	7.9	8.9	14.5
4 à 6 jours par semaine	9.5	13.3	1.3
1 fois par jour	4.8	6.7	17.1
plusieurs fois par jour	7.9	62.2	40.8
N**	63	45	76
<i>données manquantes</i>	38	23	43
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	19.6	2.3	7.8
1 jour par semaine ou moins	28.3	4.7	9.1
2 à 3 jours par semaine	13.0	7.0	10.4
4 à 6 jours par semaine	19.6	16.3	6.5
1 fois par jour	10.9	4.7	16.9
plusieurs fois par jour	8.7	65.1	49.4
N**	46	43	77
<i>données manquantes</i>	55	25	42

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T16.1a Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2011), hommes

Patients: principale substance posant problème										
Hommes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	16.0	21.1	21.2	21.5	20.1	29.9	18.0	14.7	15.4	21.1
écart-type	3.5	11.5	5.9	6.2	5.6	14.2	.	2.0	2.9	8.4
1er quartile	14.0	14.0	17.0	18.0	16.0	18.0	18.0	14.0	13.0	15.0
valeur médiane	16.0	17.0	20.0	20.0	18.0	27.5	18.0	15.0	15.5	18.0
3e quartile	17.0	23.0	24.0	24.0	23.0	39.0	18.0	16.0	17.0	29.0
N*	1'021	7	190	136	21	14	1	639	40	15
données manquantes	1'591	4	145	105	14	14	2	195	40	29
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	22.6	24.6	22.2	23.6	20.8	33.2	.	15.9	17.6	20.0
écart-type	8.4	12.8	6.4	6.6	5.5	13.4	.	2.7	4.1	7.1
1er quartile	17.0	18.0	18.0	19.0	18.0	25.0	.	15.0	14.0	17.0
valeur médiane	20.0	20.0	20.0	22.0	18.0	30.0	.	15.0	16.5	18.0
3e quartile	25.0	26.0	25.0	26.0	23.0	39.0	.	17.0	20.0	20.0
N*	1'043	5	178	125	17	13	0	528	42	10
données manquantes	1'569	6	157	116	18	15	3	306	38	34
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	32.3	25.2	22.9	25.0	21.7	29.4	18.0	16.8	20.5	26.4
écart-type	11.9	12.8	6.3	7.1	5.3	11.4	.	3.7	9.4	8.3
1er quartile	23.0	18.0	18.0	20.0	18.0	19.5	18.0	15.0	15.0	18.0
valeur médiane	30.0	21.0	21.0	24.0	21.0	26.0	18.0	16.0	18.0	28.0
3e quartile	40.0	28.0	25.5	29.0	26.0	38.5	18.0	17.0	23.0	35.0
N*	881	5	144	130	19	8	1	515	43	7
données manquantes	1'731	6	191	111	16	20	2	319	37	37
Période de latence (en années)**										
moyenne	24.8	.	9.4	8.0	4.7	9.3	1.4	4.9	15.7	12.2
écart-type	13.2	.	9.8	5.6	5.0	11.7	.	6.4	16.4	17.3
1er quartile	14.1	.	2.8	3.3	0.8	2.3	1.4	1.4	2.9	2.9
valeur médiane	24.3	.	5.3	6.6	3.1	7.2	1.4	2.7	9.2	4.5
3e quartile	34.6	.	10.7	11.8	6.5	7.3	1.4	5.1	27.2	14.4
N*	466	0	37	75	13	5	1	482	28	8
données manquantes	507	0	15	26	7	0	0	78	22	13

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1b Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2011), femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	18.1	16.5	20.6	18.2	15.9	34.1	.	14.6	16.0	21.8
écart-type	6.3	2.1	5.8	3.8	2.3	13.0	.	2.0	4.4	11.0
1er quartile	15.0	15.0	16.0	16.0	14.0	28.0	.	13.0	13.0	16.0
valeur médiane	16.5	16.5	19.0	17.0	16.0	33.5	.	14.0	15.5	18.0
3e quartile	20.0	18.0	24.0	19.0	17.0	44.0	.	16.0	17.0	20.0
N*	392	2	80	33	15	10	0	138	42	5
données manquantes	733	3	48	27	12	11	0	43	30	10
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	27.1	20.0	21.9	19.9	16.8	33.5	.	15.5	19.2	19.0
écart-type	10.4	7.1	6.0	4.1	2.3	12.2	.	2.1	8.8	4.0
1er quartile	19.0	15.0	18.0	18.0	15.0	28.0	.	14.0	14.0	18.0
valeur médiane	25.0	20.0	20.0	19.0	17.0	33.0	.	15.0	17.0	18.0
3e quartile	34.0	25.0	25.0	22.0	18.0	44.0	.	16.0	21.0	20.0
N*	427	2	69	29	15	10	0	110	43	5
données manquantes	698	3	59	31	12	11	0	71	29	10
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	35.8	.	21.9	20.0	16.3	40.0	.	16.2	21.1	31.8
écart-type	11.9	.	6.5	3.5	1.7	14.0	.	2.9	10.9	15.0
1er quartile	26.0	.	17.0	17.0	15.0	30.0	.	15.0	14.0	19.0
valeur médiane	36.0	.	20.0	20.0	16.5	44.0	.	16.0	17.0	30.5
3e quartile	44.0	.	25.0	22.0	18.0	49.0	.	17.0	24.0	44.5
N*	423	0	58	31	12	7	0	121	44	4
données manquantes	702	5	70	29	15	14	0	60	28	11
Période de latence (en années)**										
moyenne	25.4	0.1	4.1	5.2	4.1	5.5	.	4.3	16.6	1.5
écart-type	12.5	.	3.5	3.7	2.6	3.2	.	5.4	15.5	1.6
1er quartile	15.9	0.1	0.8	2.7	1.9	3.5	.	1.2	2.6	0.3
valeur médiane	25.5	0.1	3.0	4.7	3.1	6.4	.	2.4	13.1	1.5
3e quartile	34.2	0.1	7.0	7.0	7.0	7.5	.	4.7	29.3	2.7
N*	162	1	15	19	10	4	0	106	29	2
données manquantes	217	0	3	12	5	1	0	18	13	2

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1c Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2011), hommes & femmes

Patient-e-s: principale substance posant problème										
<i>Hommes & femmes</i>	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	16.6	20.1	21.0	20.9	18.4	31.7	18.0	14.7	15.7	21.3
écart-type	4.6	10.2	5.9	6.0	4.9	13.6	.	2.0	3.7	8.8
1er quartile	15.0	15.0	17.0	17.0	15.0	18.5	18.0	14.0	13.0	15.5
valeur médiane	16.0	17.0	20.0	19.0	16.0	30.0	18.0	15.0	15.5	18.0
3e quartile	18.0	19.0	24.0	23.0	20.5	41.5	18.0	16.0	17.0	28.5
N*	1'413	9	270	169	36	24	1	777	82	20
<i>données manquantes</i>	2'324	7	193	132	26	25	2	238	70	39
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	23.9	23.3	22.1	22.9	18.9	33.3	.	15.9	18.4	19.7
écart-type	9.2	11.1	6.3	6.3	4.7	12.6	.	2.6	6.9	6.1
1er quartile	18.0	15.0	18.0	18.0	16.0	25.0	.	14.0	14.0	17.0
valeur médiane	20.0	20.0	20.0	21.0	18.0	31.0	.	15.0	17.0	18.0
3e quartile	28.0	26.0	25.0	26.0	21.0	40.0	.	17.0	20.0	20.0
N*	1'470	7	247	154	32	23	0	638	85	15
<i>données manquantes</i>	2'267	9	216	147	30	26	3	377	67	44
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	33.4	25.2	22.6	24.1	19.6	34.3	18.0	16.7	20.8	28.4
écart-type	12.0	12.8	6.3	6.9	5.0	13.4	.	3.5	10.1	10.8
1er quartile	24.0	18.0	18.0	18.0	17.0	21.0	18.0	15.0	15.0	18.0
valeur médiane	30.5	21.0	20.0	23.0	18.0	35.0	18.0	16.0	17.0	28.0
3e quartile	41.0	28.0	25.0	28.0	22.0	45.0	18.0	17.0	23.0	35.0
N*	1'304	5	202	161	31	15	1	636	87	11
<i>données manquantes</i>	2'433	11	261	140	31	34	2	379	65	48
Période de latence (en années)**										
moyenne	25.0	0.1	7.9	7.4	4.4	7.6	1.4	4.8	16.1	10.1
écart-type	13.0	.	8.8	5.4	4.1	8.7	.	6.3	15.8	15.9
1er quartile	14.8	0.1	2.3	3.3	1.4	2.3	1.4	1.4	2.6	2.4
valeur médiane	24.4	0.1	5.1	6.3	3.1	6.7	1.4	2.7	10.9	3.5
3e quartile	34.5	0.1	9.8	10.7	7.0	7.3	1.4	5.1	29.3	11.2
N*	628	1	52	94	23	9	1	588	57	10
<i>données manquantes</i>	724	0	18	38	12	1	0	96	35	15

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2a Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2011), hommes

Patients: problème principal			
Hommes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	24.4	18.0	18.7
écart-type	9.3	2.8	10.3
1er quartile	20.0	16.0	13.0
valeur médiane	23.0	18.0	14.0
3e quartile	28.0	20.0	20.0
N*	27	2	25
<i>données manquantes</i>	58	4	59
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	28.1	22.7	21.0
écart-type	8.7	6.7	10.1
1er quartile	24.0	17.0	14.0
valeur médiane	27.0	21.0	17.5
3e quartile	32.5	30.0	25.0
N*	28	3	34
<i>données manquantes</i>	57	3	50
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	30.9	24.5	23.1
écart-type	9.0	7.8	11.1
1er quartile	27.0	19.0	15.0
valeur médiane	30.0	24.5	19.0
3e quartile	35.0	30.0	26.0
N*	30	2	36
<i>données manquantes</i>	55	4	48
Période de latence (en années)**			
moyenne	12.7	3.9	6.5
écart-type	10.4	2.1	5.8
1er quartile	4.5	2.4	2.2
valeur médiane	7.7	3.9	4.1
3e quartile	17.8	5.4	10.0
N*	26	2	25
<i>données manquantes</i>	59	4	59

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2b Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2011), femmes

Patientes: problème principal			
Femmes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	28.3	16.9	28.3
écart-type	11.4	3.7	16.6
1er quartile	21.0	15.0	16.5
valeur médiane	24.0	17.0	24.5
3e quartile	35.5	18.0	35.5
N*	4	31	12
données manquantes	12	31	23
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	30.8	17.7	28.3
écart-type	14.6	3.4	15.9
1er quartile	29.0	16.0	19.0
valeur médiane	33.0	17.0	25.0
3e quartile	36.0	19.0	34.0
N*	5	31	13
données manquantes	11	31	22
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	37.0	19.3	28.8
écart-type	9.6	4.6	15.1
1er quartile	30.0	17.0	20.0
valeur médiane	33.0	18.5	26.5
3e quartile	48.0	21.5	35.0
N*	3	36	14
données manquantes	13	26	21
Période de latence (en années)**			
moyenne	15.2	10.6	4.5
écart-type	8.2	8.2	4.9
1er quartile	10.0	3.3	1.6
valeur médiane	14.8	9.3	3.0
3e quartile	20.4	16.6	5.6
N*	4	31	12
données manquantes	12	31	23

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2c Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2011), hommes & femmes

Patients: problème principal			
Hommes & femmes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	24.9	16.9	21.8
écart-type	9.5	3.6	13.3
1er quartile	20.0	15.0	13.0
valeur médiane	23.0	17.0	16.0
3e quartile	28.0	18.0	26.0
N*	31	33	37
<i>données manquantes</i>	70	35	82
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	28.5	18.2	23.0
écart-type	9.5	3.9	12.2
1er quartile	24.0	16.0	14.0
valeur médiane	28.0	17.0	18.0
3e quartile	33.0	20.0	27.0
N*	33	34	47
<i>données manquantes</i>	68	34	72
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	31.4	19.6	24.7
écart-type	9.1	4.8	12.5
1er quartile	27.0	17.0	15.0
valeur médiane	30.0	19.0	21.0
3e quartile	35.0	22.0	28.0
N*	33	38	50
<i>données manquantes</i>	68	30	69
Période de latence (en années)**			
moyenne	13.0	10.2	5.9
écart-type	10.1	8.1	5.5
1er quartile	5.0	3.3	1.9
valeur médiane	9.6	9.3	4.0
3e quartile	17.8	16.3	8.3
N*	30	33	37
<i>données manquantes</i>	71	35	82

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T17 Mode d'administration de la principale substance posant problème au cours des 6 derniers mois avant l'admission (2011)

Patient-e-s: principale substance posant problème															
	Héroïne			Cocaïne			Amphétamines			Cannabis			Benzodiazépines		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Mode d'administration*															
injection	31.0	25.8	29.3	3.6	16.1	5.9	15.4	0.0	8.3	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0
fumée/inhalation	42.1	51.6	45.2	13.7	16.1	14.1	0.0	18.2	8.3	99.3	97.7	99.0	0.0	0.0	0.0
ingestion (manger/boire)	3.2	0.0	2.1	1.4	0.0	1.2	53.8	36.4	45.8	0.4	0.8	0.4	91.7	100.0	95.0
sniff	23.8	22.6	23.4	81.3	67.7	78.8	30.8	45.5	37.5	0.4	0.0	0.3	8.3	0.0	5.0
autre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0
N**	126	62	188	139	31	170	13	11	24	543	133	676	12	8	20
<i>données manquantes</i>	140	46	186	102	29	131	10	6	16	291	48	339	13	9	22

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T18 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 6 derniers mois avant l'admission des injections, échange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois avant l'admission et âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2011)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Injections au cours de la vie*																
oui	5.4	5.2	5.3	64.3	54.8	61.7	9.5	19.0	11.6	3.4	4.0	3.5	10.0	9.2	9.8	399
non	94.6	94.8	94.7	35.7	45.2	38.3	90.5	81.0	88.4	96.6	96.0	96.5	90.0	90.8	90.2	3'691
N**	1'654	699	2'353	244	93	337	148	42	190	656	150	806	2'941	1'149	4'090	4'090
données manquantes	958	426	1'384	102	40	142	93	18	111	178	31	209	1'457	598	2'055	2'055
Injections au cours des 6 derniers mois*																
oui	0.9	0.3	0.7	34.9	28.2	33.0	7.4	11.9	8.4	2.1	2.0	2.1	4.1	3.0	3.8	154
non	99.1	99.7	99.3	65.1	71.8	67.0	92.6	88.1	91.6	97.9	98.0	97.9	95.9	97.0	96.2	3'895
N**	1'646	703	2'349	215	85	300	148	42	190	657	148	805	2'906	1'143	4'049	4'049
données manquantes	966	422	1'388	131	48	179	93	18	111	177	33	210	1'492	604	2'096	2'096
Injections au cours des 30 derniers jours*																
oui	0.2	0.3	0.2	26.1	19.0	24.1	4.5	11.6	6.1	0.2	0.0	0.1	2.2	1.8	2.1	90
non	99.8	99.7	99.8	73.9	81.0	75.9	95.5	88.4	93.9	99.8	100.0	99.9	97.8	98.2	97.9	4'164
N**	1'760	747	2'507	199	79	278	155	43	198	664	151	815	3'051	1'203	4'254	4'254
données manquantes	852	378	1'230	147	54	201	86	17	103	170	30	200	1'347	544	1'891	1'891
Echange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois***																
oui	0.0	0.0	0.0	12.5	20.0	13.8	0.0	100.0	28.6	0.0	0.0	0.0	7.4	25.0	10.3	10
non	100.0	100.0	100.0	87.5	80.0	86.2	100.0	0.0	71.4	100.0	100.0	100.0	92.6	75.0	89.7	87
N**	10	1	11	48	10	58	5	2	7	14	3	17	81	16	97	97
données manquantes	4	1	5	17	6	23	4	2	6	0	0	0	25	9	34	34
Age lors de la première injection****																
jusqu'à 14 ans	3.2	12.5	6.4	2.2	17.4	5.3	12.5	0.0	8.3	0.0	.	0.0	2.8	13.3	5.3	10
de 15 à 16 ans	16.1	12.5	14.9	14.3	13.0	14.0	25.0	25.0	25.0	11.1	.	11.1	15.9	15.6	15.8	30
de 17 à 18 ans	29.0	37.5	31.9	23.1	26.1	23.7	12.5	25.0	16.7	44.4	.	44.4	25.5	31.1	26.8	51
de 19 à 20 ans	9.7	12.5	10.6	24.2	4.3	20.2	0.0	25.0	8.3	22.2	.	22.2	18.6	8.9	16.3	31
de 21 à 25 ans	22.6	12.5	19.1	19.8	21.7	20.2	12.5	0.0	8.3	22.2	.	22.2	20.7	15.6	19.5	37
de 26 à 30 ans	6.5	6.3	6.4	12.1	13.0	12.3	12.5	25.0	16.7	0.0	.	0.0	9.7	11.1	10.0	19
de 31 à 39 ans	12.9	6.3	10.6	2.2	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	4.1	2.2	3.7	7
dès 40 ans	0.0	0.0	0.0	2.2	4.3	2.6	25.0	0.0	16.7	0.0	.	0.0	2.8	2.2	2.6	5
N**	31	16	47	91	23	114	8	4	12	9	0	9	145	45	190	190
données manquantes	58	20	78	66	28	94	6	4	10	13	6	19	148	61	209	209

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 6 derniers mois. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2011), hommes
Hommes

	Patients: principale substance posant problème									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool	-	55.6	32.4	42.4	23.3	30.4	50.0	23.4	10.2	44.8
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.4	-	6.2	0.5	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
héroïne	2.3	22.2	3.9	8.2	6.7	30.4	50.0	0.9	0.0	6.9
méthadone	1.7	44.4	21.6	5.4	6.7	17.4	0.0	0.0	0.0	3.4
autres opiacés	0.4	0.0	2.7	1.1	0.0	0.0	50.0	0.3	0.0	3.4
cocaïne	5.3	22.2	27.0	0.0	23.3	8.7	50.0	7.3	0.0	6.9
crack, freebase	0.2	0.0	0.8	0.5	0.0	0.0	50.0	0.1	0.0	0.0
amphétamines	1.4	11.1	5.4	8.7	10.0	0.0	100.0	4.9	0.0	6.9
MDMA et substances similaires (ecstasy)	1.1	11.1	4.2	11.4	3.3	0.0	50.0	4.8	0.0	3.4
autres stimulants	0.2	0.0	0.4	0.0	3.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
barbituriques	0.2	0.0	0.8	1.1	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	3.4
benzodiazépines	1.6	22.2	15.4	3.3	6.7	0.0	0.0	0.3	0.0	10.3
autres somnifères et tranquillisants	0.7	11.1	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
LSD	0.5	0.0	4.6	4.3	6.7	0.0	0.0	1.8	0.0	3.4
autres hallucinogènes	0.2	0.0	1.2	1.6	3.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
substances volatiles	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
cannabis	10.4	33.3	32.0	34.2	40.0	13.0	100.0	-	4.1	6.9
tabac	29.4	44.4	35.1	38.6	30.0	13.0	0.0	38.4	-	13.8
autres substances	0.4	0.0	2.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
jeu pathologique	0.4	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	6.9
troubles alimentaires	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.3	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.7	6.1	0.0
aucun autre problème addictif	59.4	0.0	23.9	22.8	26.7	43.5	0.0	43.0	79.6	27.6
N**	1'635	9	259	184	30	23	2	670	49	29
données manquantes	977	2	76	57	5	5	1	164	31	15

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2011), femmes
Femmes

	Patientes: principale substance posant problème									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool	-	50.0	30.6	45.1	31.6	35.3	.	20.0	10.5	40.0
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.3	-	5.1	0.0	5.3	0.0	.	0.0	0.0	0.0
héroïne	1.9	50.0	7.1	11.8	10.5	0.0	.	4.0	0.0	10.0
méthadone	1.4	0.0	26.5	3.9	0.0	5.9	.	1.3	0.0	10.0
autres opiacés	0.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
cocaïne	4.0	50.0	30.6	0.0	52.6	0.0	.	8.7	0.0	20.0
crack, freebase	0.0	0.0	1.0	0.0	5.3	0.0	.	0.7	0.0	0.0
amphétamines	0.9	25.0	4.1	17.6	26.3	0.0	.	6.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.4	25.0	3.1	21.6	26.3	0.0	.	8.7	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	1.0	2.0	5.3	0.0	.	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	3.7	25.0	18.4	7.8	5.3	0.0	.	1.3	1.8	10.0
autres somnifères et tranquillisants	1.7	0.0	2.0	3.9	0.0	0.0	.	0.0	0.0	10.0
LSD	0.1	25.0	3.1	13.7	31.6	0.0	.	6.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	25.0	0.0	9.8	15.8	0.0	.	0.7	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	.	0.7	1.8	0.0
cannabis	6.8	25.0	38.8	33.3	57.9	11.8	.	-	7.0	10.0
tabac	28.9	25.0	32.7	37.3	31.6	17.6	.	44.0	-	20.0
autres substances	0.4	0.0	2.0	3.9	0.0	5.9	.	0.7	0.0	0.0
jeu pathologique	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.7	0.0	0.0
troubles alimentaires	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	.	1.3	1.8	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	3.5	0.0
aucun autre problème addictif	61.3	25.0	19.4	19.6	5.3	29.4	.	36.7	75.4	50.0
N**	702	4	98	51	19	17	0	150	57	10
<i>données manquantes</i>	423	1	30	9	8	4	0	31	15	5

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2011), hommes & femmes
Hommes & femmes

	Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool	-	53.8	31.9	43.0	26.5	32.5	50.0	22.8	10.4	43.6
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.4	-	5.9	0.4	2.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
héroïne	2.2	30.8	4.8	8.9	8.2	17.5	50.0	1.5	0.0	7.7
méthadone	1.6	30.8	23.0	5.1	4.1	12.5	0.0	0.2	0.0	5.1
autres opiacés	0.4	0.0	2.5	0.9	0.0	0.0	50.0	0.2	0.0	2.6
cocaïne	4.9	30.8	28.0	0.0	34.7	5.0	50.0	7.6	0.0	10.3
crack, freebase	0.1	0.0	0.8	0.4	2.0	0.0	50.0	0.2	0.0	0.0
amphétamines	1.2	15.4	5.0	10.6	16.3	0.0	100.0	5.1	0.0	5.1
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.9	15.4	3.9	13.6	12.2	0.0	50.0	5.5	0.0	2.6
autres stimulants	0.1	0.0	0.6	0.4	4.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
barbituriques	0.2	0.0	0.6	0.9	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.6
benzodiazépines	2.2	23.1	16.2	4.3	6.1	0.0	0.0	0.5	0.9	10.3
autres somnifères et tranquillisants	1.0	7.7	1.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.6
LSD	0.4	7.7	4.2	6.4	16.3	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6
autres hallucinogènes	0.2	7.7	0.8	3.4	8.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.0
cannabis	9.3	30.8	33.9	34.0	46.9	12.5	100.0	-	5.7	7.7
tabac	29.3	38.5	34.5	38.3	30.6	15.0	0.0	39.4	-	15.4
autres substances	0.4	0.0	2.5	1.7	0.0	2.5	0.0	0.6	0.0	0.0
jeu pathologique	0.4	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	5.1
troubles alimentaires	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.3	0.0	0.6	0.0	2.0	0.0	0.0	0.6	4.7	0.0
aucun autre problème addictif	59.9	7.7	22.7	22.1	18.4	37.5	0.0	41.8	77.4	33.3
N**	2'337	13	357	235	49	40	2	820	106	39
données manquantes	1'400	3	106	66	13	9	1	195	46	20

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2011), hommes

Hommes

Patients: problème principal			
	Jeux pathologiques	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	9.3	0.0	6.6
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	1.6
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	1.9	20.0	3.3
tabac	13.0	20.0	4.9
autres substances	3.7	0.0	1.6
jeu pathologique	-	0.0	1.6
troubles alimentaires	0.0	-	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	1.9	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	75.9	80.0	86.9
N**	54	5	61
<i>données manquantes</i>	31	1	23

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2011), femmes

Femmes

	Patientes: problème principal		
	Jeux pathologiques	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	10.0	2.5	18.2
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	2.5	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	0.0	2.5	0.0
tabac	0.0	2.5	4.5
autres substances	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	-	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0	-	4.5
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	5.0	0.0
aucun autre problème addictif	90.0	87.5	77.3
N**	10	40	22
<i>données manquantes</i>	6	22	13

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2011), hommes & femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal		
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	9.4	2.2	9.6
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	2.2	1.2
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	1.6	4.4	2.4
tabac	10.9	4.4	4.8
autres substances	3.1	0.0	1.2
jeu pathologique	-	0.0	1.2
troubles alimentaires	0.0	-	1.2
autres troubles assimilables à une addiction	1.6	4.4	0.0
aucun autre problème addictif	78.1	86.7	84.3
N**	64	45	83
<i>données manquantes</i>	37	23	36

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T20 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2011)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation d'alcool*																
jamais	10.1	11.3	10.5	9.9	11.8	10.4	6.7	4.0	6.3	11.5	15.7	12.3	11.3	13.5	11.9	441
1 fois par mois ou moins	3.3	4.6	3.7	19.3	16.2	18.5	10.4	20.0	11.9	19.4	28.9	21.1	9.0	10.1	9.3	343
2 à 4 fois par mois	7.9	6.6	7.5	19.9	27.9	22.1	22.4	32.0	23.9	43.2	38.0	42.3	17.1	13.8	16.2	599
2 à 3 fois par semaine	16.4	15.4	16.1	19.9	32.4	23.3	36.6	28.0	35.2	18.6	10.7	17.2	18.2	16.5	17.7	655
4 fois ou plus par semaine	62.3	62.1	62.2	30.9	11.8	25.7	23.9	16.0	22.6	7.3	6.6	7.2	44.4	46.1	44.9	1'660
N**	1'667	710	2'377	181	68	249	134	25	159	532	121	653	2'677	1'021	3'698	3'698
<i>données manquantes</i>	945	415	1'360	165	65	230	107	35	142	302	60	362	1'721	726	2'447	2'447
Nbre de boissons standards par jour***																
1 ou 2	7.9	7.6	7.8	50.7	52.5	51.2	34.8	22.7	32.8	47.7	65.6	50.9	21.6	21.9	21.7	680
3 ou 4	18.4	18.9	18.6	27.7	29.5	28.2	43.5	45.5	43.8	34.3	24.7	32.6	23.8	20.9	23.0	722
5 ou 6	22.3	24.8	23.0	10.8	16.4	12.4	10.4	13.6	10.9	12.0	8.6	11.4	18.3	20.9	19.0	597
7 à 9	20.5	23.5	21.4	4.7	1.6	3.8	5.2	9.1	5.8	3.2	1.1	2.8	14.7	17.4	15.5	485
10 ou plus	30.8	25.2	29.2	6.1	0.0	4.3	6.1	9.1	6.6	2.8	0.0	2.3	21.5	18.8	20.8	652
N**	1'469	618	2'087	148	61	209	115	22	137	434	93	527	2'281	855	3'136	3'136
<i>données manquantes</i>	1'143	507	1'650	198	72	270	126	38	164	400	88	488	2'117	892	3'009	3'009
Fréquence de fortes consom. d'alcool***																
jamais	11.9	14.6	12.7	35.9	47.6	39.4	28.6	27.3	28.4	44.7	61.5	48.0	22.7	27.4	24.0	800
moins d'une fois par mois	11.2	9.4	10.6	28.8	22.2	26.9	25.2	27.3	25.5	30.7	22.0	29.0	17.3	13.1	16.1	538
1 fois par mois	11.5	10.8	11.3	13.7	19.0	15.3	16.8	27.3	18.4	14.0	11.0	13.5	12.3	11.4	12.0	401
1 fois par semaine	24.3	24.3	24.3	9.8	9.5	9.7	25.2	13.6	23.4	9.6	4.6	8.7	20.0	18.8	19.7	656
presque chaque jour	41.2	40.8	41.1	11.8	1.6	8.8	4.2	4.5	4.3	0.9	0.9	0.9	27.7	29.2	28.1	938
N**	1'533	649	2'182	153	63	216	119	22	141	456	109	565	2'403	930	3'333	3'333
<i>données manquantes</i>	1'079	476	1'555	193	70	263	122	38	160	378	72	450	1'995	817	2'812	2'812

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation d'alcool. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T21 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2011)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	31.1	35.9	32.6	2.7	3.6	3.0	10.7	13.8	11.3	16.6	14.5	16.2	24.0	28.7	25.3	704
1 jour par semaine ou moins	1.2	0.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	2.8	3.4	2.9	1.6	1.0	1.4	39
2 à 3 jours par semaine	1.0	1.3	1.1	0.7	0.0	0.5	0.8	0.0	0.7	3.0	3.4	3.1	1.6	1.6	1.6	45
4 à 6 jours par semaine	0.7	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	0.7	0.5	0.6	17
1 fois par jour	1.0	0.6	0.9	0.7	0.0	0.5	0.8	0.0	0.7	3.0	2.6	2.9	1.4	1.3	1.4	38
plusieurs fois par jour	65.0	60.9	63.7	95.9	96.4	96.1	86.8	86.2	86.7	73.5	76.1	74.0	70.8	66.9	69.7	1'938
N**	1'048	463	1'511	147	56	203	121	29	150	505	117	622	1'986	795	2'781	2'781
données manquantes	1'564	662	2'226	199	77	276	120	31	151	329	64	393	2'412	952	3'364	3'364
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10	15.3	19.5	16.5	12.0	14.6	12.7	20.8	14.3	19.7	50.1	46.2	49.4	25.9	25.2	25.7	480
11 à 20	44.2	50.2	45.9	47.2	56.3	49.7	43.6	57.1	45.9	39.0	45.2	40.2	42.8	47.6	44.1	824
21 à 30	28.9	24.9	27.8	30.4	20.8	27.7	21.8	23.8	22.1	7.8	7.5	7.7	22.3	22.0	22.3	416
31 ou plus	11.6	5.4	9.8	10.4	8.3	9.8	13.9	4.8	12.3	3.1	1.1	2.7	9.0	5.1	8.0	149
N**	640	257	897	125	48	173	101	21	122	387	93	480	1'361	508	1'869	1'869
données manquantes	82	40	122	18	6	24	7	4	11	34	7	41	149	59	208	208

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T22a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2011), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème										
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Objectif de consommation*										
abstinence définitive	33.9	80.0	78.1	82.1	83.3	70.6	100.0	51.8	75.0	66.7
abstinence limitée dans le temps	24.0	20.0	3.1	5.3	8.3	5.9	0.0	7.9	0.0	4.2
consommation contrôlée	28.1	0.0	11.3	6.3	8.3	17.6	0.0	21.7	16.7	12.5
aucune limitation envisagée	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	4.2
pas déterminé pour l'instant	11.0	0.0	3.8	6.3	0.0	5.9	0.0	15.0	8.3	8.3
autre	0.5	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
N**	1'045	5	160	95	12	17	1	253	12	24
données manquantes	1'567	6	175	146	23	11	2	581	68	20

T22b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2011), femmes

Objectif de consommation*										
abstinence définitive	36.6	100.0	80.6	55.6	87.5	36.4	.	55.0	75.0	37.5
abstinence limitée dans le temps	17.9	0.0	1.6	5.6	0.0	0.0	.	12.5	0.0	12.5
consommation contrôlée	32.4	0.0	4.8	5.6	12.5	36.4	.	17.5	25.0	0.0
aucune limitation envisagée	0.5	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	12.6	0.0	11.3	33.3	0.0	27.3	.	15.0	0.0	50.0
autre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
N**	429	2	62	18	8	11	0	40	8	8
données manquantes	696	3	66	42	19	10	0	141	64	7

T22c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2011), hommes & femmes

Objectif de consommation*										
abstinence définitive	34.7	85.7	78.8	77.9	85.0	57.1	100.0	52.2	75.0	59.4
abstinence limitée dans le temps	22.3	14.3	2.7	5.3	5.0	3.6	0.0	8.5	0.0	6.3
consommation contrôlée	29.4	0.0	9.5	6.2	10.0	25.0	0.0	21.2	20.0	9.4
aucune limitation envisagée	1.9	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1
pas déterminé pour l'instant	11.5	0.0	5.9	10.6	0.0	14.3	0.0	15.0	5.0	18.8
autres	0.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
N**	1'474	7	222	113	20	28	1	293	20	32
données manquantes	2'263	9	241	188	42	21	2	722	132	27

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23a Problèmes psychiques au cours de la vie (2011), hommes

Hommes

	Patients: problème principal									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*										
dépansions sévères	32.1	50.0	41.9	24.7	45.5	57.1	100.0	16.7	33.3	33.3
états anxieux/tension nerv. importants	24.1	25.0	43.4	32.5	27.3	71.4	0.0	17.6	33.3	50.0
diffic. compréhension/mémoire/concentr.	11.5	25.0	19.9	15.6	18.2	28.6	0.0	15.0	0.0	29.2
hallucinations	3.1	0.0	9.6	6.5	0.0	14.3	0.0	4.0	0.0	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	13.6	0.0	19.9	9.1	0.0	35.7	100.0	15.9	0.0	29.2
problèmes psychiques traités avec médic.	11.6	25.0	16.9	18.2	18.2	14.3	100.0	10.1	0.0	4.2
pensées suicidaires sérieuses	14.8	25.0	20.6	11.7	0.0	35.7	100.0	11.0	0.0	12.5
tentatives de suicide	7.0	25.0	14.0	7.8	0.0	21.4	100.0	3.5	0.0	0.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	2.2	0.0	1.5	7.8	0.0	0.0	0.0	0.9	33.3	0.0
aucun	41.0	50.0	28.7	37.7	36.4	7.1	0.0	51.5	33.3	25.0
N**	817	4	136	77	11	14	1	227	3	24
données manquantes	1'795	7	199	164	24	14	2	607	77	20

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23b Problèmes psychiques au cours de la vie (2011), femmes
Femmes

	Patientes: problème principal									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*										
dépansions sévères	51.4	66.7	36.5	25.0	33.3	90.0	.	32.5	40.0	66.7
états anxieux/tension nerv. importants	36.7	33.3	42.3	50.0	33.3	70.0	.	35.0	20.0	66.7
diffic. compréhension/mémoire/concentr.	15.9	0.0	17.3	18.8	16.7	30.0	.	22.5	0.0	33.3
hallucinations	3.5	0.0	0.0	12.5	16.7	10.0	.	7.5	0.0	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	9.2	0.0	7.7	25.0	16.7	20.0	.	10.0	0.0	16.7
problèmes psychiques traités avec médic.	25.1	33.3	26.9	43.8	16.7	20.0	.	20.0	40.0	16.7
pensées suicidaires sérieuses	19.1	66.7	26.9	31.3	50.0	50.0	.	17.5	20.0	50.0
tentatives de suicide	11.8	0.0	19.2	12.5	33.3	0.0	.	10.0	0.0	50.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	3.5	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	.	5.0	0.0	0.0
aucun	19.9	0.0	26.9	31.3	16.7	0.0	.	35.0	40.0	16.7
N**	346	3	52	16	6	10	0	40	5	6
données manquantes	779	2	76	44	21	11	0	141	67	9

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23c Problèmes psychiques au cours de la vie (2011), hommes & femmes
Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*										
dépansions sévères	37.8	57.1	40.4	24.7	41.2	70.8	100.0	19.1	37.5	40.0
états anxieux/tension nerv. importants	27.9	28.6	43.1	35.5	29.4	70.8	0.0	20.2	25.0	53.3
diffic. compréhension/mémoire/concentr.	12.8	14.3	19.1	16.1	17.6	29.2	0.0	16.1	0.0	30.0
hallucinations	3.2	0.0	6.9	7.5	5.9	12.5	0.0	4.5	0.0	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	12.3	0.0	16.5	11.8	5.9	29.2	100.0	15.0	0.0	26.7
problèmes psychiques traités avec médic.	15.6	28.6	19.7	22.6	17.6	16.7	100.0	11.6	25.0	6.7
pensées suicidaires sérieuses	16.1	42.9	22.3	15.1	17.6	41.7	100.0	12.0	12.5	20.0
tentatives de suicide	8.4	14.3	15.4	8.6	11.8	12.5	100.0	4.5	0.0	10.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	2.6	0.0	1.6	6.5	0.0	0.0	0.0	1.5	12.5	0.0
aucun	34.7	28.6	28.2	36.6	29.4	4.2	0.0	49.1	37.5	23.3
N**	1'163	7	188	93	17	24	1	267	8	30
<i>données manquantes</i>	<i>2'574</i>	<i>9</i>	<i>275</i>	<i>208</i>	<i>45</i>	<i>25</i>	<i>2</i>	<i>748</i>	<i>144</i>	<i>29</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24 Proches: Lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2011)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	N
lien avec la tierce personne*				
mère/père	34.4	27.9	29.2	285
filles/fils	21.5	14.3	15.8	154
sœur/frère	4.1	5.1	4.9	48
conjoint-e/partenaire	31.8	45.7	42.9	419
autre proche/parent-e	0.5	2.2	1.8	18
collègue/ami-e	2.6	2.4	2.5	24
employeur/se, enseignant-e	2.1	0.9	1.1	11
tuteur/trice, curateur/trice	0.0	0.1	0.1	1
autre	3.1	1.4	1.7	17
N**	195	782	977	977
<i>données manquantes</i>	6	19	25	25

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T25 Proches: problème principal et autres problèmes de la tierce personne (2011)

Proches					
	Total			Total	
	%	N		%	N
Problème principal de la tierce personne*			Autres problèmes de la tierce personne***		
alcool	65.1	637	alcool	31.5	118
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.6	6	cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0
héroïne	2.7	26	héroïne	2.7	10
méthadone	0.2	2	méthadone	2.9	11
autres opiacés (morphine, codéine, etc)	0.1	1	autres opiacés (morphine, codéine, etc)	0.3	1
cocaïne	2.9	28	cocaïne	5.9	22
crack, feebase	0.0	0	crack, feebase	0.0	0
amphétamines	0.2	2	amphétamines	2.1	8
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.5	5	MDMA et substances similaires (ecstasy)	2.1	8
autres stimulants (khat, etc)	0.0	0	autres stimulants (khat, etc)	0.5	2
barbituriques	1.8	18	barbituriques	0.0	0
benzodiazépines	0.2	2	benzodiazépines	4.0	15
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0	autres somnifères et tranquillisants	1.9	7
LSD	0.0	0	LSD	1.6	6
autres hallucinogènes	1.0	10	autres hallucinogènes	0.0	0
substances volatiles (solvants, etc)	0.2	2	substances volatiles (solvants, etc)	0.0	0
cannabis	11.8	115	cannabis	18.9	71
tabac	1.4	14	tabac	19.5	73
autre substance	0.3	3	autre substance	0.8	3
jeu pathologique	2.0	20	jeu pathologique	3.5	13
troubles alimentaires	2.7	26	troubles alimentaires	1.3	5
autre comportement de type addictif	6.2	61	autre comportement de type addictif	6.4	24
			aucun	26.7	100
N**	978	978	N**	375	375
<i>données manquantes</i>	24	24	<i>données manquantes</i>	625	625

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

*** Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T26 Proches: Propres problèmes des proches liés au problème de la tierce personne (2011)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	
propres problèmes*				
propres probl. de consom. de substances	7.8	12.1	11.4	42
propres comportements de type addictif	0.0	0.7	0.5	2
propres problèmes somatiques	1.6	2.6	2.4	9
propres problèmes psychiques	20.3	32.0	30.0	111
problèmes de couple	21.9	42.8	39.2	145
problèmes familiaux	57.8	51.6	52.7	195
problèmes financiers	3.1	7.5	6.8	25
problèmes liés à la profession/formation	6.3	3.6	4.1	15
problèmes de logement	6.3	6.5	6.5	24
problèmes de violence (victime)	7.8	6.5	6.8	25
problèmes à contrôler sa propre violence	3.1	0.3	0.8	3
problèmes juridiques	3.1	2.0	2.2	8
autre	1.6	1.3	1.4	5
aucun	29.7	13.4	16.2	60
N**	64	306	370	370
<i>données manquantes</i>	137	495	632	632

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T27 Sexe et âge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2011)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
Sexe*																			
hommes			70.9			74.0			82.2			83.8			19.5			64.6	4'407
femmes			29.1			26.0			17.8			16.2			80.5			35.4	2'410
sexe pas connu			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	2'589	1'063	3'652	355	125	480	222	48	270	735	142	877	200	826	1'026	4'407	2'410	6'817	6'817
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	7.0	5.4	1.5	0.4	0.6	1.3	0.7	1.1	73
15-19	1.9	1.9	1.9	2.5	8.8	4.2	2.7	12.5	4.4	56.3	60.6	57.0	6.1	2.9	3.5	12.1	7.5	10.5	712
20-24	4.0	2.3	3.5	8.5	21.6	11.9	9.5	33.3	13.7	14.1	12.7	13.9	4.6	4.9	4.8	6.8	6.5	6.7	456
25-29	7.3	5.5	6.7	17.5	17.6	17.5	29.7	29.2	29.6	10.7	9.2	10.5	5.6	4.9	5.0	10.0	6.9	8.9	604
30-34	9.9	5.4	8.6	16.1	22.4	17.7	23.4	14.6	21.9	6.3	2.1	5.6	7.1	7.8	7.7	10.4	7.2	9.3	629
35-39	10.1	8.9	9.8	20.8	12.0	18.5	15.8	0.0	13.0	2.4	2.8	2.5	6.6	9.0	8.6	9.7	8.6	9.3	635
40-44	13.8	14.0	13.9	18.9	9.6	16.5	12.2	4.2	10.7	2.4	2.1	2.4	12.2	12.8	12.7	12.0	12.1	12.0	817
45-49	13.8	16.2	14.5	8.7	5.6	7.9	4.5	6.3	4.8	1.8	2.8	1.9	12.2	19.8	18.3	10.7	15.6	12.4	845
50-54	13.9	15.2	14.3	5.9	1.6	4.8	2.3	0.0	1.9	0.3	0.0	0.2	11.7	15.4	14.7	9.8	12.7	10.9	739
55-59	11.6	12.0	11.7	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.3	12.8	8.9	9.6	7.7	8.9	8.2	555
60-64	7.0	8.5	7.4	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.5	5.4	4.6	5.9	5.1	344
65-69	3.8	6.2	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	3.9	4.4	2.7	4.2	3.2	218
70-74	2.1	2.4	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	2.7	3.0	1.5	2.1	1.7	117
75 et plus	0.8	1.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	3.6	1.2	1.7	0.7	1.0	0.8	55
N**	2'584	1'063	3'647	355	125	480	222	48	270	735	142	877	196	820	1'016	4'396	2'403	6'799	6'799
données manquantes	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10	11	7	18	18
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	45.7	48.2	46.4	36.1	31.0	34.8	32.8	27.3	31.8	21.9	21.4	21.8	46.4	45.8	46.0	39.6	43.5	41.0	
écart-type	13.0	12.8	13.0	8.9	8.9	9.2	7.6	7.6	7.9	8.4	8.3	8.4	16.2	13.3	13.9	15.1	14.8	15.1	
1er quartile	35.9	40.5	37.0	29.1	24.1	27.5	27.2	22.2	26.6	16.9	16.7	16.9	34.8	37.1	36.4	27.5	32.7	28.9	
valeur médiane	46.1	48.7	46.9	36.6	30.7	34.5	31.6	26.6	30.5	18.3	18.0	18.2	47.6	46.5	46.6	39.7	45.2	41.8	
3e quartile	55.1	57.0	55.8	42.5	36.7	41.5	37.7	30.1	37.0	24.5	23.0	24.2	57.8	54.0	54.5	51.1	53.8	52.1	
N**	2'584	1'063	3'647	355	125	480	222	48	270	735	142	877	196	820	1'016	4'396	2'403	6'799	
données manquantes	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10	11	7	18	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2011)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Etat civil*																			
célibataire	41.2	29.3	37.7	74.0	68.5	72.5	66.3	82.9	69.2	94.3	93.9	94.2	24.7	24.5	24.6	54.4	37.2	48.2	2'934
marié-e	30.6	32.9	31.3	12.9	10.8	12.3	19.2	2.4	16.2	3.4	3.0	3.3	61.5	51.3	53.3	25.4	34.5	28.7	1'744
séparé-e	5.9	5.2	5.7	2.9	5.4	3.6	3.6	4.9	3.8	0.3	0.0	0.3	3.3	4.2	4.0	4.3	4.6	4.4	267
divorcé-e	20.2	27.2	22.2	10.3	9.0	10.0	7.8	7.3	7.7	2.0	3.0	2.2	7.1	16.0	14.3	14.5	19.4	16.2	988
veuf/veuve	1.4	4.6	2.3	0.0	2.7	0.7	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.6	3.3	3.0	0.9	3.5	1.8	112
partenariat enregistré	0.7	0.8	0.7	0.0	3.6	0.9	2.6	2.4	2.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.7	0.9	0.6	0.8	0.7	42
N**	2'289	949	3'238	311	111	422	193	41	234	649	132	781	182	758	940	3'903	2'184	6'087	6'087
données manquantes	300	114	414	44	14	58	29	7	36	86	10	96	18	68	86	504	226	730	730
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	4.6	6.4	5.1	2.7	0.0	2.0	1.4	0.0	1.1	0.4	0.0	0.4	5.2	5.9	5.8	3.4	4.8	3.9	253
périphérie des grands centres	16.1	16.2	16.1	3.5	7.6	4.6	13.5	12.8	13.4	7.3	8.5	7.5	16.1	13.2	13.8	12.7	13.3	12.9	842
villes de moyenne importance	13.8	16.4	14.6	17.7	25.4	19.7	19.5	25.5	20.6	22.4	28.4	23.4	21.9	19.8	20.2	16.6	19.2	17.5	1'144
petites villes	35.0	33.6	34.6	50.4	44.1	48.8	44.7	36.2	43.1	37.3	41.1	38.0	26.0	32.7	31.4	37.5	35.1	36.7	2'396
campagne	30.4	27.4	29.6	25.7	22.9	24.9	20.9	25.5	21.8	32.6	22.0	30.8	30.7	28.3	28.8	29.8	27.6	29.0	1'895
N**	2'464	1'006	3'470	339	118	457	215	47	262	715	141	856	192	794	986	4'222	2'308	6'530	6'530
données manquantes	125	57	182	16	7	23	7	1	8	20	1	21	8	32	40	185	102	287	287

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2011)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de ménage*																			
seul-e en ménage	39.2	35.5	38.1	44.4	33.8	41.6	43.8	34.5	42.0	14.3	8.3	13.3	15.7	15.5	15.6	33.1	26.2	30.6	1'314
avec un ou les parents	6.8	3.8	5.9	13.6	16.9	14.5	14.1	17.2	14.6	65.7	61.5	65.0	9.4	6.9	7.4	19.9	10.9	16.6	715
avec enfant(s), sans partenaire	3.3	9.3	5.1	0.0	7.0	1.9	0.8	0.0	0.6	0.6	3.1	1.0	3.9	14.8	12.7	2.4	10.6	5.4	231
avec partenaire, sans enfant	26.1	30.4	27.4	11.6	14.1	12.3	19.5	13.8	18.5	5.0	7.3	5.3	22.8	25.2	24.8	20.1	24.9	21.9	939
avec partenaire et enfant(s)	16.7	16.0	16.5	11.6	14.1	12.3	14.8	13.8	14.6	2.2	1.0	2.0	41.7	35.7	36.9	14.9	21.4	17.3	742
avec d'autres proches	1.3	0.6	1.1	1.0	2.8	1.5	1.6	0.0	1.3	1.8	1.0	1.7	2.4	0.2	0.6	1.5	0.6	1.2	50
avec des amis (colocation)	2.0	1.2	1.7	2.5	0.0	1.9	0.8	10.3	2.5	2.0	2.1	2.0	0.8	0.7	0.8	1.9	1.6	1.8	76
autre	4.7	3.2	4.3	15.2	11.3	14.1	4.7	10.3	5.7	8.5	15.6	9.7	3.1	0.9	1.4	6.2	3.8	5.4	230
N**	1'579	664	2'243	198	71	269	128	29	157	504	96	600	127	535	662	2'753	1'544	4'297	4'297
données manquantes	1'010	399	1'409	157	54	211	94	19	113	231	46	277	73	291	364	1'654	866	2'520	2'520
Situation de domicile*																			
domicile fixe	93.5	94.2	93.7	77.3	89.0	80.2	88.6	75.8	86.1	91.4	90.0	91.2	97.8	98.4	98.3	91.8	94.8	92.9	4'342
sans domicile fixe	4.4	4.5	4.4	12.7	5.5	10.9	9.3	15.2	10.4	3.7	3.0	3.6	1.5	1.6	1.5	4.9	3.9	4.5	212
institution	2.1	1.2	1.8	10.0	5.5	8.9	2.1	9.1	3.5	5.0	7.0	5.3	0.7	0.0	0.1	3.3	1.4	2.6	121
N**	1'748	727	2'475	220	73	293	140	33	173	545	100	645	136	579	715	3'015	1'660	4'675	4'675
données manquantes	841	336	1'177	135	52	187	82	15	97	190	42	232	64	247	311	1'392	750	2'142	2'142
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	31.6	27.1	30.2	46.7	33.3	43.1	36.0	42.9	37.1	64.4	39.7	60.3	19.3	17.8	18.1	37.3	25.5	32.8	1'095
relations temporaires	3.5	6.1	4.3	8.0	3.7	6.9	10.8	4.8	9.8	7.3	20.6	9.5	0.9	1.9	1.7	4.6	5.1	4.8	161
partenaire fixe, vivant séparé	10.2	10.7	10.4	12.0	22.2	14.7	12.6	14.3	12.9	16.2	28.6	18.3	6.4	13.7	12.3	11.0	13.7	12.0	401
partenaire fixe, ménage commun	54.7	56.1	55.1	33.3	40.7	35.3	40.5	38.1	40.2	12.1	11.1	11.9	73.4	66.5	67.8	47.1	55.6	50.3	1'677
N**	1'246	560	1'806	150	54	204	111	21	132	315	63	378	109	466	575	2'068	1'266	3'334	3'334
données manquantes	1'343	503	1'846	205	71	276	111	27	138	420	79	499	91	360	451	2'339	1'144	3'483	3'483

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T30 Plus haute formation achevée, source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2011)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Plus haute formation achevée*																			
aucune form. achevée	6.0	8.4	6.7	9.5	12.0	10.1	2.2	14.3	4.3	20.0	14.2	19.0	10.2	4.8	5.9	9.6	8.3	9.2	367
scolarité obligatoire	13.4	14.3	13.6	29.4	42.7	32.8	17.8	32.1	20.2	53.2	64.2	55.1	11.1	12.1	11.9	23.1	20.5	22.2	890
scolarité complémentaire	2.6	5.2	3.3	3.2	4.0	3.4	1.5	0.0	1.2	1.9	7.5	2.9	2.8	4.6	4.2	2.5	4.7	3.2	130
apprentissage/école prof.	59.1	52.2	57.1	50.7	33.3	46.3	65.9	42.9	62.0	20.6	10.4	18.8	40.7	52.3	50.0	49.1	46.2	48.1	1'929
maturité/diplôme	3.7	4.9	4.0	2.3	5.3	3.0	5.9	3.6	5.5	2.1	1.9	2.1	5.6	5.5	5.5	3.6	5.5	4.3	171
école normale, pédagog.	0.7	2.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	1.9	4.1	3.7	0.5	2.4	1.2	47
form. profession. supérieure	6.7	5.7	6.4	1.8	2.7	2.0	4.4	0.0	3.7	1.7	0.9	1.6	16.7	6.6	8.6	5.9	5.2	5.7	227
école profession. supérieure	1.6	1.2	1.5	0.5	0.0	0.3	0.7	7.1	1.8	0.0	0.0	0.0	2.8	1.4	1.6	1.1	1.2	1.1	46
haute école spécialisée	2.0	1.7	1.9	0.5	0.0	0.3	0.7	0.0	0.6	0.2	0.9	0.3	1.9	1.8	1.8	1.5	1.5	1.5	59
université, haute école	4.2	3.9	4.1	2.3	0.0	1.7	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	6.5	6.8	6.8	3.1	4.5	3.6	144
N**	1'472	594	2'066	221	75	296	135	28	163	515	106	621	108	438	546	2'641	1'369	4'010	4'010
données manquantes	1'117	469	1'586	134	50	184	87	20	107	220	36	256	92	388	480	1'766	1'041	2'807	2'807
Source de revenu principale*																			
salaires	59.1	39.1	53.3	30.2	14.6	26.2	66.7	29.7	59.2	30.6	22.0	29.1	64.9	61.0	61.8	52.1	44.1	49.3	2'435
économies, épargne	0.8	1.5	1.0	0.4	0.0	0.3	0.7	0.0	0.5	0.3	0.0	0.3	0.7	1.0	0.9	0.6	1.0	0.7	37
rente (AVS, AI ou autre)	16.8	25.4	19.3	17.4	19.5	18.0	8.2	13.5	9.2	3.3	3.4	3.3	17.6	11.0	12.3	13.8	17.4	15.1	744
aide sociale	12.5	12.7	12.6	37.4	47.6	40.1	12.2	29.7	15.8	7.3	13.6	8.4	4.1	2.5	2.8	12.8	10.7	12.1	596
assurance-chômage	6.8	4.5	6.1	6.8	6.1	6.6	4.8	10.8	6.0	3.0	1.7	2.8	2.0	1.8	1.9	5.5	3.4	4.7	234
soutien du/de la partenaire	0.5	13.9	4.4	0.4	1.2	0.6	1.4	2.7	1.6	0.5	1.7	0.7	2.0	16.5	13.6	0.7	12.8	5.0	247
soutien parents/proches/amis	2.0	2.1	2.0	3.4	8.5	4.7	2.7	10.8	4.3	53.5	55.1	53.8	8.8	4.8	5.6	12.8	9.3	11.6	571
deal, combines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	3
autres revenus illégaux	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	4
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autre	1.5	0.9	1.3	3.8	2.4	3.5	2.7	2.7	2.7	1.0	2.5	1.3	0.0	1.2	0.9	1.5	1.2	1.4	70
N**	1'837	757	2'594	235	82	317	147	37	184	572	118	690	148	600	748	3'181	1'760	4'941	4'941
données manquantes	752	306	1'058	120	43	163	75	11	86	163	24	187	52	226	278	1'226	650	1'876	1'876
Taux d'activité principal*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	56.1	24.3	46.9	27.8	9.5	22.9	64.0	28.6	57.5	19.5	9.7	17.9	65.6	37.6	43.3	47.7	27.8	40.7	1'729
activité à temps partiel	5.1	21.9	10.0	5.9	5.4	5.7	4.0	17.9	6.5	2.3	1.9	2.3	1.6	31.4	25.3	4.3	21.6	10.4	444
plusieurs activités occas.	0.9	1.1	0.9	2.0	4.1	2.5	0.8	0.0	0.7	1.4	1.9	1.5	0.0	0.2	0.2	1.0	0.9	1.0	41.0
en formation	3.3	3.6	3.4	0.5	10.8	3.2	2.4	10.7	3.9	60.4	66.0	61.3	8.6	7.2	7.5	14.7	12.0	13.8	585
sans activité prof.	19.6	36.9	24.7	27.3	36.5	29.7	13.6	17.9	14.4	4.3	2.9	4.1	15.6	19.0	18.3	16.7	26.8	20.3	862
sans travail, en quête d'emploi	9.5	8.1	9.1	21.0	13.5	19.0	8.0	14.3	9.2	5.9	9.7	6.5	4.7	2.6	3.0	9.2	6.2	8.2	347
sans travail, futur emploi garanti	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	1.0	0.8	0.8	0.0	0.2	0.4	0.1	0.3	12
autre	5.3	4.2	5.0	14.6	20.3	16.1	7.2	10.7	7.8	5.5	6.8	5.7	3.1	2.0	2.2	6.0	4.5	5.4	231
N**	1'574	645	2'219	205	74	279	125	28	153	512	103	615	128	500	628	2'749	1'502	4'251	4'251
données manquantes	1'015	418	1'433	150	51	201	97	20	117	223	39	262	72	326	398	1'658	908	2'566	2'566

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2011)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	27.5	43.8	32.4	56.3	64.0	58.2	24.7	33.3	25.9	14.3	26.8	16.1	24.4	24.0	24.1	27.6	37.4	30.8	654
apprenti-e, stagiaire	1.7	0.6	1.4	0.6	6.0	1.9	4.1	6.7	4.5	29.4	39.0	30.8	2.2	2.6	2.5	6.8	4.3	6.0	127
manœuvre, aide	3.6	4.9	4.0	3.8	4.0	3.8	2.1	13.3	3.6	2.9	0.0	2.5	0.0	2.1	1.7	3.3	3.7	3.4	73
ouvrier/ère formé-e sur le tas	5.4	5.4	5.4	5.7	6.0	5.8	5.2	0.0	4.5	1.7	2.4	1.8	2.2	8.3	7.2	4.8	5.9	5.2	110
ouvrier/ère formé-e (CFC)	19.1	8.6	16.0	18.4	10.0	16.3	20.6	26.7	21.4	5.0	4.9	5.0	11.1	6.3	7.2	16.3	8.9	13.9	294
contremaître-sse	3.4	0.9	2.7	1.3	0.0	1.0	7.2	6.7	7.1	2.1	0.0	1.8	4.4	0.5	1.3	3.3	0.7	2.5	52
employé-e non qualifié-e	14.4	20.6	16.2	4.4	10.0	5.8	13.4	6.7	12.5	9.2	7.3	9.0	15.6	30.2	27.4	12.1	20.6	14.9	316
empl. qualifié-e, cadre moyen	10.6	7.2	9.5	3.8	0.0	2.9	6.2	0.0	5.4	3.4	0.0	2.9	26.7	9.9	13.1	9.0	6.8	8.3	176
employé-e, cadre supérieur	3.9	1.7	3.3	1.9	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.7	4.6	2.6	2.2	2.5	52
indépendant-e	8.7	3.7	7.2	1.9	0.0	1.4	14.4	0.0	12.5	3.4	0.0	2.9	4.4	8.9	8.0	7.4	4.3	6.4	136
écolier/ère, étudiant-e	1.1	2.3	1.5	0.0	0.0	0.0	2.1	6.7	2.7	27.7	19.5	26.5	4.4	2.6	3.0	5.9	5.0	5.6	119
autre statut	0.6	0.3	0.5	1.9	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.6	12
N**	815	349	1'164	158	50	208	97	15	112	238	41	279	45	192	237	1'426	695	2'121	2'121
<i>données manquantes</i>	<i>1'774</i>	<i>714</i>	<i>2'488</i>	<i>197</i>	<i>75</i>	<i>272</i>	<i>125</i>	<i>33</i>	<i>158</i>	<i>497</i>	<i>101</i>	<i>598</i>	<i>155</i>	<i>634</i>	<i>789</i>	<i>2'981</i>	<i>1'715</i>	<i>4'696</i>	<i>4'696</i>
Revenu mensuel net*																			
aucun revenu	27.2	46.5	32.4	35.4	39.1	36.1	25.0	50.0	30.0	47.7	80.0	52.2	16.7	11.4	12.2	32.9	39.9	34.8	394
moins de 1000 fr.	4.5	4.1	4.4	7.3	26.1	10.9	15.6	0.0	12.5	26.5	8.0	23.9	25.0	14.3	15.9	10.1	9.5	9.9	112
de 1001 à 2000 fr.	5.0	8.2	5.8	13.5	4.3	11.8	3.1	12.5	5.0	5.8	8.0	6.1	0.0	5.7	4.9	6.0	7.0	6.3	71
de 2001 à 3000 fr.	7.6	14.1	9.3	18.8	17.4	18.5	12.5	12.5	12.5	3.9	4.0	3.9	0.0	17.1	14.6	8.3	13.9	9.9	112
de 3001 à 4000 fr.	9.9	11.8	10.4	6.3	13.0	7.6	15.6	12.5	15.0	7.7	0.0	6.7	0.0	24.3	20.7	9.2	14.2	10.6	120
de 4001 à 5000 fr.	20.1	5.9	16.3	10.4	0.0	8.4	9.4	12.5	10.0	5.2	0.0	4.4	16.7	10.0	11.0	14.7	6.3	12.4	140
de 5001 à 6000 fr.	12.3	5.3	10.4	7.3	0.0	5.9	15.6	0.0	12.5	0.6	0.0	0.6	16.7	8.6	9.8	9.4	5.1	8.2	93
de 6001 à 8000 fr.	8.0	2.9	6.6	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.5	1.9	0.0	1.7	8.3	7.1	7.3	5.4	3.2	4.8	54
de 8001 à 10 000 fr.	2.8	0.6	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	16.7	1.4	3.7	2.2	0.6	1.8	20
de 10 001 à 15 000 fr.	2.2	0.0	1.6	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.0	11
plus de 15 000 fr.	0.4	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.4	4
N**	463	170	633	96	23	119	32	8	40	155	25	180	12	70	82	815	316	1'131	1'131
<i>données manquantes</i>	<i>2'126</i>	<i>893</i>	<i>3'019</i>	<i>259</i>	<i>102</i>	<i>361</i>	<i>190</i>	<i>40</i>	<i>230</i>	<i>580</i>	<i>117</i>	<i>697</i>	<i>188</i>	<i>756</i>	<i>944</i>	<i>3'592</i>	<i>2'094</i>	<i>5'686</i>	<i>5'686</i>

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2011)

Raison principale*	Patient-e-s: problème principal ¹									Proches			Toutes sorties			N			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total		Hommes	Femmes	Total
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
fin régulière sans transfert	47.6	45.4	47.0	27.7	29.8	28.2	42.3	36.2	41.3	61.4	64.8	61.9	68.5	67.9	68.0	49.3	53.8	50.9	3'434
fin régulière avec transfert	6.3	8.3	6.8	11.7	11.6	11.7	9.5	10.6	9.7	4.1	8.5	4.8	2.5	3.1	3.0	6.1	6.7	6.3	426
changement de domicile	2.8	3.1	2.9	6.0	7.4	6.4	5.4	8.5	5.9	3.0	2.1	2.9	0.5	1.3	1.2	3.2	2.7	3.0	203
hospitalisation	0.6	0.9	0.7	1.7	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	0.6	0.0	0.1	0.1	0.7	0.7	0.7	46
détention	0.2	0.1	0.2	3.1	0.0	2.3	0.5	0.0	0.4	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	22
perte de contact	28.2	28.0	28.2	30.6	33.9	31.4	31.1	31.9	31.2	17.1	12.7	16.4	20.8	17.5	18.1	26.2	23.4	25.2	1'704
rupture explicite	10.6	9.8	10.4	11.4	11.6	11.5	8.1	10.6	8.6	10.4	9.9	10.3	5.1	5.6	5.5	10.2	8.6	9.7	652
décès	1.6	1.7	1.6	6.0	2.5	5.1	2.7	2.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.9	1.3	91
autre raison	2.2	2.7	2.3	1.7	1.7	1.7	0.5	0.0	0.4	3.2	1.4	2.9	2.5	4.5	4.1	2.2	3.1	2.5	172
N**	2'559	1'053	3'612	350	121	471	222	47	269	730	142	872	197	819	1'016	4'363	2'387	6'750	6'750
données manquantes	30	10	40	5	4	9	0	1	1	5	0	5	3	7	10	44	23	67	67

T32b Destination des transferts, selon le problème principal¹ et chez les proches (2011)

Destination des transferts***	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
traitement résidentiel	34.0	32.7	33.6	33.3	37.5	34.2	33.3	50.0	36.8	23.5	25.0	24.0	33.3	10.0	15.4	32.9	29.7	31.8	82
prise en charge ambulatoire	43.3	57.7	48.3	43.3	25.0	39.5	46.7	25.0	42.1	58.8	62.5	60.0	66.7	60.0	61.5	46.1	56.0	49.6	128
appartement protégé	3.1	3.8	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.2	1.9	5
autre institution spécialisée	19.6	5.8	14.8	23.3	37.5	26.3	20.0	25.0	21.1	17.6	12.5	16.0	0.0	30.0	23.1	19.2	12.1	16.7	43
N**	97	52	149	30	8	38	15	4	19	17	8	25	3	10	13	167	91	258	258
données manquantes	63	35	98	11	6	17	6	1	7	13	4	17	2	15	17	100	68	168	168

T32c Cause de décès, selon le problème principal¹ et chez les proches (2011)

Cause de décès****	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
suicide	11.1	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	40.0	.	40.0	10.0	0.0	8.2	5
accident	3.7	20.0	8.1	17.6	0.0	16.7	0.0	.	0.0	10.0	18.2	11.5	7
maladie	74.1	80.0	75.7	58.8	100.0	61.1	60.0	.	60.0	66.0	81.8	68.9	42
surdose ou intoxication aiguë	7.4	0.0	5.4	17.6	0.0	16.7	0.0	.	0.0	10.0	0.0	8.2	5
autre cause de décès	3.7	0.0	2.7	5.9	0.0	5.6	0.0	.	0.0	4.0	0.0	3.3	2.0
N**	27	10	37	17	1	18	5	0	5	0	0	0	0	0	0	50	11	61	61
données manquantes	14	8	22	4	2	6	1	1	2	0	0	0	0	0	0	19	11	30	30

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s transféré-e-s. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s décédé-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2011)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
Durée de la prise en charge* (%)																			
1 semaine ou moins	3.7	3.4	3.6	2.3	4.8	2.9	1.8	0.0	1.5	6.1	2.8	5.6	10.5	7.9	8.4	4.3	5.0	4.6	310
> 1 semaine à 1 mois	3.1	3.0	3.1	1.7	1.6	1.7	1.8	2.1	1.9	8.8	13.4	9.6	3.0	4.5	4.2	4.0	4.0	4.0	273
> 1 à 2 mois	3.5	3.4	3.5	2.5	6.5	3.5	1.8	0.0	1.5	7.9	9.9	8.2	4.5	4.7	4.7	4.2	4.5	4.3	294
>2 à 3 mois	3.4	3.6	3.4	1.1	4.0	1.9	1.4	6.3	2.2	5.2	7.7	5.6	5.0	4.6	4.7	3.8	4.4	4.0	271
>3 à 6 mois	10.1	11.1	10.4	9.0	4.8	7.9	10.8	10.4	10.7	13.9	15.5	14.1	10.0	16.8	15.5	11.0	13.3	11.8	801
>6 mois à 1 an	27.4	28.4	27.7	25.6	21.8	24.6	30.6	41.7	32.6	33.1	31.7	32.8	40.0	31.6	33.3	29.5	30.8	30.0	2'034
>1 à 2 ans	25.2	24.2	24.9	22.0	28.2	23.6	26.1	20.8	25.2	18.6	12.0	17.6	16.0	19.4	18.7	22.8	21.6	22.4	1'519
>2 à 3 ans	10.2	10.3	10.2	13.0	8.9	11.9	11.3	8.3	10.7	4.5	4.2	4.4	5.0	4.7	4.8	9.0	7.4	8.5	574
>3 à 5 ans	9.4	9.2	9.3	13.2	14.5	13.6	11.3	8.3	10.7	1.6	2.8	1.8	5.0	3.3	3.6	7.9	6.5	7.4	501
>5 à 10 ans	2.9	2.3	2.7	7.6	4.0	6.7	3.2	2.1	3.0	0.3	0.0	0.2	0.5	1.5	1.3	2.6	1.8	2.3	158
plus de 10 ans	1.1	1.0	1.1	2.0	0.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	56
N**	2'573	1'056	3'629	355	124	479	222	48	270	735	142	877	200	825	1'025	4'391	2'400	6'791	6'791
<i>données manquantes</i>	16	7	23	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	10	26	26
Durée (en semaines)																			
moyenne	80.0	77.0	79.1	109.9	93.6	105.7	79.8	68.0	77.7	38.7	35.5	38.2	48.2	54.2	53.0	71.7	64.4	69.1	
écart-type	99.4	94.3	98.0	124.3	106.1	120.0	74.8	62.7	72.9	39.9	43.2	40.5	63.7	91.1	86.4	91.6	88.8	90.7	
1er quartile	25.3	24.8	25.0	31.9	26.9	30.4	29.3	30.1	29.3	9.3	7.3	9.0	14.1	14.4	14.3	21.9	18.9	20.9	
valeur médiane	50.9	49.4	50.1	67.6	67.1	67.6	52.9	47.6	51.8	29.9	24.5	29.1	30.9	32.0	31.9	43.7	38.9	42.1	
3e quartile	99.0	96.6	98.3	146.3	112.8	141.6	105.6	82.2	101.9	52.3	42.3	51.1	57.3	60.3	59.0	88.4	75.1	83.6	
N**	2'573	1'056	3'629	355	124	479	222	48	270	735	142	877	200	825	1'025	4'391	2'400	6'791	
<i>données manquantes</i>	16	7	23	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	10	26	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2011)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution pendant la prise en charge*																
non	97.8	97.9	97.9	38.2	41.0	38.9	88.5	87.2	88.2	99.5	100.0	99.6	92.7	93.6	92.9	3'961
oui	2.2	2.1	2.1	61.8	59.0	61.1	11.5	12.8	11.8	0.5	0.0	0.4	7.3	6.4	7.1	302
N**	1'859	770	2'629	251	83	334	156	39	195	586	110	696	3'096	1'167	4'263	4'263
données manquantes	730	292	1'022	104	42	146	66	9	75	149	32	181	1'111	416	1'527	1'527
Type de substitution***																
héroïne	5.3	0.0	3.7	3.7	4.3	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	3.6	2.8	3.3	9
méthadone	39.5	81.3	51.9	88.8	89.4	89.0	78.6	100.0	83.3	100.0	.	100.0	78.7	88.9	81.4	218
autres opiacés	5.3	12.5	7.4	5.2	2.1	4.4	14.3	0.0	11.1	0.0	.	0.0	5.6	4.2	5.2	14
autres substances	50.0	6.3	37.0	2.2	4.3	2.8	7.1	0.0	5.6	0.0	.	0.0	12.2	4.2	10.0	27
N**	38	16	54	134	47	181	14	4	18	2	0	2	196	72	268	268
données manquantes	2	0	2	21	2	23	4	1	5	1	0	1	31	3	34	34
Substitution après la prise en charge*																
non	99.5	99.6	99.5	68.0	70.3	68.5	94.8	97.0	95.2	99.8	100.0	99.8	96.9	97.6	97.1	3'638
oui	0.5	0.4	0.5	32.0	29.7	31.5	5.2	3.0	4.8	0.2	0.0	0.2	3.1	2.4	2.9	108
N**	1'650	675	2'325	206	64	270	135	33	168	517	99	616	2'727	1'019	3'746	3'746
données manquantes	939	387	1'326	149	61	210	87	15	102	218	43	261	1'480	564	2'044	2'044
Type de substitution***																
prescription d'héroïne	25.0	0.0	18.2	15.2	10.5	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	14.3	8.3	13.0	13
traitement de substitution	75.0	100.0	81.8	84.8	89.5	85.9	100.0	100.0	100.0	100.0	.	100.0	85.7	91.7	87.0	144
N**	8	3	11	66	19	85	7	1	8	1	0	1	84	24	108	157
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s substitué-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2011)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Postcure prévue et mise en place*																
non	88.5	80.2	86.3	81.5	75.5	80.2	87.5	95.5	89.1	89.2	94.3	89.8	88.1	82.2	86.7	1'871
oui	11.5	19.8	13.7	18.5	24.5	19.8	12.5	4.5	10.9	10.8	5.7	10.2	11.9	17.8	13.3	287
N**	1'004	368	1'372	168	49	217	88	22	110	268	35	303	1'636	522	2'158	2'158
<i>données manquantes</i>	1'585	694	2'279	187	76	263	134	26	160	467	107	574	2'571	1'061	3'632	3'632
Type de la postcure prévue***																
appartement protégé de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	1
service de postcure de l'institution	2.9	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	8.3	3.7	0.0	3.4	2.8	0.0	1.9	5
appartement protégé extérieur	3.9	3.0	3.6	6.5	0.0	4.8	0.0	100.0	8.3	3.7	0.0	3.4	3.9	3.5	3.8	10
service de postcure extérieur	10.8	11.9	11.2	12.9	9.1	11.9	0.0	0.0	0.0	11.1	50.0	13.8	10.7	11.8	11.0	29
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	22.5	19.4	21.3	12.9	9.1	11.9	9.1	0.0	8.3	11.1	0.0	10.3	18.5	16.5	17.9	47
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	3.9	6.0	4.7	22.6	36.4	26.2	18.2	0.0	16.7	22.2	0.0	20.7	10.7	9.4	10.3	27
autre centre de consultation	8.8	4.5	7.1	22.6	18.2	21.4	18.2	0.0	16.7	11.1	0.0	10.3	12.4	5.9	10.3	27
groupe d'entraide	5.9	9.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	7.1	4.6	12
groupe d'ancien-ne-s client-e-s de l'institution	0.0	1.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.4	1
autre	45.1	52.2	47.9	45.2	27.3	40.5	36.4	0.0	33.3	37.0	50.0	37.9	43.3	50.6	45.6	120
N**	102	67	169	31	11	42	11	1	12	27	2	29	178	85	263	263
<i>données manquantes</i>	13	6	19	0	1	1	0	0	0	2	0	2	16	8	24	24

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pour lesquels une postcure est prévue. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2011)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Problèmes addictifs*																
alcool	53.6	60.5	55.6	26.1	17.9	24.2	22.0	14.8	20.7	11.0	6.7	10.3	38.1	42.8	39.4	1'321
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.1	0.0	0.0	2.2	1.8	2.1	3.3	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	10
héroïne	0.5	0.5	0.5	47.8	46.4	47.5	4.9	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.3	4.0	133
méthadone	0.3	1.0	0.5	21.7	16.1	20.3	3.3	0.0	2.7	0.2	0.0	0.2	2.2	1.7	2.1	69
autres opiacés	0.0	0.0	0.0	1.7	1.8	1.7	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	5
cocaïne	1.5	1.8	1.6	10.0	8.9	9.7	40.7	51.9	42.7	0.4	3.4	0.9	3.9	3.9	3.9	131
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
amphétamines	0.2	0.5	0.3	0.6	0.0	0.4	2.4	3.7	2.7	0.0	1.1	0.2	0.4	1.0	0.5	18
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.1	0.5	0.2	0.6	0.0	0.4	0.8	7.4	2.0	0.4	4.5	1.1	0.3	1.5	0.7	22
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
barbituriques	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	4
benzodizépines	0.8	2.0	1.2	14.4	14.3	14.4	6.5	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	2.4	80
autres somnifères et tranquillisants	0.2	0.5	0.3	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.3	9
LSD	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	1.1	0.2	0.2	0.1	0.1	5
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
substances volatiles	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	4
cannabis	3.1	1.2	2.5	13.3	8.9	12.3	12.2	14.8	12.7	48.1	46.1	47.8	13.1	6.2	11.2	376
tabac	10.6	9.0	10.1	18.9	16.1	18.2	15.4	7.4	14.0	12.5	10.1	12.1	12.7	12.0	12.5	419
autres substances	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.2	0.0	0.2	0.5	0.0	0.3	11
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.1	0.8	1.0	35
troubles alimentaires	0.1	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	5.3	1.6	54
autres troubles assimilable à une addiction	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.7	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	0.9	30
aucun	41.7	35.7	40.0	28.9	32.1	29.7	39.8	33.3	38.7	43.4	49.4	44.4	40.7	35.5	39.2	1'316
N**	1'466	603	2'069	180	56	236	123	27	150	472	89	561	2'435	918	3'353	3'353
<i>données manquantes</i>	<i>1'123</i>	<i>459</i>	<i>1'582</i>	<i>175</i>	<i>69</i>	<i>244</i>	<i>99</i>	<i>21</i>	<i>120</i>	<i>263</i>	<i>53</i>	<i>316</i>	<i>1'772</i>	<i>665</i>	<i>2'437</i>	<i>2'437</i>

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T37 Fréquence des rechutes, substance ou comportement impliqué et durée des rechutes pendant la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2011)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Fréquence des rechutes*																
aucune	60.2	48.4	56.9	34.3	30.8	33.6	54.3	47.1	52.9	75.0	60.0	73.1	60.0	49.0	57.3	790
une fois	11.1	11.5	11.2	12.7	23.1	14.8	5.7	0.0	4.6	9.5	12.0	9.8	10.7	11.3	10.9	150
deux fois	6.6	7.4	6.8	7.8	11.5	8.6	7.1	5.9	6.9	2.4	8.0	3.1	6.1	7.5	6.5	89
trois ou quatre fois	10.6	15.6	12.0	19.6	3.8	16.4	14.3	29.4	17.2	7.7	4.0	7.3	11.2	14.9	12.1	167
cinq fois ou plus	11.6	17.2	13.1	25.5	30.8	26.6	18.6	17.6	18.4	5.4	16.0	6.7	12.0	17.3	13.3	183
N**	640	244	884	102	26	128	70	17	87	168	25	193	1'044	335	1'379	1'379
<i>données manquantes</i>	1'949	818	2'767	253	99	352	152	31	183	567	117	684	3'163	1'248	4'411	4'411
Substance/comportement addictif lors des rechutes***																
alcool	97.5	98.3	97.8	33.3	38.9	34.6	46.9	33.3	43.9	9.8	11.1	10.0	71.0	79.5	73.5	410
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.4	0.0	0.3	6.3	0.0	4.9	3.1	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.1	6
opiacés	2.5	0.8	1.9	87.3	61.1	81.5	9.4	11.1	9.8	0.0	0.0	0.0	16.6	8.1	14.2	79
cocaïne et dérivés	4.6	2.5	3.9	27.0	27.8	27.2	84.4	88.9	85.4	0.0	0.0	0.0	14.1	9.9	12.9	72
stimulants	0.8	0.8	0.8	3.2	0.0	2.5	6.3	0.0	4.9	12.2	0.0	10.0	3.5	1.2	2.9	16
médicaments	0.4	2.5	1.1	23.8	16.7	22.2	9.4	11.1	9.8	0.0	0.0	0.0	5.3	5.6	5.4	30
hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1
cannabis	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	1
tabac	4.6	2.5	3.9	22.2	11.1	19.8	12.5	11.1	12.2	82.9	88.9	84.0	16.1	8.7	14.0	78
substances volatiles	0.8	0.8	0.8	7.9	5.6	7.4	0.0	0.0	0.0	12.2	11.1	12.0	3.3	2.5	3.0	17
autres substances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	2
jeu pathologique	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	1.3	7
troubles alimentaires	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	3
autres troubles assimilables à une addiction	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	1.3	7
N**	241	118	359	63	18	81	32	9	41	41	9	50	397	161	558	558
<i>données manquantes</i>	14	8	22	4	0	4	0	0	0	1	1	2	21	10	31	31
Durée des rechutes****																
1 à 2 jours	27.2	34.0	29.2	25.0	50.0	30.0	21.1	50.0	26.1	47.1	50.0	47.6	30.1	37.5	32.0	79
3 à 6 jours	22.8	27.7	24.2	29.2	0.0	23.3	26.3	50.0	30.4	29.4	0.0	23.8	24.0	25.0	24.3	60
7 à 10 jours	14.9	10.6	13.7	12.5	33.3	16.7	10.5	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	13.1	12.5	13.0	32
>10 jours à 2 semaines	4.4	10.6	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	7.8	4.0	10
>2 à 4 semaines	7.9	6.4	7.5	12.5	16.7	13.3	21.1	0.0	17.4	5.9	0.0	4.8	9.3	6.3	8.5	21
>4 à 6 semaines	12.3	8.5	11.2	4.2	0.0	3.3	10.5	0.0	8.7	0.0	25.0	4.8	9.3	7.8	8.9	22
>6 à 8 semaines	1.8	2.1	1.9	8.3	0.0	6.7	5.3	0.0	4.3	0.0	25.0	4.8	2.7	3.1	2.8	7
>2 mois	8.8	0.0	6.2	8.3	0.0	6.7	5.3	0.0	4.3	17.6	0.0	14.3	8.7	0.0	6.5	16
N**	114	47	161	24	6	30	19	4	23	17	4	21	183	64	247	247
<i>données manquantes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Pourcentages par colonne, une seule catégorie possible

T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal¹ (selement patient-e-s) (2011)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	29.8	40.4	32.7	5.4	0.0	4.1	12.9	0.0	11.0	16.3	0.0	14.3	23.8	31.7	25.8	299
1 jour par semaine ou moins	0.9	1.5	1.1	1.1	0.0	0.8	0.0	9.1	1.4	2.8	0.0	2.5	1.3	1.8	1.4	16
2 à 3 jours par semaine	0.8	0.0	0.5	1.1	0.0	0.8	3.2	0.0	2.7	2.8	0.0	2.5	1.5	0.0	1.1	13
4 à 6 jours par semaine	0.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	0.5	0.4	0.4	5
une fois par jour	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.6	0.0	0.4	5
plusieurs fois par jour	67.4	57.6	64.7	92.4	100.0	94.3	83.9	90.9	84.9	75.9	100.0	78.9	72.4	66.2	70.9	823
N**	533	203	736	92	30	122	62	11	73	141	20	161	877	284	1'161	1'161
<i>données manquantes</i>	<i>2'056</i>	<i>859</i>	<i>2'915</i>	<i>263</i>	<i>95</i>	<i>358</i>	<i>160</i>	<i>37</i>	<i>197</i>	<i>594</i>	<i>122</i>	<i>716</i>	<i>3'330</i>	<i>1'299</i>	<i>4'629</i>	<i>4'629</i>
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10 cigarettes par jour	21.8	20.0	21.3	14.1	5.9	12.3	6.7	10.0	7.3	49.0	15.4	45.2	25.0	16.7	23.2	145
11 à 20 cigarettes par jour	48.1	51.8	49.0	40.6	64.7	45.7	48.9	50.0	49.1	40.2	84.6	45.2	45.3	56.1	47.6	297
21 à 30 cigarettes par jour	19.5	22.4	20.2	35.9	29.4	34.6	40.0	40.0	40.0	10.8	0.0	9.6	22.2	23.5	22.4	140
31 cigarettes par jour ou plus	10.7	5.9	9.5	9.4	0.0	7.4	4.4	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	7.5	3.8	6.7	42
N**	262	85	347	64	17	81	45	10	55	102	13	115	492	132	624	624
<i>données manquantes</i>	<i>112</i>	<i>36</i>	<i>148</i>	<i>23</i>	<i>13</i>	<i>36</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>16</i>	<i>7</i>	<i>23</i>	<i>176</i>	<i>62</i>	<i>238</i>	<i>238</i>

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème¹ (seulement patient-e-s) (2011)

	Patient-e-s: principale substance posant problème ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Objectif de consommation*																
abstinence définitive	36.1	40.0	37.2	71.4	73.0	71.8	69.1	81.3	71.1	58.2	45.7	56.5	46.0	45.2	45.8	832
abstinence limitée dans le temps	16.9	9.6	14.8	0.8	0.0	0.6	6.2	0.0	5.2	5.6	17.1	7.3	11.8	8.4	11.0	199
consommation contrôlée	33.3	35.5	33.9	12.8	16.2	13.5	11.1	18.8	12.4	22.1	20.0	21.8	28.1	32.3	29.1	529
aucune limitation envisagée	3.4	3.0	3.3	2.3	2.7	2.4	2.5	0.0	2.1	5.2	2.9	4.8	3.4	2.8	3.2	59
pas déterminé pour l'instant	9.8	11.6	10.3	9.8	8.1	9.4	11.1	0.0	9.3	8.9	14.3	9.7	9.9	11.2	10.2	186
autre	0.6	0.3	0.5	3.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.6	11
N**	829	335	1'164	133	37	170	81	16	97	213	35	248	1'351	465	1'816	1'816
<i>données manquantes</i>	1'760	727	2'487	222	88	310	141	32	173	522	107	629	2'856	1'118	3'974	3'974
Pronostic*																
très bon pronostic	15.6	15.4	15.5	7.4	7.7	7.5	15.4	11.1	14.6	21.7	3.1	19.5	15.3	14.3	15.0	287
bon pronostic	47.7	44.4	46.8	36.5	35.9	36.4	44.9	61.1	47.9	48.3	75.0	51.5	46.8	46.2	46.7	891
plutôt mauvais pronostic	25.7	30.8	27.1	41.2	35.9	40.1	30.8	27.8	30.2	24.8	21.9	24.4	27.7	30.6	28.4	542
mauvais pronostic	11.0	9.5	10.6	14.9	20.5	16.0	9.0	0.0	7.3	5.2	0.0	4.6	10.2	8.9	9.9	189
N**	879	338	1'217	148	39	187	78	18	96	230	32	262	1'439	470	1'909	1'909
<i>données manquantes</i>	1'710	724	2'434	207	86	293	144	30	174	505	110	615	2'768	1'113	3'881	3'881

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

ANNEXE

A1 Données de base d'institutions non participantes: Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal (2011)

	Patient-e-s: problème principal												Toutes prises en charge***			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Sexe*																
hommes			67.1			76.5			79.1			76.3			72.4	996
femmes			31.0			22.1			19.6			20.9			26.2	360
sexe pas connu			1.9			1.4			1.4			2.8			1.5	20
N**	247	114	368	221	64	289	117	29	148	161	44	211	996	360	1'376	1'376
Age (en années)*																
jusqu'à 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	1.9	0.8	0.0	0.6	8
15-19	3.7	2.9	3.6	1.8	4.7	2.4	0.0	3.4	0.7	40.6	34.1	40.5	9.3	10.6	10.0	133
20-24	4.6	1.9	3.6	8.7	20.3	11.1	12.1	17.2	13.6	23.8	11.4	20.5	11.4	11.1	11.2	150
25-29	11.4	8.6	10.6	13.7	20.3	15.3	19.0	13.8	17.7	13.1	13.6	13.3	13.9	14.0	13.9	186
30-34	12.8	9.5	11.8	19.6	15.6	18.8	23.3	17.2	22.4	8.1	11.4	8.6	16.1	12.0	15.0	200
35-39	16.0	8.6	13.3	22.8	10.9	20.2	16.4	13.8	15.6	5.6	4.5	5.2	16.8	10.3	14.9	199
40-44	12.8	18.1	14.5	14.2	10.9	13.6	14.7	20.7	15.6	2.5	11.4	4.3	12.6	16.6	13.6	182
45-49	11.4	15.2	12.4	11.9	9.4	11.1	7.8	10.3	8.2	1.3	4.5	1.9	8.8	9.4	8.8	118
50-54	12.8	12.4	12.7	3.2	1.6	2.8	4.3	3.4	4.1	1.9	4.5	2.4	5.4	6.0	5.5	74
55-59	6.8	10.5	8.2	4.1	6.3	4.5	1.7	0.0	1.4	0.0	2.3	0.5	2.7	5.1	3.4	45
60-64	3.2	3.8	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	1.0	14
65-69	1.8	2.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.5	7
70-74	2.3	1.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	8
75 et plus	0.5	3.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.3	1.0	0.3	2.0	0.7	10
N**	219	105	331	219	64	287	116	29	147	160	44	210	964	350	1'334	1'334
données manquantes	28	9	37	2	0	2	1	0	1	1	0	1	32	10	42	42
Age (valeurs centrales)																
moyenne	41.7	46.2	43.1	36.3	32.9	35.5	35.1	34.3	34.8	24.2	30.5	25.4	34.8	37.2	35.4	
écart-type	12.8	15.5	13.9	9.0	10.7	9.5	9.3	9.4	9.3	10.6	16.6	12.3	11.8	15.4	12.9	
1er quartile	31.2	36.1	32.3	30.0	24.6	28.4	28.3	26.2	28.0	17.2	18.1	17.2	26.0	26.0	26.0	
valeur médiane	40.2	45.9	42.8	36.0	30.0	35.0	34.0	34.0	34.0	21.0	26.5	21.0	34.0	36.0	34.5	
3e quartile	51.8	53.2	52.3	42.0	40.5	42.0	41.43	41.0	41.0	28.0	39.1	29.0	42.1	45.0	43.0	
N**	219	105	331	219	64	287	116	29	147	160	44	210	964	350	1'334	
données manquantes	28	9	37	2	0	2	1	0	1	1	0	1	32	10	42	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

A2 Données de base d'institutions non participantes: Problème principal à l'admission (patient-e-s) (2011)

Tous patients et patientes				
	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	
Problème principal*				
alcool	24.8	31.7	26.7	368
opiacés	22.2	17.8	21.0	289
cocaïne	11.7	8.1	10.8	148
stimulants	1.6	2.2	1.7	24
hypnotiques/sedatives	0.9	1.4	1.0	14
hallucinogènes	0.2	0.0	0.1	2
substances volatiles	0.1	0.3	0.1	2
cannabis	16.2	12.2	15.3	211
tabac	0.2	3.6	1.1	15
autre substance	0.8	1.9	1.1	15
consommation multiple**	19.6	16.1	18.4	253
non lié à une substance	1.7	4.7	2.5	35
N***	996	360	1'376	1'376
<i>données manquantes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Plusieurs institutions ne définissent pas le problème principal selon les directives d'act-info et répertorient notamment la "consommation multiple". Ainsi, la distribution résultante n'est pas directement comparable avec celle des institutions participantes

*** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu