

Traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégalés

Résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2017 – Données de base

Recueil de tableaux statistiques

Relevé des données : Susanne Schaaf, Heidi Bolliger et Andreas Wenger, l'Institut suisse de recherche sur la santé publique et les addictions (ISGF), Zurich

Analyse des données et établissement du rapport : Marina Delgrande Jordan et Andrea Kretschmann, Addiction Suisse, Lausanne

Octobre 2018

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring act-*info*. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-*info* et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, auprès d'Addiction Suisse, un grand merci à Edith Bacher pour la gestion et le contrôle des questionnaires, ainsi qu'à Yvonne Eichenberger pour sa participation aux travaux préparatoires des analyses statistiques.

Table des matières

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland	4
act-info dans le domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales (act-info-FOS).....	4
Base de données 2017	5
Contenu du rapport et unité d'analyse	5
Aide à la lecture des tableaux.....	5
Autres publications	7
Personne de contact.....	7
Informations recueillies au moment de l'ADMISSION.....	9
1. Caractéristiques socio-démographiques	9
1.1 Sexe, âge et nationalité	9
1.2 Intégration sociale	11
1.3 Position socio-économique.....	13
2. Circonstances du début de la prise en charge.....	15
2.1 Principale instance d'envoi.....	15
2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement	15
2.3 Traitement de substitution.....	15
3. Substances et comportements problématiques	17
3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 ^{ère} consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique.....	17
3.1.1 Problème principal 'alcool'.....	20
3.1.2 Problème principal 'opioïde'	21
3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés'	22
3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'	23
3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'	24
3.1.6 Problème principal 'hallucinogène'	25
3.1.7 Problème principal 'substances volatiles' (aucun-e client-e n'a ce problème principal).....	26
3.1.8 Problème principal 'cannabis'.....	26
3.1.9 Problème principal 'tabac'	27
3.1.10 Problème principal 'autre substance'	28
3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation.....	29
3.3 Autres substances ou comportements problématiques.....	30
3.4 Utilisation de substances multiples (CIM-10).....	35
3.5 Usage de drogues illégales par injection	39
4. Santé	41
4.1 Santé physique	41
Informations recueillies au moment de la SORTIE	42
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	42
1.1 Sexe et âge	42
1.2 Intégration sociale	43
2. Déroulement de la prise en charge	44
2.1 Durée de la prise en charge.....	44
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge	45
3. Substances ou comportements problématiques	47
3.1 Substances ou comportements problématiques	47

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (act-info) réunit sous le même toit les cinq anciennes statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance, à savoir:

- SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue)
- SAKRAM/CIRSA (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HegeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Substitution (Statistique nationale des traitements de substitution)

Ces cinq statistiques, réalisées séparément jusqu'à fin 2003, disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés qui servent à la constitution d'une base de données nationale centralisée (contenant les variables de base¹) et permettent d'obtenir des résultats comparables tant au niveau national qu'au niveau international.

En 2012, une révision en profondeur des standards de mesure européens (Treatment Demand Indicator ; TDI) a eu lieu. Afin de maintenir la conformité des instruments act-info avec le TDI, les questionnaires act-info ont également été révisés.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Depuis mars 2018, la réalisation d'act-info dans les cinq domaines de traitement est confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring act-info sont disponibles sur le site Internet: <http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info/>.

act-info dans le domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales (act-info-FOS)

En janvier 2003, act-info est entré en vigueur dans le domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales. Jusqu'en 2017, le relevé statistique dans ce domaine de traitement était réalisé par l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF).

act-info-FOS renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes liés aux drogues illégales**. Les institutions participantes offrent des thérapies – pour la plupart orientées vers l'abstinence – de courte, moyenne et longue durée.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution. Depuis janvier 2013, le relevé statistique se base sur un questionnaire d'entrée et un questionnaire de sortie révisés (Version 2.0).

¹ Variables correspondant aux questions de base, c'est-à-dire obligatoires pour les cinq statistiques sectorielles act-info. Elles sont à distinguer des questions spécifiques au domaine de traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales.

Base de données 2017

Ce recueil de tableaux statistiques non commentés repose sur **les 501 admissions et les 457 sorties intervenues dans les institutions ayant participé à la statistique sectorielle act-info-FOS en 2017.**

Ce recueil présente les données de base que l'ISGF a mises à disposition d'Addiction Suisse. Autrement dit, ce rapport présente les résultats relatifs aux questions de base incluses dans le questionnaire act-info-FOS, qui sont obligatoires pour les cinq statistiques sectorielles act-info. Il ne présente en revanche pas les résultats relatifs aux questions spécifiques au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales.

Contenu du rapport et unité d'analyse


La première partie de ce rapport présente le profil détaillé des **client-e-s entré-e-s dans cette institution en 2017** alors que la seconde partie concerne **les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2017.**

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2017 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc l'épisode de traitement. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser le terme "client-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire act-info-FOS, sachant que, dans chaque tableau, le nom de la variable concernée apparaît dans l'angle supérieur gauche.

Seules les **réponses valides** sont prises en considération dans les analyses. Ainsi, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (*missings*) sont exclues des analyses.



Lors de l'interprétation des résultats, il faut être attentif au fait que les questions n'ont pas toujours été remplies par l'ensemble des client-e-s. En effet, le nombre de réponses valides à une question ne correspond pas toujours au nombre total des admissions resp. sorties enregistrées au cours d'une année donnée².

Les résultats des questions auxquelles **aucune réponse** n'a été donnée ne sont pas présentés.

² Voir ci-dessus, sous le point 'Base de données 2017', le total de toutes les admissions resp. sorties.

Les tableaux et graphiques présentent de façon distincte les résultats pour les hommes et pour les femmes. La colonne resp. la ligne "TOTAL" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question, même si l'information concernant le sexe est manquante.

Par ailleurs, dans les tableaux les résultats sont présentés aussi bien en **chiffres absolus (n)** qu'en **pourcentages (%)**.

Les remarques figurant sous certains tableaux renseignent sur les particularités à prendre en compte lors de l'interprétation des résultats.

Dans certains tableaux du sous-chapitre 3.1 (voir l'exemple ci-dessous, point 1.) les résultats sont présentés séparément pour chaque problème principal. Autrement dit, lorsqu'un tableau contient l'indication "PROBLÈME PRINCIPAL = ...", cela signifie que les cas pris en considération concernent uniquement les client-e-s qui ont mentionné le problème principal indiqué (p. ex l'indication PROBLÈME PRINCIPAL = ALCOOL signifie que seul-e-s les client-e-s dont le problème principal est l'alcool sont pris-e-s en compte dans le tableau).

1.	2. qmed040					
PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	14.93	4.16	13.00	14.00	16.00	72
Femmes	17.37	6.83	14.00	15.00	18.00	30
TOTAL	15.65	5.18	13.00	14.00	17.00	102

Dans le sous-chapitre susmentionné, les paramètres de position et de dispersion suivants sont présentés (voir point 2.):

Moyenne La moyenne arithmétique s'obtient par la somme des valeurs observées divisée par le nombre de cas correspondant.

Ecart-type L'écart-type mesure le degré de dispersion des données en analysant les écarts entre les valeurs observées et la moyenne (arithmétique). Plus l'écart-type est petit, plus les valeurs observées sont proches de la moyenne.

Médiane Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, la médiane est la valeur qui divise par le milieu les valeurs observées. Ainsi, 50% des valeurs observées sont \geq que la médiane et 50% des valeurs observées sont \leq que la médiane.

1^{er} quartile /3^e quartile Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 1^{er} quartile est la valeur telle que 25% des valeurs observées sont \leq à cette valeur. De même, si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 3^e quartile est la valeur telle que 75% des valeurs observées sont \leq à cette valeur.

Il existe **trois types de tableaux**:

- Pour **les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédéfinies** (par ex. qmec040 "état civil") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour **les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédéfinies** (par ex. qnec120 "formation(s) achevée(s) par un diplôme ou un certificat") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Les pourcentages sont calculés sur le nombre total de personnes qui, dans chaque groupe ou sous-groupe considéré, ont coché au moins une catégorie de réponse. Les pourcentages ne peuvent être additionnés.
- Pour **les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédéfinies**, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique") : le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1^{er} quartile, 3^e quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

Autres publications

Les rapports annuels, articles et feuilles-info publiés par Addiction Suisse dans le cadre du projet *act-info* sont disponibles sur le site Internet: <http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info/>.

Personne de contact

Addiction Suisse

Marina Delgrande Jordan

Lettres: Addiction Suisse, case postale 870, 1001 Lausanne

Paquets: Addiction Suisse, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Tél. direct : 021 321 29 96

E-mail: mdelgrande@addictionsuisse.ch

Informations recueillies au moment de l'ADMISSION

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe, âge et nationalité


Nombre d'admissions, selon le sexe (2017)

	n	%	% valides	% cumulés
Hommes	383	76.4	76.6	76.6
Femmes	117	23.4	23.4	100.0
Total	500	99.8	100.0	
Missing	1	.2		
Total	501	100.0		

Âge lors de l'admission, selon le sexe (2017)

	qmec020 Âge (en années)					N
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	
Hommes	33.82	9.56	27.00	34.00	40.00	383
Femmes	33.32	10.20	25.00	32.00	40.00	116
TOTAL	33.67	9.72	26.00	33.00	40.00	500

Distribution de l'âge lors de l'admission, selon le sexe (2017)



Nationalité lors de l'admission (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
@nec050	Suisse	241	68.3%	87	81.3%	329	71.4%
	Union européenne	87	24.6%	16	15.0%	103	22.3%
	autre	25	7.1%	4	3.7%	29	6.3%
	Total	353	100.0%	107	100.0%	461	100.0%

Remarque: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'

1.2 Intégration sociale

Etat civil lors de l'admission (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmec040	célibataire	299	80.8%	77	68.1%	377	77.9%
	marié-e	22	5.9%	11	9.7%	33	6.8%
	séparé-e (juridiquement)	6	1.6%	8	7.1%	14	2.9%
	divorcé-e	38	10.3%	15	13.3%	53	11.0%
	veuf/veuve	2	0.5%	2	1.8%	4	0.8%
	partenariat enregistré (PaCS)	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%
	Total	370	100.0%	113	100.0%	484	100.0%

Taille du lieu de domicile lors de l'admission (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmec035	grands centres urbains	41	11.3%	12	10.9%	53	11.2%
	périphérie des 3 grands centres urbains	50	13.7%	19	17.3%	69	14.5%
	villes de moyenne importance	72	19.8%	15	13.6%	87	18.3%
	petites villes	127	34.9%	36	32.7%	163	34.3%
	campagne	74	20.3%	28	25.5%	103	21.7%
	Total	364	100.0%	110	100.0%	475	100.0%

Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours précédant l'admission (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qnec060	seul-e en ménage	70	18.8%	15	13.5%	85	17.6%
	avec famille d'origine	58	15.6%	10	9.0%	68	14.0%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	23	6.2%	17	15.3%	40	8.3%
	avec des amis ou d'autres personnes	20	5.4%	2	1.8%	22	4.5%
	en prison	36	9.7%	7	6.3%	43	8.9%
	institution thérapeutique/foyer	40	10.8%	14	12.6%	54	11.2%
	hôpital/clinique	117	31.5%	40	36.0%	157	32.4%
	autre	8	2.2%	6	5.4%	15	3.1%
	Total	372	100.0%	111	100.0%	484	100.0%

Avoir des enfants (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qnec067	non, aucun	267	72.8%	53	46.1%	321	66.5%
	oui	100	27.2%	62	53.9%	162	33.5%
	Total	367	100.0%	115	100.0%	483	100.0%

Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)? (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qnec068	non	75	77.3%	39	63.9%	114	72.2%
	oui	22	22.7%	22	36.1%	44	27.8%
	Total	97	100.0%	61	100.0%	158	100.0%

Situation de logement prédominante durant les 30 jours précédant l'admission (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qnec070	logement stable	153	41.0%	41	36.0%	194	39.8%
	logement instable/sans domicile fixe	29	7.8%	13	11.4%	43	8.8%
	en prison	36	9.7%	7	6.1%	43	8.8%
	institution/foyer/hôpital/autre	155	41.6%	53	46.5%	208	42.6%
	Total	373	100.0%	114	100.0%	488	100.0%

1.3 Position socio-économique

Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
@nec120	aucune formation achevée	32	8.7%	16	14.8%	48	10.1%
	école obligatoire	109	29.8%	38	35.2%	148	31.2%
	formation de transition	13	3.6%	6	5.6%	19	4.0%
	formation générale sans maturité	7	1.9%	3	2.8%	10	2.1%
	formation prof. de base/apprentissage	172	47.0%	38	35.2%	210	44.2%
	maturité ou école normale	13	3.6%	4	3.7%	17	3.6%
	formation prof. supérieure	16	4.4%	2	1.9%	18	3.8%
	haute école spécialisée et université	4	1.1%	1	0.9%	5	1.1%
	doctorat ou habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	366	100.0%	108	100.0%	475	100.0%

Principale source de revenu durant les 30 jours précédant l'admission (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qnec080	salaires	38	10.3%	1	0.9%	39	8.0%
	économies, épargne	14	3.8%	1	0.9%	15	3.1%
	rente (AVS/AI ou autres)	35	9.5%	20	17.2%	55	11.3%
	aide sociale	198	53.8%	78	67.2%	276	56.9%
	assurance-chômage	5	1.4%	0	0.0%	5	1.0%
	soutien du/de la partenaire	0	0.0%	4	3.4%	4	0.8%
	soutien des parents/proches/ami-e-s	26	7.1%	5	4.3%	32	6.6%
	deal, petit trafic	8	2.2%	4	3.4%	12	2.5%
	autres revenus illégaux	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
	prostitution	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
	assurance d'indemnités journalières	24	6.5%	2	1.7%	26	5.4%
	autre	18	4.9%	1	0.9%	19	3.9%
	Total	368	100.0%	116	100.0%	485	100.0%

Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours précédant l'admission (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
q nec100	activité prof. à plein temps (dès 70%)	37	10.1%	2	1.7%	39	8.1%
	activité prof. à temps partiel	6	1.6%	2	1.7%	8	1.7%
	jobs occasionnels	5	1.4%	0	0.0%	5	1.0%
	en formation	9	2.5%	2	1.7%	12	2.5%
	sans travail, en quête d'emploi	48	13.1%	6	5.2%	54	11.2%
	sans travail, sans recherche d'emploi	173	47.1%	60	52.2%	233	48.2%
	rentier/rentière	8	2.2%	1	0.9%	9	1.9%
	incapacité de travail	49	13.4%	23	20.0%	72	14.9%
	femme/homme au foyer	1	0.3%	6	5.2%	7	1.4%
	autre	31	8.4%	13	11.3%	44	9.1%
	Total	367	100.0%	115	100.0%	483	100.0%

2. Circonstances du début de la prise en charge

2.1 Principale instance d'envoi

Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qneb080	condamnation/mesure/justice/police	56	15.2%	7	6.5%	63	13.2%
	cabinet médical	14	3.8%	4	3.7%	18	3.8%
	institution spécialisée dans addictions	107	29.0%	29	27.1%	136	28.5%
	autre service médical/social/de santé	53	14.4%	26	24.3%	79	16.6%
	institution formatrice/éducative	3	0.8%	1	0.9%	4	0.8%
	employeur/employeuse	1	0.3%	2	1.9%	3	0.6%
	initiative personnelle/famille/amis	126	34.1%	33	30.8%	159	33.3%
	autre	9	2.4%	5	4.7%	15	3.1%
	Total	369	100.0%	107	100.0%	477	100.0%

2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement

Expérience(s) antérieure(s) de traitement (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
\$neb050	oui, problèmes liés à l'alcool	106	28.6%	35	31.0%	141	29.1%
	oui, problèmes liés aux drogues	306	82.5%	85	75.2%	391	80.6%
	oui, problèmes liés aux médicaments	23	6.2%	10	8.8%	33	6.8%
	oui, problèmes liés au tabac	2	0.5%	1	0.9%	3	0.6%
	oui, comport. comparables à dépendance	17	4.6%	14	12.4%	32	6.6%
	non, jamais	30	8.1%	10	8.8%	40	8.2%

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

2.3 Traitement de substitution

A suivi au moins un traitement de substitution (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qneb065	non, jamais	187	52.2%	48	44.0%	236	50.4%
	oui	171	47.8%	61	56.0%	232	49.6%
	Total	358	100.0%	109	100.0%	468	100.0%

Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qneb066	14	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%
	16	1	0.7%	2	3.9%	3	1.5%
	17	2	1.4%	4	7.8%	6	3.1%
	18	6	4.2%	3	5.9%	9	4.6%
	19	10	6.9%	2	3.9%	12	6.2%
	20	18	12.5%	5	9.8%	23	11.8%
	21	8	5.6%	3	5.9%	11	5.6%
	22	5	3.5%	3	5.9%	8	4.1%
	23	5	3.5%	3	5.9%	8	4.1%
	24	11	7.6%	4	7.8%	15	7.7%
	25	12	8.3%	7	13.7%	19	9.7%
	26	5	3.5%	0	0.0%	5	2.6%
	27	6	4.2%	3	5.9%	9	4.6%
	28	5	3.5%	2	3.9%	7	3.6%
	29	5	3.5%	1	2.0%	6	3.1%
	30	7	4.9%	2	3.9%	9	4.6%
	31	3	2.1%	2	3.9%	5	2.6%
	32	4	2.8%	0	0.0%	4	2.1%
	33	8	5.6%	0	0.0%	8	4.1%
	34	2	1.4%	3	5.9%	5	2.6%
	35	6	4.2%	1	2.0%	7	3.6%
	36	2	1.4%	0	0.0%	2	1.0%
	37	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%
	38	2	1.4%	1	2.0%	3	1.5%
	39	4	2.8%	0	0.0%	4	2.1%
	40	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%
	43	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%
44	2	1.4%	0	0.0%	2	1.0%	
52	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%	
Total		144	100.0%	51	100.0%	195	100.0%

3. Substances et comportements problématiques

3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1^{ère} consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique

Problème principal* lors de l'admission (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned010	alcool	79	21.3%	32	28.6%	111	22.9%
	héroïne	77	20.8%	25	22.3%	102	21.1%
	méthadone	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%
	buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre opioïde	1	0.3%	1	0.9%	2	0.4%
	cocaïne en poudre	109	29.4%	30	26.8%	139	28.7%
	crack	18	4.9%	1	0.9%	19	3.9%
	autre forme de cocaïne	3	0.8%	1	0.9%	4	0.8%
	amphétamines	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%
	méthamphétamines	6	1.6%	2	1.8%	8	1.7%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
	cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre stimulant	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbiturique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépine	10	2.7%	2	1.8%	12	2.5%
	GHB/GBL	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
	autre hypnotique/sédatif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
	kétamine	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
	autre hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	52	14.0%	12	10.7%	64	13.2%
	tabac	2	0.5%	1	0.9%	3	0.6%
	autre substance	1	0.3%	1	0.9%	2	0.4%
	jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre comportement de type addictif	4	1.1%	4	3.6%	9	1.9%
	Total		371	100.0%	112	100.0%	484

Remarque: *selon le manuel act-info, on se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

Problème principal* lors de l'admission - 11 catégories générales (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
hptprob11	alcool	79	21.3%	32	28.6%	111	22.9%
	opioïde	80	21.6%	26	23.2%	106	21.9%
	cocaïne ou dérivé	130	35.0%	32	28.6%	162	33.5%
	autre stimulant	10	2.7%	2	1.8%	12	2.5%
	hypnotique/sédatif	11	3.0%	2	1.8%	13	2.7%
	hallucinogène	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%
	substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	52	14.0%	12	10.7%	64	13.2%
	tabac	2	0.5%	1	0.9%	3	0.6%
	autre substance	1	0.3%	1	0.9%	2	0.4%
	comportement de type addictif	4	1.1%	4	3.6%	9	1.9%
	Total		371	100.0%	112	100.0%	484


Remarque: *selon le manuel act-info, on se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

Problème principal* lors de l'admission - 5 groupes généraux (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qhaupt	alcool	79	21.3%	32	28.6%	111	22.9%
	drogue illégale	274	73.9%	72	64.3%	346	71.5%
	hypnotique/sédatif	11	3.0%	2	1.8%	13	2.7%
	autre substance	3	0.8%	2	1.8%	5	1.0%
	comportement de type addictif	4	1.1%	4	3.6%	9	1.9%
	Total		371	100.0%	112	100.0%	484

Remarque: *selon le manuel act-info, on se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

Problème principal lors de l'admission - 5 groupes généraux (pp5grp) (2017)



Remarque: selon le manuel act-info, on se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s

3.1.1 Problème principal 'alcool'

Fréq. de consommation du PP 'alcool' durant les 30j/6m précédant l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073a	chaque jour	35	49.3%	8	28.6%	43	43.4%
	4 à 6 jours par semaine	4	5.6%	2	7.1%	6	6.1%
	2 à 3 jours par semaine	5	7.0%	3	10.7%	8	8.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	8	11.3%	3	10.7%	11	11.1%
	aucun-e consommation/usage	19	26.8%	12	42.9%	31	31.3%
	Total	71	100.0%	28	100.0%	99	100.0%

Âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed040					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	14.93	4.16	13.00	14.00	16.00	72
Femmes	17.37	6.83	14.00	15.00	18.00	30
TOTAL	15.65	5.18	13.00	14.00	17.00	102

Âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed060					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	24.60	8.11	18.00	22.00	30.00	67
Femmes	25.93	10.34	17.00	26.00	32.00	29
TOTAL	25.00	8.81	18.00	24.00	30.00	96

3.1.2 Problème principal 'opioïde'

Fréq. de l'usage du PP 'opioïde' durant les 30j/6m précédant l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073babe	chaque jour	18	25.7%	6	25.0%	24	25.5%
	4 à 6 jours par semaine	7	10.0%	2	8.3%	9	9.6%
	2 à 3 jours par semaine	6	8.6%	1	4.2%	7	7.4%
	1 jour par semaine ou moins souvent	8	11.4%	3	12.5%	11	11.7%
	aucun-e consommation/usage	31	44.3%	12	50.0%	43	45.7%
	Total	70	100.0%	24	100.0%	94	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed040					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	21.61	7.26	18.00	20.00	24.00	74
Femmes	17.71	3.38	14.50	17.50	21.00	24
TOTAL	20.65	6.73	17.00	19.00	22.00	98

Âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed060					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	24.18	6.78	20.00	23.00	28.00	73
Femmes	19.73	2.96	18.00	19.50	22.00	22
TOTAL	23.15	6.38	19.00	22.00	26.00	95

3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés'

Fréq. de l'usage du PP 'cocaïne ou dérivé' durant les 30j/6m précédant l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073cacc	chaque jour	30	26.8%	5	22.7%	35	26.1%
	4 à 6 jours par semaine	7	6.3%	1	4.5%	8	6.0%
	2 à 3 jours par semaine	20	17.9%	3	13.6%	23	17.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	21	18.8%	7	31.8%	28	20.9%
	aucun-e consommation/usage	34	30.4%	6	27.3%	40	29.9%
	Total	112	100.0%	22	100.0%	134	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivé' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed040					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	20.06	6.26	16.00	18.00	22.00	117
Femmes	21.40	7.53	16.00	20.00	25.00	30
TOTAL	20.33	6.54	16.00	18.00	22.00	147

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivé' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed060					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	25.72	8.18	20.00	24.00	28.00	114
Femmes	25.52	8.33	18.00	24.00	29.00	25
TOTAL	25.68	8.17	20.00	24.00	29.00	139

3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'

Fréq. de l'usage du PP 'autre stimulant' durant les 30j/6m précédant l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073dade	chaque jour	1	10.0%	1	50.0%	2	16.7%
	4 à 6 jours par semaine	1	10.0%	1	50.0%	2	16.7%
	2 à 3 jours par semaine	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	aucun-e consommation/usage	5	50.0%	0	0.0%	5	41.7%
	Total	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed040					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	18.60	4.58	16.00	17.50	20.00	10
Femmes	23.50	7.78	18.00	23.50	29.00	2
TOTAL	19.42	5.12	16.50	18.00	22.00	12

Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed060					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	22.10	5.51	18.00	20.00	26.00	10
Femmes	24.00	8.49	18.00	24.00	30.00	2
TOTAL	22.42	5.65	18.00	20.00	27.00	12

3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'

Fréq. de l'usage du PP 'hypnotique/sédatif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073eaed	chaque jour	7	63.6%	2	100.0%	9	69.2%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	3	27.3%	0	0.0%	3	23.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	Total	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed040					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	21.38	10.89	15.00	16.00	25.00	8
Femmes	0
TOTAL	21.38	10.89	15.00	16.00	25.00	8

Âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed060					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	25.38	10.64	18.50	21.50	30.00	8
Femmes	0
TOTAL	25.38	10.64	18.50	21.50	30.00	8

3.1.6 Problème principal 'hallucinogène'

Fréq. de l'usage du PP 'hallucinogène' durant les 30j/6m précédant l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073fafc	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'hallucinogène' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE	qmed040					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	19.50	6.36	15.00	19.50	24.00	2
Femmes	0
TOTAL	19.50	6.36	15.00	19.50	24.00	2

Âge au début de l'usage problématique du PP 'hallucinogène' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE	qmed060					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	22.00	8.49	16.00	22.00	28.00	2
Femmes	0
TOTAL	22.00	8.49	16.00	22.00	28.00	2

3.1.7 Problème principal 'substances volatiles' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

—

3.1.8 Problème principal 'cannabis'

Fréq. de l'usage du PP 'cannabis' durant les 30j/6m précédant l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073h	chaque jour	31	62.0%	7	63.6%	38	62.3%
	4 à 6 jours par semaine	3	6.0%	0	0.0%	3	4.9%
	2 à 3 jours par semaine	4	8.0%	1	9.1%	5	8.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	2.0%	0	0.0%	1	1.6%
	aucun-e consommation/usage	11	22.0%	3	27.3%	14	23.0%
	Total	50	100.0%	11	100.0%	61	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed040					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	14.38	3.38	13.00	14.00	16.00	50
Femmes	13.45	2.07	13.00	14.00	14.00	11
TOTAL	14.21	3.19	13.00	14.00	15.00	61

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed060					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	18.48	7.00	15.00	16.00	19.00	42
Femmes	16.60	3.10	14.00	16.00	18.00	10
TOTAL	18.12	6.45	15.00	16.00	18.50	52

3.1.9 Problème principal 'tabac'

Fréq. de consommation du PP 'tabac' durant les 30j/6m précédant l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073i	chaque jour	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%

Âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed040					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1
Femmes	19.00	.	19.00	19.00	19.00	1
TOTAL	18.50	.71	18.00	18.50	19.00	2

Âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed060					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	36.50	21.92	21.00	36.50	52.00	2
Femmes	0
TOTAL	36.50	21.92	21.00	36.50	52.00	2

3.1.10 Problème principal 'autre substance'

Fréq. de l'usage du PP 'autre substance' durant les 30j/6m précédant l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073j	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'autre substance' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE	qmed040					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1
Femmes	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1
TOTAL	15.50	.71	15.00	15.50	16.00	2

Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre substance' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE	qmed060					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1
Femmes	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1
TOTAL	16.00	1.41	15.00	16.00	17.00	2

3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation

Principal mode de consommation relatif au PP 'héroïne', lors de l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=HÉROÏNE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	22	29.3%	9	36.0%	31	31.0%
	fumée/inhalation	34	45.3%	11	44.0%	45	45.0%
	ingestion (manger/boire)	2	2.7%	1	4.0%	3	3.0%
	sniff	16	21.3%	4	16.0%	20	20.0%
	autre	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	75	100.0%	25	100.0%	100	100.0%

Principal mode de consommation relatif au PP 'cocaïne sous forme de poudre', lors de l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE EN POUDRE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	26	25.2%	8	27.6%	34	25.8%
	fumée/inhalation	32	31.1%	13	44.8%	45	34.1%
	ingestion (manger/boire)	1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%
	sniff	44	42.7%	8	27.6%	52	39.4%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	103	100.0%	29	100.0%	132	100.0%

Principal mode de consommation relatif au PP 'cannabis', lors de l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fumée/inhalation	50	96.2%	11	91.7%	61	95.3%
	ingestion (manger/boire)	1	1.9%	0	0.0%	1	1.6%
	sniff	1	1.9%	0	0.0%	1	1.6%
	autre	0	0.0%	1	8.3%	1	1.6%
	Total	52	100.0%	12	100.0%	64	100.0%

3.3 Autres substances ou comportements problématiques

si PP 'alcool': autres substances ou cpts problématiques lors de l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
\$xned070	alcool	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	héroïne	15	24.2%	6	23.1%	21	23.9%
	méthadone	2	3.2%	1	3.8%	3	3.4%
	buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	4	6.5%	1	3.8%	5	5.7%
	cocaïne en poudre	36	58.1%	15	57.7%	51	58.0%
	crack	5	8.1%	3	11.5%	8	9.1%
	autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	12	19.4%	3	11.5%	15	17.0%
	méthamphétamines	2	3.2%	1	3.8%	3	3.4%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	9	14.5%	3	11.5%	12	13.6%
	cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	11	17.7%	2	7.7%	13	14.8%
	GHB/GBL	1	1.6%	1	3.8%	2	2.3%
	autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	6	9.7%	1	3.8%	7	8.0%
	kétamine	2	3.2%	1	3.8%	3	3.4%
	autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%
	cannabis	31	50.0%	13	50.0%	44	50.0%
	tabac	38	61.3%	16	61.5%	54	61.4%
	autre(s) substance(s)	1	1.6%	1	3.8%	2	2.3%
	jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	3	4.8%	5	19.2%	8	9.1%
	aucune	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Remarques: selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

si PP 'drogue illégale': autres substances ou cpts problématiques lors de l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=DROGUE ILLÉGALE		Hommes		Femmes		TOTAL	
\$xned070	alcool	95	43.0%	20	33.3%	115	40.9%
	héroïne	40	18.1%	16	26.7%	56	19.9%
	méthadone	18	8.1%	3	5.0%	21	7.5%
	buprénorphine	2	0.9%	0	0.0%	2	0.7%
	fentanyl	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%
	autres opioïdes	13	5.9%	3	5.0%	16	5.7%
	cocaïne en poudre	79	35.7%	27	45.0%	106	37.7%
	crack	26	11.8%	5	8.3%	31	11.0%
	autre forme de cocaïne	4	1.8%	0	0.0%	4	1.4%
	amphétamines	36	16.3%	8	13.3%	44	15.7%
	méthamphétamines	13	5.9%	3	5.0%	16	5.7%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	39	17.6%	7	11.7%	46	16.4%
	cathinones synthétiques	3	1.4%	0	0.0%	3	1.1%
	autres stimulants	3	1.4%	2	3.3%	5	1.8%
	barbituriques	3	1.4%	1	1.7%	4	1.4%
	benzodiazépines	44	19.9%	12	20.0%	56	19.9%
	GHB/GBL	8	3.6%	1	1.7%	9	3.2%
	autres hypnotiques et sédatifs	5	2.3%	1	1.7%	6	2.1%
	LSD	22	10.0%	4	6.7%	26	9.3%
	kétamine	11	5.0%	2	3.3%	13	4.6%
	autres hallucinogènes	8	3.6%	1	1.7%	9	3.2%
	substances volatiles	2	0.9%	1	1.7%	3	1.1%
	cannabis	81	36.7%	20	33.3%	101	35.9%
	tabac	131	59.3%	33	55.0%	164	58.4%
	autre(s) substance(s)	4	1.8%	0	0.0%	4	1.4%
	jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	4	1.8%	5	8.3%	9	3.2%
	aucune	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Remarques: selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

si PP 'hypnotique/sédatif': autres substances ou cpts problématiques lors de l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
\$xned070	alcool	7	77.8%	1	100.0%	8	80.0%
	héroïne	3	33.3%	1	100.0%	4	40.0%
	méthadone	2	22.2%	0	0.0%	2	20.0%
	buprénorphine	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%
	fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne en poudre	5	55.6%	1	100.0%	6	60.0%
	crack	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%
	autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	4	44.4%	0	0.0%	4	40.0%
	méthamphétamines	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	3	33.3%	0	0.0%	3	30.0%
	cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%
	kétamine	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%
	autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%
	cannabis	3	33.3%	1	100.0%	4	40.0%
	tabac	7	77.8%	1	100.0%	8	80.0%
	autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucune	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Remarques: selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

si PP 'autre subst.': autres substances ou cpts problématiques lors de l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		Hommes		Femmes		TOTAL	
\$xned070	alcool	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%
	héroïne	1	50.0%	1	100.0%	2	66.7%
	méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne en poudre	1	50.0%	1	100.0%	2	66.7%
	crack	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%
	autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%
	méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%
	GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%
	tabac	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucune	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Remarques: selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

si PP 'comportement de type addictif': autres substances ou cpts problématiques lors de l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
\$xned070	alcool	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%
	héroïne	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%
	méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne en poudre	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%
	crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%
	benzodiazépines	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%
	GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%
	LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	3	100.0%	1	50.0%	4	80.0%
	tabac	2	66.7%	0	0.0%	2	40.0%
	autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucune	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Remarques: selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

3.4 Utilisation de substances multiples (CIM-10)

Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (CIM-10) (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned015	oui	155	47.3%	50	49.0%	205	47.6%
	non	173	52.7%	52	51.0%	226	52.4%
	Total	328	100.0%	102	100.0%	431	100.0%

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement.

Si PP 'alcool': Question filtrée - Si oui: quelle combinaison de substances? (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned016	Alc + Can	3	10.7%	1	16.7%	4	11.8%
	Alc + Hyp/Séd	1	3.6%	0	0.0%	1	2.9%
	Alc + Sti + Can	1	3.6%	0	0.0%	1	2.9%
	Alc + Coc	4	14.3%	1	16.7%	5	14.7%
	Alc+ Coc + Tab	1	3.6%	0	0.0%	1	2.9%
	Alc + Coc+ Can	1	3.6%	2	33.3%	3	8.8%
	Alc + Coc + Can + Tab	3	10.7%	1	16.7%	4	11.8%
	Alc + Coc + Hyp/Séd	1	3.6%	0	0.0%	1	2.9%
	Alc + Coc + Sti + Tab	1	3.6%	0	0.0%	1	2.9%
	Alc + Coc + Sti + Can	1	3.6%	0	0.0%	1	2.9%
	Alc + Coc + Sti + Hall + Can + Tab	2	7.1%	0	0.0%	2	5.9%
	Alc + Opi	2	7.1%	0	0.0%	2	5.9%
	Alc + Opi + Can	2	7.1%	0	0.0%	2	5.9%
	Alc + Opi + Can + Tab	1	3.6%	0	0.0%	1	2.9%
	Alc + Opi + Hyp/Séd + Can + Tab	1	3.6%	0	0.0%	1	2.9%
	Alc + Opi + Coc	2	7.1%	0	0.0%	2	5.9%
	Alc + Opi + Coc + Can	0	0.0%	1	16.7%	1	2.9%
	Alc + Opi + Coc + Can + Tab	1	3.6%	0	0.0%	1	2.9%
	Total	28	100.0%	6	100.0%	34	100.0%

Si PP 'drogue illégale': Question filtrée - Si oui: quelle combinaison de substances? (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=DROGUE ILLÉGALE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned016	Alc + Can	3	2.8%	2	5.6%	5	3.5%
	Alc + Can + Tab	0	0.0%	1	2.8%	1	0.7%
	Alc + Sti	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
	Alc + Coc	11	10.2%	1	2.8%	12	8.3%
	Alc + Coc + Tab	3	2.8%	0	0.0%	3	2.1%
	Alc + Coc + Can	5	4.6%	0	0.0%	5	3.5%
	Alc + Coc + Can + Tab	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Alc + Coc + Hyp/Séd	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Alc + Coc + Hyp/Séd + Can	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Alc + Coc + Hyp/Séd + Can + Tab	1	0.9%	1	2.8%	2	1.4%
	Alc + Coc + Sti	2	1.9%	1	2.8%	3	2.1%
	Alc + Coc + Sti + Can + Tab	3	2.8%	0	0.0%	3	2.1%
	Alc + Coc + Sti + Hall + Can	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Alc + Opi	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Alc + Opi + Tab	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
	Alc + Opi + Sti + Tab	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Alc + Opi + Sti + Hyp/Séd + Can	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Alc + Opi + Coc	0	0.0%	4	11.1%	4	2.8%
	Alc+ Opi + Coc + Tab	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
	Alc + Opi + Coc + Can	3	2.8%	1	2.8%	4	2.8%
	Alc + Opi + Coc + Can + Tab	0	0.0%	1	2.8%	1	0.7%
	Alc + Opi + Coc + Hyp/Séd	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
	Alc + Opi + Coc + Hyp/Séd + Can + Tab	0	0.0%	2	5.6%	2	1.4%
	Alc + Opi + Coc + Sti	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Alc + Opi + Sti + Can + Tab	0	0.0%	1	2.8%	1	0.7%
	Alc + Opi + Coc + Sti + Hall + Can	0	0.0%	1	2.8%	1	0.7%
	Alc + Opi + Coc + Sti + Hall + Can + Tab	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Alc + Opi + Coc + Sti + Hyp/Séd	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Alc + Opi + Coc + Sti + Hyp/Séd + Can + Tab	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Alc+Opi+Coc+Sti+Hyp/Séd+Can+Tab+autre	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Alc+Opi+Coc+Sti+Hyp/Séd+Hall+Can	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Alc+Opi+Coc+Sti+Hyp/Séd+Hall+Can+autre	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Alc+Opi+Coc+Sti+Hyp/Séd+Hall+Can+Tab	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Can + Tab	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Coc + Tab	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Coc + Can	4	3.7%	2	5.6%	6	4.2%
	Coc + Can + Tab	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Coc + Hyp/Séd	1	0.9%	1	2.8%	2	1.4%
	Coc + Hyp/Séd + Can	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%

Si PP 'drogue illégale': Question filtrée - Si oui: quelle combinaison de substances? (2017) (suite)

PROBLÈME PRINCIPAL=DROGUE ILLÉGALE	Hommes		Femmes		TOTAL	
Coc + Sti + Can	0	0.0%	1	2.8%	1	0.7%
Coc + Sti + Hall	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Coc + Sti + Hall + Can + Tab	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Coc + Sti + Hyp/Séd + Can	0	0.0%	1	2.8%	1	0.7%
Opi + Can	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Opi + Can + Tab	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Opi + Hyp/Sed	3	2.8%	0	0.0%	3	2.1%
Opi + Sti	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Opi + Sti + Can	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Opi + Coc	12	11.1%	6	16.7%	18	12.5%
Opi + Coc + autre	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Opi + Coc + Tab	1	0.9%	1	2.8%	2	1.4%
Opi + Coc + Can	6	5.6%	1	2.8%	7	4.9%
Opi + Coc + Hall + Can + Tab	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Opi + Coc + Hyp/Séd	5	4.6%	1	2.8%	6	4.2%
Opi + Coc + Hyp/Séd + Tab	2	1.9%	2	5.6%	4	2.8%
Opi + Coc + Hyp/Séd + Can	1	0.9%	2	5.6%	3	2.1%
Opi + Coc + Sti + Hall + Can + Tab	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
Opi + Coc + Sti + Hall +subst. volatile +Can + Tab	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Opi + Coc + Sti + Hyp/Séd + Hall + Can +Tab	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Sti + Can	0	0.0%	1	2.8%	1	0.7%
Sti + Can + Tab	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Sti + Hall	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Sti + Hall + Can	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Sti + Hall + Can + Tab	0	0.0%	1	2.8%	1	0.7%
Total	108	100.0%	36	100.0%	144	100.0%

Si PP 'hypnotique/sédatif': Question filtrée - Si oui: quelle combinaison de substances? (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned016	Alc +Hyp/Séd	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%
	Alc + Sti + Hyp/Séd	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%
	Alc + Coc + Hyp/Séd + Can + Tab	0	0.0%	1	100.0%	1	20.0%
	Coc + Hyp/Séd + Tab	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%
	Opi + Hyp/Séd	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%
	Total	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%

3.5 Usage de drogues illégales par injection

Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned090	oui	131	37.1%	52	47.7%	184	39.7%
	jamais	221	62.6%	57	52.3%	278	60.0%
	ne souhaite pas répondre	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
	Total	353	100.0%	109	100.0%	463	100.0%

Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection (2017)

	qmed096 Âge (en années)					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	20.63	10.43	17.00	21.00	26.00	131
Femmes	16.83	8.59	15.00	18.50	22.00	52
TOTAL	19.52	10.04	16.00	20.00	25.00	184

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned092	oui	27	23.7%	19	44.2%	47	29.7%
	jamais	86	75.4%	23	53.5%	109	69.0%
	ne souhaite pas répondre	1	0.9%	1	2.3%	2	1.3%
	Total	114	100.0%	43	100.0%	158	100.0%

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned093	oui	94	74.6%	26	52.0%	121	68.4%
	non, pas dans les 12 derniers mois	32	25.4%	24	48.0%	56	31.6%
	Total	126	100.0%	50	100.0%	177	100.0%

Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned094	oui	8	29.6%	6	31.6%	15	31.9%
	non, pas dans les 12 derniers mois	19	70.4%	13	68.4%	32	68.1%
	Total	27	100.0%	19	100.0%	47	100.0%

Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned095	oui	44	51.8%	11	50.0%	55	50.9%
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	41	48.2%	11	50.0%	53	49.1%
	Total	85	100.0%	22	100.0%	108	100.0%

Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned098	oui	2	25.0%	3	50.0%	5	33.3%
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	6	75.0%	3	50.0%	10	66.7%
	Total	8	100.0%	6	100.0%	15	100.0%

4. Santé

4.1 Santé physique

Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qyek040	oui	281	84.6%	91	93.8%	373	86.7%
	jamais	50	15.1%	6	6.2%	56	13.0%
	ne souhaite pas répondre	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
	Total	332	100.0%	97	100.0%	430	100.0%

Question filtrée - si oui: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qyek041	oui	189	70.5%	69	79.3%	259	72.8%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	79	29.5%	18	20.7%	97	27.2%
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	268	100.0%	87	100.0%	356	100.0%

Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qyek060	oui	255	82.5%	88	88.9%	344	84.1%
	jamais	53	17.2%	11	11.1%	64	15.6%
	ne souhaite pas répondre	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
	Total	309	100.0%	99	100.0%	409	100.0%

Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qyek061	oui	171	71.5%	70	85.4%	242	75.2%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	67	28.0%	12	14.6%	79	24.5%
	ne souhaite pas répondre	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%
	Total	239	100.0%	82	100.0%	322	100.0%

Informations recueillies au moment de la SORTIE

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe et âge


Nombre de sorties, selon le sexe (2017)

	n	%	% valides	% cumulés
Hommes	346	75.7	75.7	75.7
Femmes	111	24.3	24.3	100.0
Total	457	100.0	100.0	

Âge à la sortie, selon le sexe (2017)

	qmac005 Âge (en années)					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes	34.83	10.73	27.00	34.00	42.00	346
Femmes	34.99	10.32	28.00	34.00	41.00	111
TOTAL	34.87	10.62	28.00	34.00	42.00	457

Distribution de l'âge lors de la sortie, selon le sexe (2017)



1.2 Intégration sociale

Partenaire(s) d'habitation à la sortie (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qnac030	seul-e en ménage	102	32.7%	26	26.3%	128	31.1%
	avec famille d'origine	54	17.3%	10	10.1%	64	15.6%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	36	11.5%	14	14.1%	50	12.2%
	avec des amis ou d'autres personnes	19	6.1%	8	8.1%	27	6.6%
	en prison	17	5.4%	2	2.0%	19	4.6%
	institution thérapeutique/foyer	56	17.9%	24	24.2%	80	19.5%
	hôpital/clinique	11	3.5%	7	7.1%	18	4.4%
	autre	17	5.4%	8	8.1%	25	6.1%
	Total	312	100.0%	99	100.0%	411	100.0%

Situation de logement à la sortie (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qnac040	logement stable	180	57.7%	43	43.0%	223	54.1%
	logement instable/sans domicile fixe	42	13.5%	18	18.0%	60	14.6%
	en prison	18	5.8%	2	2.0%	20	4.9%
	institution/foyer/hôpital/autre	72	23.1%	37	37.0%	109	26.5%
	Total	312	100.0%	100	100.0%	412	100.0%

2. Déroulement de la prise en charge

2.1 Durée de la prise en charge

Durée de la prise en charge (en semaines) (2017)

	Durée (en semaines)					N
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	
Hommes	39.99	37.05	15.14	27.50	52.14	346
Femmes	41.73	36.63	14.57	30.71	64.14	111
TOTAL	40.42	36.91	14.71	28.29	54.00	457

Durée de la prise en charge (2017)

		Hommes	Femmes	TOTAL			
@mab020	1 semaine ou moins	4	1.2%	0	0.0%	4	0.9%
	> 1 semaine à 1 mois	18	5.2%	11	9.9%	29	6.3%
	>1 mois à 2 mois	26	7.5%	5	4.5%	31	6.8%
	>2 mois à 3 mois	24	6.9%	7	6.3%	31	6.8%
	>3 mois à 6 mois	70	20.2%	22	19.8%	92	20.1%
	> 6 mois à 1 année	115	33.2%	33	29.7%	148	32.4%
	> 1 année à 2 ans	66	19.1%	27	24.3%	93	20.4%
	> 2 ans à 3 ans	14	4.0%	5	4.5%	19	4.2%
	> 3 ans à 5 ans	9	2.6%	1	0.9%	10	2.2%
	> 5 ans à 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	346	100.0%	111	100.0%	457	100.0%

2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

Raison principale de la fin de la prise en charge (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmab040	fin régulière sans transfert	123	35.9%	34	30.6%	157	34.6%
	fin régulière avec transfert	55	16.0%	28	25.2%	83	18.3%
	changement de domicile	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
	hospitalisation	4	1.2%	4	3.6%	8	1.8%
	détention	9	2.6%	2	1.8%	11	2.4%
	perte de contact	3	0.9%	1	0.9%	4	0.9%
	rupture explicite	136	39.7%	37	33.3%	173	38.1%
	décès	1	0.3%	1	0.9%	2	0.4%
	autre raison	11	3.2%	4	3.6%	15	3.3%
	Total	343	100.0%	111	100.0%	454	100.0%

Question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qnab041	traitement résidentiel	12	21.8%	10	37.0%	22	26.8%
	structure/clinique de jour	11	20.0%	5	18.5%	16	19.5%
	prise en charge ambulatoire	26	47.3%	11	40.7%	37	45.1%
	appartement protégé	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre institution spécialisée	6	10.9%	1	3.7%	7	8.5%
	Total	55	100.0%	27	100.0%	82	100.0%

Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours? (2017)

		qmab042 Nombre de jours					
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N
Hommes		16.50	20.51	2.00	16.50	31.00	2
Femmes		0
TOTAL		16.50	20.51	2.00	16.50	31.00	2

Question filtrée - si décès: quelle cause? (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmab044	suicide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	accident	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	maladie	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	surdose ou intoxication aiguë	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre cause de décès	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

3. Substances ou comportements problématiques

3.1 Substances ou comportements problématiques

Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie (2017)

		Hommes		Femmes		TOTAL	
\$nad010	alcool	168	50.0%	67	60.9%	235	52.7%
	héroïne	99	29.5%	36	32.7%	135	30.3%
	méthadone	6	1.8%	2	1.8%	8	1.8%
	buprénorphine	2	0.6%	1	0.9%	3	0.7%
	fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	5	1.5%	3	2.7%	8	1.8%
	cocaïne en poudre	157	46.7%	43	39.1%	200	44.8%
	crack	8	2.4%	0	0.0%	8	1.8%
	autres formes de cocaïne	2	0.6%	1	0.9%	3	0.7%
	amphétamines	25	7.4%	4	3.6%	29	6.5%
	méthamphétamines	12	3.6%	2	1.8%	14	3.1%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	15	4.5%	1	0.9%	16	3.6%
	cathinones synthétiques	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
	autres stimulants	2	0.6%	1	0.9%	3	0.7%
	barbituriques	3	0.9%	0	0.0%	3	0.7%
	benzodiazépines	26	7.7%	23	20.9%	49	11.0%
	GHB/GBL	7	2.1%	1	0.9%	8	1.8%
	autres hypnotiques et sédatifs	3	0.9%	2	1.8%	5	1.1%
	LSD	8	2.4%	1	0.9%	9	2.0%
	kétamine	2	0.6%	0	0.0%	2	0.4%
	autres hallucinogènes	3	0.9%	0	0.0%	3	0.7%
	substances volatiles	3	0.9%	0	0.0%	3	0.7%
	cannabis	100	29.8%	21	19.1%	121	27.1%
	tabac	109	32.4%	33	30.0%	142	31.8%
	autre(s) substance(s)	1	0.3%	1	0.9%	2	0.4%
	jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) comportement(s) de type addictif	5	1.5%	2	1.8%	7	1.6%
	aucun	43	12.8%	13	11.8%	56	12.6%

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)