

**ZUSAMMENFASSENDE ERGEBNISSE DER
SCHWEIZERISCHEN GESUNDHEITSBEFRAGUNGEN
2007, 2002, 1997 UND 1992
HINSICHTLICH DES KONSUMS VON
TABAK, ALKOHOL, MEDIKAMENTEN
UND ILLEGALEN DROGEN**

Luca Notari
Marina Delgrande Jordan
Etienne Maffli

INHALTSVERZEICHNIS

TABAK	15
Tabakkonsum, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	16
Tabakkonsum, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	17
Tabakkonsum, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	18
Tabakkonsum, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	19
Tabakkonsum, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	20
Tabakkonsum, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	21
Tabakkonsum, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	22
Tabakkonsum, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	23
Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	24
Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	25
Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	26
Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	27
Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	28
Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	29
Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	30
Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	31
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten* pro Tag, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	32
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten* pro Tag, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	33
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten* pro Tag, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	34
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten* pro Tag, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	35
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten* pro Tag, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	36
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten* pro Tag, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	37

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten* pro Tag, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	38
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten* pro Tag, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	39
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	41
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	42
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	43
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	45
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	46
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	47
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	49
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	50
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	51
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	53
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	54
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	55
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	57
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	58
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	59
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	61
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	62
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Sprachregion pro Tag, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	63
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	65
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	66
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	67
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	69
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	70

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	71
Wasserpfeife-Rauchen, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, 2007	73
Wasserpfeife-Rauchen, nach Alter Männer, aktueller Status, 2007	74
Wasserpfeife-Rauchen, nach Alter Frauen, aktueller Status, 2007	75
Wasserpfeife-Rauchen, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, 2007	77
Wasserpfeife-Rauchen, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, 2007	78
Wasserpfeife-Rauchen, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, 2007	79
Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2007	80
Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2007	81
Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter Rauchende Männer, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2007	82
Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter Rauchende Frauen, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2007	83
Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2007	84
Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2007	85
Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion Rauchende Männer, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2007	86
Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion Rauchende Frauen, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2007	87
Passives Rauchen, nach Alter Gesamtpopulation, Anzahl Stunden pro Tag, 2007	89
Passives Rauchen, nach Alter Männer, Anzahl Stunden pro Tag, 2007	90
Passives Rauchen, nach Alter Frauen, Anzahl Stunden pro Tag, 2007	91
Passives Rauchen, nach Sprachregion Gesamtpopulation, Anzahl Stunden pro Tag, 2007	93
Passives Rauchen, nach Sprachregion Männer, Anzahl Stunden pro Tag, 2007	94
Passives Rauchen, nach Sprachregion Frauen, Anzahl Stunden pro Tag, 2007	95

ALKOHOL **97**

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	98
Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	99

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	100
Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	101
Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	102
Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	103
Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	104
Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007	105
Alkohol-Abstinenz, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	106
Alkohol-Abstinenz, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	107
Alkohol-Abstinenz, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	108
Alkohol-Abstinenz, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	109
Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	110
Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	111
Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	112
Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	113
Häufigkeit des Bierkonsums, nach Alter Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	115
Häufigkeit des Bierkonsums, nach Alter Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	116
Häufigkeit des Bierkonsums, nach Alter Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	117
Häufigkeit des Bierkonsums, nach Sprachregion Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	119
Häufigkeit des Bierkonsums, nach Sprachregion Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	120
Häufigkeit des Bierkonsums, nach Sprachregion Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	121
Häufigkeit des Weinkonsums, nach Alter Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	123
Häufigkeit des Weinkonsums, nach Alter Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	124
Häufigkeit des Weinkonsums, nach Alter Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	125
Häufigkeit des Weinkonsums, nach Sprachregion Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	127
Häufigkeit des Weinkonsums, nach Sprachregion Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	128

Häufigkeit des Weinkonsums, nach Sprachregion Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	129
Häufigkeit des Apfelweinkonsums, nach Alter Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	131
Häufigkeit des Apfelweinkonsums, nach Alter Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	132
Häufigkeit des Apfelweinkonsums, nach Alter Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	133
Häufigkeit des Apfelweinkonsums, nach Sprachregion Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	135
Häufigkeit des Apfelweinkonsums, nach Sprachregion Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	136
Häufigkeit des Apfelweinkonsums, nach Sprachregion Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	137
Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Alter Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	139
Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Alter Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	140
Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Alter Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	141
Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Sprachregion Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	143
Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Sprachregion Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	144
Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Sprachregion Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007	145
Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Alter Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, 2007	147
Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Alter Männer, in den letzten 7 Tagen, 2007	148
Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Alter Frauen, in den letzten 7 Tagen, 2007	149
Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Sprachregion Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, 2007	151
Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Sprachregion Männer, in den letzten 7 Tagen, 2007	152
Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Sprachregion Frauen, in den letzten 7 Tagen, 2007	153
Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, 2007	155
Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter Männer, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, 2007	156
Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter Frauen, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, 2007	157
Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, 2007	159
Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion Männer, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, 2007	160
Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion Frauen, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, 2007	161

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränkety, Vergleich 1997-2007	163
Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter Männer, in Liter reines Alkohols pro Getränkety, Vergleich 1997-2007	164
Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter Frauen, in Liter reines Alkohols pro Getränkety, Vergleich 1997-2007	165
Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränkety, Vergleich 1997-2007	167
Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion Männer, in Liter reines Alkohols pro Getränkety, Vergleich 1997-2007	168
Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion Frauen, in Liter reines Alkohols pro Getränkety, Vergleich 1997-2007	169
Alkohol-Konsumklassen, nach Alter Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, 2007	171
Alkohol-Konsumklassen, nach Alter Männer, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, 2007	172
Alkohol-Konsumklassen, nach Alter Frauen, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, 2007	173
Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, 2007	175
Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion Männer, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, 2007	176
Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion Frauen, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, 2007	177
Alkohol-Konsumklassen, nach Alter Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2007	178
Alkohol-Konsumklassen, nach Alter Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2007	179
Alkohol-Konsumklassen, nach Alter Männer, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2007	180
Alkohol-Konsumklassen, nach Alter Frauen, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2007	181
Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2007	182
Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2007	183
Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion Männer, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2007	184
Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion Frauen, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2007	185
Häufigkeit des gelegentlichsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Alter Gesamtpopulation, im letzten Jahr, 2007	187
Häufigkeit des gelegentlichsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Alter Männer, im letzten Jahr, 2007	188
Häufigkeit des gelegentlichsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Alter Frauen, im letzten Jahr, 2007	189
Häufigkeit des gelegentlichsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Sprachregion Gesamtpopulation, im letzten Jahr, 2007	191
Häufigkeit des gelegentlichsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Sprachregion Männer, im letzten Jahr, 2007	192

Häufigkeit des gelegentlichsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Sprachregion Frauen, im letzten Jahr, 2007	193
Häufigkeit des Rauschtrinkens, nach Alter Gesamtpopulation, im letzten Jahr, Vergleich 1997-2007	195
Häufigkeit des Rauschtrinkens, nach Alter Männer, im letzten Jahr, Vergleich 1997-2007	196
Häufigkeit des Rauschtrinkens, nach Alter Frauen, im letzten Jahr, Vergleich 1997-2007	197
Häufigkeit des Rauschtrinkens, nach Sprachregion Gesamtpopulation, im letzten Jahr, Vergleich 1997-2007	199
Häufigkeit des Rauschtrinkens, nach Sprachregion Männer, im letzten Jahr, Vergleich 1997-2007	200
Häufigkeit des Rauschtrinkens, nach Sprachregion Frauen, im letzten Jahr, Vergleich 1997-2007	201
Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Alter Gesamtpopulation, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, 2007	203
Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Alter Männer, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, 2007	204
Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Alter Frauen, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, 2007	205
Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Sprachregion Gesamtpopulation, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, 2007	207
Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Sprachregion Männer, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, 2007	208
Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Sprachregion Frauen, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, 2007	209
Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Alter Gesamtpopulation, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, Vergleich 1997-2007	210
Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Alter Gesamtpopulation, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, Vergleich 1997-2007	211
Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Alter Männer, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, Vergleich 1997-2007	212
Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Alter Frauen, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, Vergleich 1997-2007	213
Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Sprachregion Gesamtpopulation, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, Vergleich 1997-2007	214
Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Sprachregion Gesamtpopulation, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, Vergleich 1997-2007	215
Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Sprachregion Männer, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, Vergleich 1997-2007	216
Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Sprachregion Frauen, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, Vergleich 1997-2007	217
Fragen zur Berechnung der AUDIT-Scores:	218

MEDIKAMENTE **219**

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	220
--	-----

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	221
Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	222
Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	223
Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	224
Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	225
Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	226
Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	227
Häufigkeit der Beruhigungsmiteleinnahe, nach Alter Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	228
Häufigkeit der Beruhigungsmiteleinnahe, nach Alter Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	229
Häufigkeit der Beruhigungsmiteleinnahe, nach Alter Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	230
Häufigkeit der Beruhigungsmiteleinnahe, nach Alter Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	231
Häufigkeit der Beruhigungsmiteleinnahe, nach Sprachregion Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	232
Häufigkeit der Beruhigungsmiteleinnahe, nach Sprachregion Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	233
Häufigkeit der Beruhigungsmiteleinnahe, nach Sprachregion Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	234
Häufigkeit der Beruhigungsmiteleinnahe, nach Sprachregion Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	235
Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	236
Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	237
Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	238
Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	239
Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	240
Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	241
Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	242
Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007	243
Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007	244
Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007	245

Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit Männer, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007	246
Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit Frauen, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007	247
Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007	248
Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007	249
Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit Männer, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007	250
Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit Frauen, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007	251
Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007	252
Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007	253
Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit Männer, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007	254
Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit Frauen, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007	255

ILLEGALE DROGEN

257

Gebrauch von illegalen Drogen, nach Alter Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2007	258
Gebrauch von illegalen Drogen, nach Alter Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2007	259
Gebrauch von illegalen Drogen, nach Alter Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2007	260
Gebrauch von illegalen Drogen, nach Alter Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2007	261
Gebrauch von illegalen Drogen, nach Sprachregion Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2007	262
Gebrauch von illegalen Drogen, nach Sprachregion Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2007	263
Gebrauch von illegalen Drogen, nach Sprachregion Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2007	264
Gebrauch von illegalen Drogen, nach Sprachregion Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2007	265
Cannabisgebrauch, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007	266
Cannabisgebrauch, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007	267
Cannabisgebrauch, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007	268
Cannabisgebrauch, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007	269
Cannabisgebrauch, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	270

Cannabisgebrauch, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	271
Cannabisgebrauch, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	272
Cannabisgebrauch, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	273
Häufigkeit des Cannabisgebrauchs, nach Alter Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, Vergleich (1992) 1997-2007	274
Heroingebrauch, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007	275
Heroingebrauch, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007	276
Heroingebrauch, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007	277
Heroingebrauch, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	279
Heroingebrauch, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	280
Heroingebrauch, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	281
Kokaingebrauch, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007	283
Kokaingebrauch, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007	284
Kokaingebrauch, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007	285
Kokaingebrauch, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	287
Kokaingebrauch, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	288
Kokaingebrauch, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	289
Gebrauch von Methadon, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007	291
Gebrauch von Methadon, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007	292
Gebrauch von Methadon, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007	293
Gebrauch von Methadon, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	295
Gebrauch von Methadon, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	296
Gebrauch von Methadon, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	297
Gebrauch von Ecstasy, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	299
Gebrauch von Ecstasy, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	300
Gebrauch von Ecstasy, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	301

Gebrauch von Ecstasy, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	303
Gebrauch von Ecstasy, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	304
Gebrauch von Ecstasy, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	305
Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	307
Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	308
Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	309
Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	311
Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	312
Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007	313

MULTIPLER SUBSTANZGEBRAUCH **315**

Alkohol-Konsumklassen und durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten* pro Tag Vergleich 1997-2007	316
Häufigkeit des Cannabisgebrauchs in den letzten 12 Monaten und durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten* pro Tag Vergleich 1997-2007	317
Alkohol-Konsumklassen und Häufigkeit des Cannabisgebrauchs in den letzten 12 Monaten Vergleich 1997-2007	318
Alkohol-Konsumklassen und Häufigkeit der Medikamenteneinnahme in den letzten 7 Tagen Vergleich 1997-2007	319
Häufigkeit der Medikamenteneinnahme in den letzten 7 Tagen und durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten* pro Tag Vergleich 1997-2007	320
Häufigkeit der Medikamenteneinnahme in den letzten 7 Tagen und Häufigkeit des Cannabisgebrauchs in den letzten 12 Monaten Vergleich 1997-2007	321

NACHTRAG (ILLEGALE DROGEN) **321**

Cannabisgebrauch, nach Alter Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007	322
Cannabisgebrauch, nach Alter Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007	322
Cannabisgebrauch, nach Alter Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007	322
Cannabisgebrauch, nach Sprachregion Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007	323
Cannabisgebrauch, nach Sprachregion Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007	323
Cannabisgebrauch, nach Sprachregion Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007	323


Heroingebrauch, nach Alter Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007	324
Heroingebrauch, nach Alter Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007	324
Heroingebrauch, nach Alter Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007	324
Heroingebrauch, nach Sprachregion Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007	325
Heroingebrauch, nach Sprachregion Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007	325
Heroingebrauch, nach Sprachregion Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007	325
Kokaingebrauch, nach Alter Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007	326
Kokaingebrauch, nach Alter Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007	326
Kokaingebrauch, nach Alter Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007	326
Kokaingebrauch, nach Sprachregion Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007	327
Kokaingebrauch, nach Sprachregion Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007	327
Kokaingebrauch, nach Sprachregion Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007	327
Gebrauch von Methadon, nach Alter Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007	328
Gebrauch von Methadon, nach Alter Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007	328
Gebrauch von Methadon, nach Alter Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007	328
Gebrauch von Methadon, nach Sprachregion Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007	329
Gebrauch von Methadon, nach Sprachregion Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007	329
Gebrauch von Methadon, nach Sprachregion Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007	329
Gebrauch von Ecstasy, nach Alter Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007	330
Gebrauch von Ecstasy, nach Alter Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007	330
Gebrauch von Ecstasy, nach Alter Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007	330
Gebrauch von Ecstasy, nach Sprachregion Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007	331
Gebrauch von Ecstasy, nach Sprachregion Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007	331
Gebrauch von Ecstasy, nach Sprachregion Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007	331
Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007	332

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007	332
Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007	332
Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007	333
Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007	333
Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007	333

TABAK

Tabakkonsum, nach Alter

Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007



Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'

Anmerkung: Prozente werden gewichtet berechnet.

Tabakkonsum, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	Nie-Rauchende	62.0	50.1	51.5	42.1	44.5	50.9	60.7	50.9
	Ex-Rauchende	4.4	13.3	18.9	26.6	30.4	32.6	31.4	21.2
	Rauchende	33.6	36.6	29.6	31.2	25.1	16.5	7.9	27.9
	<i>N (gewichtet)</i>	2'865	2'877	3'689	3'228	2'711	1'851	1'527	18'748
	N (ungewichtet)	1'813	2'509	3'807	3'007	3'114	2'494	2'003	18'747
2002	Nie-Rauchende	57.8	51.6	45.1	39.5	44.6	54.5	64.7	49.6
	Ex-Rauchende	4.8	12.4	18.2	26.3	29.9	27.7	25.8	19.9
	Rauchende	37.4	36.0	36.7	34.1	25.4	17.9	9.5	30.5
	<i>N (gewichtet)</i>	2'763	3'364	3'931	3'250	2'732	2'104	1'552	19'697
	N (ungewichtet)	1'700	3'022	4'202	3'174	3'242	2'537	1'822	19'699
1997	Nie-Rauchende	52.3	48.2	39.9	39.4	46.9	55.9	63.6	47.6
	Ex-Rauchende	4.1	11.4	19.9	25.9	27.4	27.1	25.0	19.2
	Rauchende	43.6	40.4	40.2	34.7	25.7	17.0	11.4	33.2
	<i>N (gewichtet)</i>	1'786	2'501	2'465	2'197	1'639	1'392	1'013	12'994
	N (ungewichtet)	1'412	2'866	2'508	1'958	1'682	1'512	1'056	12'994
1992	Nie-Rauchende	63.4	45.5	41.8	41.6	48.6	53.5	61.9	49.2
	Ex-Rauchende	5.7	16.3	22.3	26.4	26.4	28.6	27.4	20.8
	Rauchende	30.9	38.2	35.9	31.9	25.0	17.8	10.7	30.1
	<i>N (gewichtet)</i>	2'302	3'185	2'781	2'527	1'800	1'769	918	15'282
	N (ungewichtet)	1'802	3'541	2'872	2'398	2'003	1'709	957	15'282

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'

Anmerkungen: Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Tabakkonsum, nach Alter

Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	Nie-Rauchende	59.8	44.2	48.0	38.6	33.8	33.9	34.8	43.4
	Ex-Rauchende	3.7	12.6	19.7	28.5	35.3	42.8	54.0	24.3
	Rauchende	36.6	43.2	32.3	32.8	30.8	23.3	11.2	32.3
	<i>N (gewichtet)</i>	1'476	1'419	1'843	1'620	1'343	859	599	9'158
	N (ungewichtet)	923	1'130	1'775	1'422	1'399	1'008	759	8'416
2002	Nie-Rauchende	55.8	45.5	42.3	30.1	30.8	33.4	40.4	40.2
	Ex-Rauchende	4.3	12.3	17.8	30.1	38.9	42.0	44.5	23.9
	Rauchende	39.9	42.2	39.9	39.8	30.3	24.6	15.1	36.0
	<i>N (gewichtet)</i>	1'409	1'661	1'983	1'635	1'351	898	586	9'524
	N (ungewichtet)	857	1'361	2'059	1'448	1'408	1'064	708	8'905
1997	Nie-Rauchende	50.2	45.1	35.5	29.2	32.0	31.7	35.7	37.6
	Ex-Rauchende	(3.2)	9.8	20.1	30.2	37.2	43.8	44.4	23.3
	Rauchende	46.6	45.2	44.3	40.6	30.8	24.5	19.9	39.1
	<i>N (gewichtet)</i>	900	1'241	1'245	1'090	812	596	364	6'249
	N (ungewichtet)	685	1'349	1'155	895	731	587	354	5'756
1992	Nie-Rauchende	58.2	43.8	36.1	26.9	30.6	26.6	29.4	37.6
	Ex-Rauchende	5.9	13.3	22.8	33.0	37.8	47.0	51.7	25.8
	Rauchende	35.9	42.8	41.1	40.1	31.6	26.4	18.9	36.5
	<i>N (gewichtet)</i>	1'164	1'535	1'374	1'210	859	824	391	7'357
	N (ungewichtet)	857	1'641	1'395	1'091	859	677	334	6'854

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'

Anmerkungen: Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Tabakkonsum, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007


Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	Nie-Rauchende	64.4	55.8	55.0	45.7	54.9	65.7	77.4	58.2
	Ex-Rauchende	5.1	13.9	18.1	24.7	25.6	23.7	16.9	18.2
	Rauchende	30.5	30.3	26.9	29.6	19.6	10.7	5.7	23.6
	<i>N (gewichtet)</i>	1'390	1'458	1'847	1'608	1'368	991	929	9'590
	N (ungewichtet)	890	1'379	2'032	1'585	1'715	1'486	1'244	10'331
2002	Nie-Rauchende	59.9	57.6	48.0	49.1	58.1	70.2	79.4	58.4
	Ex-Rauchende	5.4	12.4	18.5	22.5	21.2	17.0	14.5	16.2
	Rauchende	34.8	30.0	33.5	28.4	20.7	12.8	6.1	25.5
	<i>N (gewichtet)</i>	1'355	1'703	1'948	1'615	1'381	1'206	966	10'173
	N (ungewichtet)	843	1'661	2'143	1'726	1'834	1'473	1'114	10'794
1997	Nie-Rauchende	54.4	51.2	44.4	49.5	61.5	74.0	79.2	56.8
	Ex-Rauchende	5.0	13.0	19.7	21.6	17.7	14.6	14.2	15.5
	Rauchende	40.5	35.7	35.9	28.9	20.7	11.4	6.6	27.8
	<i>N (gewichtet)</i>	887	1'260	1'220	1'107	826	796	649	6'745
	N (ungewichtet)	727	1'517	1'353	1'063	951	925	702	7'238
1992	Nie-Rauchende	68.8	47.0	47.3	55.2	65.1	77.0	86.1	59.9
	Ex-Rauchende	5.5	19.1	21.8	20.3	16.0	12.6	9.3	16.0
	Rauchende	25.7	33.9	30.9	24.5	18.9	10.3	4.6	24.1
	<i>N (gewichtet)</i>	1'138	1'649	1'407	1'318	941	945	526	7'924
	N (ungewichtet)	945	1'900	1'477	1'307	1'144	1'032	623	8'428

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'

Anmerkungen: Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Tabakkonsum, nach Sprachregion

Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007



Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'

Anmerkung: Prozente werden gewichtet berechnet.

Tabakkonsum, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	Nie-Rauchende	51.4	48.8	53.8	50.9
	Ex-Rauchende	20.6	23.2	19.3	21.2
	Rauchende	27.9	28.0	26.9	27.9
	<i>N (gewichtet)</i>	13'484	4'409	856	18'748
	N (ungewichtet)	11'479	5'724	1'544	18'747
2002	Nie-Rauchende	50.1	47.0	54.0	49.6
	Ex-Rauchende	19.7	20.8	17.8	19.9
	Rauchende	30.2	32.2	28.1	30.5
	<i>N (gewichtet)</i>	14'218	4'571	908	19'697
	N (ungewichtet)	13'211	4'936	1'552	19'699
1997	Nie-Rauchende	48.7	43.5	50.3	47.6
	Ex-Rauchende	18.4	22.2	17.4	19.2
	Rauchende	32.9	34.3	32.2	33.2
	<i>N (gewichtet)</i>	9'292	3'084	618	12'994
	N (ungewichtet)	8'259	3'609	1'126	12'994
1992	Nie-Rauchende	50.6	45.2	46.9	49.2
	Ex-Rauchende	20.4	21.8	21.2	20.8
	Rauchende	29.0	33.0	31.9	30.1
	<i>N (gewichtet)</i>	10'970	3'595	717	15'282
	N (ungewichtet)	10'335	4'116	831	15'282

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'

Anmerkungen: Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Tabakkonsum, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	Nie-Rauchende	43.7	41.7	47.5	43.4
	Ex-Rauchende	23.7	26.3	23.4	24.3
	Rauchende	32.6	32.0	29.1	32.3
	<i>N (gewichtet)</i>	6'598	2'157	403	9'158
	N (ungewichtet)	5'197	2'555	664	8'416
2002	Nie-Rauchende	40.6	38.1	44.2	40.2
	Ex-Rauchende	23.6	24.9	23.5	23.9
	Rauchende	35.9	37.0	32.3	36.0
	<i>N (gewichtet)</i>	6'983	2'117	424	9'524
	N (ungewichtet)	6'103	2'122	680	8'905
1997	Nie-Rauchende	38.5	34.1	41.0	37.6
	Ex-Rauchende	22.6	25.6	23.0	23.3
	Rauchende	38.9	40.3	35.9	39.1
	<i>N (gewichtet)</i>	4'532	1'440	276	6'249
	N (ungewichtet)	3'740	1'548	468	5'756
1992	Nie-Rauchende	38.7	34.9	34.4	37.6
	Ex-Rauchende	25.5	26.4	28.4	25.8
	Rauchende	35.8	38.7	37.2	36.5
	<i>N (gewichtet)</i>	5'310	1'709	338	7'357
	N (ungewichtet)	4'667	1'853	334	6'854

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'

Anmerkungen: Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.


Tabakkonsum, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	Nie-Rauchende	58.9	55.7	59.4	58.2
	Ex-Rauchende	17.7	20.2	15.5	18.2
	Rauchende	23.4	24.1	25.0	23.6
	<i>N (gewichtet)</i>	6'886	2'252	452	9'590
	N (ungewichtet)	6'282	3'169	880	10'331
2002	Nie-Rauchende	59.3	54.6	62.6	58.4
	Ex-Rauchende	16.0	17.3	12.9	16.2
	Rauchende	24.6	28.1	24.5	25.5
	<i>N (gewichtet)</i>	7'235	2'454	484	10'173
	N (ungewichtet)	7'108	2'814	872	10'794
1997	Nie-Rauchende	58.4	51.7	57.9	56.8
	Ex-Rauchende	14.4	19.1	12.9	15.5
	Rauchende	27.2	29.2	29.2	27.8
	<i>N (gewichtet)</i>	4'759	1'644	342	6'745
	N (ungewichtet)	4'519	2'061	658	7'238
1992	Nie-Rauchende	61.8	54.6	58.0	59.9
	Ex-Rauchende	15.6	17.7	14.7	16.0
	Rauchende	22.6	27.8	27.2	24.1
	<i>N (gewichtet)</i>	5'660	1'886	379	7'924
	N (ungewichtet)	5'668	2'263	497	8'428

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'

Anmerkungen: Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007



Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "gelegentlich Rauchende" zugeordnet. Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 2.5% werden nicht berichtet.

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich Rauchende	25.2	28.8	24.3	25.3	20.4	14.1	6.8	22.4
	gelegentlich Rauchende	7.9	8.4	5.5	5.2	4.5	2.6	(0.9)	5.4
	Nicht-Rauchende	66.9	62.8	70.2	69.5	75.1	83.3	92.3	72.2
	<i>N (gewichtet)</i>	2'670	2'697	3'476	3'020	2'584	1'759	1'364	17'569
	N (ungewichtet)	1'711	2'391	3'660	2'881	3'019	2'418	1'828	17'908
2002	täglich Rauchende	31.8	31.0	32.1	29.1	21.8	15.0	7.6	26.2
	gelegentlich Rauchende	5.5	4.5	4.5	4.1	3.2	2.4	(1.1)	3.9
	Nicht-Rauchende	62.7	64.5	63.4	66.8	75.1	82.6	91.3	69.8
	<i>N (gewichtet)</i>	2'601	3'161	3'729	3'079	2'599	2'007	1'389	18'565
	N (ungewichtet)	1'602	2'899	4'046	3'046	3'119	2'442	1'681	18'835
1997	täglich Rauchende	36.6	34.9	35.5	30.6	22.0	14.9	10.2	28.9
	gelegentlich Rauchende	7.3	5.6	4.8	4.0	3.0	(1.9)	(1.3)	4.4
	Nicht-Rauchende	56.1	59.5	59.8	65.4	74.9	83.1	88.5	66.7
	<i>N (gewichtet)</i>	1'765	2'448	2'413	2'159	1'597	1'339	948	12'670
	N (ungewichtet)	1'394	2'829	2'475	1'934	1'652	1'465	1'006	12'755
1992	täglich Rauchende	29.1	36.2	33.9	29.6	22.7	15.6	9.7	28.1
	gelegentlich Rauchende	2.0	2.2	1.8	2.4	1.7	(1.6)	-	1.9
	Nicht-Rauchende	68.9	61.6	64.3	68.1	75.6	82.7	89.5	69.9
	<i>N (gewichtet)</i>	2'169	3'063	2'660	2'430	1'717	1'675	830	14'542
	N (ungewichtet)	1'717	3'439	2'767	2'314	1'930	1'642	895	14'704

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "gelegentlich Rauchende" zugeordnet. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	täglich Rauchende	28.4	34.5	25.5	25.7	23.9	19.4	9.4	25.6
	gelegentlich Rauchende	7.8	9.1	7.2	5.7	6.7	4.0	(1.4)	6.6
	Nicht-Rauchende	63.8	56.4	67.4	68.6	69.3	76.6	89.2	67.8
	N (gewichtet)	1'370	1'325	1'741	1'505	1'245	819	521	8'526
	N (ungewichtet)	862	1'073	1'700	1'347	1'325	968	661	7'936
2002	täglich Rauchende	34.0	35.9	34.0	33.1	24.8	20.0	11.7	30.3
	gelegentlich Rauchende	5.6	5.9	5.8	5.8	5.0	4.0	(1.2)	5.3
	Nicht-Rauchende	60.4	58.2	60.1	61.2	70.2	76.0	87.1	64.4
	N (gewichtet)	1'321	1'547	1'866	1'523	1'235	827	493	8'813
	N (ungewichtet)	803	1'289	1'959	1'365	1'307	995	622	8'340
1997	täglich Rauchende	40.5	38.5	37.9	34.4	25.5	21.3	18.2	33.6
	gelegentlich Rauchende	6.2	6.6	6.2	5.9	4.4	(3.5)	-	5.6
	Nicht-Rauchende	53.3	54.9	55.9	59.6	70.1	75.2	79.3	60.9
	N (gewichtet)	888	1'213	1'220	1'070	783	565	333	6'071
	N (ungewichtet)	675	1'332	1'140	881	709	561	328	5'626
1992	täglich Rauchende	34.3	40.6	38.6	36.5	28.5	22.6	17.0	34.0
	gelegentlich Rauchende	(2.1)	2.3	2.5	4.0	(2.6)	(2.9)	-	2.7
	Nicht-Rauchende	63.6	57.1	58.9	59.5	68.9	74.5	81.4	63.3
	N (gewichtet)	1'090	1'461	1'279	1'148	796	762	338	6'873
	N (ungewichtet)	810	1'582	1'309	1'039	804	634	295	6'473

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "gelegentlich Rauchende" zugeordnet. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.


Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	täglich Rauchende	21.9	23.3	23.1	24.9	17.2	9.5	5.2	19.3
	gelegentlich Rauchende	8.0	7.7	3.7	4.7	2.4	(1.3)	-	4.4
	Nicht-Rauchende	70.0	69.1	73.1	70.4	80.5	89.3	94.2	76.3
	N (gewichtet)	1'300	1'372	1'735	1'516	1'339	939	843	9'044
	N (ungewichtet)	849	1'318	1'960	1'534	1'694	1'450	1'167	9'972
2002	täglich Rauchende	29.5	26.4	30.2	25.2	19.0	11.5	5.3	22.6
	gelegentlich Rauchende	5.5	3.2	3.2	2.5	1.4	(1.3)	(1.0)	2.7
	Nicht-Rauchende	65.0	70.4	66.6	72.3	79.5	87.2	93.6	74.7
	N (gewichtet)	1'281	1'614	1'863	1'556	1'364	1'180	896	9'752
	N (ungewichtet)	799	1'610	2'087	1'681	1'812	1'447	1'059	10'495
1997	täglich Rauchende	32.6	31.3	33.0	26.8	18.7	10.3	5.9	24.6
	gelegentlich Rauchende	8.4	4.6	3.3	(2.1)	(1.7)	(0.7)	-	3.3
	Nicht-Rauchende	59.0	64.1	63.7	71.1	79.6	89.0	93.5	72.1
	N (gewichtet)	877	1'235	1'194	1'089	813	775	615	6'598
	N (ungewichtet)	719	1'497	1'335	1'053	943	904	678	7'129
1992	täglich Rauchende	23.9	32.1	29.6	23.3	17.7	9.8	4.7	22.9
	gelegentlich Rauchende	(2.0)	2.1	(1.1)	(0.9)	(1.0)	-	-	1.3
	Nicht-Rauchende	74.2	65.8	69.4	75.8	81.4	89.6	95.1	75.9
	N (gewichtet)	1'079	1'601	1'381	1'282	921	913	492	7'669
	N (ungewichtet)	907	1'857	1'458	1'275	1'126	1'008	600	8'231

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "gelegentlich Rauchende" zugeordnet. Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007



Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "gelegentlich Rauchende" zugeordnet. Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 2.5% werden nicht berichtet.

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich Rauchende	22.0	23.2	24.3	22.4
	gelegentlich Rauchende	5.7	5.0	2.9	5.4
	Nicht-Rauchende	72.3	71.8	72.8	72.2
	<i>N (gewichtet)</i>	12'691	4'081	798	17'569
	N (ungewichtet)	11'034	5'415	1'459	17'908
2002	täglich Rauchende	25.6	28.5	25.5	26.2
	gelegentlich Rauchende	4.3	3.2	2.0	3.9
	Nicht-Rauchende	70.2	68.3	72.5	69.8
	<i>N (gewichtet)</i>	13'391	4'343	831	18'565
	N (ungewichtet)	12'656	4'737	1'442	18'835
1997	täglich Rauchende	28.4	30.3	30.0	28.9
	gelegentlich Rauchende	4.7	3.9	(2.2)	4.4
	Nicht-Rauchende	67.0	65.7	67.7	66.7
	<i>N (gewichtet)</i>	9'023	3'035	612	12'670
	N (ungewichtet)	8'077	3'561	1'117	12'755
1992	täglich Rauchende	27.1	30.7	31.6	28.1
	gelegentlich Rauchende	1.8	2.5	-	1.9
	Nicht-Rauchende	71.1	66.8	67.9	69.9
	<i>N (gewichtet)</i>	10'509	3'347	685	14'542
	N (ungewichtet)	10'010	3'892	802	14'704

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "gelegentlich Rauchende" zugeordnet. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich Rauchende	25.5	25.7	26.2	25.6
	gelegentlich Rauchende	6.9	6.2	(3.1)	6.6
	Nicht-Rauchende	67.5	68.1	70.7	67.8
	N (gewichtet)	6'187	1'969	370	8'526
	N (ungewichtet)	4'947	2'376	613	7'936
2002	täglich Rauchende	29.7	32.6	28.8	30.3
	gelegentlich Rauchende	5.9	3.8	(2.2)	5.3
	Nicht-Rauchende	64.4	63.6	69.0	64.4
	N (gewichtet)	6'473	1'968	371	8'813
	N (ungewichtet)	5'743	1'990	607	8'340
1997	täglich Rauchende	33.0	35.5	33.3	33.6
	gelegentlich Rauchende	5.9	4.9	(3.0)	5.6
	Nicht-Rauchende	61.1	59.6	63.7	60.9
	N (gewichtet)	4'386	1'412	273	6'071
	N (ungewichtet)	3'643	1'520	463	5'626
1992	täglich Rauchende	33.1	36.3	37.5	34.0
	gelegentlich Rauchende	2.7	3.1	-	2.7
	Nicht-Rauchende	64.3	60.6	62.2	63.3
	N (gewichtet)	5'011	1'544	318	6'873
	N (ungewichtet)	4'457	1'700	316	6'473

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "gelegentlich Rauchende" zugeordnet. Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.


Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich Rauchende	18.6	20.8	22.6	19.3
	gelegentlich Rauchende	4.6	4.0	(2.7)	4.4
	Nicht-Rauchende	76.8	75.2	74.7	76.3
	<i>N (gewichtet)</i>	6'504	2'112	428	9'044
	N (ungewichtet)	6'087	3'039	846	9'972
2002	täglich Rauchende	21.7	25.1	22.8	22.6
	gelegentlich Rauchende	2.7	2.8	(1.8)	2.7
	Nicht-Rauchende	75.6	72.2	75.4	74.7
	<i>N (gewichtet)</i>	6'918	2'375	460	9'752
	N (ungewichtet)	6'913	2'747	835	10'495
1997	täglich Rauchende	24.0	25.8	27.5	24.6
	gelegentlich Rauchende	3.5	3.1	-	3.3
	Nicht-Rauchende	72.5	71.0	71.0	72.1
	<i>N (gewichtet)</i>	4'637	1'622	339	6'598
	N (ungewichtet)	4'434	2'041	654	7'129
1992	täglich Rauchende	21.6	26.0	26.5	22.9
	gelegentlich Rauchende	1.1	1.9	-	1.3
	Nicht-Rauchende	77.3	72.1	72.8	75.9
	<i>N (gewichtet)</i>	5'499	1'803	368	7'669
	N (ungewichtet)	5'553	2'192	486	8'231

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "gelegentlich Rauchende" zugeordnet. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten* pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007



Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Einheiten. Rauchende, welche keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "gelegentlich Rauchende" zugeordnet. * Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteneinheiten transformiert: eine Pfeife oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Einheiten; eine Zigarre entspricht 5 Einheiten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Entsprechend einem Grossteil der Antworten wurden die Kategorien als Vielfache von fünf Einheiten mit folgenden Grenzwerten gewählt: ca. 1-2 Einheiten = 1 bis 2.5 Zigaretteneinheiten; ca. 5 Einheiten = 3 bis 7.5 Zigaretteneinheiten; ca. 10 Einheiten = 8 bis 12.5 Zigaretteneinheiten; ca. 15 Einheiten = 13 bis 17.5 Zigaretteneinheiten; ca. 20 Einheiten = 18 bis 22.5 Zigaretteneinheiten; > ca. 20 Einheiten = mehr als 22.5 Zigaretteneinheiten. Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 2.5% werden nicht berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten* pro Tag, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	> ca. 20 Einheiten	(1.4)	2.2	2.8	3.1	3.2	1.6	-	2.3
	ca. 20 Einheiten	4.1	6.2	6.2	6.8	5.3	2.8	(1.0)	5.1
	ca. 15 Einheiten	3.6	4.5	3.4	3.7	2.3	1.2	(0.7)	3.1
	ca. 10 Einheiten	6.6	7.5	5.2	5.6	4.7	3.4	1.9	5.3
	ca. 5 Einheiten	6.7	6.0	4.2	4.4	3.6	4.1	2.2	4.6
	ca. 1-2 Einheiten	2.8	2.6	2.4	1.7	1.3	(1.0)	(0.7)	1.9
	gelegentlich Rauchende	7.9	8.4	5.5	5.2	4.5	2.6	(0.9)	5.4
	Nicht-Rauchende	66.9	62.8	70.2	69.5	75.1	83.3	92.3	72.2
	N (gewichtet)	2'670	2'697	3'476	3'020	2'584	1'759	1'364	17'569
	N (ungewichtet)	1'711	2'391	3'660	2'881	3'019	2'418	1'828	17'908
2002	> ca. 20 Einheiten	(2.1)	3.7	5.4	5.2	3.5	1.7	-	3.6
	ca. 20 Einheiten	5.5	8.6	9.3	8.6	5.7	2.7	(1.1)	6.7
	ca. 15 Einheiten	3.5	4.2	3.5	3.8	2.6	2.0	(1.1)	3.2
	ca. 10 Einheiten	7.8	6.7	6.7	5.0	4.0	3.7	2.2	5.5
	ca. 5 Einheiten	9.2	5.0	5.1	4.4	4.6	3.8	2.7	5.1
	ca. 1-2 Einheiten	3.7	2.8	2.1	2.3	1.4	(1.0)	-	2.1
	gelegentlich Rauchende	5.5	4.5	4.5	4.1	3.2	2.4	(1.1)	3.9
	Nicht-Rauchende	62.7	64.5	63.4	66.8	75.1	82.6	91.3	69.8
	N (gewichtet)	2'600	3'161	3'729	3'079	2'599	2'007	1'389	18'564
	N (ungewichtet)	1'601	2'899	4'046	3'046	3'119	2'442	1'681	18'834
1997	> ca. 20 Einheiten	2.2	4.5	7.0	7.3	4.8	2.4	(0.9)	4.7
	ca. 20 Einheiten	8.3	10.3	10.8	8.4	6.0	2.8	(2.5)	7.9
	ca. 15 Einheiten	3.7	3.4	3.1	3.7	2.6	(1.7)	-	3.0
	ca. 10 Einheiten	9.8	7.3	7.0	5.0	4.4	3.9	(2.1)	6.1
	ca. 5 Einheiten	8.3	6.8	5.2	4.8	2.9	3.3	(3.3)	5.2
	ca. 1-2 Einheiten	4.3	2.6	2.2	(1.4)	(1.4)	(0.8)	(0.8)	2.1
	gelegentlich Rauchende	7.3	5.6	4.8	4.0	3.0	(1.9)	(1.3)	4.4
	Nicht-Rauchende	56.1	59.5	59.8	65.4	74.9	83.1	88.5	66.7
	N (gewichtet)	1'765	2'448	2'413	2'159	1'597	1'339	948	12'670
	N (ungewichtet)	1'394	2'829	2'475	1'934	1'652	1'465	1'006	12'755
1992	> ca. 20 Einheiten	2.5	5.0	6.8	5.9	5.2	2.3	-	4.6
	ca. 20 Einheiten	8.0	11.4	9.7	9.0	5.8	3.3	(1.2)	8.0
	ca. 15 Einheiten	3.1	5.1	4.2	3.9	2.5	2.1	-	3.5
	ca. 10 Einheiten	7.0	6.9	6.1	5.4	4.9	3.1	(2.9)	5.6
	ca. 5 Einheiten	6.4	5.7	4.8	4.3	3.6	3.7	2.8	4.7
	ca. 1-2 Einheiten	2.1	2.1	2.3	1.1	(0.7)	(1.2)	(1.2)	1.7
	gelegentlich Rauchende	2.0	2.2	1.8	2.4	1.7	(1.6)	-	1.9
	Nicht-Rauchende	68.9	61.6	64.3	68.1	75.6	82.7	89.5	69.9
	N (gewichtet)	2'169	3'063	2'660	2'430	1'717	1'675	830	14'542
	N (ungewichtet)	1'717	3'439	2'767	2'314	1'930	1'642	895	14'704

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Einheiten. Rauchende, welche keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "gelegentlich Rauchende" zugeordnet.
* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteinheiten transformiert: eine Pfeiffe oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Einheiten; eine Zigarre entspricht 5 Einheiten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Entsprechend einem Grossteil der Antworten wurden die Kategorien als Vielfache von fünf Einheiten mit folgenden Grenzwerten gewählt: ca. 1-2 Einheiten = 1 bis 2.5 Zigaretteinheiten; ca. 5 Einheiten = 3 bis 7.5 Zigaretteinheiten; ca. 10 Einheiten = 8 bis 12.5 Zigaretteinheiten; ca. 15 Einheiten = 13 bis 17.5 Zigaretteinheiten; ca. 20 Einheiten = 18 bis 22.5 Zigaretteinheiten; > ca. 20 Einheiten = mehr als 22.5 Zigaretteinheiten
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten* pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	> ca. 20 Einheiten	(2.4)	3.5	3.9	3.6	5.4	2.9	-	3.5
	ca. 20 Einheiten	4.8	8.4	7.3	7.8	6.7	3.8	-	6.3
	ca. 15 Einheiten	5.2	5.8	4.1	3.6	(2.3)	(1.5)	-	3.7
	ca. 10 Einheiten	7.2	8.0	4.3	4.3	4.8	3.2	(2.6)	5.2
	ca. 5 Einheiten	6.0	6.3	3.7	4.4	2.9	6.4	(3.5)	4.7
	ca. 1-2 Einheiten	2.8	2.6	2.1	(2.0)	(2.0)	(1.5)	-	2.1
	gelegentlich Rauchende	7.8	9.1	7.2	5.7	6.7	4.0	(1.4)	6.6
	Nicht-Rauchende	63.8	56.4	67.4	68.6	69.3	76.6	89.2	67.8
	N (gewichtet)	1'370	1'325	1'741	1'505	1'245	819	521	8'526
	N (ungewichtet)	862	1'073	1'700	1'347	1'325	968	661	7'936
2002	> ca. 20 Einheiten	(2.3)	6.2	7.6	8.5	5.0	(2.8)	-	5.5
	ca. 20 Einheiten	6.7	10.7	10.0	9.8	6.1	3.7	(1.5)	8.0
	ca. 15 Einheiten	(3.7)	5.4	3.4	4.4	3.5	(2.6)	(2.1)	3.8
	ca. 10 Einheiten	8.3	7.2	6.0	4.0	3.8	4.5	(3.0)	5.6
	ca. 5 Einheiten	9.6	3.7	5.1	3.9	4.8	5.2	(4.6)	5.2
	ca. 1-2 Einheiten	(3.6)	(2.7)	1.9	2.6	(1.5)	(1.1)	-	2.2
	gelegentlich Rauchende	5.6	5.9	5.8	5.8	5.0	4.0	(1.2)	5.3
	Nicht-Rauchende	60.4	58.2	60.1	61.2	70.2	76.0	87.1	64.4
	N (gewichtet)	1'321	1'547	1'866	1'523	1'235	827	493	8'813
	N (ungewichtet)	803	1'289	1'959	1'365	1'307	995	622	8'340
1997	> ca. 20 Einheiten	(2.7)	6.4	10.2	11.0	6.5	(4.4)	-	7.0
	ca. 20 Einheiten	9.7	12.7	11.5	8.5	6.5	(4.0)	(4.1)	9.2
	ca. 15 Einheiten	4.8	4.0	3.7	4.2	(3.4)	(2.2)	-	3.7
	ca. 10 Einheiten	11.4	6.6	5.7	4.2	4.9	5.0	(3.5)	6.2
	ca. 5 Einheiten	7.9	6.4	4.7	4.9	(2.8)	(4.3)	(6.4)	5.3
	ca. 1-2 Einheiten	(4.1)	2.4	(2.2)	(1.6)	-	-	-	2.2
	gelegentlich Rauchende	6.2	6.6	6.2	5.9	4.4	(3.5)	-	5.6
	Nicht-Rauchende	53.3	54.9	55.9	59.6	70.1	75.2	79.3	60.9
	N (gewichtet)	888	1'213	1'220	1'070	783	565	333	6'071
	N (ungewichtet)	675	1'332	1'140	881	709	561	328	5'626
1992	> ca. 20 Einheiten	(2.9)	7.3	10.1	9.5	9.0	4.6	-	7.2
	ca. 20 Einheiten	12.2	14.3	12.0	11.2	7.8	4.6	-	10.6
	ca. 15 Einheiten	(3.6)	6.0	4.9	3.9	(3.3)	(3.0)	-	4.2
	ca. 10 Einheiten	6.8	6.3	5.2	6.4	4.0	(4.5)	(4.3)	5.6
	ca. 5 Einheiten	7.3	5.2	3.7	4.2	(3.6)	(4.2)	(4.3)	4.8
	ca. 1-2 Einheiten	(1.5)	(1.5)	(2.6)	(1.3)	-	-	-	1.6
	gelegentlich Rauchende	(2.1)	2.3	2.5	4.0	(2.6)	(2.9)	-	2.7
	Nicht-Rauchende	63.6	57.1	58.9	59.5	68.9	74.5	81.4	63.3
	N (gewichtet)	1'090	1'461	1'279	1'148	796	762	338	6'873
	N (ungewichtet)	810	1'582	1'309	1'039	804	634	295	6'473

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Einheiten. Rauchende, welche keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "gelegentlich Rauchende" zugeordnet.
* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteneinheiten transformiert: eine Pfeife oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Einheiten; eine Zigarre entspricht 5 Einheiten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Entsprechend einem Grossteil der Antworten wurden die Kategorien als Vielfache von fünf Einheiten mit folgenden Grenzwerten gewählt: ca. 1-2 Einheiten = 1 bis 2.5 Zigaretteneinheiten; ca. 5 Einheiten = 3 bis 7.5 Zigaretteneinheiten; ca. 10 Einheiten = 8 bis 12.5 Zigaretteneinheiten; ca. 15 Einheiten = 13 bis 17.5 Zigaretteneinheiten; ca. 20 Einheiten = 18 bis 22.5 Zigaretteneinheiten; > ca. 20 Einheiten = mehr als 22.5 Zigaretteneinheiten
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.


Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten* pro Tag, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	> ca. 20 Einheiten	-	(0.8)	1.7	2.5	(1.2)	(0.5)	-	1.2
	ca. 20 Einheiten	3.4	4.0	5.1	5.8	4.0	1.9	(0.9)	3.9
	ca. 15 Einheiten	(1.9)	3.2	2.8	3.8	2.4	(0.9)	-	2.4
	ca. 10 Einheiten	6.0	6.9	6.1	7.0	4.6	3.6	(1.5)	5.4
	ca. 5 Einheiten	7.6	5.7	4.8	4.4	4.3	2.1	(1.4)	4.6
	ca. 1-2 Einheiten	(2.9)	2.5	2.7	(1.4)	(0.7)	(0.5)	-	1.7
	gelegentlich Rauchende	8.0	7.7	3.7	4.7	2.4	(1.3)	-	4.4
	Nicht-Rauchende	70.0	69.1	73.1	70.4	80.5	89.3	94.2	76.3
	N (gewichtet)	1'300	1'372	1'735	1'516	1'339	939	843	9'044
	N (ungewichtet)	849	1'318	1'960	1'534	1'694	1'450	1'167	9'972
2002	> ca. 20 Einheiten	(1.9)	(1.4)	3.1	1.9	2.2	(1.0)	-	1.8
	ca. 20 Einheiten	4.3	6.6	8.7	7.4	5.3	2.0	(1.0)	5.6
	ca. 15 Einheiten	(3.3)	3.1	3.6	3.2	1.8	1.6	-	2.7
	ca. 10 Einheiten	7.3	6.1	7.5	6.0	4.1	3.1	(1.7)	5.5
	ca. 5 Einheiten	8.7	6.2	5.1	4.8	4.3	2.8	(1.6)	5.0
	ca. 1-2 Einheiten	3.9	3.0	2.3	(1.9)	(1.3)	(1.0)	-	2.1
	gelegentlich Rauchende	5.5	3.2	3.2	2.5	1.4	(1.3)	(1.0)	2.7
	Nicht-Rauchende	65.1	70.4	66.6	72.3	79.5	87.2	93.6	74.7
	N (gewichtet)	1'280	1'614	1'863	1'556	1'364	1'180	896	9'752
	N (ungewichtet)	798	1'610	2'087	1'681	1'812	1'447	1'059	10'494
1997	> ca. 20 Einheiten	(1.7)	2.7	3.8	3.7	3.1	(1.0)	-	2.6
	ca. 20 Einheiten	6.8	7.9	10.2	8.3	5.4	(1.9)	(1.6)	6.6
	ca. 15 Einheiten	(2.7)	2.9	2.6	3.1	(1.9)	(1.3)	-	2.3
	ca. 10 Einheiten	8.1	8.0	8.4	5.7	3.9	3.2	-	6.0
	ca. 5 Einheiten	8.7	7.2	5.8	4.7	3.0	(2.6)	(1.6)	5.2
	ca. 1-2 Einheiten	4.6	2.8	2.3	(1.2)	(1.3)	-	-	2.0
	gelegentlich Rauchende	8.4	4.6	3.3	(2.1)	(1.7)	(0.7)	-	3.3
	Nicht-Rauchende	59.0	64.1	63.7	71.1	79.6	89.0	93.5	72.1
	N (gewichtet)	877	1'235	1'194	1'089	813	775	615	6'598
	N (ungewichtet)	719	1'497	1'335	1'053	943	904	678	7'129
1992	> ca. 20 Einheiten	(2.1)	3.0	3.7	2.7	1.9	-	-	2.3
	ca. 20 Einheiten	3.6	8.7	7.6	7.0	4.1	(2.1)	-	5.6
	ca. 15 Einheiten	(2.5)	4.3	3.5	3.9	(1.8)	(1.4)	-	2.9
	ca. 10 Einheiten	7.3	7.5	6.9	4.5	5.7	(1.9)	(1.9)	5.6
	ca. 5 Einheiten	5.5	6.0	5.8	4.3	3.6	3.3	(1.7)	4.7
	ca. 1-2 Einheiten	(2.8)	2.6	2.1	(1.0)	-	-	-	1.7
	gelegentlich Rauchende	(2.0)	2.1	(1.1)	(0.9)	(1.0)	-	-	1.3
	Nicht-Rauchende	74.2	65.8	69.4	75.8	81.4	89.6	95.1	75.9
	N (gewichtet)	1'079	1'601	1'381	1'282	921	913	492	7'669
	N (ungewichtet)	907	1'857	1'458	1'275	1'126	1'008	600	8'231

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Einheiten. Rauchende, welche keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "gelegentlich Rauchende" zugeordnet.
* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteinheiten transformiert: eine Pfeiffe oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Einheiten; eine Zigarre entspricht 5 Einheiten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Entsprechend einem Grossteil der Antworten wurden die Kategorien als Vielfache von fünf Einheiten mit folgenden Grenzwerten gewählt: ca. 1-2 Einheiten = 1 bis 2.5 Zigaretteinheiten; ca. 5 Einheiten = 3 bis 7.5 Zigaretteinheiten; ca. 10 Einheiten = 8 bis 12.5 Zigaretteinheiten; ca. 15 Einheiten = 13 bis 17.5 Zigaretteinheiten; ca. 20 Einheiten = 18 bis 22.5 Zigaretteinheiten; > ca. 20 Einheiten = mehr als 22.5 Zigaretteinheiten
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten* pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007



Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Einheiten. Rauchende, welche keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "gelegentlich Rauchende" zugeordnet. * Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteneinheiten transformiert: eine Pfeife oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Einheiten; eine Zigarre entspricht 5 Einheiten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Entsprechend einem Grossteil der Antworten wurden die Kategorien als Vielfache von fünf Einheiten mit folgenden Grenzwerten gewählt: ca. 1-2 Einheiten = 1 bis 2.5 Zigaretteneinheiten; ca. 5 Einheiten = 3 bis 7.5 Zigaretteneinheiten; ca. 10 Einheiten = 8 bis 12.5 Zigaretteneinheiten; ca. 15 Einheiten = 13 bis 17.5 Zigaretteneinheiten; ca. 20 Einheiten = 18 bis 22.5 Zigaretteneinheiten; > ca. 20 Einheiten = mehr als 22.5 Zigaretteneinheiten. Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 2.5% werden nicht berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten* pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	> ca. 20 Einheiten	2.2	2.5	1.8	2.3
	ca. 20 Einheiten	5.1	5.1	5.1	5.1
	ca. 15 Einheiten	3.0	3.3	2.6	3.1
	ca. 10 Einheiten	5.3	5.4	6.3	5.3
	ca. 5 Einheiten	4.5	4.8	6.9	4.6
	ca. 1-2 Einheiten	1.9	2.1	(1.8)	1.9
	gelegentlich Rauchende	5.7	5.0	2.9	5.4
	Nicht-Rauchende	72.3	71.8	72.8	72.2
	N (gewichtet)	12'691	4'081	798	17'569
	N (ungewichtet)	11'034	5'415	1'459	17'908
2002	> ca. 20 Einheiten	3.3	4.4	3.5	3.6
	ca. 20 Einheiten	6.6	7.1	5.9	6.7
	ca. 15 Einheiten	3.2	3.5	2.3	3.2
	ca. 10 Einheiten	5.3	6.0	6.6	5.5
	ca. 5 Einheiten	5.0	5.5	4.7	5.1
	ca. 1-2 Einheiten	2.2	2.0	(2.4)	2.1
	gelegentlich Rauchende	4.3	3.2	2.0	3.9
	Nicht-Rauchende	70.2	68.3	72.6	69.8
	N (gewichtet)	13'391	4'343	830	18'564
	N (ungewichtet)	12'656	4'737	1'441	18'834
1997	> ca. 20 Einheiten	4.5	5.4	3.7	4.7
	ca. 20 Einheiten	7.7	8.6	7.5	7.9
	ca. 15 Einheiten	2.7	3.5	4.3	3.0
	ca. 10 Einheiten	5.9	6.2	7.7	6.1
	ca. 5 Einheiten	5.4	4.7	5.1	5.2
	ca. 1-2 Einheiten	2.1	2.0	(1.8)	2.1
	gelegentlich Rauchende	4.7	3.9	(2.2)	4.4
	Nicht-Rauchende	67.0	65.7	67.7	66.7
	N (gewichtet)	9'023	3'035	612	12'670
	N (ungewichtet)	8'077	3'561	1'117	12'755
1992	> ca. 20 Einheiten	4.2	5.9	4.5	4.6
	ca. 20 Einheiten	7.9	8.2	8.2	8.0
	ca. 15 Einheiten	3.5	3.5	(3.7)	3.5
	ca. 10 Einheiten	5.5	6.0	5.8	5.6
	ca. 5 Einheiten	4.5	5.1	6.7	4.7
	ca. 1-2 Einheiten	1.5	2.0	(2.7)	1.7
	gelegentlich Rauchende	1.8	2.5	-	1.9
	Nicht-Rauchende	71.1	66.8	67.9	69.9
	N (gewichtet)	10'509	3'347	685	14'542
	N (ungewichtet)	10'010	3'892	802	14'704

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Einheiten. Rauchende, welche keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "gelegentlich Rauchende" zugeordnet.
* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteneinheiten transformiert: eine Pfeife oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Einheiten; eine Zigarre entspricht 5 Einheiten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Entsprechend einem Grossteil der Antworten wurden die Kategorien als Vielfache von fünf Einheiten mit folgenden Grenzwerten gewählt: ca. 1-2 Einheiten = 1 bis 2.5 Zigaretteneinheiten; ca. 5 Einheiten = 3 bis 7.5 Zigaretteneinheiten; ca. 10 Einheiten = 8 bis 12.5 Zigaretteneinheiten; ca. 15 Einheiten = 13 bis 17.5 Zigaretteneinheiten; ca. 20 Einheiten = 18 bis 22.5 Zigaretteneinheiten; > ca. 20 Einheiten = mehr als 22.5 Zigaretteneinheiten
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten* pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	> ca. 20 Einheiten	3.5	3.5	(2.5)	3.5
	ca. 20 Einheiten	6.6	5.7	5.6	6.3
	ca. 15 Einheiten	3.8	3.7	(2.5)	3.7
	ca. 10 Einheiten	5.2	5.0	6.4	5.2
	ca. 5 Einheiten	4.2	5.8	7.4	4.7
	ca. 1-2 Einheiten	2.1	2.2	(1.9)	2.1
	gelegentlich Rauchende	6.9	6.2	(3.1)	6.6
	Nicht-Rauchende	67.5	68.1	70.7	67.8
	N (gewichtet)	6'187	1'969	370	8'526
	N (ungewichtet)	4'947	2'376	613	7'936
2002	> ca. 20 Einheiten	5.0	7.1	5.8	5.5
	ca. 20 Einheiten	8.2	7.6	6.5	8.0
	ca. 15 Einheiten	3.8	4.2	(2.0)	3.8
	ca. 10 Einheiten	5.6	5.3	6.8	5.6
	ca. 5 Einheiten	5.1	5.9	(4.5)	5.2
	ca. 1-2 Einheiten	2.1	2.4	(3.3)	2.2
	gelegentlich Rauchende	5.9	3.8	(2.2)	5.3
	Nicht-Rauchende	64.4	63.6	69.0	64.4
	N (gewichtet)	6'473	1'968	371	8'813
	N (ungewichtet)	5'743	1'990	607	8'340
1997	> ca. 20 Einheiten	6.9	7.5	5.4	7.0
	ca. 20 Einheiten	8.9	10.1	9.0	9.2
	ca. 15 Einheiten	3.3	4.5	(5.6)	3.7
	ca. 10 Einheiten	6.0	6.4	6.5	6.2
	ca. 5 Einheiten	5.5	4.9	(5.1)	5.3
	ca. 1-2 Einheiten	2.3	2.1	-	2.2
	gelegentlich Rauchende	5.9	4.9	(3.0)	5.6
	Nicht-Rauchende	61.1	59.6	63.7	60.9
	N (gewichtet)	4'386	1'412	273	6'071
	N (ungewichtet)	3'643	1'520	463	5'626
1992	> ca. 20 Einheiten	6.6	9.2	(6.6)	7.2
	ca. 20 Einheiten	10.7	10.1	12.1	10.6
	ca. 15 Einheiten	4.1	4.0	(5.9)	4.2
	ca. 10 Einheiten	5.5	6.3	(5.1)	5.6
	ca. 5 Einheiten	4.7	5.0	(4.1)	4.8
	ca. 1-2 Einheiten	1.5	1.7	-	1.6
	gelegentlich Rauchende	2.7	3.1	-	2.7
	Nicht-Rauchende	64.3	60.6	62.2	63.3
	N (gewichtet)	5'011	1'544	318	6'873
	N (ungewichtet)	4'457	1'700	316	6'473

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Einheiten. Rauchende, welche keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "gelegentlich Rauchende" zugeordnet.
* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteneinheiten transformiert: eine Pfeiffe oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Einheiten; eine Zigarre entspricht 5 Einheiten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Entsprechend einem Grossteil der Antworten wurden die Kategorien als Vielfache von fünf Einheiten mit folgenden Grenzwerten gewählt: ca. 1-2 Einheiten = 1 bis 2.5 Zigaretteneinheiten; ca. 5 Einheiten = 3 bis 7.5 Zigaretteneinheiten; ca. 10 Einheiten = 8 bis 12.5 Zigaretteneinheiten; ca. 15 Einheiten = 13 bis 17.5 Zigaretteneinheiten; ca. 20 Einheiten = 18 bis 22.5 Zigaretteneinheiten; > ca. 20 Einheiten = mehr als 22.5 Zigaretteneinheiten
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten* pro Tag, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	> ca. 20 Einheiten	1.0	1.6	(1.1)	1.2
	ca. 20 Einheiten	3.7	4.5	4.6	3.9
	ca. 15 Einheiten	2.3	3.0	(2.7)	2.4
	ca. 10 Einheiten	5.3	5.8	6.2	5.4
	ca. 5 Einheiten	4.7	3.9	6.4	4.6
	ca. 1-2 Einheiten	1.7	2.0	(1.6)	1.7
	gelegentlich Rauchende	4.6	4.0	(2.7)	4.4
	Nicht-Rauchende	76.8	75.2	74.7	76.3
	N (gewichtet)	6'504	2'112	428	9'044
	N (ungewichtet)	6'087	3'039	846	9'972
2002	> ca. 20 Einheiten	1.7	2.1	(1.6)	1.8
	ca. 20 Einheiten	5.2	6.6	5.5	5.6
	ca. 15 Einheiten	2.5	3.0	(2.6)	2.7
	ca. 10 Einheiten	5.0	6.6	6.5	5.5
	ca. 5 Einheiten	5.0	5.1	4.8	5.0
	ca. 1-2 Einheiten	2.3	1.6	(1.7)	2.1
	gelegentlich Rauchende	2.7	2.8	(1.8)	2.7
	Nicht-Rauchende	75.6	72.2	75.5	74.7
	N (gewichtet)	6'918	2'375	459	9'752
	N (ungewichtet)	6'913	2'747	834	10'494
1997	> ca. 20 Einheiten	2.2	3.7	(2.4)	2.6
	ca. 20 Einheiten	6.4	7.2	6.3	6.6
	ca. 15 Einheiten	2.1	2.6	(3.2)	2.3
	ca. 10 Einheiten	5.8	6.0	8.6	6.0
	ca. 5 Einheiten	5.4	4.5	5.0	5.2
	ca. 1-2 Einheiten	2.0	1.9	(1.9)	2.0
	gelegentlich Rauchende	3.5	3.1	-	3.3
	Nicht-Rauchende	72.5	71.0	71.0	72.1
	N (gewichtet)	4'637	1'622	339	6'598
	N (ungewichtet)	4'434	2'041	654	7'129
1992	> ca. 20 Einheiten	2.0	3.1	(2.7)	2.3
	ca. 20 Einheiten	5.3	6.6	(4.8)	5.6
	ca. 15 Einheiten	2.9	3.1	(1.8)	2.9
	ca. 10 Einheiten	5.5	5.7	6.4	5.6
	ca. 5 Einheiten	4.3	5.2	9.0	4.7
	ca. 1-2 Einheiten	1.5	2.2	-	1.7
	gelegentlich Rauchende	1.1	1.9	-	1.3
	Nicht-Rauchende	77.3	72.1	72.8	75.9
	N (gewichtet)	5'499	1'803	368	7'669
	N (ungewichtet)	5'553	2'192	486	8'231

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Einheiten. Rauchende, welche keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "gelegentlich Rauchende" zugeordnet.
* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteneinheiten transformiert: eine Pfeife oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Einheiten; eine Zigarre entspricht 5 Einheiten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Entsprechend einem Grossteil der Antworten wurden die Kategorien als Vielfache von fünf Einheiten mit folgenden Grenzwerten gewählt: ca. 1-2 Einheiten = 1 bis 2.5 Zigaretteneinheiten; ca. 5 Einheiten = 3 bis 7.5 Zigaretteneinheiten; ca. 10 Einheiten = 8 bis 12.5 Zigaretteneinheiten; ca. 15 Einheiten = 13 bis 17.5 Zigaretteneinheiten; ca. 20 Einheiten = 18 bis 22.5 Zigaretteneinheiten; > ca. 20 Einheiten = mehr als 22.5 Zigaretteneinheiten
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	> 40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	0.2
	31-40 Zigaretten	-	(0.6)	0.8	1.0	(0.8)	(0.3)	-	0.6
	21-30 Zigaretten	(1.0)	1.4	1.5	1.8	1.5	(0.6)	-	1.3
	16-20 Zigaretten	4.6	6.3	6.6	7.3	5.1	2.9	(0.9)	5.3
	11-15 Zigaretten	4.3	4.6	3.2	4.1	2.8	1.3	(0.7)	3.3
	6-10 Zigaretten	7.1	9.1	5.7	5.5	4.3	3.4	(1.2)	5.6
	1-5 Zigaretten	7.6	6.6	5.6	4.4	3.2	2.5	1.6	4.9
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	6.6	6.5	3.3	3.1	1.5	(1.1)	(0.6)	3.6
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	(1.6)	2.0	2.7	3.2	5.3	4.4	2.5	3.1
	Nicht-Rauchende	66.8	62.8	70.2	69.5	75.1	83.3	92.3	72.2
	<i>N gewichtet</i>	2'671	2'697	3'476	3'020	2'584	1'760	1'364	17'571
	<i>N ungewichtet</i>	1'713	2'391	3'660	2'880	3'020	2'419	1'828	17'911
	2002	> 40 Zigaretten	-	-	(0.2)	(0.3)	-	-	-
31-40 Zigaretten		-	(0.8)	1.7	1.5	0.9	(0.3)	-	1.0
21-30 Zigaretten		(1.4)	2.5	3.2	3.0	2.0	(0.8)	-	2.1
16-20 Zigaretten		5.5	9.0	9.4	8.2	5.6	2.7	(1.1)	6.7
11-15 Zigaretten		4.1	4.7	3.9	4.2	2.7	2.0	(0.9)	3.5
6-10 Zigaretten		9.8	7.1	7.1	4.6	3.7	3.4	2.1	5.8
1-5 Zigaretten		10.3	6.4	5.3	4.8	3.7	2.7	(1.7)	5.3
gelegentlich Zigaretten-Rauchende		4.9	3.0	2.6	1.9	1.2	(1.1)	(0.4)	2.3
Rauchende (aber keine Zigaretten)		(0.7)	1.9	3.2	4.8	5.0	4.3	2.5	3.2
Nicht-Rauchende		62.7	64.5	63.4	66.8	75.1	82.6	91.2	69.8
<i>N gewichtet</i>		2'600	3'161	3'731	3'080	2'599	2'007	1'390	18'569
<i>N ungewichtet</i>		1'601	2'899	4'047	3'048	3'119	2'442	1'682	18'838
1997		> 40 Zigaretten	-	-	(0.5)	-	-	-	-
	31-40 Zigaretten	(0.5)	1.5	2.2	2.5	(1.6)	-	-	1.5
	21-30 Zigaretten	(1.4)	2.7	3.9	3.5	1.9	(0.7)	-	2.4
	16-20 Zigaretten	8.5	10.4	11.0	8.9	5.7	2.9	(2.5)	8.0
	11-15 Zigaretten	4.7	4.3	4.3	3.3	2.7	(1.8)	-	3.4
	6-10 Zigaretten	11.0	7.4	6.5	5.2	3.2	3.7	(1.9)	6.0
	1-5 Zigaretten	10.3	7.9	6.1	3.9	2.8	2.4	(2.0)	5.6
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	6.6	4.5	2.7	1.5	(1.5)	(0.8)	-	2.9
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	(0.7)	1.6	3.1	5.3	5.3	3.7	3.6	3.2
	Nicht-Rauchende	56.1	59.5	59.8	65.4	74.9	83.1	88.5	66.7
	<i>N gewichtet</i>	1'765	2'448	2'413	2'159	1'597	1'339	948	12'670
	<i>N ungewichtet</i>	1'394	2'829	2'475	1'934	1'652	1'465	1'006	12'755
	1992	> 40 Zigaretten	-	(0.6)	(0.7)	(0.6)	-	-	-
31-40 Zigaretten		(0.7)	1.7	1.8	2.0	(1.4)	-	-	1.3
21-30 Zigaretten		1.9	2.8	3.9	2.7	2.1	(0.8)	-	2.4
16-20 Zigaretten		8.1	11.5	9.7	8.7	5.6	3.1	-	7.9
11-15 Zigaretten		3.4	5.7	4.3	3.7	2.5	2.1	-	3.7
6-10 Zigaretten		7.9	7.6	6.5	4.7	4.9	2.9	(2.2)	5.8
1-5 Zigaretten		7.1	5.9	5.1	3.5	2.0	2.7	(1.9)	4.5
gelegentlich Zigaretten-Rauchende		1.9	1.8	0.9	(0.6)	(1.1)	(0.7)	-	1.2
Rauchende (aber keine Zigaretten)		-	(0.8)	2.8	5.3	4.4	4.3	4.3	2.9
Nicht-Rauchende		68.9	61.6	64.3	68.1	75.6	82.7	89.4	69.9
<i>N gewichtet</i>		2'169	3'063	2'660	2'430	1'717	1'675	830	14'543
<i>N ungewichtet</i>		1'717	3'440	2'767	2'314	1'930	1'642	896	14'706

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigaretten.
 Rauchende, welche keine Zigaretten rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Zigaretten)" zugeordnet.
 Rauchende, welche Zigaretten rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigaretten gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
 Es gilt zu beachten, dass in jeder Kategorie ein Grossteil der enthaltenen Antworten im oberen Grenzwertbereich (Vielfache von fünf Zigaretten) liegen.
 Spaltenprozent
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	> 40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	(0.3)
	31-40 Zigaretten	-	(1.0)	(1.1)	(1.2)	(1.5)	-	-	0.9
	21-30 Zigaretten	(1.7)	(2.3)	2.1	1.9	(2.3)	(1.0)	-	1.8
	16-20 Zigaretten	5.2	8.6	8.2	8.3	6.3	3.9	-	6.6
	11-15 Zigaretten	5.7	5.8	3.1	3.6	(2.4)	(1.2)	-	3.6
	6-10 Zigaretten	8.2	9.8	4.7	4.1	3.9	(3.0)	(1.0)	5.5
	1-5 Zigaretten	6.2	6.6	4.7	4.1	2.4	3.3	(1.4)	4.4
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	5.9	5.7	3.3	2.4	(1.3)	-	-	3.2
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	(2.6)	3.7	4.9	5.6	10.3	9.5	6.4	5.8
	Nicht-Rauchende	63.8	56.4	67.4	68.6	69.3	76.5	89.2	67.8
	N gewichtet	1'371	1'325	1'741	1'505	1'245	820	521	8'528
	N ungewichtet	864	1'073	1'700	1'347	1'325	969	661	7'939
2002	> 40 Zigaretten	-	-	(0.3)	(0.5)	-	-	-	0.3
	31-40 Zigaretten	-	(1.4)	2.2	2.4	(1.2)	-	-	1.4
	21-30 Zigaretten	(1.6)	4.1	4.6	4.6	2.4	-	-	3.2
	16-20 Zigaretten	6.7	11.3	10.0	9.1	5.8	3.5	(1.5)	7.9
	11-15 Zigaretten	4.3	5.6	3.8	4.5	2.9	(2.1)	-	3.9
	6-10 Zigaretten	10.7	7.2	5.9	3.0	3.0	3.5	(2.7)	5.5
	1-5 Zigaretten	9.9	5.2	4.8	4.0	2.9	(2.3)	-	4.8
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	4.4	3.0	2.5	(1.5)	(1.2)	-	-	2.3
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	(1.3)	3.5	5.8	9.2	10.2	10.0	5.9	6.3
	Nicht-Rauchende	60.4	58.2	60.1	61.1	70.2	76.1	86.8	64.4
	N gewichtet	1'321	1'547	1'868	1'524	1'235	827	495	8'817
	N ungewichtet	803	1'289	1'960	1'367	1'307	995	623	8'344
1997	> 40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	(0.5)
	31-40 Zigaretten	-	2.1	3.2	3.4	(1.6)	-	-	2.1
	21-30 Zigaretten	(1.4)	3.6	5.4	5.1	(2.6)	-	-	3.3
	16-20 Zigaretten	10.1	12.9	11.8	9.2	6.0	(4.3)	(4.0)	9.4
	11-15 Zigaretten	6.0	4.9	4.9	(3.2)	(2.7)	(2.2)	-	4.0
	6-10 Zigaretten	11.4	6.9	4.9	3.5	(2.5)	(3.8)	-	5.4
	1-5 Zigaretten	10.6	6.8	5.0	3.7	(2.1)	(2.7)	(2.6)	5.2
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	5.2	4.5	2.3	(1.1)	-	-	-	2.6
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	3.0	5.8	10.3	10.7	8.8	10.3	6.5
	Nicht-Rauchende	53.3	54.9	55.9	59.6	70.1	75.2	79.3	60.9
	N gewichtet	888	1'213	1'220	1'070	783	565	333	6'071
	N ungewichtet	675	1'332	1'140	881	709	561	328	5'626
1992	> 40 Zigaretten	-	(1.1)	(1.2)	(1.0)	-	-	-	0.8
	31-40 Zigaretten	-	2.4	2.6	3.4	(2.4)	-	-	2.1
	21-30 Zigaretten	(2.4)	3.9	5.3	3.8	(2.8)	-	-	3.3
	16-20 Zigaretten	12.5	14.3	11.7	10.3	7.1	4.6	-	10.4
	11-15 Zigaretten	3.9	6.6	4.6	3.3	(2.1)	(3.0)	-	4.0
	6-10 Zigaretten	7.7	6.6	5.4	4.9	(3.6)	(2.5)	-	5.2
	1-5 Zigaretten	7.2	4.8	3.8	(2.3)	(1.6)	(2.5)	-	3.8
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	(1.9)	(1.6)	(0.8)	-	-	-	-	1.1
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	(1.6)	5.8	11.0	9.5	9.5	10.6	6.0
	Nicht-Rauchende	63.6	57.1	58.9	59.5	68.9	74.5	81.2	63.3
	N gewichtet	1'090	1'462	1'279	1'148	796	762	338	6'874
	N ungewichtet	810	1'583	1'309	1'039	804	634	296	6'475

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigaretten.
 Rauchende, welche keine Zigaretten rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Zigaretten)" zugeordnet.
 Rauchende, welche Zigaretten rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigaretten gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
 Es gilt zu beachten, dass in jeder Kategorie ein Grossteil der enthaltenen Antworten im oberen Grenzwertbereich (Vielfache von fünf Zigaretten) liegen.
 Spaltenprozentage
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	> 40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	-
	31-40 Zigaretten	-	-	(0.6)	(0.7)	-	-	-	0.3
	21-30 Zigaretten	-	-	(1.0)	1.8	(0.7)	-	-	0.8
	16-20 Zigaretten	3.9	4.1	5.1	6.3	4.1	2.0	(0.9)	4.1
	11-15 Zigaretten	(2.8)	3.4	3.3	4.5	3.1	(1.3)	-	3.0
	6-10 Zigaretten	5.8	8.4	6.6	6.9	4.6	3.8	(1.4)	5.7
	1-5 Zigaretten	9.1	6.5	6.4	4.6	4.0	1.9	(1.8)	5.3
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	7.4	7.4	3.4	3.8	1.8	(1.3)	-	3.9
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	-	(0.5)	(0.8)	(0.7)	-	-	0.5
	Nicht-Rauchende	70.0	69.1	73.1	70.4	80.5	89.3	94.2	76.3
	N gewichtet	1'300	1'372	1'735	1'515	1'339	939	843	9'044
	N ungewichtet	849	1'318	1'960	1'533	1'695	1'450	1'167	9'972
2002	> 40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	31-40 Zigaretten	-	-	(1.2)	(0.6)	(0.6)	-	-	0.6
	21-30 Zigaretten	-	(1.0)	1.8	(1.4)	(1.6)	(0.7)	-	1.2
	16-20 Zigaretten	4.3	6.7	8.8	7.3	5.3	2.1	(0.9)	5.6
	11-15 Zigaretten	3.9	3.9	4.1	3.9	2.6	1.8	-	3.2
	6-10 Zigaretten	8.8	6.9	8.4	6.2	4.2	3.4	(1.8)	6.1
	1-5 Zigaretten	10.6	7.4	5.8	5.5	4.5	2.9	(1.7)	5.7
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	5.4	2.9	2.7	2.2	(1.3)	(1.2)	-	2.4
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	-	(0.5)	-	-	-	-	0.4
	Nicht-Rauchende	65.1	70.4	66.6	72.3	79.5	87.2	93.6	74.7
	N gewichtet	1'280	1'614	1'863	1'556	1'364	1'180	896	9'752
	N ungewichtet	798	1'610	2'087	1'681	1'812	1'447	1'059	10'494
1997	> 40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	-
	31-40 Zigaretten	-	(0.9)	(1.2)	(1.6)	(1.6)	-	-	0.9
	21-30 Zigaretten	-	1.8	2.3	(2.0)	(1.2)	-	-	1.6
	16-20 Zigaretten	6.8	7.9	10.2	8.5	5.4	(1.9)	(1.6)	6.7
	11-15 Zigaretten	(3.3)	3.7	3.6	3.5	(2.8)	(1.6)	-	2.9
	6-10 Zigaretten	10.6	7.9	8.0	7.0	3.9	3.6	(1.8)	6.6
	1-5 Zigaretten	10.1	9.1	7.2	4.2	3.3	(2.2)	(1.6)	5.9
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	8.1	4.4	3.1	(1.8)	(1.7)	(0.7)	-	3.1
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	Nicht-Rauchende	59.0	64.1	63.7	71.1	79.6	89.0	93.5	72.1
	N gewichtet	877	1'235	1'194	1'089	813	775	615	6'598
	N ungewichtet	719	1'497	1'335	1'053	943	904	678	7'129
1992	> 40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	-
	31-40 Zigaretten	-	(1.1)	(1.0)	(0.7)	(0.5)	-	-	0.7
	21-30 Zigaretten	(1.5)	1.8	2.6	(1.7)	(1.5)	-	-	1.6
	16-20 Zigaretten	3.7	8.9	7.8	7.4	4.3	(1.9)	-	5.8
	11-15 Zigaretten	2.8	4.9	4.1	4.0	2.9	(1.3)	-	3.4
	6-10 Zigaretten	8.1	8.5	7.5	4.6	6.1	3.3	(2.0)	6.3
	1-5 Zigaretten	7.0	6.9	6.3	4.6	2.4	2.8	(1.9)	5.1
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	(2.0)	2.0	(1.0)	(0.8)	(1.0)	-	-	1.2
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nicht-Rauchende	74.2	65.8	69.4	75.8	81.4	89.6	95.1	75.9
	N gewichtet	1'079	1'601	1'381	1'282	921	913	492	7'669
	N ungewichtet	907	1'857	1'458	1'275	1'126	1'008	600	8'231

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigaretten. Rauchende, welche keine Zigaretten rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Zigaretten)" zugeordnet. Rauchende, welche Zigaretten rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigaretten gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Es gilt zu beachten, dass in jeder Kategorie ein Grossteil der enthaltenen Antworten im oberen Grenzwertbereich (Vielfache von fünf Zigaretten) liegen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2007	> 40 Zigaretten	(0.2)	(0.2)	-	0.2
	31-40 Zigaretten	0.6	0.8	-	0.6
	21-30 Zigaretten	1.3	1.3	(1.3)	1.3
	16-20 Zigaretten	5.4	5.2	5.1	5.3
	11-15 Zigaretten	3.2	3.6	3.4	3.3
	6-10 Zigaretten	5.4	5.8	7.3	5.6
	1-5 Zigaretten	4.7	5.3	5.9	4.9
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	3.7	3.5	2.2	3.6
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	3.4	2.5	(1.4)	3.1
	Nicht-Rauchende	72.3	71.7	72.8	72.2
	<i>N gewichtet</i>	12'690	4'083	798	17'571
	N ungewichtet	11'033	5'419	1'459	17'911
	2002	> 40 Zigaretten	(0.2)	-	-
31-40 Zigaretten		0.9	1.2	(0.8)	1.0
21-30 Zigaretten		1.9	2.9	2.2	2.1
16-20 Zigaretten		6.6	7.0	5.8	6.7
11-15 Zigaretten		3.4	4.1	2.9	3.5
6-10 Zigaretten		5.6	6.2	6.7	5.8
1-5 Zigaretten		5.2	5.6	5.3	5.3
gelegentlich Zigaretten-Rauchende		2.5	2.2	(1.5)	2.3
Rauchende (aber keine Zigaretten)		3.6	2.4	(1.9)	3.2
Nicht-Rauchende		70.2	68.2	72.6	69.8
<i>N gewichtet</i>		13'393	4'345	830	18'569
N ungewichtet		12'658	4'739	1'441	18'838
1997		> 40 Zigaretten	(0.3)	-	-
	31-40 Zigaretten	1.3	2.0	(1.6)	1.5
	21-30 Zigaretten	2.3	2.8	(1.5)	2.4
	16-20 Zigaretten	7.9	8.5	7.7	8.0
	11-15 Zigaretten	3.1	4.1	5.5	3.4
	6-10 Zigaretten	5.8	6.2	8.0	6.0
	1-5 Zigaretten	5.6	5.4	4.9	5.6
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	3.0	2.8	(1.4)	2.9
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	3.7	2.3	(1.2)	3.2
	Nicht-Rauchende	67.0	65.7	67.7	66.7
	<i>N gewichtet</i>	9'023	3'035	612	12'670
	N ungewichtet	8'077	3'561	1'117	12'755
	1992	> 40 Zigaretten	0.4	(0.6)	-
31-40 Zigaretten		1.2	1.8	(2.0)	1.3
21-30 Zigaretten		2.2	3.0	(2.1)	2.4
16-20 Zigaretten		7.8	8.2	8.1	7.9
11-15 Zigaretten		3.6	3.7	4.4	3.7
6-10 Zigaretten		5.6	6.3	6.3	5.8
1-5 Zigaretten		4.1	5.1	7.5	4.5
gelegentlich Zigaretten-Rauchende		1.0	1.7	-	1.2
Rauchende (aber keine Zigaretten)		3.0	2.8	-	2.9
Nicht-Rauchende		71.1	66.8	67.9	69.9
<i>N gewichtet</i>		10'511	3'347	685	14'543
N ungewichtet		10'012	3'892	802	14'706

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigaretten. Rauchende, welche keine Zigaretten rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Zigaretten)" zugeordnet. Rauchende, welche Zigaretten rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigaretten gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Es gilt zu beachten, dass in jeder Kategorie ein Grossteil der enthaltenen Antworten im oberen Grenzwertbereich (Vielfache von fünf Zigaretten) liegen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2007	> 40 Zigaretten	(0.3)	-	-	(0.3)
	31-40 Zigaretten	0.9	1.1	-	0.9
	21-30 Zigaretten	1.9	1.5	(2.0)	1.8
	16-20 Zigaretten	7.0	5.8	5.5	6.6
	11-15 Zigaretten	3.6	3.6	(2.8)	3.6
	6-10 Zigaretten	5.2	5.8	8.3	5.5
	1-5 Zigaretten	4.0	5.7	5.5	4.4
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	3.2	3.4	(2.3)	3.2
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	6.3	4.8	(2.4)	5.8
	Nicht-Rauchende	67.5	68.0	70.7	67.8
	<i>N gewichtet</i>	6'187	1'971	370	8'528
	N ungewichtet	4'947	2'379	613	7'939
2002	> 40 Zigaretten	(0.3)	-	-	0.3
	31-40 Zigaretten	1.2	2.1	(1.3)	1.4
	21-30 Zigaretten	2.8	4.5	(3.6)	3.2
	16-20 Zigaretten	8.1	7.5	6.1	7.9
	11-15 Zigaretten	3.8	4.4	(2.3)	3.9
	6-10 Zigaretten	5.5	5.4	6.5	5.5
	1-5 Zigaretten	4.5	5.8	(5.3)	4.8
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	2.4	1.9	(1.4)	2.3
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	7.0	4.7	(4.1)	6.3
	Nicht-Rauchende	64.4	63.5	69.0	64.4
	<i>N gewichtet</i>	6'475	1'971	371	8'817
	N ungewichtet	5'745	1'992	607	8'344
1997	> 40 Zigaretten	(0.5)	-	-	(0.5)
	31-40 Zigaretten	1.9	2.7	(2.3)	2.1
	21-30 Zigaretten	3.4	3.5	-	3.3
	16-20 Zigaretten	9.3	10.0	9.3	9.4
	11-15 Zigaretten	3.6	4.7	(6.5)	4.0
	6-10 Zigaretten	5.0	6.4	7.2	5.4
	1-5 Zigaretten	5.2	5.3	(4.3)	5.2
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	2.7	2.4	-	2.6
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	7.3	4.8	(2.8)	6.5
	Nicht-Rauchende	61.1	59.6	63.7	60.9
	<i>N gewichtet</i>	4'386	1'412	273	6'071
	N ungewichtet	3'643	1'520	463	5'626
1992	> 40 Zigaretten	0.8	(1.1)	-	0.8
	31-40 Zigaretten	1.9	2.3	(3.3)	2.1
	21-30 Zigaretten	3.0	4.5	(2.6)	3.3
	16-20 Zigaretten	10.4	9.9	11.9	10.4
	11-15 Zigaretten	3.9	4.0	(6.0)	4.0
	6-10 Zigaretten	5.0	6.1	(5.1)	5.2
	1-5 Zigaretten	3.6	4.0	(6.4)	3.8
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	1.0	1.5	-	1.1
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	6.2	5.9	-	6.0
	Nicht-Rauchende	64.2	60.6	62.2	63.3
	<i>N gewichtet</i>	5'012	1'544	318	6'874
	N ungewichtet	4'459	1'700	316	6'475

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigaretten. Rauchende, welche keine Zigaretten rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Zigaretten)" zugeordnet. Rauchende, welche Zigaretten rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigaretten gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Es gilt zu beachten, dass in jeder Kategorie ein Grossteil der enthaltenen Antworten im oberen Grenzwertbereich (Vielfache von fünf Zigaretten) liegen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2007	> 40 Zigaretten	-	-	-	-
	31-40 Zigaretten	(0.3)	(0.4)	-	0.3
	21-30 Zigaretten	0.6	1.2	-	0.8
	16-20 Zigaretten	3.9	4.7	4.9	4.1
	11-15 Zigaretten	2.8	3.6	3.9	3.0
	6-10 Zigaretten	5.6	5.9	6.5	5.7
	1-5 Zigaretten	5.3	5.0	6.3	5.3
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	4.1	3.6	(2.2)	3.9
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	0.5	(0.4)	-	0.5
	Nicht-Rauchende	76.8	75.2	74.7	76.3
	<i>N gewichtet</i>	6'503	2'112	428	9'044
	<i>N ungewichtet</i>	6'086	3'040	846	9'972
	2002	> 40 Zigaretten	-	-	-
31-40 Zigaretten		0.6	(0.6)	-	0.6
21-30 Zigaretten		1.1	1.5	(1.1)	1.2
16-20 Zigaretten		5.2	6.7	5.5	5.6
11-15 Zigaretten		3.0	3.9	3.3	3.2
6-10 Zigaretten		5.7	6.9	6.9	6.1
1-5 Zigaretten		5.9	5.3	5.4	5.7
gelegentlich Zigaretten-Rauchende		2.5	2.4	(1.5)	2.4
Rauchende (aber keine Zigaretten)		(0.4)	(0.5)	-	0.4
Nicht-Rauchende		75.6	72.2	75.5	74.7
<i>N gewichtet</i>		6'918	2'375	459	9'752
<i>N ungewichtet</i>		6'913	2'747	834	10'494
1997		> 40 Zigaretten	-	-	-
	31-40 Zigaretten	0.8	(1.3)	-	0.9
	21-30 Zigaretten	1.3	2.2	(1.3)	1.6
	16-20 Zigaretten	6.5	7.1	6.4	6.7
	11-15 Zigaretten	2.6	3.6	4.7	2.9
	6-10 Zigaretten	6.6	5.9	8.6	6.6
	1-5 Zigaretten	6.0	5.5	5.4	5.9
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	3.3	3.0	-	3.1
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	(0.3)	-	-	(0.2)
	Nicht-Rauchende	72.5	71.0	71.0	72.1
	<i>N gewichtet</i>	4'637	1'622	339	6'598
	<i>N ungewichtet</i>	4'434	2'041	654	7'129
	1992	> 40 Zigaretten	-	-	-
31-40 Zigaretten		0.5	1.3	-	0.7
21-30 Zigaretten		1.5	1.7	(1.7)	1.6
16-20 Zigaretten		5.5	6.7	(4.9)	5.8
11-15 Zigaretten		3.3	3.5	(3.0)	3.4
6-10 Zigaretten		6.1	6.6	7.3	6.3
1-5 Zigaretten		4.5	6.1	8.5	5.1
gelegentlich Zigaretten-Rauchende		1.0	1.9	-	1.2
Rauchende (aber keine Zigaretten)		-	-	-	-
Nicht-Rauchende		77.3	72.1	72.8	75.9
<i>N gewichtet</i>		5'499	1'803	368	7'669
<i>N ungewichtet</i>		5'553	2'192	486	8'231

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigaretten. Rauchende, welche keine Zigaretten rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Zigaretten)" zugeordnet. Rauchende, welche Zigaretten rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigaretten gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Es gilt zu beachten, dass in jeder Kategorie ein Grossteil der enthaltenen Antworten im oberen Grenzwertbereich (Vielfache von fünf Zigaretten) liegen.
Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	-	-	-	(0.5)	(0.6)	(0.9)	(1.0)	0.4
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	1.6	3.2	2.7	3.1	3.2	1.8	(0.7)	2.5
	Rauchende (aber keine Zigarren)	31.4	34.1	27.0	26.9	20.8	13.9	6.0	24.9
	Nicht-Rauchende	66.9	62.8	70.2	69.5	75.1	83.3	92.3	72.2
	<i>N gewichtet</i>	2'670	2'700	3'479	3'022	2'584	1'760	1'365	17'579
	<i>N ungewichtet</i>	1'711	2'394	3'663	2'882	3'020	2'420	1'830	17'920
2002	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	-	-	(0.4)	(0.9)	(0.8)	(1.1)	(1.1)	0.6
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	(1.5)	3.3	3.3	3.7	2.7	1.6	(0.5)	2.6
	Rauchende (aber keine Zigarren)	36.0	32.4	33.1	28.8	21.0	14.6	7.2	27.1
	Nicht-Rauchende	62.4	64.0	63.2	66.4	75.0	82.5	91.2	69.6
	<i>N gewichtet</i>	2'614	3'186	3'742	3'097	2'601	2'011	1'390	18'641
	<i>N ungewichtet</i>	1'609	2'909	4'055	3'056	3'126	2'445	1'685	18'885
1997	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	-	(0.4)	(0.6)	(0.9)	(1.8)	(1.0)	(1.7)	0.8
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	(1.5)	2.3	2.2	2.7	2.0	(1.3)	-	1.9
	Rauchende (aber keine Zigarren)	42.2	37.8	37.4	30.5	20.9	14.2	8.9	30.3
	Nicht-Rauchende	56.1	59.5	59.7	65.4	74.9	83.1	89.0	66.7
	<i>N gewichtet</i>	1'765	2'449	2'415	2'160	1'598	1'340	943	12'670
	<i>N ungewichtet</i>	1'394	2'830	2'476	1'935	1'656	1'466	1'002	12'759
1992	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Zigarren	-	-	(0.9)	(1.2)	(1.4)	(0.8)	(2.2)	0.8
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	(0.9)	1.4	1.5	(1.0)	(1.0)	-	1.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	30.0	36.8	33.0	28.5	21.1	14.9	6.7	27.6
	Nicht-Rauchende	69.5	62.0	64.6	68.5	75.6	82.8	89.5	70.3
	<i>N gewichtet</i>	2'150	3'043	2'651	2'414	1'716	1'673	829	14'477
	<i>N ungewichtet</i>	1'697	3'411	2'755	2'300	1'928	1'640	895	14'626

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigarren rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigarren. Rauchende, welche keine Zigarren rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Zigarren)" zugeordnet. Rauchende, welche Zigarren rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigarren gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	-	-	-	(0.9)	(1.2)	(1.9)	(2.5)	0.8
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	2.7	5.7	5.1	5.6	6.3	3.6	(1.5)	4.7
	Rauchende (aber keine Zigarren)	33.2	37.9	27.2	24.8	22.4	17.7	6.6	26.5
	Nicht-Rauchende	63.8	56.3	67.3	68.6	69.3	76.5	89.2	67.8
	<i>N gewichtet</i>	1'370	1'327	1'742	1'505	1'245	820	521	8'530
	N ungewichtet	862	1'074	1'701	1'348	1'325	969	661	7'940
2002	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Zigarren	-	-	(0.7)	(1.7)	(1.7)	(2.6)	(3.1)	1.2
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	(2.6)	6.4	6.0	6.9	5.2	3.5	-	5.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	36.9	34.9	33.2	30.2	21.9	17.5	8.8	29.1
	Nicht-Rauchende	60.3	58.1	59.9	60.6	70.2	75.8	86.9	64.2
	<i>N gewichtet</i>	1'323	1'552	1'872	1'537	1'234	830	494	8'842
	N ungewichtet	805	1'292	1'963	1'371	1'308	996	624	8'359
1997	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Zigarren	-	(0.7)	(1.0)	(1.8)	(3.6)	(2.3)	(5.0)	1.6
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	(2.7)	4.4	4.3	5.2	(3.8)	(3.0)	-	3.9
	Rauchende (aber keine Zigarren)	43.7	39.9	38.7	32.5	21.8	18.5	14.1	33.2
	Nicht-Rauchende	53.3	54.9	55.8	59.6	69.9	75.2	80.0	60.9
	<i>N gewichtet</i>	888	1'213	1'222	1'071	785	565	330	6'072
	N ungewichtet	675	1'332	1'141	882	712	561	326	5'629
1992	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.4)
	1-4 Zigarren	-	-	(1.9)	(2.5)	(3.1)	(1.7)	(5.5)	1.7
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	(1.7)	2.6	(2.9)	(2.1)	(2.3)	-	2.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	34.9	40.3	35.9	34.1	24.0	20.6	9.2	32.0
	Nicht-Rauchende	64.2	57.5	59.2	59.9	68.9	74.5	81.5	63.7
	<i>N gewichtet</i>	1'080	1'449	1'273	1'139	796	762	337	6'836
	N ungewichtet	800	1'566	1'303	1'032	803	634	295	6'433

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigarren rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigarren. Rauchende, welche keine Zigarren rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Zigarren)" zugeordnet. Rauchende, welche Zigarren rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigarren gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	-	(0.6)	-	-	-	0.4
	Rauchende (aber keine Zigarren)	29.5	30.3	26.7	29.0	19.2	10.5	5.7	23.3
	Nicht-Rauchende	70.0	69.0	73.0	70.4	80.5	89.2	94.1	76.3
	<i>N gewichtet</i>	1'300	1'373	1'737	1'516	1'339	940	844	9'049
	<i>N ungewichtet</i>	849	1'320	1'962	1'534	1'695	1'451	1'169	9'980
2002	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	(0.5)	-	-	-	-	0.4
	Rauchende (aber keine Zigarren)	35.1	30.0	33.0	27.4	20.2	12.6	6.3	25.2
	Nicht-Rauchende	64.5	69.5	66.4	72.1	79.4	87.1	93.6	74.4
	<i>N gewichtet</i>	1'290	1'634	1'869	1'561	1'367	1'181	896	9'799
	<i>N ungewichtet</i>	804	1'617	2'092	1'685	1'818	1'449	1'061	10'526
1997	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Zigarren)	40.6	35.7	36.2	28.6	20.0	11.2	6.1	27.7
	Nicht-Rauchende	59.0	64.1	63.7	71.1	79.6	88.8	93.9	72.1
	<i>N gewichtet</i>	877	1'235	1'194	1'089	814	776	613	6'598
	<i>N ungewichtet</i>	719	1'498	1'335	1'053	944	905	676	7'130
1992	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	0.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	25.1	33.6	30.3	23.6	18.6	10.2	4.9	23.7
	Nicht-Rauchende	74.8	66.1	69.6	76.1	81.4	89.8	95.1	76.2
	<i>N gewichtet</i>	1'070	1'594	1'378	1'276	920	911	492	7'641
	<i>N ungewichtet</i>	897	1'845	1'452	1'268	1'125	1'006	600	8'193

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigarren rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigarren. Rauchende, welche keine Zigarren rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Zigarren)" zugeordnet. Rauchende, welche Zigarren rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigarren gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	> 8 Zigarren	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	0.4	(0.3)	-	0.4
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	2.6	2.3	(1.4)	2.5
	Rauchende (aber keine Zigarren)	24.6	25.6	25.8	24.9
	Nicht-Rauchende	72.3	71.7	72.8	72.2
	<i>N gewichtet</i>	12'695	4'085	798	17'579
	N ungewichtet	11'038	5'421	1'461	17'920
2002	> 8 Zigarren	-	-	-	(0.1)
	5-8 Zigarren	(0.1)	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	0.6	(0.4)	-	0.6
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	2.9	2.2	(0.9)	2.6
	Rauchende (aber keine Zigarren)	26.4	29.3	26.3	27.1
	Nicht-Rauchende	69.9	68.0	72.2	69.6
	<i>N gewichtet</i>	13'446	4'360	835	18'641
	N ungewichtet	12'687	4'748	1'450	18'885
1997	> 8 Zigarren	(0.2)	-	-	(0.1)
	5-8 Zigarren	(0.1)	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	0.9	(0.6)	-	0.8
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	2.1	1.9	-	1.9
	Rauchende (aber keine Zigarren)	29.8	31.7	31.6	30.3
	Nicht-Rauchende	67.0	65.7	67.7	66.7
	<i>N gewichtet</i>	9'023	3'035	612	12'670
	N ungewichtet	8'079	3'562	1'118	12'759
1992	> 8 Zigarren	(0.1)	-	-	(0.1)
	5-8 Zigarren	(0.2)	-	-	(0.2)
	1-4 Zigarren	0.8	0.8	-	0.8
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	1.0	1.5	-	1.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	26.7	29.6	31.5	27.6
	Nicht-Rauchende	71.1	68.0	67.8	70.3
	<i>N gewichtet</i>	10'501	3'290	686	14'477
	N ungewichtet	10'001	3'822	803	14'626

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigarren rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigarren. Rauchende, welche keine Zigarren rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Zigarren)" zugeordnet. Rauchende, welche Zigarren rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigarren gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	> 8 Zigarren	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	0.9	(0.6)	-	0.8
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	5.0	4.3	(2.8)	4.7
	Rauchende (aber keine Zigarren)	26.5	26.8	26.4	26.5
	Nicht-Rauchende	67.5	68.0	70.7	67.8
	<i>N gewichtet</i>	6'189	1'971	370	8'530
	N ungewichtet	4'950	2'377	613	7'940
2002	> 8 Zigarren	-	-	-	(0.2)
	5-8 Zigarren	(0.3)	-	-	(0.2)
	1-4 Zigarren	1.3	(0.9)	-	1.2
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	5.6	4.2	(1.7)	5.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	28.4	31.5	28.4	29.1
	Nicht-Rauchende	64.3	63.3	68.5	64.2
	<i>N gewichtet</i>	6'489	1'979	374	8'842
	N ungewichtet	5'751	1'997	611	8'359
1997	> 8 Zigarren	(0.3)	-	-	(0.2)
	5-8 Zigarren	(0.3)	-	-	(0.2)
	1-4 Zigarren	1.9	(1.2)	-	1.6
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	4.1	3.8	-	3.9
	Rauchende (aber keine Zigarren)	32.4	35.2	34.9	33.2
	Nicht-Rauchende	61.1	59.6	63.6	60.9
	<i>N gewichtet</i>	4'388	1'412	273	6'072
	N ungewichtet	3'645	1'520	464	5'629
1992	> 8 Zigarren	(0.2)	-	-	(0.2)
	5-8 Zigarren	(0.4)	-	-	(0.4)
	1-4 Zigarren	1.7	(1.7)	-	1.7
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	1.9	3.0	-	2.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	31.4	33.1	36.4	32.0
	Nicht-Rauchende	64.3	61.9	62.1	63.7
	<i>N gewichtet</i>	5'005	1'513	318	6'836
	N ungewichtet	4'451	1'665	317	6'433

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigarren rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigarren. Rauchende, welche keine Zigarren rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Zigarren)" zugeordnet. Rauchende, welche Zigarren rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigarren gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	> 8 Zigarren	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	(0.4)	(0.4)	-	0.4
	Rauchende (aber keine Zigarren)	22.8	24.4	25.3	23.3
	Nicht-Rauchende	76.8	75.1	74.5	76.3
	<i>N gewichtet</i>	6'506	2'114	429	9'049
	N ungewichtet	6'088	3'044	848	9'980
2002	> 8 Zigarren	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	(0.4)	(0.4)	-	0.4
	Rauchende (aber keine Zigarren)	24.4	27.6	24.6	25.2
	Nicht-Rauchende	75.1	72.0	75.1	74.4
	<i>N gewichtet</i>	6'957	2'380	462	9'799
	N ungewichtet	6'936	2'751	839	10'526
1997	> 8 Zigarren	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Zigarren)	27.2	28.7	29.0	27.7
	Nicht-Rauchende	72.6	71.0	71.0	72.1
	<i>N gewichtet</i>	4'635	1'623	339	6'598
	N ungewichtet	4'434	2'042	654	7'130
1992	> 8 Zigarren	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	-	(0.1)
	Rauchende (aber keine Zigarren)	22.5	26.6	27.2	23.7
	Nicht-Rauchende	77.4	73.1	72.8	76.2
	<i>N gewichtet</i>	5'496	1'777	368	7'641
	N ungewichtet	5'550	2'157	486	8'193

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigarren rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigarren. Rauchende, welche keine Zigarren rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Zigarren)" zugeordnet. Rauchende, welche Zigarren rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigarren gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	(0.7)	-	-	(0.4)	(0.5)	(0.4)	-	0.4
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	3.2	2.3	1.3	2.0	1.3	(1.0)	-	1.8
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	29.3	34.6	28.1	28.1	22.8	15.2	7.2	25.6
	Nicht-Rauchende	66.8	62.8	70.2	69.5	75.1	83.3	92.3	72.1
	<i>N gewichtet</i>	2'673	2'700	3'479	3'022	2'584	1'760	1'365	17'583
	<i>N ungewichtet</i>	1'713	2'394	3'663	2'883	3'019	2'421	1'830	17'923
2002	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	-	-	(0.5)	(0.3)	(0.7)	(0.4)	-	0.4
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	(2.1)	1.5	1.7	1.7	1.3	(0.5)	-	1.5
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	35.3	34.1	34.3	31.2	22.9	16.5	8.0	28.4
	Nicht-Rauchende	62.4	64.0	63.1	66.3	75.0	82.4	91.1	69.5
	<i>N gewichtet</i>	2'614	3'183	3'744	3'100	2'603	2'011	1'392	18'646
	<i>N ungewichtet</i>	1'609	2'908	4'056	3'060	3'127	2'446	1'686	18'892
1997	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	(0.8)	-	0.3
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	(0.7)	1.3	(1.2)	(1.6)	(1.1)	-	-	1.1
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	42.9	38.8	38.8	32.3	23.1	15.5	10.9	31.7
	Nicht-Rauchende	56.1	59.5	59.7	65.3	74.9	83.1	88.8	66.7
	<i>N gewichtet</i>	1'765	2'449	2'415	2'161	1'598	1'340	946	12'674
	<i>N ungewichtet</i>	1'394	2'830	2'476	1'936	1'656	1'465	1'004	12'761
1992	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	0.3
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	(0.5)	(0.3)	-	-	-	-	0.3
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	30.4	37.3	34.7	30.5	23.7	15.7	9.3	28.9
	Nicht-Rauchende	69.5	62.1	64.6	68.5	75.6	82.8	89.5	70.3
	<i>N gewichtet</i>	2'150	3'042	2'649	2'414	1'716	1'673	829	14'474
	<i>N ungewichtet</i>	1'696	3'410	2'754	2'299	1'928	1'640	895	14'622

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Cigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Cigarillos. Rauchende, welche keine Cigarillos rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Cigarillos)" zugeordnet. Rauchende, welche Cigarillos rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Cigarillos gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	(1.4)	-	-	(0.7)	(0.9)	(0.8)	-	0.7
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	4.3	3.6	2.2	2.4	(2.4)	(1.8)	-	2.7
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	30.7	39.6	29.9	28.1	26.9	20.5	9.6	28.6
	Nicht-Rauchende	63.7	56.3	67.3	68.6	69.3	76.4	89.2	67.7
	<i>N gewichtet</i>	1'373	1'327	1'742	1'505	1'245	821	521	8'534
	N ungewichtet	864	1'074	1'701	1'348	1'325	970	661	7'943
2002	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Cigarillos	-	-	(1.0)	(0.7)	(1.3)	(1.0)	-	0.8
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	(3.2)	2.7	2.7	3.1	2.4	(1.0)	-	2.5
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	36.3	38.5	35.8	34.9	25.8	22.2	11.4	32.1
	Nicht-Rauchende	60.3	58.2	59.9	60.6	70.1	75.8	86.6	64.2
	<i>N gewichtet</i>	1'323	1'549	1'874	1'538	1'236	830	496	8'846
	N ungewichtet	805	1'291	1'964	1'374	1'309	997	625	8'365
1997	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	(1.8)	-	0.6
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	2.6	(2.1)	(2.9)	(1.8)	-	-	2.0
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	45.2	41.9	41.5	36.0	26.4	21.6	19.5	36.2
	Nicht-Rauchende	53.3	54.9	55.8	59.5	69.9	75.2	79.4	60.8
	<i>N gewichtet</i>	888	1'213	1'222	1'072	785	565	332	6'076
	N ungewichtet	675	1'332	1'141	883	712	561	327	5'631
1992	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	0.5
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	(0.8)	-	-	-	-	-	0.6
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	35.6	41.4	39.4	38.0	29.5	22.5	15.7	34.8
	Nicht-Rauchende	64.2	57.6	59.2	60.0	68.9	74.5	81.5	63.7
	<i>N gewichtet</i>	1'080	1'449	1'273	1'138	796	762	337	6'835
	N ungewichtet	799	1'565	1'303	1'031	803	634	295	6'430

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Cigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Cigarillos. Rauchende, welche keine Cigarillos rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Cigarillos)" zugeordnet. Rauchende, welche Cigarillos rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Cigarillos gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	(2.1)	(1.1)	(0.5)	(1.5)	-	-	-	0.9
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	27.9	29.9	26.2	28.1	19.0	10.5	5.7	22.7
	Nicht-Rauchende	70.0	69.0	73.0	70.4	80.5	89.2	94.1	76.3
	<i>N gewichtet</i>	1'300	1'373	1'737	1'517	1'339	940	844	9'049
	<i>N ungewichtet</i>	849	1'320	1'962	1'535	1'694	1'451	1'169	9'980
2002	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	-	(0.7)	-	-	-	-	0.5
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	34.4	30.0	32.9	27.6	20.3	12.5	6.1	25.1
	Nicht-Rauchende	64.5	69.5	66.4	72.0	79.4	87.1	93.6	74.4
	<i>N gewichtet</i>	1'290	1'634	1'869	1'562	1'367	1'181	896	9'800
	<i>N ungewichtet</i>	804	1'617	2'092	1'686	1'818	1'449	1'061	10'527
1997	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	0.2
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	40.5	35.8	36.0	28.5	19.9	11.0	6.2	27.6
	Nicht-Rauchende	59.0	64.1	63.7	71.1	79.6	88.9	93.8	72.1
	<i>N gewichtet</i>	877	1'235	1'194	1'089	814	775	613	6'597
	<i>N ungewichtet</i>	719	1'498	1'335	1'053	944	904	677	7'130
1992	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	0.1
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	0.1
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	25.2	33.6	30.3	23.8	18.6	10.0	4.9	23.7
	Nicht-Rauchende	74.8	66.1	69.6	76.1	81.4	89.8	95.1	76.2
	<i>N gewichtet</i>	1'070	1'594	1'376	1'276	920	911	492	7'640
	<i>N ungewichtet</i>	897	1'845	1'451	1'268	1'125	1'006	600	8'192

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Cigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Cigarillos. Rauchende, welche keine Cigarillos rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Cigarillos)" zugeordnet. Rauchende, welche Cigarillos rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Cigarillos gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozentage
Prozentage werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	> 8 Cigarillos	(0.1)	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	(0.1)	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	0.4	(0.4)	-	0.4
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	1.9	1.5	-	1.8
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	25.3	26.2	26.7	25.6
	Nicht-Rauchende	72.3	71.7	72.8	72.1
	<i>N gewichtet</i>	12'698	4'087	798	17'583
	N ungewichtet	11'040	5'422	1'461	17'923
2002	> 8 Cigarillos	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	(0.1)	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	0.4	(0.4)	-	0.4
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	1.6	1.2	-	1.5
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	27.9	30.3	27.1	28.4
	Nicht-Rauchende	69.9	68.0	72.2	69.5
	<i>N gewichtet</i>	13'449	4'362	835	18'646
	N ungewichtet	12'692	4'750	1'450	18'892
1997	> 8 Cigarillos	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	(0.1)	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	(0.4)	-	-	0.3
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	1.2	0.9	-	1.1
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	31.3	33.0	32.1	31.7
	Nicht-Rauchende	67.0	65.7	67.7	66.7
	<i>N gewichtet</i>	9'025	3'036	612	12'674
	N ungewichtet	8'079	3'564	1'118	12'761
1992	> 8 Cigarillos	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	(0.2)	(0.4)	-	0.3
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	(0.2)	(0.6)	-	0.3
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	28.2	30.7	32.1	28.9
	Nicht-Rauchende	71.2	68.0	67.8	70.3
	<i>N gewichtet</i>	10'499	3'289	686	14'474
	N ungewichtet	9'999	3'820	803	14'622

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Cigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Cigarillos. Rauchende, welche keine Cigarillos rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Cigarillos)" zugeordnet. Rauchende, welche Cigarillos rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Cigarillos gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	> 8 Cigarillos	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	0.7	(0.9)	-	0.7
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	3.0	2.2	-	2.7
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	28.6	28.7	28.6	28.6
	Nicht-Rauchende	67.5	68.0	70.7	67.7
	<i>N gewichtet</i>	6'191	1'973	370	8'534
	N ungewichtet	4'951	2'379	613	7'943
2002	> 8 Cigarillos	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	(0.3)	-	-	(0.2)
	1-4 Cigarillos	0.8	(0.9)	-	0.8
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	2.7	2.3	-	2.5
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	31.8	33.5	30.2	32.1
	Nicht-Rauchende	64.2	63.2	68.5	64.2
	<i>N gewichtet</i>	6'490	1'982	374	8'846
	N ungewichtet	5'755	1'999	611	8'365
1997	> 8 Cigarillos	-	-	-	(0.2)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	(0.2)
	1-4 Cigarillos	(0.8)	-	-	0.6
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	2.2	(1.6)	-	2.0
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	35.6	38.0	35.8	36.2
	Nicht-Rauchende	61.0	59.6	63.6	60.8
	<i>N gewichtet</i>	4'391	1'413	273	6'076
	N ungewichtet	3'646	1'521	464	5'631
1992	> 8 Cigarillos	-	-	-	(0.2)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	(0.2)
	1-4 Cigarillos	(0.5)	(0.8)	-	0.5
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	(0.5)	(1.1)	-	0.6
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	34.4	35.4	37.7	34.8
	Nicht-Rauchende	64.3	61.9	62.1	63.7
	<i>N gewichtet</i>	5'004	1'512	318	6'835
	N ungewichtet	4'450	1'663	317	6'430

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Cigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Cigarillos. Rauchende, welche keine Cigarillos rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Cigarillos)" zugeordnet. Rauchende, welche Cigarillos rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Cigarillos gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Sprachregion pro Tag, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	> 8 Cigarillos	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	0.9	(0.9)	-	0.9
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	22.2	23.9	25.1	22.7
	Nicht-Rauchende	76.8	75.2	74.5	76.3
	<i>N gewichtet</i>	6'507	2'114	429	9'049
	N ungewichtet	6'089	3'043	848	9'980
2002	> 8 Cigarillos	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	0.5	(0.4)	-	0.5
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	24.3	27.6	24.5	25.1
	Nicht-Rauchende	75.1	72.0	75.1	74.4
	<i>N gewichtet</i>	6'958	2'380	462	9'800
	N ungewichtet	6'937	2'751	839	10'527
1997	> 8 Cigarillos	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	(0.2)	-	-	(0.2)
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	27.2	28.7	29.0	27.6
	Nicht-Rauchende	72.6	71.0	71.0	72.1
	<i>N gewichtet</i>	4'635	1'624	339	6'597
	N ungewichtet	4'433	2'043	654	7'130
1992	> 8 Cigarillos	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	22.5	26.7	27.2	23.7
	Nicht-Rauchende	77.4	73.1	72.8	76.2
	<i>N gewichtet</i>	5'495	1'777	368	7'640
	N ungewichtet	5'549	2'157	486	8'192

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Cigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Cigarillos. Rauchende, welche keine Cigarillos rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Cigarillos)" zugeordnet. Rauchende, welche Cigarillos rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Cigarillos gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Pfeifen	-	-	-	(0.6)	(0.8)	(1.4)	(0.8)	0.5
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(0.8)	(0.8)	(0.4)	1.3	(0.5)	-	0.7
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	32.9	36.4	28.9	29.6	22.3	14.4	6.3	26.6
	Nicht-Rauchende	66.8	62.8	70.2	69.4	75.1	83.3	92.3	72.1
	<i>N gewichtet</i>	2'674	2'700	3'479	3'024	2'585	1'760	1'365	17'586
	<i>N ungewichtet</i>	1'714	2'394	3'663	2'884	3'021	2'421	1'830	17'927
2002	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	(0.5)	-	-	0.1
	1-4 Pfeifen	-	-	(0.5)	1.3	1.0	1.3	(0.5)	0.7
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(0.6)	0.9	(1.1)	1.6	(0.9)	-	0.9
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	37.3	35.2	35.4	31.0	21.8	15.1	7.9	28.8
	Nicht-Rauchende	62.4	64.0	63.1	66.4	75.0	82.4	91.1	69.5
	<i>N gewichtet</i>	2'614	3'186	3'744	3'097	2'603	2'011	1'392	18'645
	<i>N ungewichtet</i>	1'609	2'909	4'056	3'058	3'126	2'446	1'686	18'890
1997	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Pfeifen	-	-	-	(1.6)	(1.1)	(0.7)	-	0.7
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(1.0)	1.6	1.7	(1.0)	-	-	1.1
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	43.4	39.3	37.9	31.0	22.6	15.1	9.5	31.3
	Nicht-Rauchende	56.1	59.5	59.7	65.4	74.9	83.1	88.8	66.7
	<i>N gewichtet</i>	1'765	2'449	2'415	2'160	1'598	1'340	946	12'673
	<i>N ungewichtet</i>	1'394	2'830	2'476	1'935	1'656	1'466	1'004	12'761
1992	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	-	-	-	(0.5)	-	-	-	0.2
	1-4 Pfeifen	-	(0.4)	(1.1)	1.8	(1.2)	(1.2)	-	0.9
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(0.5)	(1.0)	1.7	(0.9)	-	-	0.8
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	30.0	37.0	33.0	27.1	21.6	15.3	9.0	27.6
	Nicht-Rauchende	69.5	62.1	64.6	68.6	75.6	82.8	89.6	70.3
	<i>N gewichtet</i>	2'150	3'041	2'649	2'410	1'716	1'673	829	14'468
	<i>N ungewichtet</i>	1'696	3'410	2'754	2'297	1'928	1'640	894	14'619

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Pfeifen. Rauchende, welche keine Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Pfeifen)" zugeordnet. Rauchende, welche Pfeifen rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Pfeifen gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl geraucher Pfeifen pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Pfeifen	-	-	-	(1.0)	(1.8)	(2.9)	(2.0)	0.9
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(1.5)	(1.4)	(0.8)	2.8	(1.0)	-	1.3
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	35.8	42.1	31.1	29.7	25.3	18.7	7.3	29.8
	Nicht-Rauchende	63.7	56.3	67.3	68.6	69.3	76.4	89.2	67.7
	N gewichtet	1'373	1'327	1'742	1'505	1'245	821	521	8'534
	N ungewichtet	865	1'074	1'701	1'348	1'325	970	661	7'944
2002	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	(1.1)	-	-	0.3
	1-4 Pfeifen	-	-	(1.0)	2.5	2.0	3.0	-	1.3
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(1.2)	1.7	(2.1)	3.3	(2.2)	-	1.7
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	39.2	40.4	37.4	34.3	23.3	18.1	10.7	32.4
	Nicht-Rauchende	60.3	58.1	59.9	60.7	70.1	75.8	86.6	64.2
	N gewichtet	1'323	1'552	1'874	1'535	1'235	830	496	8'845
	N ungewichtet	805	1'292	1'964	1'372	1'308	997	625	8'363
1997	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.4)
	1-4 Pfeifen	-	-	-	(3.3)	(2.2)	(1.7)	-	1.4
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(1.9)	3.0	3.4	(1.9)	-	-	2.1
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	46.2	42.9	39.6	33.2	25.0	20.5	15.7	35.1
	Nicht-Rauchende	53.3	54.9	55.8	59.6	69.9	75.2	79.4	60.8
	N gewichtet	888	1'213	1'222	1'071	785	565	332	6'075
	N ungewichtet	675	1'332	1'141	882	712	561	327	5'630
1992	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.3)
	5-8 Pfeifen	-	-	-	(1.2)	-	-	-	0.5
	1-4 Pfeifen	-	(0.8)	(2.3)	3.8	(2.7)	(2.7)	-	2.0
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(1.0)	(2.0)	(3.3)	(2.0)	-	-	1.5
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	34.7	40.4	36.0	30.9	25.1	21.5	15.0	32.0
	Nicht-Rauchende	64.2	57.6	59.2	60.2	68.9	74.5	81.6	63.8
	N gewichtet	1'080	1'447	1'273	1'134	796	762	336	6'829
	N ungewichtet	799	1'565	1'303	1'029	803	634	294	6'427

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl geraucher Pfeifen. Rauchende, welche keine Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Pfeifen)" zugeordnet. Rauchende, welche Pfeifen rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl geraucher Pfeifen gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	29.8	30.9	26.7	29.4	19.6	10.8	5.7	23.6
	Nicht-Rauchende	70.0	69.0	73.0	70.3	80.4	89.2	94.1	76.3
	<i>N gewichtet</i>	1'300	1'373	1'737	1'518	1'339	940	844	9'051
	N ungewichtet	849	1'320	1'962	1'536	1'696	1'451	1'169	9'983
2002	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	35.4	30.4	33.5	27.8	20.5	12.9	6.4	25.5
	Nicht-Rauchende	64.5	69.5	66.4	72.0	79.4	87.1	93.6	74.4
	<i>N gewichtet</i>	1'290	1'634	1'869	1'562	1'367	1'181	896	9'800
	N ungewichtet	804	1'617	2'092	1'686	1'818	1'449	1'061	10'527
1997	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	40.6	35.8	36.1	28.9	20.3	11.2	6.2	27.8
	Nicht-Rauchende	59.0	64.1	63.7	71.1	79.6	88.8	93.8	72.1
	<i>N gewichtet</i>	877	1'235	1'194	1'089	814	776	613	6'598
	N ungewichtet	719	1'498	1'335	1'053	944	905	677	7'131
1992	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	25.2	33.8	30.3	23.6	18.6	10.2	4.9	23.8
	Nicht-Rauchende	74.8	66.1	69.6	76.1	81.4	89.8	95.1	76.2
	<i>N gewichtet</i>	1'070	1'594	1'376	1'276	920	911	492	7'640
	N ungewichtet	897	1'845	1'451	1'268	1'125	1'006	600	8'192

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Pfeifen. Rauchende, welche keine Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Pfeifen)" zugeordnet. Rauchende, welche Pfeifen rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Pfeifen gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	> 8 Pfeifen	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	(0.1)	-	-	(0.1)
	1-4 Pfeifen	0.5	(0.3)	-	0.5
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	0.7	(0.4)	-	0.7
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	26.4	27.5	26.0	26.6
	Nicht-Rauchende	72.2	71.7	72.8	72.1
	<i>N gewichtet</i>	12'699	4'088	798	17'586
	N ungewichtet	11'041	5'425	1'461	17'927
2002	> 8 Pfeifen	-	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	(0.1)	(0.2)	-	0.1
	1-4 Pfeifen	0.7	(0.5)	-	0.7
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	0.9	0.8	(0.6)	0.9
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	28.3	30.6	26.2	28.8
	Nicht-Rauchende	69.9	68.0	72.2	69.5
	<i>N gewichtet</i>	13'448	4'362	835	18'645
	N ungewichtet	12'690	4'750	1'450	18'890
1997	> 8 Pfeifen	-	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	(0.2)	-	-	(0.2)
	1-4 Pfeifen	0.8	(0.5)	-	0.7
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	1.2	(0.7)	-	1.1
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	30.8	32.9	30.8	31.3
	Nicht-Rauchende	67.0	65.7	67.7	66.7
	<i>N gewichtet</i>	9'025	3'036	612	12'673
	N ungewichtet	8'079	3'564	1'118	12'761
1992	> 8 Pfeifen	(0.1)	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	(0.2)	(0.3)	-	0.2
	1-4 Pfeifen	0.9	1.1	-	0.9
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	0.8	(0.7)	-	0.8
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	26.7	29.7	31.4	27.6
	Nicht-Rauchende	71.2	68.0	67.8	70.3
	<i>N gewichtet</i>	10'494	3'288	686	14'468
	N ungewichtet	9'997	3'819	803	14'619

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Pfeifen. Rauchende, welche keine Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Pfeifen)" zugeordnet. Rauchende, welche Pfeifen rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Pfeifen gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	> 8 Pfeifen	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	(0.2)	-	-	(0.2)
	1-4 Pfeifen	0.9	(0.6)	-	0.9
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	1.4	(0.7)	-	1.3
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	29.8	30.4	26.5	29.8
	Nicht-Rauchende	67.5	68.0	70.7	67.7
	<i>N gewichtet</i>	6'191	1'973	370	8'534
	N ungewichtet	4'951	2'380	613	7'944
2002	> 8 Pfeifen	-	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	(0.2)	(0.3)	-	0.3
	1-4 Pfeifen	1.5	(0.9)	-	1.3
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	1.8	(1.5)	-	1.7
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	32.1	33.9	28.1	32.4
	Nicht-Rauchende	64.3	63.2	68.5	64.2
	<i>N gewichtet</i>	6'490	1'982	374	8'845
	N ungewichtet	5'753	1'999	611	8'363
1997	> 8 Pfeifen	-	-	-	(0.2)
	5-8 Pfeifen	(0.4)	-	-	(0.4)
	1-4 Pfeifen	1.6	(1.0)	-	1.4
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	2.3	(1.5)	-	2.1
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	34.5	37.5	32.9	35.1
	Nicht-Rauchende	61.1	59.6	63.6	60.8
	<i>N gewichtet</i>	4'390	1'413	273	6'075
	N ungewichtet	3'645	1'521	464	5'630
1992	> 8 Pfeifen	(0.3)	-	-	(0.3)
	5-8 Pfeifen	(0.4)	(0.7)	-	0.5
	1-4 Pfeifen	1.9	2.3	-	2.0
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	1.6	(1.5)	-	1.5
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	31.3	33.3	36.3	32.0
	Nicht-Rauchende	64.4	62.0	62.1	63.8
	<i>N gewichtet</i>	4'999	1'511	318	6'829
	N ungewichtet	4'448	1'662	317	6'427

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Pfeifen.
Rauchende, welche keine Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Pfeifen)" zugeordnet.
Rauchende, welche Pfeifen rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Pfeifen gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	> 8 Pfeifen	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	(0.1)
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	23.1	24.7	25.5	23.6
	Nicht-Rauchende	76.8	75.1	74.5	76.3
	<i>N gewichtet</i>	6'508	2'115	429	9'051
	N ungewichtet	6'090	3'045	848	9'983
2002	> 8 Pfeifen	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	(0.1)
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	24.8	27.8	24.6	25.5
	Nicht-Rauchende	75.1	72.0	75.1	74.4
	<i>N gewichtet</i>	6'958	2'380	462	9'800
	N ungewichtet	6'937	2'751	839	10'527
1997	> 8 Pfeifen	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	27.3	28.9	29.0	27.8
	Nicht-Rauchende	72.6	71.0	71.0	72.1
	<i>N gewichtet</i>	4'635	1'624	339	6'598
	N ungewichtet	4'434	2'043	654	7'131
1992	> 8 Pfeifen	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	22.6	26.7	27.2	23.8
	Nicht-Rauchende	77.4	73.1	72.8	76.2
	<i>N gewichtet</i>	5'495	1'777	368	7'640
	N ungewichtet	5'549	2'157	486	8'192

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Pfeifen. Rauchende, welche keine Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (aber keine Pfeifen)" zugeordnet. Rauchende, welche Pfeifen rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Pfeifen gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Wasserpfeife-Rauchen, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, 2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	Wasserpfeife-Rauchende	8.6	3.2	0.9	(0.4)	-	-	-	2.1
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	24.6	34.0	29.0	30.1	24.8	16.7	7.7	25.8
	Nicht-Rauchende	66.8	62.8	70.2	69.4	75.1	83.3	92.3	72.1
	<i>N gewichtet</i>	2'674	2'698	3'479	3'024	2'585	1'760	1'365	17'583
	<i>N ungewichtet</i>	1'714	2'392	3'663	2'884	3'021	2'421	1'830	17'925

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?'

Anmerkungen: Beide Fragen wurden in stellvertretenden Interviews (Proxys) gestellt. Trotzdem wurden Angaben von Proxy-Interviews ausgeschlossen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den anderen Tabakerzeugnisse zu ermöglichen.
Rauchende, welche keine Wasserpfeife rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)" zugeordnet.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Wasserpfeife-Rauchen, nach Alter
Männer, aktueller Status, 2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	Wasserpfeife-Rauchende	10.0	5.0	(0.6)	-	-	-	-	2.7
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	26.4	38.7	32.1	30.7	30.5	23.5	10.8	29.6
	Nicht-Rauchende	63.7	56.3	67.3	68.6	69.3	76.4	89.2	67.7
	N gewichtet	1'373	1'327	1'742	1'505	1'245	821	521	8'534
	N ungewichtet	865	1'074	1'701	1'348	1'325	970	661	7'944

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?'

Anmerkungen: Beide Fragen wurden in stellvertretenden Interviews (Proxys) gestellt. Trotzdem wurden Angaben von Proxy-Interviews ausgeschlossen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den anderen Tabakerzeugnisse zu ermöglichen.
Rauchende, welche keine Wasserpfeife rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)" zugeordnet.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Wasserpfeife-Rauchen, nach Alter
Frauen, aktueller Status, 2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	Wasserpfeife-Rauchende	7.2	(1.5)	(1.2)	-	-	-	-	1.5
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	22.8	29.4	25.8	29.5	19.5	10.8	5.9	22.2
	Nicht-Rauchende	70.0	69.1	73.0	70.3	80.4	89.2	94.1	76.3
	<i>N gewichtet</i>	1'300	1'371	1'737	1'518	1'339	940	844	9'049
	N ungewichtet	849	1'318	1'962	1'536	1'696	1'451	1'169	9'981

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?'

Anmerkungen: Beide Fragen wurden in stellvertretenden Interviews (Proxys) gestellt. Trotzdem wurden Angaben von Proxy-Interviews ausgeschlossen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den anderen Tabakerzeugnisse zu ermöglichen.
Rauchende, welche keine Wasserpfeife rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)" zugeordnet.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Wasserpfeife-Rauchen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, 2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	Wasserpfeife-Rauchende	2.3	1.5	-	2.1
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	25.4	26.8	26.5	25.8
	Nicht-Rauchende	72.3	71.7	72.8	72.1
	<i>N gewichtet</i>	12'697	4'088	798	17'583
	N ungewichtet	11'039	5'425	1'461	17'925

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?'

Anmerkungen: Beide Fragen wurden in stellvertretenden Interviews (Proxys) gestellt. Trotzdem wurden Angaben von Proxy-Interviews ausgeschlossen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den anderen Tabakerzeugnisse zu ermöglichen.
Rauchende, welche keine Wasserpfeife rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)" zugeordnet.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Wasserpfeife-Rauchen, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, 2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	Wasserpfeife-Rauchende	2.9	2.2	-	2.7
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	29.6	29.8	28.1	29.6
	Nicht-Rauchende	67.5	68.0	70.7	67.7
	<i>N gewichtet</i>	6'191	1'973	370	8'534
	N ungewichtet	4'951	2'380	613	7'944

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?'

Anmerkungen: Beide Fragen wurden in stellvertretenden Interviews (Proxys) gestellt. Trotzdem wurden Angaben von Proxy-Interviews ausgeschlossen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den anderen Tabakerzeugnisse zu ermöglichen.
Rauchende, welche keine Wasserpfeife rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)" zugeordnet.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.


Wasserpfeife-Rauchen, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, 2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	Wasserpfeife-Rauchende	1.8	(0.8)	-	1.5
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	21.4	24.0	25.1	22.2
	Nicht-Rauchende	76.8	75.1	74.5	76.3
	<i>N gewichtet</i>	6'506	2'115	429	9'049
	N ungewichtet	6'088	3'045	848	9'981

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?'

Anmerkungen: Beide Fragen wurden in stellvertretenden Interviews (Proxys) gestellt. Trotzdem wurden Angaben von Proxy-Interviews ausgeschlossen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den anderen Tabakerzeugnisse zu ermöglichen.
Rauchende, welche keine Wasserpfeife rauchen, wurden der Kategorie "Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)" zugeordnet.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter
Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2007



Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?' und 'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören. Prozente werden gewichtet berechnet.

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter
Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	schon versucht	35.2	32.6	25.8	28.2	25.8	27.9	(14.2)	29.2
	nie versucht, möchte gerne	24.3	32.7	37.3	37.1	30.9	27.0	(23.5)	32.3
	nie versucht, will nicht	40.5	34.6	36.9	34.7	43.3	45.1	62.3	38.5
	<i>N gewichtet</i>	823	967	997	882	609	277	95	4'649
	N ungewichtet	575	832	1'092	903	723	395	138	4'658
2002	schon versucht	32.1	28.3	26.6	25.3	25.9	25.6	23.4	27.5
	nie versucht, möchte gerne	24.3	35.8	38.9	35.9	32.6	24.1	14.7	33.0
	nie versucht, will nicht	43.6	35.9	34.5	38.8	41.5	50.2	61.9	39.5
	<i>N gewichtet</i>	950	1'089	1'309	983	613	334	112	5'390
	N ungewichtet	580	1'012	1'459	1'049	785	420	143	5'448
1997	schon versucht	33.8	23.1	23.4	21.8	20.3	21.7	(21.2)	24.5
	nie versucht, möchte gerne	22.6	33.9	37.6	35.2	31.1	24.6	(10.1)	31.6
	nie versucht, will nicht	43.6	43.0	39.0	43.0	48.5	53.7	68.7	43.9
	<i>N gewichtet</i>	759	962	946	723	382	215	95	4'082
	N ungewichtet	614	1'131	990	661	409	251	104	4'160
1992	schon versucht	27.8	28.4	26.0	23.4	27.9	21.4	(18.9)	26.2
	nie versucht, möchte gerne	24.8	28.9	32.0	34.1	24.3	19.0	-	28.3
	nie versucht, will nicht	47.4	42.7	42.0	42.6	47.8	59.7	75.2	45.4
	<i>N gewichtet</i>	674	1'173	949	774	421	289	77	4'357
	N ungewichtet	588	1'379	1'020	771	487	276	85	4'606

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?' und 'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.
Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter
Rauchende Männer, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	schon versucht	34.9	31.7	29.6	26.9	21.4	29.3	(12.9)	29.0
	nie versucht, möchte gerne	27.7	32.1	35.9	41.8	31.5	25.9	(20.9)	33.1
	nie versucht, will nicht	37.4	36.2	34.5	31.3	47.1	44.8	66.2	37.9
	<i>N gewichtet</i>	462	549	545	451	363	183	51	2'605
	N ungewichtet	308	436	552	431	370	227	76	2'400
2002	schon versucht	31.9	26.7	26.5	23.6	26.3	24.9	(27.7)	26.8
	nie versucht, möchte gerne	24.9	37.2	39.5	34.8	28.2	22.9	-	32.7
	nie versucht, will nicht	43.2	36.1	34.0	41.6	45.5	52.1	65.6	40.5
	<i>N gewichtet</i>	507	622	706	563	343	190	60	2'992
	N ungewichtet	302	516	752	518	382	222	75	2'767
1997	schon versucht	34.0	20.9	21.8	24.3	19.4	(21.9)	(15.4)	23.8
	nie versucht, möchte gerne	23.7	36.1	38.6	31.4	28.9	24.3	-	31.6
	nie versucht, will nicht	42.3	43.1	39.6	44.3	51.7	53.8	71.1	44.5
	<i>N gewichtet</i>	407	524	515	420	223	131	58	2'278
	N ungewichtet	321	583	492	340	211	140	60	2'147
1992	schon versucht	28.7	27.7	23.4	22.4	27.6	20.3	(22.3)	25.3
	nie versucht, möchte gerne	24.0	29.8	32.3	33.2	19.9	(16.7)	-	27.4
	nie versucht, will nicht	47.4	42.4	44.2	44.4	52.5	63.0	74.9	47.3
	<i>N gewichtet</i>	396	626	524	465	250	194	57	2'512
	N ungewichtet	315	695	551	440	253	165	55	2'474

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?' und 'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.
Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.


Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter
Rauchende Frauen, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	schon versucht	35.6	33.9	21.3	29.5	32.3	25.2	(15.8)	29.5
	nie versucht, möchte gerne	20.0	33.5	38.9	32.3	30.2	29.2	(26.5)	31.3
	nie versucht, will nicht	44.4	32.6	39.9	38.3	37.5	45.6	57.7	39.2
	<i>N gewichtet</i>	361	417	452	431	245	94	44	2'045
	N ungewichtet	267	396	540	472	353	168	62	2'258
2002	schon versucht	32.3	30.5	26.7	27.5	25.5	26.6	(18.4)	28.3
	nie versucht, möchte gerne	23.7	34.0	38.1	37.4	38.2	25.8	(23.8)	33.5
	nie versucht, will nicht	44.0	35.6	35.1	35.1	36.3	47.7	57.8	38.2
	<i>N gewichtet</i>	443	466	602	421	270	144	52	2'398
	N ungewichtet	278	496	707	531	403	198	68	2'681
1997	schon versucht	33.5	25.7	25.3	18.4	21.7	(21.5)	(30.3)	25.4
	nie versucht, möchte gerne	21.3	31.4	36.5	40.5	34.3	25.0	-	31.6
	nie versucht, will nicht	45.2	43.0	38.2	41.2	44.1	53.5	(64.9)	43.0
	<i>N gewichtet</i>	352	439	430	302	159	84	37	1'804
	N ungewichtet	293	548	498	321	198	111	44	2'013
1992	schon versucht	26.6	29.1	29.2	24.8	28.4	(23.5)	-	27.5
	nie versucht, möchte gerne	25.9	27.8	31.6	35.4	30.6	(23.7)	-	29.6
	nie versucht, will nicht	47.5	43.1	39.2	39.8	41.0	52.8	(76.0)	43.0
	<i>N gewichtet</i>	278	547	425	308	171	95	20	1'845
	N ungewichtet	273	684	469	331	234	111	30	2'132

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?' und 'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.
Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion
Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2007



Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?' und 'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören. Prozente werden gewichtet berechnet.

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion
Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	schon versucht	30.6	26.5	22.0	29.2
	nie versucht, möchte gerne	30.4	37.1	37.7	32.3
	nie versucht, will nicht	39.0	36.4	40.3	38.5
	<i>N gewichtet</i>	<i>3'356</i>	<i>1'085</i>	<i>208</i>	<i>4'649</i>
	N ungewichtet	2'844	1'442	372	4'658
2002	schon versucht	28.4	24.6	27.8	27.5
	nie versucht, möchte gerne	30.8	39.7	31.1	33.0
	nie versucht, will nicht	40.8	35.7	41.1	39.5
	<i>N gewichtet</i>	<i>3'816</i>	<i>1'352</i>	<i>222</i>	<i>5'390</i>
	N ungewichtet	3'572	1'475	401	5'448
1997	schon versucht	25.3	23.5	18.5	24.5
	nie versucht, möchte gerne	28.7	38.6	37.9	31.6
	nie versucht, will nicht	46.0	37.9	43.6	43.9
	<i>N gewichtet</i>	<i>2'884</i>	<i>1'006</i>	<i>192</i>	<i>4'082</i>
	N ungewichtet	2'573	1'224	363	4'160
1992	schon versucht	26.6	24.6	28.5	26.2
	nie versucht, möchte gerne	25.8	36.3	23.5	28.3
	nie versucht, will nicht	47.6	39.1	48.0	45.4
	<i>N gewichtet</i>	<i>3'035</i>	<i>1'104</i>	<i>218</i>	<i>4'357</i>
	N ungewichtet	3'012	1'347	247	4'606

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?' und 'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.
Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion
 Rauchende Männer, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	schon versucht	29.3	29.2	22.7	29.0
	nie versucht, möchte gerne	31.6	36.8	39.2	33.1
	nie versucht, will nicht	39.1	34.0	38.1	37.9
	<i>N gewichtet</i>	<i>1'911</i>	<i>591</i>	<i>104</i>	<i>2'605</i>
	N ungewichtet	1'520	714	166	2'400
2002	schon versucht	27.4	24.9	26.5	26.8
	nie versucht, möchte gerne	30.9	38.8	29.8	32.7
	nie versucht, will nicht	41.7	36.3	43.7	40.5
	<i>N gewichtet</i>	<i>2'180</i>	<i>700</i>	<i>111</i>	<i>2'992</i>
	N ungewichtet	1'893	691	183	2'767
1997	schon versucht	23.7	25.8	(14.1)	23.8
	nie versucht, möchte gerne	28.6	38.7	43.9	31.6
	nie versucht, will nicht	47.7	35.5	42.0	44.5
	<i>N gewichtet</i>	<i>1'637</i>	<i>547</i>	<i>94</i>	<i>2'278</i>
	N ungewichtet	1'370	609	168	2'147
1992	schon versucht	25.3	24.5	29.1	25.3
	nie versucht, möchte gerne	24.5	36.7	25.4	27.4
	nie versucht, will nicht	50.3	38.8	45.5	47.3
	<i>N gewichtet</i>	<i>1'789</i>	<i>604</i>	<i>119</i>	<i>2'512</i>
	N ungewichtet	1'666	694	114	2'474

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?' und 'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.
 Spaltenprozentage
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion
Rauchende Frauen, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	schon versucht	32.2	23.2	21.3	29.5
	nie versucht, möchte gerne	28.8	37.5	36.2	31.3
	nie versucht, will nicht	38.9	39.3	42.6	39.2
	<i>N gewichtet</i>	<i>1'446</i>	<i>495</i>	<i>104</i>	<i>2'045</i>
	N ungewichtet	1'324	728	206	2'258
2002	schon versucht	29.8	24.3	29.0	28.3
	nie versucht, möchte gerne	30.7	40.7	32.5	33.5
	nie versucht, will nicht	39.5	35.0	38.5	38.2
	<i>N gewichtet</i>	<i>1'636</i>	<i>651</i>	<i>111</i>	<i>2'398</i>
	N ungewichtet	1'679	784	218	2'681
1997	schon versucht	27.3	20.8	22.7	25.4
	nie versucht, möchte gerne	29.0	38.5	32.2	31.6
	nie versucht, will nicht	43.7	40.7	45.1	43.0
	<i>N gewichtet</i>	<i>1'247</i>	<i>458</i>	<i>98</i>	<i>1'804</i>
	N ungewichtet	1'203	615	195	2'013
1992	schon versucht	28.5	24.7	27.9	27.5
	nie versucht, möchte gerne	27.8	35.7	21.2	29.6
	nie versucht, will nicht	43.7	39.5	51.0	43.0
	<i>N gewichtet</i>	<i>1'246</i>	<i>499</i>	<i>99</i>	<i>1'845</i>
	N ungewichtet	1'346	653	133	2'132

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?' und 'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Passives Rauchen, nach Alter

Gesamtpopulation, Anzahl Stunden pro Tag, 2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	nicht ausgesetzt	30.7	48.7	60.8	63.4	72.0	81.6	87.8	60.6
	weniger als 30 Minuten	13.1	13.9	12.3	11.8	9.3	6.8	5.5	11.1
	30 Minuten - <1 Stunde	14.0	11.3	8.4	7.2	5.3	4.1	2.8	8.2
	1 Stunde - <2 Stunden	20.3	13.3	8.9	8.2	7.0	4.1	2.5	9.9
	2 Stunden - <4 Stunden	12.2	7.0	5.2	4.7	3.8	2.0	(1.1)	5.6
	4 Stunden - <8 Stunden	6.6	2.9	2.7	2.9	1.7	(1.1)	-	2.9
	8 Stunden - <12 Stunden	2.8	2.7	1.4	1.6	(0.7)	-	-	1.5
	12 Stunden oder mehr	-	-	(0.3)	-	-	-	-	(0.2)
	<i>N gewichtet</i>	2'592	2'631	3'379	2'927	2'517	1'699	1'323	17'068
	N ungewichtet	1'656	2'343	3'578	2'791	2'945	2'351	1'781	17'445

Frage: 'Wieviele Stunden sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
 Spaltenprozent
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Passives Rauchen, nach Alter
Männer, Anzahl Stunden pro Tag, 2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	nicht ausgesetzt	28.7	41.4	52.8	56.6	62.5	74.7	81.6	53.0
	weniger als 30 Minuten	13.3	13.7	13.3	14.0	10.6	8.6	8.5	12.4
	30 Minuten - <1 Stunde	14.7	14.4	11.6	9.7	7.8	5.5	(4.1)	10.6
	1 Stunde - <2 Stunden	21.2	16.9	11.7	10.4	10.9	7.0	4.1	12.8
	2 Stunden - <4 Stunden	13.3	6.9	6.5	5.5	5.3	2.4	(1.3)	6.6
	4 Stunden - <8 Stunden	4.9	3.8	2.5	2.0	(1.8)	(1.6)	-	2.7
	8 Stunden - <12 Stunden	3.5	2.9	(1.2)	(1.7)	(0.8)	-	-	1.7
	12 Stunden oder mehr	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	N gewichtet	1'341	1'295	1'696	1'463	1'209	788	506	8'297
	N ungewichtet	840	1'055	1'664	1'306	1'286	938	642	7'731

Frage: 'Wieviele Stunden sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Passives Rauchen, nach Alter
Frauen, Anzahl Stunden pro Tag, 2007

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	nicht ausgesetzt	32.8	55.9	68.8	70.3	80.8	87.6	91.6	67.8
	weniger als 30 Minuten	12.9	14.1	11.4	9.6	8.1	5.2	3.6	9.9
	30 Minuten - <1 Stunde	13.3	8.4	5.1	4.6	3.0	3.0	(2.0)	5.9
	1 Stunde - <2 Stunden	19.3	9.8	6.1	6.0	3.4	1.6	(1.6)	7.3
	2 Stunden - <4 Stunden	10.9	7.1	3.8	4.0	2.3	(1.8)	-	4.7
	4 Stunden - <8 Stunden	8.4	2.0	2.9	3.9	1.6	-	-	3.0
	8 Stunden - <12 Stunden	(2.0)	2.6	(1.6)	(1.4)	(0.7)	-	-	1.3
	12 Stunden oder mehr	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	<i>N gewichtet</i>	1'251	1'336	1'684	1'464	1'307	912	817	8'771
	N ungewichtet	816	1'288	1'914	1'485	1'659	1'413	1'139	9'714

Frage: 'Wieviele Stunden sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Passives Rauchen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Anzahl Stunden pro Tag, 2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	nicht ausgesetzt	61.1	57.3	70.0	60.6
	weniger als 30 Minuten	11.4	10.6	7.6	11.1
	30 Minuten - <1 Stunde	8.5	7.8	5.1	8.2
	1 Stunde - <2 Stunden	9.8	11.0	6.2	9.9
	2 Stunden - <4 Stunden	5.1	7.0	6.1	5.6
	4 Stunden - <8 Stunden	2.6	3.6	3.2	2.9
	8 Stunden - <12 Stunden	1.2	2.4	(1.6)	1.5
	12 Stunden oder mehr	(0.1)	(0.3)	-	(0.2)
	<i>N gewichtet</i>	12'297	3'998	773	17'068
	N ungewichtet	10'709	5'311	1'425	17'445

Frage: 'Wieviele Stunden sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Passives Rauchen, nach Sprachregion
Männer, Anzahl Stunden pro Tag, 2007

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	nicht ausgesetzt	53.2	50.9	62.6	53.0
	weniger als 30 Minuten	12.7	11.9	8.8	12.4
	30 Minuten - <1 Stunde	11.2	10.0	(5.1)	10.6
	1 Stunde - <2 Stunden	12.7	13.6	9.9	12.8
	2 Stunden - <4 Stunden	6.3	7.4	7.4	6.6
	4 Stunden - <8 Stunden	2.4	3.4	(3.3)	2.7
	8 Stunden - <12 Stunden	1.4	2.6	(2.6)	1.7
	12 Stunden oder mehr	-	-	-	(0.2)
	<i>N gewichtet</i>	6'012	1'930	355	8'297
	N ungewichtet	4'804	2'333	594	7'731

Frage: 'Wieviele Stunden sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Passives Rauchen, nach Sprachregion
Frauen, Anzahl Stunden pro Tag, 2007


Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	nicht ausgesetzt	68.7	63.3	76.3	67.8
	weniger als 30 Minuten	10.2	9.4	6.5	9.9
	30 Minuten - <1 Stunde	5.9	5.8	5.0	5.9
	1 Stunde - <2 Stunden	7.1	8.6	(3.1)	7.3
	2 Stunden - <4 Stunden	4.0	6.6	5.0	4.7
	4 Stunden - <8 Stunden	2.8	3.8	(3.2)	3.0
	8 Stunden - <12 Stunden	1.1	2.2	-	1.3
	12 Stunden oder mehr	-	-	-	(0.2)
	<i>N gewichtet</i>	6'285	2'068	418	8'771
	N ungewichtet	5'905	2'978	831	9'714

Frage: 'Wieviele Stunden sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

ALKOHOL

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007



Frage: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Für 2007 stellt die Kategorie "seltener" eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich".
Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 2.5% werden nicht berichtet.

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	(0.3)	(0.5)	(0.8)	-	0.3
	2 mal pro Tag	-	(0.7)	1.3	2.2	3.7	7.2	5.3	2.5
	1 mal pro Tag	(1.3)	3.3	7.1	13.9	19.1	23.3	22.6	11.4
	mehrmals pro Woche	4.5	9.6	11.4	11.1	11.6	9.5	6.7	9.5
	1-2 mal wöchentlich	39.6	40.8	36.9	34.8	29.5	22.2	16.5	33.4
	seltener	33.4	28.5	28.0	23.1	20.9	20.7	24.2	26.0
	nie, abstinenter	20.7	17.1	15.2	14.5	14.7	16.2	24.3	17.0
	N (gewichtet)	2'858	2'875	3'687	3'225	2'708	1'851	1'530	18'733
	N (ungewichtet)	1'809	2'507	3'803	3'004	3'111	2'495	2'002	18'731
2002	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	(0.4)	(0.7)	(0.6)	(0.9)	(1.0)	0.5
	2 mal pro Tag	-	(0.6)	2.6	3.5	5.5	6.0	5.5	3.1
	1 mal pro Tag	(1.5)	4.7	9.0	14.1	20.4	22.3	24.7	12.3
	mehrmals pro Woche	5.0	10.2	12.2	13.6	10.4	8.7	5.1	9.9
	1-2 mal wöchentlich	39.1	37.1	32.1	29.6	26.3	16.7	12.8	29.5
	seltener	27.4	24.6	23.9	19.8	17.9	19.5	19.1	22.1
	nie, abstinenter	26.6	22.7	19.8	18.7	18.8	25.8	31.8	22.5
	N (gewichtet)	2'757	3'357	3'930	3'243	2'731	2'102	1'553	19'673
	N (ungewichtet)	1'695	3'018	4'199	3'170	3'240	2'534	1'822	19'678
1997	3 mal oder mehr pro Tag	-	(0.4)	(0.4)	(0.8)	(1.1)	(0.7)	(1.1)	0.6
	2 mal pro Tag	-	1.4	2.8	4.0	5.3	5.8	5.0	3.2
	1 mal pro Tag	2.0	6.3	11.3	17.5	21.7	21.2	21.8	13.3
	mehrmals pro Woche	6.6	12.1	12.5	12.8	10.0	7.4	6.9	10.4
	1-2 mal wöchentlich	33.2	35.0	32.7	28.0	21.2	15.8	11.0	27.5
	seltener	31.9	29.0	25.7	23.3	23.9	24.7	24.8	26.4
	nie, abstinenter	25.8	16.0	14.5	13.7	16.8	24.4	29.3	18.7
	N (gewichtet)	1'786	2'502	2'465	2'197	1'635	1'390	1'020	12'996
	N (ungewichtet)	1'412	2'867	2'508	1'958	1'680	1'509	1'063	12'997
1992	3 mal oder mehr pro Tag	-	0.7	1.4	2.1	1.8	(1.0)	(2.0)	1.3
	2 mal pro Tag	(0.5)	3.5	7.1	7.4	9.2	8.2	8.4	5.9
	1 mal pro Tag	3.5	8.4	14.6	16.8	17.6	18.6	22.3	13.3
	mehrmals pro Woche	8.2	12.8	13.3	11.8	9.0	7.6	4.1	10.5
	1-2 mal wöchentlich	33.0	31.6	31.6	26.1	23.8	17.0	12.4	27.1
	seltener	29.4	29.1	21.3	23.3	24.8	27.1	26.9	25.9
	nie, abstinenter	25.0	13.7	10.7	12.6	13.8	20.5	23.9	16.1
	N (gewichtet)	2'302	3'182	2'781	2'527	1'800	1'767	922	15'282
	N (ungewichtet)	1'802	3'540	2'872	2'397	2'003	1'707	961	15'282

Frage: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebranntes Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Für 2007 stellt die Kategorie "seltener" eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich".
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	(0.6)	(0.9)	(1.7)	-	0.5
	2 mal pro Tag	-	(1.1)	2.0	3.4	5.9	11.7	9.2	3.8
	1 mal pro Tag	(1.8)	4.8	9.9	19.4	24.9	29.2	35.9	15.2
	mehrmals pro Woche	6.9	13.2	15.9	13.6	15.1	13.6	10.1	12.9
	1-2 mal wöchentlich	47.0	47.8	42.0	36.1	28.8	23.6	19.4	37.5
	seltener	25.5	22.2	21.3	16.8	14.1	11.3	14.3	18.9
	nie, abstinent	17.7	10.8	8.8	10.1	10.3	8.9	10.5	11.1
	N (gewichtet)	1'471	1'418	1'840	1'617	1'342	859	600	9'147
	N (ungewichtet)	921	1'129	1'772	1'419	1'398	1'009	759	8'407
2002	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	(0.4)	(1.2)	(0.9)	(1.9)	(2.3)	0.8
	2 mal pro Tag	-	(1.0)	4.7	5.9	8.8	11.1	10.0	5.2
	1 mal pro Tag	(2.5)	7.2	12.2	19.0	25.4	30.9	37.0	16.2
	mehrmals pro Woche	7.6	14.8	16.8	18.1	13.5	12.3	8.7	13.9
	1-2 mal wöchentlich	47.2	43.8	33.6	29.0	25.6	18.6	13.2	32.8
	seltener	19.8	20.5	20.6	13.2	13.8	11.0	14.8	16.9
	nie, abstinent	22.2	12.5	11.8	13.6	12.0	14.1	14.1	14.2
	N (gewichtet)	1'403	1'661	1'983	1'635	1'349	897	587	9'516
	N (ungewichtet)	853	1'361	2'057	1'448	1'406	1'062	708	8'895
1997	3 mal oder mehr pro Tag	-	(0.8)	(0.6)	(1.2)	(2.1)	(1.5)	-	1.1
	2 mal pro Tag	-	2.3	4.7	5.8	7.9	10.6	8.2	5.0
	1 mal pro Tag	(3.2)	9.4	15.7	24.7	30.6	29.7	34.9	18.6
	mehrmals pro Woche	10.8	17.2	17.0	17.4	12.2	10.5	11.0	14.6
	1-2 mal wöchentlich	39.8	40.1	34.9	27.8	21.9	18.6	12.5	30.8
	seltener	23.3	21.2	17.9	15.8	16.4	16.9	17.9	18.7
	nie, abstinent	22.0	9.0	9.2	7.4	8.8	12.2	13.8	11.2
	N (gewichtet)	900	1'241	1'244	1'090	809	595	368	6'247
	N (ungewichtet)	685	1'349	1'154	895	729	586	357	5'755
1992	3 mal oder mehr pro Tag	-	(1.3)	2.6	3.7	3.3	(1.6)	(3.0)	2.2
	2 mal pro Tag	-	5.9	11.3	11.5	14.9	13.0	14.0	9.3
	1 mal pro Tag	6.0	11.8	20.6	21.9	25.9	26.6	31.7	18.6
	mehrmals pro Woche	12.1	19.2	16.8	16.2	12.7	9.5	(6.8)	14.6
	1-2 mal wöchentlich	36.7	34.2	30.3	26.6	23.3	20.1	15.2	28.8
	seltener	22.4	19.6	12.4	13.8	14.3	19.9	19.0	17.1
	nie, abstinent	21.2	7.9	5.9	6.4	5.4	9.2	10.3	9.4
	N (gewichtet)	1'164	1'533	1'374	1'209	859	822	391	7'353
	N (ungewichtet)	857	1'640	1'395	1'090	859	675	334	6'850

Frage: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebranntes Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Für 2007 stellt die Kategorie "seltener" eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich".
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.


Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	-	-	-	-	0.1
	2 mal pro Tag	-	-	(0.6)	(0.9)	1.7	3.3	2.7	1.1
	1 mal pro Tag	-	(1.8)	4.2	8.4	13.4	18.3	14.0	7.8
	mehrmals pro Woche	(1.9)	6.2	7.0	8.7	8.2	5.9	4.5	6.2
	1-2 mal wöchentlich	31.8	33.9	31.8	33.5	30.2	21.0	14.7	29.4
	seltener	41.6	34.7	34.6	29.4	27.6	28.9	30.7	32.8
	nie, abstinent	23.9	23.2	21.7	19.0	18.9	22.5	33.2	22.6
	<i>N (gewichtet)</i>	1'387	1'457	1'846	1'608	1'366	991	930	9'586
	N (ungewichtet)	888	1'378	2'031	1'585	1'713	1'486	1'243	10'324
2002	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	-	-	-	-	0.3
	2 mal pro Tag	-	-	(0.5)	(1.1)	2.2	2.2	2.7	1.1
	1 mal pro Tag	-	2.3	5.8	9.0	15.6	15.9	17.2	8.6
	mehrmals pro Woche	(2.2)	5.6	7.5	9.0	7.4	6.0	3.0	6.1
	1-2 mal wöchentlich	30.7	30.5	30.5	30.2	26.9	15.3	12.6	26.5
	seltener	35.3	28.6	27.3	26.4	22.0	25.8	21.7	27.0
	nie, abstinent	31.1	32.8	28.0	23.9	25.5	34.6	42.5	30.4
	<i>N (gewichtet)</i>	1'354	1'696	1'947	1'607	1'381	1'205	966	10'157
	N (ungewichtet)	842	1'657	2'142	1'722	1'834	1'472	1'114	10'783
1997	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	-	-	-	-	0.2
	2 mal pro Tag	-	-	(0.9)	(2.3)	2.7	(2.1)	(3.2)	1.5
	1 mal pro Tag	-	3.2	7.0	10.5	13.1	14.8	14.4	8.4
	mehrmals pro Woche	(2.4)	7.0	7.8	8.2	7.9	5.0	(4.6)	6.4
	1-2 mal wöchentlich	26.5	29.9	30.5	28.2	20.5	13.8	10.2	24.3
	seltener	40.7	36.6	33.6	30.6	31.1	30.6	28.7	33.5
	nie, abstinent	29.7	22.9	20.0	19.8	24.5	33.5	38.2	25.7
	<i>N (gewichtet)</i>	887	1'261	1'221	1'107	826	795	652	6'749
	N (ungewichtet)	727	1'518	1'354	1'063	951	923	706	7'242
1992	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	(0.7)	-	-	-	0.4
	2 mal pro Tag	-	(1.3)	3.0	3.6	4.0	3.9	(4.2)	2.6
	1 mal pro Tag	(0.9)	5.3	8.8	12.1	10.1	11.6	15.4	8.4
	mehrmals pro Woche	4.1	6.9	10.0	7.7	5.5	5.9	(2.1)	6.6
	1-2 mal wöchentlich	29.2	29.2	32.8	25.6	24.2	14.3	10.4	25.6
	seltener	36.6	38.0	29.9	32.0	34.4	33.4	32.6	34.0
	nie, abstinent	29.0	19.1	15.3	18.3	21.4	30.4	34.0	22.3
	<i>N (gewichtet)</i>	1'138	1'649	1'407	1'318	941	945	531	7'929
	N (ungewichtet)	945	1'900	1'477	1'307	1'144	1'032	627	8'432

Frage: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebranntes Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Für 2007 stellt die Kategorie "seltener" eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich".
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007



Frage: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Für 2007 stellt die Kategorie "seltener" eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich".
Prozente werden gewichtet berechnet.

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	3 mal oder mehr pro Tag	(0.2)	0.6	(0.6)	0.3
	2 mal pro Tag	1.4	4.9	7.6	2.5
	1 mal pro Tag	10.3	13.1	19.4	11.4
	mehrmals pro Woche	9.8	9.6	4.8	9.5
	1-2 mal wöchentlich	35.5	30.0	17.1	33.4
	seltener	27.7	22.6	16.5	26.0
	nie, abstinent	15.2	19.3	34.0	17.0
	<i>N (gewichtet)</i>	13'477	4'404	852	18'733
	N (ungewichtet)	11'475	5'717	1'539	18'731
2002	3 mal oder mehr pro Tag	0.4	0.8	(0.9)	0.5
	2 mal pro Tag	1.8	5.4	12.4	3.1
	1 mal pro Tag	11.3	15.0	13.9	12.3
	mehrmals pro Woche	11.1	7.2	4.8	9.9
	1-2 mal wöchentlich	31.9	25.2	14.2	29.5
	seltener	23.4	19.1	17.0	22.1
	nie, abstinent	20.1	27.4	36.7	22.5
	<i>N (gewichtet)</i>	14'201	4'565	907	19'673
	N (ungewichtet)	13'199	4'929	1'550	19'678
1997	3 mal oder mehr pro Tag	0.4	1.0	(1.4)	0.6
	2 mal pro Tag	1.5	6.6	11.6	3.2
	1 mal pro Tag	12.1	16.6	15.6	13.3
	mehrmals pro Woche	11.2	8.6	6.0	10.4
	1-2 mal wöchentlich	29.1	25.2	14.8	27.5
	seltener	28.0	22.9	19.6	26.4
	nie, abstinent	17.7	19.2	30.9	18.7
	<i>N (gewichtet)</i>	9'290	3'085	621	12'996
	N (ungewichtet)	8'257	3'610	1'130	12'997
1992	3 mal oder mehr pro Tag	0.9	1.9	4.3	1.3
	2 mal pro Tag	3.5	11.4	14.6	5.9
	1 mal pro Tag	12.5	15.3	15.1	13.3
	mehrmals pro Woche	12.0	6.6	5.7	10.5
	1-2 mal wöchentlich	29.2	24.2	10.8	27.1
	seltener	26.6	24.9	20.1	25.9
	nie, abstinent	15.4	15.7	29.3	16.1
	<i>N (gewichtet)</i>	10'970	3'595	717	15'282
	N (ungewichtet)	10'335	4'116	831	15'282

Frage: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebranntes Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Für 2007 stellt die Kategorie "seltener" eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich".
Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	3 mal oder mehr pro Tag	(0.3)	1.1	(1.2)	0.5
	2 mal pro Tag	2.2	7.5	11.5	3.8
	1 mal pro Tag	14.1	17.0	24.6	15.2
	mehrmals pro Woche	13.3	13.0	6.6	12.9
	1-2 mal wöchentlich	40.2	32.9	19.1	37.5
	seltener	20.0	15.8	15.8	18.9
	nie, abstinenter	10.0	12.7	21.3	11.1
	N (gewichtet)	6'591	2'155	401	9'147
	N (ungewichtet)	5'194	2'552	661	8'407
2002	3 mal oder mehr pro Tag	0.6	1.4	(1.4)	0.8
	2 mal pro Tag	3.1	8.9	20.5	5.2
	1 mal pro Tag	15.5	18.8	15.9	16.2
	mehrmals pro Woche	15.6	10.0	5.7	13.9
	1-2 mal wöchentlich	35.2	27.6	18.9	32.8
	seltener	17.4	15.7	15.8	16.9
	nie, abstinenter	12.7	17.4	21.8	14.2
	N (gewichtet)	6'979	2'114	423	9'516
	N (ungewichtet)	6'098	2'118	679	8'895
1997	3 mal oder mehr pro Tag	0.6	2.0	(3.1)	1.1
	2 mal pro Tag	2.3	10.5	19.6	5.0
	1 mal pro Tag	17.6	21.4	20.3	18.6
	mehrmals pro Woche	16.0	11.7	7.4	14.6
	1-2 mal wöchentlich	32.4	28.3	18.1	30.8
	seltener	20.1	14.9	14.7	18.7
	nie, abstinenter	10.8	11.3	16.7	11.2
	N (gewichtet)	4'529	1'441	276	6'247
	N (ungewichtet)	3'738	1'549	468	5'755
1992	3 mal oder mehr pro Tag	1.5	3.2	(8.6)	2.2
	2 mal pro Tag	6.0	17.2	22.1	9.3
	1 mal pro Tag	18.8	18.2	16.7	18.6
	mehrmals pro Woche	17.0	8.7	(8.1)	14.6
	1-2 mal wöchentlich	30.4	26.9	12.6	28.8
	seltener	17.5	16.3	15.2	17.1
	nie, abstinenter	8.9	9.5	16.6	9.4
	N (gewichtet)	5'306	1'709	338	7'353
	N (ungewichtet)	4'663	1'853	334	6'850

Frage: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebranntes Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Für 2007 stellt die Kategorie "seltener" eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich".
Spaltenprozentage
Prozentage werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.


Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	-
	2 mal pro Tag	0.5	2.4	4.2	1.1
	1 mal pro Tag	6.8	9.4	14.7	7.8
	mehrmals pro Woche	6.4	6.2	3.1	6.2
	1-2 mal wöchentlich	31.0	27.2	15.4	29.4
	seltener	35.0	29.0	17.1	32.8
	nie, abstinenter	20.1	25.7	45.4	22.6
	<i>N (gewichtet)</i>	6'886	2'249	451	9'586
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'281	3'165	878	10'324
2002	3 mal oder mehr pro Tag	(0.2)	-	-	0.3
	2 mal pro Tag	0.5	2.3	5.4	1.1
	1 mal pro Tag	7.3	11.8	12.0	8.6
	mehrmals pro Woche	6.7	4.7	4.1	6.1
	1-2 mal wöchentlich	28.8	23.0	10.1	26.5
	seltener	29.3	22.1	18.1	27.0
	nie, abstinenter	27.2	35.9	49.8	30.4
	<i>N (gewichtet)</i>	7'222	2'451	484	10'157
	<i>N (ungewichtet)</i>	7'101	2'811	871	10'783
1997	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	(0.2)
	2 mal pro Tag	(0.7)	3.1	5.1	1.5
	1 mal pro Tag	6.8	12.3	11.9	8.4
	mehrmals pro Woche	6.7	5.9	5.0	6.4
	1-2 mal wöchentlich	25.9	22.4	12.2	24.3
	seltener	35.4	29.9	23.6	33.5
	nie, abstinenter	24.3	26.1	42.2	25.7
	<i>N (gewichtet)</i>	4'760	1'644	345	6'749
	<i>N (ungewichtet)</i>	4'519	2'061	662	7'242
1992	3 mal oder mehr pro Tag	(0.3)	(0.7)	-	0.4
	2 mal pro Tag	1.1	6.2	7.8	2.6
	1 mal pro Tag	6.6	12.7	13.7	8.4
	mehrmals pro Woche	7.4	4.7	(3.7)	6.6
	1-2 mal wöchentlich	28.0	21.8	9.1	25.6
	seltener	35.1	32.8	24.6	34.0
	nie, abstinenter	21.4	21.2	40.7	22.3
	<i>N (gewichtet)</i>	5'664	1'886	379	7'929
	<i>N (ungewichtet)</i>	5'672	2'263	497	8'432

Frage: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Für 2007 stellt die Kategorie "seltener" eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich".
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Abstinenz, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007



Fragen: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'
Falls kein Konsum: 'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Prozente werden gewichtet berechnet.

Alkohol-Abstinenz, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	Lebenszeit-Abstinenz	14.9	12.1	10.4	9.0	9.0	10.1	16.6	11.4
	ehemaliger Konsum	6.1	5.0	4.8	5.6	5.7	6.1	7.8	5.7
	aktueller Konsum	79.1	82.9	84.8	85.4	85.3	83.8	75.6	83.0
	N (gewichtet)	2'865	2'877	3'690	3'228	2'714	1'852	1'533	18'759
	N (ungewichtet)	1'813	2'509	3'808	3'006	3'118	2'496	2'008	18'758
2002	Lebenszeit-Abstinenz	23.5	18.3	16.5	14.8	13.7	19.7	26.3	18.2
	ehemaliger Konsum	3.1	4.5	3.3	3.8	5.1	6.2	5.5	4.3
	aktueller Konsum	73.4	77.2	80.2	81.3	81.2	74.1	68.2	77.4
	N (gewichtet)	2'759	3'361	3'930	3'240	2'731	2'104	1'553	19'678
	N (ungewichtet)	1'695	3'020	4'199	3'168	3'240	2'536	1'822	19'680
1997	Lebenszeit-Abstinenz	22.7	12.2	10.4	9.0	11.8	18.1	22.7	14.2
	ehemaliger Konsum	3.1	3.7	4.2	4.7	5.0	6.2	6.5	4.5
	aktueller Konsum	74.2	84.0	85.4	86.4	83.2	75.7	70.8	81.3
	N (gewichtet)	1'786	2'502	2'466	2'196	1'637	1'389	1'018	12'994
	N (ungewichtet)	1'412	2'866	2'509	1'957	1'681	1'508	1'059	12'992

Fragen: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebranntes Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'
Falls kein Konsum: 'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Alkohol-Abstinenz, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	Lebenszeit-Abstinenz	12.7	7.1	5.2	3.9	3.8	4.2	4.3	6.1
	ehemals Konsumierende	5.3	3.6	3.5	6.3	6.5	4.8	6.2	5.1
	aktuell Konsumierende	82.0	89.2	91.3	89.8	89.6	91.0	89.5	88.8
	N (gewichtet)	1'476	1'419	1'842	1'619	1'344	860	601	9'162
	N (ungewichtet)	923	1'130	1'775	1'421	1'401	1'010	762	8'422
2002	Lebenszeit-Abstinenz	19.3	8.9	8.6	9.2	6.2	8.8	8.4	10.0
	ehemaliger Konsum	(3.1)	3.5	3.2	4.3	5.9	5.4	5.8	4.2
	aktueller Konsum	77.7	87.5	88.2	86.5	87.9	85.8	85.8	85.8
	N (gewichtet)	1'405	1'661	1'983	1'632	1'351	898	587	9'517
	N (ungewichtet)	854	1'361	2'057	1'447	1'407	1'063	709	8'898
1997	Lebenszeit-Abstinenz	19.0	6.8	4.6	3.0	5.4	6.9	(7.1)	7.3
	ehemaliger Konsum	(3.1)	2.2	4.7	4.4	(3.6)	5.1	(6.6)	3.9
	aktueller Konsum	78.0	91.0	90.7	92.6	91.0	88.0	86.3	88.8
	N (gewichtet)	900	1'241	1'245	1'090	810	593	368	6'248
	N (ungewichtet)	685	1'348	1'155	895	730	585	356	5'754

Fragen: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebranntes Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'
Falls kein Konsum: 'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.


Alkohol-Abstinenz, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	Lebenszeit-Abstinenz	17.2	16.9	15.7	14.2	14.0	15.3	24.6	16.4
	ehemaliger Konsum	6.9	6.3	6.0	4.8	5.0	7.3	8.7	6.2
	aktueller Konsum	75.9	76.8	78.4	81.0	81.0	77.5	66.7	77.4
	N (gewichtet)	1'390	1'458	1'848	1'608	1'370	991	931	9'597
	N (ungewichtet)	890	1'379	2'033	1'585	1'717	1'486	1'246	10'336
2002	Lebenszeit-Abstinenz	27.9	27.5	24.6	20.6	21.1	27.8	37.2	26.0
	ehemaliger Konsum	(3.2)	5.5	3.4	3.4	4.4	6.9	5.3	4.4
	aktueller Konsum	68.9	67.0	72.0	76.1	74.5	65.4	57.5	69.6
	N (gewichtet)	1'353	1'700	1'947	1'608	1'380	1'206	966	10'161
	N (ungewichtet)	841	1'659	2'142	1'721	1'833	1'473	1'113	10'782
1997	Lebenszeit-Abstinenz	26.6	17.6	16.4	14.8	18.1	26.5	31.6	20.6
	ehemaliger Konsum	(3.1)	5.3	3.6	4.9	6.4	7.0	6.4	5.1
	aktueller Konsum	70.3	77.1	80.0	80.3	75.5	66.5	62.0	74.4
	N (gewichtet)	887	1'261	1'221	1'106	826	795	650	6'746
	N (ungewichtet)	727	1'518	1'354	1'062	951	923	703	7'238

Fragen: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebranntes Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'
Falls kein Konsum: 'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007



Fragen: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebranntes Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'
Falls kein Konsum: 'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Prozente werden gewichtet berechnet.

Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	Lebenszeit-Abstinenz	9.6	13.9	26.2	11.4
	ehemaliger Konsum	5.6	5.4	8.1	5.7
	aktueller Konsum	84.8	80.6	65.7	83.0
	<i>N (gewichtet)</i>	13'494	4'409	856	18'759
	N (ungewichtet)	11'489	5'725	1'544	18'758
2002	Lebenszeit-Abstinenz	15.8	23.2	31.5	18.2
	ehemaliger Konsum	4.3	4.1	5.2	4.3
	aktueller Konsum	79.9	72.7	63.3	77.4
	<i>N (gewichtet)</i>	14'209	4'562	907	19'678
	N (ungewichtet)	13'200	4'930	1'550	19'680
1997	Lebenszeit-Abstinenz	13.4	14.6	24.2	14.2
	ehemaliger Konsum	4.4	4.5	6.6	4.5
	aktueller Konsum	82.2	80.9	69.2	81.3
	<i>N (gewichtet)</i>	9'291	3'082	620	12'994
	N (ungewichtet)	8'258	3'607	1'127	12'992

Fragen: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Falls kein Konsum: 'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	Lebenszeit-Abstinenz	5.1	7.7	13.7	6.1
	ehemaliger Konsum	4.9	5.0	8.0	5.1
	aktueller Konsum	90.0	87.3	78.2	88.8
	<i>N (gewichtet)</i>	6'601	2'157	403	9'162
	N (ungewichtet)	5'202	2'556	664	8'422
2002	Lebenszeit-Abstinenz	8.5	13.6	16.8	10.0
	ehemaliger Konsum	4.3	3.7	4.9	4.2
	aktueller Konsum	87.2	82.7	78.2	85.8
	<i>N (gewichtet)</i>	6'983	2'111	423	9'517
	N (ungewichtet)	6'101	2'118	679	8'898
1997	Lebenszeit-Abstinenz	7.0	7.4	11.0	7.3
	ehemaliger Konsum	3.9	3.7	(5.6)	3.9
	aktueller Konsum	89.1	88.8	83.4	88.8
	<i>N (gewichtet)</i>	4'532	1'440	276	6'248
	N (ungewichtet)	3'740	1'548	466	5'754

Fragen: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebranntes Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'
Falls kein Konsum: 'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	Lebenszeit-Abstinenz	13.9	19.9	37.4	16.4
	ehemaliger Konsum	6.2	5.9	8.1	6.2
	aktueller Konsum	79.9	74.2	54.5	77.4
	<i>N (gewichtet)</i>	6'892	2'252	452	9'597
	N (ungewichtet)	6'287	3'169	880	10'336
2002	Lebenszeit-Abstinenz	22.9	31.6	44.3	26.0
	ehemaliger Konsum	4.4	4.4	5.5	4.4
	aktueller Konsum	72.7	64.1	50.2	69.6
	<i>N (gewichtet)</i>	7'226	2'452	484	10'161
	N (ungewichtet)	7'099	2'812	871	10'782
1997	Lebenszeit-Abstinenz	19.4	20.9	34.7	20.6
	ehemaliger Konsum	4.9	5.2	7.4	5.1
	aktueller Konsum	75.7	73.9	57.9	74.4
	<i>N (gewichtet)</i>	4'759	1'642	344	6'746
	N (ungewichtet)	4'518	2'059	661	7'238

Fragen: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'
Falls kein Konsum: 'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Häufigkeit des Bierkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Bier		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	1.6	3.3	3.6	4.7	5.4	5.3	2.3	3.8
	fast täglich	(1.4)	(1.0)	1.2	1.2	1.6	(1.2)	(0.5)	1.2
	3 oder 4mal diese Woche	6.7	6.7	5.9	5.0	4.6	2.9	2.0	5.2
	1 oder 2mal diese Woche	28.3	27.1	23.8	20.5	17.9	15.4	11.9	21.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	62.0	62.0	65.5	68.5	70.5	75.2	83.4	68.0
	N (gewichtet)	2'669	2'697	3'473	3'015	2'577	1'757	1'361	17'550
	N (ungewichtet)	1'713	2'391	3'654	2'876	3'011	2'416	1'825	17'886
2002	täglich	2.0	2.5	4.7	5.2	6.2	4.7	2.4	4.1
	fast täglich	(1.0)	1.4	1.5	2.0	1.3	(0.9)	(1.0)	1.4
	3 oder 4mal diese Woche	5.2	5.9	5.5	5.0	3.3	3.3	(1.8)	4.6
	1 oder 2mal diese Woche	25.7	22.3	20.7	19.9	18.4	15.4	9.9	19.9
	keinmal (letzte 7 Tage)	66.1	67.8	67.5	67.8	70.8	75.8	85.0	70.1
	N (gewichtet)	2'600	3'154	3'720	3'071	2'588	2'001	1'386	18'521
	N (ungewichtet)	1'600	2'892	4'035	3'039	3'109	2'431	1'678	18'784
1997	täglich	1.5	4.3	5.5	6.5	5.7	4.3	(2.5)	4.5
	fast täglich	(1.9)	1.7	2.4	2.6	2.3	(0.7)	-	1.9
	3 oder 4mal diese Woche	4.3	6.7	6.0	5.7	5.2	3.0	(1.3)	5.1
	1 oder 2mal diese Woche	28.2	24.5	23.7	20.2	16.8	13.6	10.7	21.0
	keinmal (letzte 7 Tage)	64.2	62.8	62.5	65.0	69.9	78.4	84.4	67.5
	N (gewichtet)	1'765	2'446	2'413	2'163	1'593	1'336	937	12'654
	N (ungewichtet)	1'394	2'828	2'474	1'937	1'652	1'461	997	12'743

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Bier getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Bierkonsums, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Bier		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	(2.2)	4.9	6.3	8.8	10.1	10.3	5.6	6.8
	fast täglich	(2.1)	(1.7)	2.1	2.4	2.9	(2.4)	-	2.2
	3 oder 4mal diese Woche	10.7	11.4	10.6	8.0	9.0	5.5	4.6	9.2
	1 oder 2mal diese Woche	37.5	38.9	35.8	32.4	27.6	25.2	23.6	33.0
	keinmal (letzte 7 Tage)	47.5	43.1	45.2	48.4	50.4	56.7	65.6	48.9
	N (gewichtet)	1'369	1'326	1'738	1'500	1'241	818	520	8'511
	N (ungewichtet)	864	1'073	1'695	1'342	1'318	967	659	7'918
2002	täglich	(3.3)	4.5	8.9	10.0	11.3	10.3	5.8	7.8
	fast täglich	(1.7)	2.6	2.8	3.8	2.3	(1.6)	(1.4)	2.5
	3 oder 4mal diese Woche	8.9	10.9	9.6	8.9	6.2	7.5	(4.4)	8.6
	1 oder 2mal diese Woche	35.5	35.8	31.5	29.9	26.2	24.8	19.0	30.5
	keinmal (letzte 7 Tage)	50.6	46.1	47.2	47.3	54.0	55.8	69.3	50.5
	N (gewichtet)	1'316	1'538	1'860	1'527	1'228	821	493	8'783
	N (ungewichtet)	801	1'286	1'952	1'367	1'301	984	620	8'311
1997	täglich	(2.2)	8.1	9.5	12.4	10.7	9.1	(5.7)	8.6
	fast täglich	(3.6)	3.2	4.4	4.9	4.5	-	-	3.7
	3 oder 4mal diese Woche	7.0	12.0	10.3	10.8	9.8	6.8	(3.3)	9.5
	1 oder 2mal diese Woche	39.1	34.3	32.9	28.7	26.2	22.3	20.5	30.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	48.1	42.4	43.0	43.2	48.8	60.5	68.1	47.4
	N (gewichtet)	888	1'212	1'218	1'074	781	561	329	6'062
	N (ungewichtet)	675	1'330	1'138	884	709	558	324	5'618

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Bier getrunken?'**
Falls ja: **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Bierkonsums, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Bier		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	(1.0)	(1.7)	(1.0)	(0.7)	(1.0)	(1.0)	-	1.0
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.3)
	3 oder 4mal diese Woche	(2.4)	(2.1)	(1.2)	2.1	(0.6)	-	-	1.5
	1 oder 2mal diese Woche	18.7	15.8	11.8	8.8	8.9	6.8	4.6	11.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	77.1	80.2	85.8	88.3	89.2	91.3	94.4	86.0
	N (gewichtet)	1'300	1'372	1'735	1'516	1'336	939	841	9'039
	N (ungewichtet)	849	1'318	1'959	1'534	1'693	1'449	1'166	9'968
2002	täglich	-	(0.6)	(0.5)	(0.5)	(1.6)	-	-	0.7
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.3)
	3 oder 4mal diese Woche	(1.4)	(1.1)	1.4	(1.2)	(0.7)	-	-	1.0
	1 oder 2mal diese Woche	15.6	9.5	9.9	10.0	11.4	8.9	4.8	10.2
	keinmal (letzte 7 Tage)	82.0	88.5	87.9	88.1	86.0	89.7	93.6	87.7
	N (gewichtet)	1'284	1'616	1'860	1'544	1'360	1'180	893	9'737
	N (ungewichtet)	799	1'606	2'083	1'672	1'808	1'447	1'058	10'473
1997	täglich	-	-	(1.3)	-	-	-	-	0.8
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.3)
	3 oder 4mal diese Woche	(1.6)	(1.5)	(1.6)	-	-	-	-	1.0
	1 oder 2mal diese Woche	17.1	15.0	14.3	11.8	7.9	7.3	5.4	11.9
	keinmal (letzte 7 Tage)	80.4	82.8	82.4	86.6	90.3	91.5	93.2	85.9
	N (gewichtet)	877	1'235	1'195	1'089	813	775	609	6'592
	N (ungewichtet)	719	1'498	1'336	1'053	943	903	673	7'125

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Bier getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Bierkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Bier		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	3.3	5.2	4.0	3.8
	fast täglich	1.2	1.1	-	1.2
	3 oder 4mal diese Woche	5.2	5.5	4.0	5.2
	1 oder 2mal diese Woche	22.7	19.9	17.2	21.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	67.6	68.2	74.1	68.0
	N (gewichtet)	12'673	4'081	795	17'550
	N (ungewichtet)	11'017	5'412	1'457	17'886
2002	täglich	3.9	4.6	5.4	4.1
	fast täglich	1.3	1.5	(1.7)	1.4
	3 oder 4mal diese Woche	4.6	4.8	3.4	4.6
	1 oder 2mal diese Woche	20.8	17.6	16.0	19.9
	keinmal (letzte 7 Tage)	69.4	71.6	73.6	70.1
	N (gewichtet)	13'351	4'335	835	18'521
	N (ungewichtet)	12'612	4'724	1'448	18'784
1997	täglich	4.2	5.3	5.6	4.5
	fast täglich	1.9	2.1	(1.8)	1.9
	3 oder 4mal diese Woche	5.3	4.6	4.3	5.1
	1 oder 2mal diese Woche	21.8	19.3	17.5	21.0
	keinmal (letzte 7 Tage)	66.8	68.7	70.8	67.5
	N (gewichtet)	9'007	3'035	612	12'654
	N (ungewichtet)	8'064	3'563	1'116	12'743

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Bier getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Bierkonsums, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Bier		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	5.9	9.3	7.4	6.8
	fast täglich	2.3	2.0	-	2.2
	3 oder 4mal diese Woche	9.1	9.7	7.0	9.2
	1 oder 2mal diese Woche	34.7	29.3	23.7	33.0
	keinmal (letzte 7 Tage)	48.0	49.7	60.4	48.9
	N (gewichtet)	6'175	1'969	367	8'511
	N (ungewichtet)	4'937	2'371	610	7'918
2002	täglich	7.2	9.2	10.1	7.8
	fast täglich	2.4	2.7	(3.3)	2.5
	3 oder 4mal diese Woche	8.5	9.4	7.5	8.6
	1 oder 2mal diese Woche	32.1	26.5	23.7	30.5
	keinmal (letzte 7 Tage)	49.7	52.2	55.4	50.5
	N (gewichtet)	6'439	1'971	373	8'783
	N (ungewichtet)	5'713	1'988	610	8'311
1997	täglich	7.9	10.4	11.1	8.6
	fast täglich	3.7	4.0	(3.1)	3.7
	3 oder 4mal diese Woche	9.7	9.0	9.0	9.5
	1 oder 2mal diese Woche	31.6	29.0	27.6	30.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	47.2	47.6	49.2	47.4
	N (gewichtet)	4'379	1'411	272	6'062
	N (ungewichtet)	3'637	1'520	461	5'618

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Bier getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Bierkonsums, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Bier		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	0.8	1.4	-	1.0
	fast täglich	(0.3)	-	-	(0.3)
	3 oder 4mal diese Woche	1.4	1.6	(1.5)	1.5
	1 oder 2mal diese Woche	11.3	11.1	11.7	11.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	86.2	85.5	85.8	86.0
	N (gewichtet)	6'498	2'112	428	9'039
	N (ungewichtet)	6'080	3'041	847	9'968
2002	täglich	0.7	(0.7)	(1.5)	0.7
	fast täglich	(0.3)	(0.4)	-	(0.3)
	3 oder 4mal diese Woche	1.1	0.9	-	1.0
	1 oder 2mal diese Woche	10.3	10.1	9.7	10.2
	keinmal (letzte 7 Tage)	87.7	87.8	88.3	87.7
	N (gewichtet)	6'913	2'363	461	9'737
	N (ungewichtet)	6'899	2'736	838	10'473
1997	täglich	0.8	(0.9)	-	0.8
	fast täglich	(0.2)	-	-	(0.3)
	3 oder 4mal diese Woche	1.1	(0.8)	-	1.0
	1 oder 2mal diese Woche	12.5	10.8	9.4	11.9
	keinmal (letzte 7 Tage)	85.4	87.1	88.1	85.9
	N (gewichtet)	4'628	1'624	340	6'592
	N (ungewichtet)	4'427	2'043	655	7'125

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Bier getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Weinkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Wein		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	(1.1)	2.5	5.9	11.8	17.2	25.4	25.3	10.8
	fast täglich	-	(1.1)	1.7	3.1	4.4	4.5	3.7	2.4
	3 oder 4mal diese Woche	1.2	5.0	8.5	8.7	10.4	9.4	5.0	7.0
	1 oder 2mal diese Woche	19.1	37.3	39.3	38.6	33.4	26.6	20.1	32.2
	keinmal (letzte 7 Tage)	78.4	54.1	44.7	37.9	34.7	34.2	45.9	47.7
	N (gewichtet)	2'666	2'697	3'469	3'019	2'580	1'759	1'361	17'551
	N (ungewichtet)	1'710	2'391	3'651	2'880	3'015	2'419	1'823	17'889
2002	täglich	(1.2)	4.2	9.1	13.4	21.1	23.6	26.0	12.4
	fast täglich	-	1.5	3.0	4.9	4.4	4.7	4.1	3.1
	3 oder 4mal diese Woche	(1.4)	6.3	8.6	10.8	8.6	6.8	4.7	7.1
	1 oder 2mal diese Woche	18.6	38.2	37.6	35.7	32.9	25.6	19.8	31.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	78.5	49.8	41.8	35.2	33.1	39.4	45.5	46.0
	N (gewichtet)	2'599	3'148	3'709	3'058	2'578	1'998	1'370	18'458
	N (ungewichtet)	1'598	2'884	4'029	3'028	3'102	2'428	1'663	18'732
1997	täglich	(1.2)	5.3	10.7	16.1	20.6	23.1	23.3	12.7
	fast täglich	-	1.5	3.4	4.4	5.8	4.9	5.4	3.4
	3 oder 4mal diese Woche	2.9	7.7	8.8	9.3	8.0	5.4	4.5	7.1
	1 oder 2mal diese Woche	22.1	40.3	40.7	37.2	33.2	25.2	20.5	33.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	73.2	45.2	36.5	33.0	32.4	41.3	46.4	43.4
	N (gewichtet)	1'761	2'448	2'412	2'160	1'595	1'338	935	12'649
	N (ungewichtet)	1'392	2'830	2'472	1'935	1'653	1'461	993	12'736

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Wein getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Weinkonsums, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Wein		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	(1.4)	2.7	7.2	14.2	19.9	32.3	38.7	13.0
	fast täglich	-	(1.3)	2.1	3.8	6.0	6.1	5.5	3.1
	3 oder 4mal diese Woche	(1.0)	6.2	9.6	9.4	12.3	12.8	7.8	8.3
	1 oder 2mal diese Woche	17.5	37.8	40.2	38.2	33.8	24.8	22.2	32.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	80.1	52.0	40.8	34.4	27.9	24.0	25.8	43.3
	N (gewichtet)	1'368	1'325	1'734	1'503	1'243	820	520	8'513
	N (ungewichtet)	863	1'072	1'692	1'346	1'322	969	659	7'923
2002	täglich	(1.4)	5.5	11.2	15.5	25.6	35.3	39.9	15.3
	fast täglich	-	(1.4)	4.1	7.4	4.9	5.2	6.4	4.0
	3 oder 4mal diese Woche	(0.9)	7.5	9.9	12.9	9.1	8.4	6.6	8.2
	1 oder 2mal diese Woche	18.7	42.9	36.5	31.0	32.8	23.6	21.2	31.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	78.5	42.7	38.2	33.1	27.5	27.5	25.9	41.0
	N (gewichtet)	1'319	1'535	1'851	1'517	1'217	820	484	8'744
	N (ungewichtet)	802	1'283	1'948	1'359	1'294	985	610	8'281
1997	täglich	(1.4)	6.8	13.0	21.1	26.3	34.5	35.0	16.4
	fast täglich	-	(1.7)	4.3	5.1	7.9	6.9	(9.5)	4.4
	3 oder 4mal diese Woche	(2.9)	8.3	10.9	10.6	9.7	7.0	(7.8)	8.5
	1 oder 2mal diese Woche	22.4	43.0	38.6	33.5	33.4	23.1	20.9	33.1
	keinmal (letzte 7 Tage)	72.8	40.2	33.1	29.7	22.7	28.5	26.9	37.6
	N (gewichtet)	886	1'213	1'219	1'070	783	564	331	6'066
	N (ungewichtet)	674	1'332	1'138	882	710	559	326	5'621

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Wein getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Weinkonsums, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Wein		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	-	2.4	4.5	9.4	14.6	19.4	17.0	8.7
	fast täglich	-	(0.8)	(1.3)	2.4	2.9	3.0	(2.5)	1.8
	3 oder 4mal diese Woche	(1.3)	3.8	7.4	7.9	8.6	6.4	3.3	5.8
	1 oder 2mal diese Woche	20.8	36.8	38.3	38.9	33.0	28.1	18.8	32.0
	keinmal (letzte 7 Tage)	76.7	56.2	48.5	41.4	40.9	43.0	58.3	51.8
	N (gewichtet)	1'298	1'372	1'736	1'515	1'336	939	841	9'038
	N (ungewichtet)	847	1'319	1'959	1'534	1'693	1'450	1'164	9'966
2002	täglich	-	2.9	7.0	11.3	17.0	15.5	18.4	9.7
	fast täglich	-	(1.6)	1.8	2.4	3.9	4.3	(2.8)	2.3
	3 oder 4mal diese Woche	(1.9)	5.3	7.3	8.7	8.1	5.7	3.6	6.0
	1 oder 2mal diese Woche	18.5	33.7	38.6	40.4	33.0	26.9	19.0	31.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	78.5	56.5	45.3	37.2	38.0	47.7	56.2	50.5
	N (gewichtet)	1'280	1'613	1'858	1'540	1'361	1'177	886	9'715
	N (ungewichtet)	796	1'601	2'081	1'669	1'808	1'443	1'053	10'451
1997	täglich	-	3.9	8.2	11.2	15.0	14.8	16.8	9.3
	fast täglich	-	(1.2)	2.4	3.7	3.9	3.5	(3.2)	2.6
	3 oder 4mal diese Woche	(2.9)	7.2	6.6	8.0	6.3	4.3	(2.6)	5.8
	1 oder 2mal diese Woche	21.8	37.6	42.8	40.7	33.1	26.8	20.3	33.6
	keinmal (letzte 7 Tage)	73.6	50.1	39.9	36.3	41.7	50.6	57.1	48.7
	N (gewichtet)	875	1'235	1'193	1'089	812	774	604	6'583
	N (ungewichtet)	718	1'498	1'334	1'053	943	902	667	7'115

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Wein getrunken?'**
Falls ja: **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Weinkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Wein		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	8.6	15.2	22.2	10.8
	fast täglich	2.3	3.1	(1.7)	2.4
	3 oder 4mal diese Woche	6.6	8.6	4.8	7.0
	1 oder 2mal diese Woche	33.5	30.7	18.3	32.2
	keinmal (letzte 7 Tage)	49.1	42.3	52.9	47.7
	<i>N (gewichtet)</i>	12'675	4'081	795	17'551
	N (ungewichtet)	11'021	5'412	1'456	17'889
2002	täglich	9.6	18.4	25.8	12.4
	fast täglich	3.1	3.3	1.9	3.1
	3 oder 4mal diese Woche	7.2	7.5	3.4	7.1
	1 oder 2mal diese Woche	33.6	27.7	16.0	31.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	46.6	43.0	52.9	46.0
	<i>N (gewichtet)</i>	13'304	4'321	833	18'458
	N (ungewichtet)	12'570	4'717	1'445	18'732
1997	täglich	9.1	21.3	24.1	12.7
	fast täglich	3.4	3.7	3.1	3.4
	3 oder 4mal diese Woche	7.0	7.6	4.9	7.1
	1 oder 2mal diese Woche	35.8	29.2	18.3	33.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	44.7	38.2	49.6	43.4
	<i>N (gewichtet)</i>	9'007	3'033	609	12'649
	N (ungewichtet)	8'064	3'560	1'112	12'736

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Wein getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen. Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Häufigkeit des Weinkonsums, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Wein		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	10.0	19.4	29.2	13.0
	fast täglich	2.9	4.1	-	3.1
	3 oder 4mal diese Woche	7.5	11.1	5.9	8.3
	1 oder 2mal diese Woche	33.5	30.9	19.3	32.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	46.1	34.4	44.0	43.3
	N (gewichtet)	6'178	1'969	367	8'513
	N (ungewichtet)	4'941	2'372	610	7'923
2002	täglich	11.8	23.3	34.6	15.3
	fast täglich	4.0	4.4	(2.7)	4.0
	3 oder 4mal diese Woche	7.8	10.1	5.0	8.2
	1 oder 2mal diese Woche	32.9	29.2	17.2	31.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	43.5	32.9	40.4	41.0
	N (gewichtet)	6'412	1'960	372	8'744
	N (ungewichtet)	5'691	1'982	608	8'281
1997	täglich	11.7	27.3	35.3	16.4
	fast täglich	4.2	4.9	(3.7)	4.4
	3 oder 4mal diese Woche	8.3	9.5	(6.6)	8.5
	1 oder 2mal diese Woche	35.8	27.7	19.2	33.1
	keinmal (letzte 7 Tage)	40.0	30.7	35.3	37.6
	N (gewichtet)	4'381	1'414	271	6'066
	N (ungewichtet)	3'640	1'521	460	5'621

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Wein getrunken?'**
Falls ja: **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Weinkonsums, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Wein		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	7.3	11.4	16.2	8.7
	fast täglich	1.7	2.2	(1.9)	1.8
	3 oder 4mal diese Woche	5.7	6.2	3.9	5.8
	1 oder 2mal diese Woche	33.5	30.4	17.5	32.0
	keinmal (letzte 7 Tage)	51.8	49.8	60.5	51.8
	N (gewichtet)	6'497	2'113	428	9'038
	N (ungewichtet)	6'080	3'040	846	9'966
2002	täglich	7.5	14.4	18.6	9.7
	fast täglich	2.4	2.3	(1.2)	2.3
	3 oder 4mal diese Woche	6.5	5.4	(2.0)	6.0
	1 oder 2mal diese Woche	34.2	26.5	15.0	31.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	49.4	51.4	63.1	50.5
	N (gewichtet)	6'893	2'362	460	9'715
	N (ungewichtet)	6'879	2'735	837	10'451
1997	täglich	6.6	16.0	15.2	9.3
	fast täglich	2.5	2.7	(2.6)	2.6
	3 oder 4mal diese Woche	5.9	5.9	(3.6)	5.8
	1 oder 2mal diese Woche	35.8	30.6	17.5	33.6
	keinmal (letzte 7 Tage)	49.3	44.7	61.1	48.7
	N (gewichtet)	4'625	1'619	338	6'583
	N (ungewichtet)	4'424	2'039	652	7'115

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Wein getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Häufigkeit des Apfelweinkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Apfelwein		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	-	-	-	-	(0.3)	(0.9)	(1.6)	0.4
	fast täglich	-	-	-	-	(0.4)	-	-	0.2
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	(0.6)	(0.5)	-	0.3
	1 oder 2mal diese Woche	2.2	2.0	2.1	2.6	3.3	2.4	1.9	2.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	97.2	97.4	97.4	96.8	95.3	96.1	95.6	96.7
	N (gewichtet)	2'665	2'698	3'473	3'018	2'577	1'758	1'362	17'552
	N (ungewichtet)	1'711	2'392	3'657	2'881	3'014	2'417	1'826	17'898
2002	täglich	-	-	(0.4)	(0.6)	(0.6)	(1.5)	2.3	0.7
	fast täglich	-	-	-	-	(0.5)	(0.5)	-	0.2
	3 oder 4mal diese Woche	-	(0.3)	-	-	(0.5)	(0.6)	-	0.3
	1 oder 2mal diese Woche	3.7	2.0	2.7	3.3	3.6	2.9	2.4	3.0
	keinmal (letzte 7 Tage)	96.0	97.3	96.6	95.6	94.8	94.5	94.3	95.8
	N (gewichtet)	2'610	3'169	3'732	3'086	2'601	2'008	1'387	18'594
	N (ungewichtet)	1'606	2'900	4'045	3'050	3'122	2'442	1'679	18'844
1997	täglich	-	-	-	(0.8)	(1.5)	(1.7)	(2.5)	0.8
	fast täglich	-	-	-	-	(1.1)	-	-	0.5
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	(0.7)	(1.0)	-	(1.0)	0.6
	1 oder 2mal diese Woche	4.8	3.6	3.1	4.7	3.8	4.5	(2.6)	3.9
	keinmal (letzte 7 Tage)	94.7	95.6	95.8	93.4	92.7	92.3	92.8	94.2
	N (gewichtet)	1'762	2'447	2'414	2'158	1'597	1'339	937	12'654
	N (ungewichtet)	1'392	2'829	2'474	1'933	1'655	1'463	995	12'741

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen saure Most getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen. Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Apfelweinkonsums, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Apfelwein		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	-	-	-	-	(0.7)	(1.3)	(2.7)	0.6
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.3)
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	-	-	-	0.4
	1 oder 2mal diese Woche	(3.1)	2.6	3.3	3.1	4.1	(2.7)	(3.9)	3.2
	keinmal (letzte 7 Tage)	96.1	97.0	96.0	95.8	93.6	95.3	91.4	95.5
	N (gewichtet)	1'366	1'326	1'738	1'500	1'239	819	521	8'509
	N (ungewichtet)	863	1'073	1'697	1'345	1'320	968	660	7'926
2002	täglich	-	-	-	(0.9)	(0.8)	(2.7)	(5.2)	1.0
	fast täglich	-	-	-	-	(1.0)	-	-	0.4
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	(0.8)	(1.2)	-	0.5
	1 oder 2mal diese Woche	4.9	3.0	3.9	4.5	4.8	5.1	(4.2)	4.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	94.7	96.4	95.2	94.0	92.7	90.2	88.6	93.9
	N (gewichtet)	1'321	1'541	1'866	1'535	1'235	828	493	8'819
	N (ungewichtet)	804	1'287	1'956	1'371	1'306	994	621	8'339
1997	täglich	-	-	-	(1.5)	(2.7)	(3.4)	(5.2)	1.4
	fast täglich	-	-	-	-	(2.0)	-	-	0.8
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	(1.3)	-	-	-	0.9
	1 oder 2mal diese Woche	6.3	4.9	3.8	6.5	5.4	6.8	(5.8)	5.5
	keinmal (letzte 7 Tage)	92.9	94.0	94.8	90.0	88.6	87.3	84.7	91.5
	N (gewichtet)	885	1'211	1'219	1'072	783	564	329	6'064
	N (ungewichtet)	673	1'330	1'139	883	711	560	324	5'620

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen saure Most getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Apfelweinkonsums, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Apfelwein		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.3)
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	-	-	-	(0.3)
	1 oder 2mal diese Woche	-	(1.4)	(0.9)	2.1	(2.6)	(2.2)	-	1.6
	keinmal (letzte 7 Tage)	98.3	97.7	98.8	97.7	96.9	96.9	98.1	97.8
	N (gewichtet)	1'299	1'372	1'735	1'518	1'338	939	842	9'043
	N (ungewichtet)	848	1'319	1'960	1'536	1'694	1'449	1'166	9'972
2002	täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.4)
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1 oder 2mal diese Woche	(2.4)	(1.1)	1.5	2.1	2.5	(1.5)	(1.4)	1.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	97.4	98.2	98.1	97.1	96.7	97.5	97.5	97.5
	N (gewichtet)	1'289	1'628	1'867	1'551	1'366	1'180	894	9'776
	N (ungewichtet)	802	1'613	2'089	1'679	1'816	1'448	1'058	10'505
1997	täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.3)
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	-	-	-	(0.3)
	1 oder 2mal diese Woche	(3.3)	2.3	2.4	(2.9)	(2.3)	(2.8)	-	2.5
	keinmal (letzte 7 Tage)	96.5	97.1	96.8	96.8	96.6	95.9	97.3	96.7
	N (gewichtet)	877	1'236	1'194	1'086	814	775	608	6'590
	N (ungewichtet)	719	1'499	1'335	1'050	944	903	671	7'121

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen saure Most getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Apfelweinkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Apfelwein		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	0.6	-	-	0.4
	fast täglich	(0.2)	-	-	0.2
	3 oder 4mal diese Woche	0.4	(0.2)	-	0.3
	1 oder 2mal diese Woche	2.8	1.4	-	2.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	96.0	98.2	99.5	96.7
	N (gewichtet)	12'673	4'084	795	17'552
	N (ungewichtet)	11'023	5'418	1'457	17'898
2002	täglich	0.8	(0.2)	-	0.7
	fast täglich	0.3	-	-	0.2
	3 oder 4mal diese Woche	0.4	-	-	0.3
	1 oder 2mal diese Woche	3.5	1.5	(1.1)	3.0
	keinmal (letzte 7 Tage)	94.9	98.1	98.3	95.8
	N (gewichtet)	13'408	4'351	835	18'594
	N (ungewichtet)	12'657	4'738	1'449	18'844
1997	täglich	1.0	-	-	0.8
	fast täglich	0.6	-	-	0.5
	3 oder 4mal diese Woche	0.7	(0.4)	-	0.6
	1 oder 2mal diese Woche	4.8	1.8	(1.0)	3.9
	keinmal (letzte 7 Tage)	92.8	97.5	98.5	94.2
	N (gewichtet)	9'011	3'033	610	12'654
	N (ungewichtet)	8'067	3'560	1'114	12'741

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen saure Most getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Apfelweinkonsums, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Apfelwein		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	0.8	-	-	0.6
	fast täglich	(0.4)	-	-	(0.3)
	3 oder 4mal diese Woche	(0.5)	-	-	0.4
	1 oder 2mal diese Woche	3.9	1.5	-	3.2
	keinmal (letzte 7 Tage)	94.4	98.0	99.1	95.5
	N (gewichtet)	6'170	1'972	367	8'509
	N (ungewichtet)	4'939	2'377	610	7'926
2002	täglich	1.3	-	-	1.0
	fast täglich	0.5	-	-	0.4
	3 oder 4mal diese Woche	0.6	-	-	0.5
	1 oder 2mal diese Woche	5.1	2.2	-	4.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	92.6	97.5	98.3	93.9
	N (gewichtet)	6'468	1'976	375	8'819
	N (ungewichtet)	5'734	1'993	612	8'339
1997	täglich	1.7	-	-	1.4
	fast täglich	1.1	-	-	0.8
	3 oder 4mal diese Woche	1.1	-	-	0.9
	1 oder 2mal diese Woche	6.6	2.5	-	5.5
	keinmal (letzte 7 Tage)	89.4	96.4	98.1	91.5
	N (gewichtet)	4'381	1'413	271	6'064
	N (ungewichtet)	3'639	1'521	460	5'620

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen saure Most getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Apfelweinkonsums, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Apfelwein		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	(0.4)	-	-	(0.3)
	fast täglich	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	(0.3)	-	-	(0.3)
	1 oder 2mal diese Woche	1.8	1.3	-	1.6
	keinmal (letzte 7 Tage)	97.5	98.4	99.8	97.8
	N (gewichtet)	6'503	2'112	428	9'043
	N (ungewichtet)	6'084	3'041	847	9'972
2002	täglich	0.5	-	-	0.4
	fast täglich	-	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	(0.2)	-	-	(0.2)
	1 oder 2mal diese Woche	2.1	(1.0)	-	1.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	97.1	98.7	98.2	97.5
	N (gewichtet)	6'940	2'374	461	9'776
	N (ungewichtet)	6'923	2'745	837	10'505
1997	täglich	(0.4)	-	-	(0.3)
	fast täglich	-	-	-	(0.2)
	3 oder 4mal diese Woche	(0.4)	-	-	(0.3)
	1 oder 2mal diese Woche	3.1	(1.2)	-	2.5
	keinmal (letzte 7 Tage)	96.0	98.4	98.8	96.7
	N (gewichtet)	4'630	1'620	340	6'590
	N (ungewichtet)	4'428	2'039	654	7'121

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen saure Most getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Spirituosen		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	täglich	-	(0.5)	(0.5)	(0.5)	0.9	1.3	2.4	0.8
	fast täglich	-	-	-	-	(0.5)	(0.7)	(0.8)	0.4
	3 oder 4mal diese Woche	(0.7)	(0.6)	1.0	1.0	1.7	1.4	(1.5)	1.1
	1 oder 2mal diese Woche	25.3	17.6	12.6	13.6	13.3	12.6	9.4	15.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	73.1	81.0	85.8	84.5	83.6	84.0	85.8	82.4
	N (gewichtet)	2'669	2'693	3'472	3'016	2'578	1'758	1'362	17'547
	N (ungewichtet)	1'713	2'387	3'655	2'878	3'012	2'416	1'825	17'886
2002	täglich	(0.7)	(0.6)	0.9	(1.1)	1.1	1.7	2.9	1.1
	fast täglich	-	-	(0.2)	-	(0.7)	(0.3)	-	0.3
	3 oder 4mal diese Woche	2.4	(1.1)	1.0	0.8	1.3	1.8	(1.3)	1.3
	1 oder 2mal diese Woche	22.5	15.5	14.4	14.9	14.8	12.9	9.6	15.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	74.2	82.6	83.5	83.0	82.1	83.2	86.0	81.9
	N (gewichtet)	2'596	3'155	3'722	3'070	2'588	2'002	1'386	18'519
	N (ungewichtet)	1'599	2'884	4'033	3'033	3'109	2'434	1'677	18'769
1997	täglich	-	(0.8)	(0.8)	(1.2)	(1.8)	(1.5)	(2.5)	1.1
	fast täglich	-	-	-	(0.6)	(0.7)	-	(1.1)	0.5
	3 oder 4mal diese Woche	(0.7)	1.5	(1.2)	(1.2)	(1.7)	(0.8)	(1.9)	1.3
	1 oder 2mal diese Woche	15.6	16.6	13.8	15.3	14.0	11.2	8.8	14.2
	keinmal (letzte 7 Tage)	83.2	80.8	83.9	81.7	81.8	85.6	85.6	82.9
	N (gewichtet)	1'763	2'446	2'408	2'161	1'597	1'339	937	12'650
	N (ungewichtet)	1'393	2'826	2'468	1'936	1'655	1'463	994	12'735

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw. getrunken?'

Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen. Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Spirituosen		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	-	-	(0.9)	(1.0)	(1.7)	(2.6)	4.7	1.4
	fast täglich	-	-	-	-	(1.0)	(1.3)	-	0.7
	3 oder 4mal diese Woche	(1.1)	-	(1.6)	(1.5)	2.7	(2.5)	(2.4)	1.7
	1 oder 2mal diese Woche	28.0	23.0	16.6	18.8	18.9	18.5	14.0	20.2
	keinmal (letzte 7 Tage)	69.8	74.9	80.6	78.0	75.7	75.1	77.4	76.1
	N (gewichtet)	1'369	1'323	1'737	1'502	1'242	820	521	8'513
	N (ungewichtet)	864	1'070	1'696	1'344	1'321	969	660	7'924
2002	täglich	-	(0.8)	(1.6)	(1.8)	(1.6)	3.4	5.8	1.8
	fast täglich	-	-	(0.4)	-	(0.9)	-	-	0.5
	3 oder 4mal diese Woche	(3.6)	(1.7)	1.7	(1.1)	(1.6)	4.0	(2.4)	2.1
	1 oder 2mal diese Woche	26.6	20.3	18.7	19.5	19.8	19.5	14.1	20.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	68.6	76.8	77.6	77.2	76.2	72.4	77.1	75.3
	N (gewichtet)	1'317	1'535	1'862	1'527	1'227	823	492	8'782
	N (ungewichtet)	801	1'279	1'953	1'363	1'299	988	618	8'301
1997	täglich	-	(1.3)	(1.4)	(2.2)	(3.2)	(3.0)	(3.6)	1.9
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	0.9
	3 oder 4mal diese Woche	(1.3)	2.7	(2.0)	(1.9)	(2.5)	(1.6)	(3.5)	2.1
	1 oder 2mal diese Woche	20.4	24.0	17.9	21.1	18.4	16.7	13.9	19.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	77.6	71.5	78.2	73.7	74.6	76.8	76.6	75.3
	N (gewichtet)	886	1'212	1'216	1'071	783	564	329	6'062
	N (ungewichtet)	674	1'330	1'136	883	711	560	324	5'618

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw. getrunken?'

Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Spirituosen		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	täglich	-	-	-	-	-	-	(1.1)	0.3
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	(0.7)	-	-	0.5
	1 oder 2mal diese Woche	22.5	12.3	8.5	8.4	8.0	7.4	6.6	10.7
	keinmal (letzte 7 Tage)	76.6	86.9	90.9	91.0	90.9	91.8	91.0	88.4
	N (gewichtet)	1'300	1'370	1'735	1'514	1'335	938	841	9'034
	N (ungewichtet)	849	1'317	1'959	1'534	1'691	1'447	1'165	9'962
2002	täglich	-	-	-	-	(0.6)	(0.5)	(1.3)	0.5
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	(1.3)	-	-	(0.6)	(1.0)	-	-	0.6
	1 oder 2mal diese Woche	18.2	10.9	10.0	10.4	10.3	8.2	7.1	10.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	80.1	88.1	89.4	88.7	87.5	90.8	90.8	87.9
	N (gewichtet)	1'279	1'620	1'860	1'543	1'361	1'179	894	9'737
	N (ungewichtet)	798	1'605	2'080	1'670	1'810	1'446	1'059	10'468
1997	täglich	-	-	-	-	-	-	-	0.4
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	(0.8)	-	-	0.5
	1 oder 2mal diese Woche	10.7	9.4	9.6	9.6	9.7	7.2	6.0	9.1
	keinmal (letzte 7 Tage)	89.0	90.0	89.8	89.5	88.8	92.0	90.5	89.9
	N (gewichtet)	877	1'233	1'192	1'089	814	775	608	6'588
	N (ungewichtet)	719	1'496	1'332	1'053	944	903	670	7'117

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw. getrunken?'

Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen. Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Spirituosen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	0.8	0.7	(1.7)	0.8
	fast täglich	0.4	(0.4)	-	0.4
	3 oder 4mal diese Woche	1.1	1.1	(0.8)	1.1
	1 oder 2mal diese Woche	16.4	13.2	9.5	15.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	81.4	84.6	87.6	82.4
	N (gewichtet)	12'669	4'084	794	17'547
	N (ungewichtet)	11'014	5'418	1'454	17'886
2002	täglich	0.9	1.3	2.6	1.1
	fast täglich	0.3	-	-	0.3
	3 oder 4mal diese Woche	1.4	1.1	(1.4)	1.3
	1 oder 2mal diese Woche	16.1	14.0	9.3	15.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	81.2	83.5	86.2	81.9
	N (gewichtet)	13'349	4'336	834	18'519
	N (ungewichtet)	12'597	4'725	1'447	18'769
1997	täglich	1.0	1.2	(2.3)	1.1
	fast täglich	0.5	(0.5)	-	0.5
	3 oder 4mal diese Woche	1.1	1.5	(2.6)	1.3
	1 oder 2mal diese Woche	14.5	14.2	10.6	14.2
	keinmal (letzte 7 Tage)	82.9	82.6	84.3	82.9
	N (gewichtet)	9'005	3'033	611	12'650
	N (ungewichtet)	8'059	3'561	1'115	12'735

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw. getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Spirituosen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	1.3	1.2	(3.7)	1.4
	fast täglich	0.7	-	-	0.7
	3 oder 4mal diese Woche	1.6	2.0	-	1.7
	1 oder 2mal diese Woche	21.1	18.6	14.1	20.2
	keinmal (letzte 7 Tage)	75.4	77.6	80.0	76.1
	N (gewichtet)	6'176	1'971	366	8'513
	N (ungewichtet)	4'940	2'376	608	7'924
2002	täglich	1.5	2.3	(4.4)	1.8
	fast täglich	0.6	-	-	0.5
	3 oder 4mal diese Woche	2.2	1.6	(2.3)	2.1
	1 oder 2mal diese Woche	20.6	20.4	14.3	20.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	75.1	75.5	77.8	75.3
	N (gewichtet)	6'444	1'966	373	8'782
	N (ungewichtet)	5'708	1'984	609	8'301
1997	täglich	1.7	2.2	(4.3)	1.9
	fast täglich	0.9	(1.0)	-	0.9
	3 oder 4mal diese Woche	1.9	2.5	(4.2)	2.1
	1 oder 2mal diese Woche	19.9	19.9	16.8	19.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	75.7	74.3	74.4	75.3
	N (gewichtet)	4'379	1'411	272	6'062
	N (ungewichtet)	3'637	1'520	461	5'618

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw. getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2007

Alkohol: Spirituosen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	(0.4)	(0.2)	-	0.3
	fast täglich	-	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	0.6	(0.2)	-	0.5
	1 oder 2mal diese Woche	11.9	8.1	5.6	10.7
	keinmal (letzte 7 Tage)	87.1	91.2	94.0	88.4
	N (gewichtet)	6'493	2'113	428	9'034
	N (ungewichtet)	6'074	3'042	846	9'962
2002	täglich	0.4	(0.5)	(1.2)	0.5
	fast täglich	(0.1)	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	0.7	(0.6)	-	0.6
	1 oder 2mal diese Woche	12.0	8.7	5.2	10.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	86.8	90.1	92.9	87.9
	N (gewichtet)	6'905	2'370	461	9'737
	N (ungewichtet)	6'889	2'741	838	10'468
1997	täglich	(0.5)	-	-	(0.4)
	fast täglich	-	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	(0.3)	(0.6)	-	0.5
	1 oder 2mal diese Woche	9.3	9.2	5.7	9.1
	keinmal (letzte 7 Tage)	89.7	89.8	92.2	89.9
	N (gewichtet)	4'626	1'622	340	6'588
	N (ungewichtet)	4'422	2'041	654	7'117

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw. getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen. Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, 2007

Alkohol: Alcopops		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1 oder 2mal diese Woche	8.8	(1.1)	(1.0)	(0.4)	-	-	-	1.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	90.4	98.9	98.9	99.6	99.8	99.9	100.0	98.0
	N (gewichtet)	2'663	2'695	3'476	3'020	2'580	1'758	1'363	17'555
	N (ungewichtet)	1'709	2'390	3'659	2'882	3'015	2'417	1'827	17'899

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Alcopops getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt.
Die Alcopops sind in den Befragungen vor 2007 nicht erfasst worden.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, 2007

Alkohol: Alcopops		Altersgruppen						Gesamt	
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74		75+
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	-	-	-	-	-	-	-	
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	-	-	-	
	1 oder 2mal diese Woche	8.1	(1.2)	(1.3)	-	-	-	1.9	
	keinmal (letzte 7 Tage)	90.9	98.7	98.6	99.5	99.8	99.8	100.0	
	N (gewichtet)	1'364	1'324	1'739	1'502	1'242	820	521	8'511
	N (ungewichtet)	862	1'072	1'698	1'346	1'321	969	660	7'928

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Alcopops getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt.
Die Alcopops sind in den Befragungen vor 2007 nicht erfasst worden.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, 2007

Alkohol: Alcopops		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 oder 2mal diese Woche	9.5	(0.9)	(0.8)	-	-	-	-	1.7
	keinmal (letzte 7 Tage)	89.9	99.0	99.2	99.7	99.9	99.9	100.0	98.2
	N (gewichtet)	1'299	1'371	1'737	1'518	1'338	938	842	9'044
	N (ungewichtet)	847	1'318	1'961	1'536	1'694	1'448	1'167	9'971

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Alcopops getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt.
Die Alcopops sind in den Befragungen vor 2007 nicht erfasst worden.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, 2007

Alkohol: Alcopops		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	(0.1)
	1 oder 2mal diese Woche	1.8	2.0	(0.8)	1.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	98.1	97.7	99.2	98.0
	N (gewichtet)	12'674	4'085	795	17'555
	N (ungewichtet)	11'023	5'419	1'457	17'899

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Alcopops getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt.
Die Alcopops sind in den Befragungen vor 2007 nicht erfasst worden.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, 2007

Alkohol: Alcopops		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-
	1 oder 2mal diese Woche	2.0	1.6	-	1.9
	keinmal (letzte 7 Tage)	97.9	97.9	98.4	97.9
	N (gewichtet)	6'172	1'972	367	8'511
	N (ungewichtet)	4'941	2'377	610	7'928

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Alcopops getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt.
Die Alcopops sind in den Befragungen vor 2007 nicht erfasst worden.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, 2007

Alkohol: Alcopops		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-
	1 oder 2mal diese Woche	1.7	2.3	-	1.7
	keinmal (letzte 7 Tage)	98.3	97.5	99.9	98.2
	N (gewichtet)	6'502	2'113	428	9'044
	N (ungewichtet)	6'082	3'042	847	9'971

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Alcopops getrunken?'
Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option "keinmal" ersetzt.
Die Alcopops sind in den Befragungen vor 2007 nicht erfasst worden.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränktyp, 2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.
2007	Bier	2.3	2.0	1.5	1.4	1.6	1.2	0.6	1.6
	Wein	0.5	1.2	1.8	2.3	2.8	3.3	2.6	2.0
	Apfelwein	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
	Spirituosen	1.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	Alcopops	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	Total	4.4	4.0	3.9	4.3	5.0	5.2	3.9	4.3
	N (gewichtet)	2'669	2'692	3'472	3'019	2'581	1'759	1'359	17'551
	N (ungewichtet)	1'712	2'386	3'655	2'881	3'016	2'418	1'822	17'890

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränktypen: 'Bier'; 'Wein'; 'suure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt.
 Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränktypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränktypen.
 Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter
Männer, in Liter reines Alkohols pro Getränkety, 2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.
2007	Bier	3.5	3.3	2.6	2.5	3.0	2.3	1.4	2.8
	Wein	0.6	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	4.1	2.5
	Apfelwein	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2
	Spirituosen	1.3	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8
	Alcopops	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	Total	6.1	5.7	5.5	6.0	7.5	7.8	6.6	6.3
	N (gewichtet)	1'368	1'326	1'739	1'501	1'243	819	519	8'516
	N (ungewichtet)	863	1'073	1'698	1'345	1'322	968	659	7'928

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränketyen: 'Bier'; 'Wein'; 'suure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt.
 Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketyen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyen.
 Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter
Frauen, in Liter reines Alkohols pro Getränkety, 2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.
2007	Bier	1.0	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5
	Wein	0.5	1.0	1.5	1.9	2.1	2.3	1.7	1.5
	Apfelwein	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
	Spirituosen	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
	Alcopops	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	Total	2.6	2.2	2.3	2.6	2.7	2.8	2.2	2.5
	<i>N (gewichtet)</i>	<i>1'300</i>	<i>1'366</i>	<i>1'733</i>	<i>1'518</i>	<i>1'338</i>	<i>939</i>	<i>840</i>	<i>9'034</i>
	<i>N (ungewichtet)</i>	<i>849</i>	<i>1'313</i>	<i>1'957</i>	<i>1'536</i>	<i>1'694</i>	<i>1'450</i>	<i>1'163</i>	<i>9'962</i>

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränketyen: 'Bier'; 'Wein'; 'suure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt.
 Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketyen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyen.
 Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränkety, 2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt Liter Alkohol
		Deutsch Liter Alkohol	Französisch Liter Alkohol	Italienisch Liter Alkohol	
2007	Bier	1.6	1.7	1.3	1.6
	Wein	1.7	2.6	2.9	2.0
	Apfelwein	0.2	0.0	0.0	0.1
	Spirituosen	0.5	0.5	0.4	0.5
	Alcopops	0.1	0.1	0.0	0.1
	Total	4.1	5.0	4.6	4.3
	N (gewichtet)	12'675	4'081	795	17'551
	N (ungewichtet)	11'020	5'414	1'456	17'890

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränkety: 'Bier'; 'Wein'; 'suure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt.
 Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränkety wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränkety.
 Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion
Männer, in Liter reines Alkohols pro Getränkety, 2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch Liter Alkohol	Französisch Liter Alkohol	Italienisch Liter Alkohol	
2007	Bier	2.7	3.0	2.3	2.8
	Wein	2.1	3.4	4.1	2.5
	Apfelwein	0.3	0.1	0.0	0.2
	Spirituosen	0.8	0.8	0.7	0.8
	Alcopops	0.1	0.1	0.0	0.1
	Total	5.9	7.4	7.1	6.3
	N (gewichtet)	6'178	1'972	366	8'516
	N (ungewichtet)	4'942	2'377	609	7'928

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränketyen: 'Bier'; 'Wein'; 'suure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt.
 Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketyen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyen.
 Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion
Frauen, in Liter reines Alkohols pro Getränkety, 2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt Liter Alkohol
		Deutsch Liter Alkohol	Französisch Liter Alkohol	Italienisch Liter Alkohol	
2007	Bier	0.5	0.6	0.4	0.5
	Wein	1.4	1.8	1.8	1.5
	Apfelwein	0.1	0.0	0.0	0.1
	Spirituosen	0.3	0.2	0.2	0.3
	Alcopops	0.1	0.1	0.0	0.1
	Total	2.4	2.7	2.4	2.5
	N (gewichtet)	6'497	2'109	428	9'034
	N (ungewichtet)	6'078	3'037	847	9'962

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränkety: 'Bier'; 'Wein'; 'suure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt.
 Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränkety wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränkety.
 Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränkety, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.
2007	Bier	2.3	2.0	1.5	1.4	1.6	1.2	0.6	1.6
	Wein	0.6	1.2	1.8	2.3	2.8	3.3	2.6	2.0
	Apfelwein	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
	Spirituosen	1.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	Total	4.0	3.9	3.9	4.3	5.0	5.2	3.9	4.3
	N (gewichtet)	2'662	2'690	3'470	3'018	2'581	1'759	1'359	17'539
	N (ungewichtet)	1'708	2'386	3'654	2'880	3'016	2'418	1'822	17'884
2002	Bier	2.0	1.7	1.8	1.8	1.6	1.1	0.8	1.6
	Wein	0.8	1.6	2.3	2.9	3.4	3.2	2.9	2.4
	Apfelwein	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Spirituosen	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
	Total	3.8	3.9	4.7	5.4	5.7	5.1	4.4	4.7
	N (gewichtet)	2'571	3'165	3'736	3'089	2'599	2'000	1'382	18'542
	N (ungewichtet)	1'587	2'892	4'044	3'049	3'118	2'431	1'672	18'793
1997	Bier	1.9	2.1	2.1	2.1	1.6	1.2	0.8	1.8
	Wein	1.0	1.9	2.5	3.0	3.2	3.0	2.6	2.4
	Apfelwein	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
	Spirituosen	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Total	3.6	4.6	5.2	5.8	5.6	4.9	4.3	4.9
	N (gewichtet)	1'751	2'443	2'409	2'150	1'590	1'337	928	12'608
	N (ungewichtet)	1'384	2'824	2'470	1'925	1'647	1'461	984	12'695

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränkety: 'Bier'; 'Wein'; 'saure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt. Alcopops wurden nur in der Befragung 2007 erhoben und werden für den Vergleich ausgeschlossen.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränkety wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränkety.
 Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter
Männer, in Liter reines Alkohols pro Getränkety, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Altersgruppen						Gesamt	
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74		75+
		Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	
2007	Bier	3.5	3.3	2.6	2.5	3.0	2.3	1.4	2.8
	Wein	0.6	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	4.1	2.5
	Apfelwein	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2
	Spirituosen	1.3	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8
	Total	5.6	5.6	5.5	6.0	7.5	7.8	6.6	6.2
	N (gewichtet)	1'368	1'326	1'739	1'501	1'243	819	519	8'516
	N (ungewichtet)	863	1'073	1'698	1'345	1'322	968	659	7'928
2002	Bier	3.1	2.9	3.2	3.2	2.7	2.2	1.8	2.9
	Wein	0.9	2.0	2.9	3.7	4.5	4.8	4.7	3.1
	Apfelwein	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.2
	Spirituosen	1.3	0.8	0.7	0.7	0.6	1.0	0.9	0.8
	Total	5.4	5.9	7.0	7.9	8.1	8.4	7.9	7.1
	N (gewichtet)	1'311	1'544	1'871	1'537	1'233	826	493	8'816
	N (ungewichtet)	799	1'289	1'960	1'372	1'304	994	621	8'339
1997	Bier	3.1	3.7	3.6	3.8	2.9	2.3	1.7	3.3
	Wein	1.2	2.3	3.1	3.8	4.3	4.6	4.2	3.2
	Apfelwein	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	0.7	0.3
	Spirituosen	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8
	Total	5.2	7.0	7.6	8.8	8.5	8.3	7.4	7.5
	N (gewichtet)	883	1'213	1'219	1'071	783	564	329	6'062
	N (ungewichtet)	671	1'332	1'139	880	711	560	322	5'615

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränkety: 'Bier'; 'Wein'; 'saure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt. Alcopops wurden nur in der Befragung 2007 erhoben und werden für den Vergleich ausgeschlossen.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketyen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyen.
 Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter
Frauen, in Liter reines Alkohols pro Getränkety, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.
2007	Bier	1.0	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5
	Wein	0.5	1.0	1.5	1.9	2.1	2.3	1.7	1.5
	Apfelwein	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
	Spirituosen	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
	Total	2.2	2.2	2.2	2.5	2.7	2.8	2.2	2.4
	N (gewichtet)	1'293	1'365	1'730	1'517	1'338	939	840	9'023
	N (ungewichtet)	845	1'313	1'956	1'535	1'694	1'450	1'163	9'956
2002	Bier	0.8	0.5	0.4	0.4	0.7	0.3	0.2	0.5
	Wein	0.6	1.2	1.7	2.1	2.4	2.2	1.9	1.7
	Apfelwein	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	Spirituosen	0.6	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
	Total	2.1	2.0	2.4	2.9	3.6	2.8	2.5	2.6
	N (gewichtet)	1'260	1'621	1'865	1'552	1'365	1'174	889	9'726
	N (ungewichtet)	788	1'603	2'084	1'677	1'814	1'437	1'051	10'454
1997	Bier	0.7	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5
	Wein	0.8	1.4	1.9	2.1	2.2	1.9	1.8	1.7
	Apfelwein	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
	Spirituosen	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3
	Total	1.9	2.3	2.8	2.9	2.8	2.5	2.6	2.5
	N (gewichtet)	868	1'230	1'190	1'079	807	774	599	6'546
	N (ungewichtet)	713	1'492	1'331	1'045	936	901	662	7'080

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränkety: 'Bier'; 'Wein'; 'saure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt. Alcopops wurden nur in der Befragung 2007 erhoben und werden für den Vergleich ausgeschlossen.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränkety wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränkety.
 Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränkety, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt Liter Alk.
		Deutsch Liter Alk.	Französisch Liter Alk.	Italienisch Liter Alk.	
2007	Bier	1.6	1.7	1.3	1.6
	Wein	1.7	2.6	2.9	2.0
	Apfelwein	0.2	0.0	0.0	0.1
	Spirituosen	0.5	0.5	0.4	0.5
	Total	4.0	4.8	4.6	4.3
	N (gewichtet)	12'666	4'078	795	17'539
	N (ungewichtet)	11'016	5'412	1'456	17'884
2002	Bier	1.6	1.7	1.9	1.6
	Wein	2.1	3.1	3.5	2.4
	Apfelwein	0.2	0.1	0.1	0.2
	Spirituosen	0.6	0.5	0.7	0.6
	Total	4.4	5.4	6.2	4.7
	N (gewichtet)	13'364	4'345	833	18'542
	N (ungewichtet)	12'623	4'727	1'443	18'793
1997	Bier	1.8	1.9	1.6	1.8
	Wein	2.0	3.4	3.6	2.4
	Apfelwein	0.3	0.1	0.0	0.2
	Spirituosen	0.5	0.5	0.5	0.5
	Total	4.6	5.8	5.8	4.9
	N (gewichtet)	8'977	3'022	609	12'608
	N (ungewichtet)	8'037	3'547	1'111	12'695

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränkety: 'Bier'; 'Wein'; 'suure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt. Alcopops wurden nur in der Befragung 2007 erhoben und werden für den Vergleich ausgeschlossen.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketyen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyen. Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion
Männer, in Liter reines Alkohols pro Getränkety, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt Liter Alk.
		Deutsch Liter Alk.	Französisch Liter Alk.	Italienisch Liter Alk.	
2007	Bier	2.7	3.0	2.3	2.8
	Wein	2.1	3.4	4.1	2.5
	Apfelwein	0.3	0.1	0.0	0.2
	Spirituosen	0.8	0.8	0.7	0.8
	Total	5.8	7.3	7.1	6.2
	N (gewichtet)	6'178	1'972	366	8'516
	N (ungewichtet)	4'942	2'377	609	7'928
2002	Bier	2.8	3.2	3.3	2.9
	Wein	2.6	4.4	5.1	3.1
	Apfelwein	0.3	0.1	0.1	0.2
	Spirituosen	0.8	0.8	0.9	0.8
	Total	6.5	8.5	9.3	7.1
	N (gewichtet)	6'464	1'979	373	8'816
	N (ungewichtet)	5'735	1'994	610	8'339
1997	Bier	3.2	3.5	3.1	3.3
	Wein	2.5	4.6	5.7	3.2
	Apfelwein	0.4	0.1	0.0	0.3
	Spirituosen	0.8	0.8	1.0	0.8
	Total	6.9	9.0	9.8	7.5
	N (gewichtet)	4'382	1'410	270	6'062
	N (ungewichtet)	3'639	1'517	459	5'615

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränkety: 'Bier'; 'Wein'; 'suure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt. Alcopops wurden nur in der Befragung 2007 erhoben und werden für den Vergleich ausgeschlossen.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketyen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyen. Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion
Frauen, in Liter reines Alkohols pro Getränkety, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt Liter Alk.
		Deutsch Liter Alk.	Französisch Liter Alk.	Italienisch Liter Alk.	
2007	Bier	0.5	0.6	0.4	0.5
	Wein	1.5	1.8	1.8	1.5
	Apfelwein	0.1	0.0	0.0	0.1
	Spirituosen	0.3	0.2	0.2	0.3
	Total	2.4	2.6	2.4	2.4
	N (gewichtet)	6'489	2'106	428	9'023
	N (ungewichtet)	6'074	3'035	847	9'956
2002	Bier	0.5	0.5	0.7	0.5
	Wein	1.6	2.0	2.3	1.7
	Apfelwein	0.1	0.0	0.2	0.1
	Spirituosen	0.4	0.3	0.5	0.3
	Total	2.5	2.8	3.7	2.6
	N (gewichtet)	6'900	2'366	460	9'726
	N (ungewichtet)	6'888	2'733	833	10'454
1997	Bier	0.5	0.5	0.5	0.5
	Wein	1.5	2.2	1.8	1.7
	Apfelwein	0.1	0.0	0.0	0.1
	Spirituosen	0.3	0.3	0.2	0.3
	Total	2.4	3.0	2.5	2.5
	N (gewichtet)	4'595	1'612	339	6'546
	N (ungewichtet)	4'398	2'030	652	7'080

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränkety*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränkety: 'Bier'; 'Wein'; 'suure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "seltener als monatlich" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt. Alcopops wurden nur in der Befragung 2007 erhoben und werden für den Vergleich ausgeschlossen.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketyen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyen. Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Alkohol-Konsumklassen, nach Alter

Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, 2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	hohes Risiko	2.4	1.2	1.4	1.0	1.8	1.6	(0.7)	1.5
	mittleres Risiko	2.7	2.7	2.4	3.5	4.3	5.0	4.2	3.3
	geringes Risiko	74.1	78.9	80.9	80.9	79.3	77.2	70.7	78.1
	abstinent	20.8	17.2	15.3	14.6	14.7	16.2	24.5	17.1
	N (gewichtet)	2'856	2'868	3'687	3'218	2'708	1'850	1'527	18'713
	N (ungewichtet)	1'806	2'500	3'803	3'002	3'110	2'493	1'998	18'712

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränktypen: 'Bier'; 'Wein'; 'suure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'

Anmerkungen: Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränktypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Die Werte der Befragung 2007 enthalten neu die Angaben zum Konsum von Alcopops und sind nicht direkt mit den Werten der vorangegangenen Befragungen vergleichbar.
 Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).
 Spaltenprozent
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Alkohol-Konsumklassen, nach Alter

Männer, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, 2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	hohes Risiko (>60 g/ Tag)	(3.0)	(1.7)	1.9	1.5	2.9	2.7	-	2.1
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	(2.7)	2.4	2.4	3.1	4.5	5.0	(3.3)	3.2
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	76.4	85.1	86.9	85.3	82.2	83.4	85.3	83.5
	abstinent	17.8	10.8	8.8	10.1	10.3	8.9	10.5	11.1
	N (gewichtet)	1'469	1'415	1'840	1'610	1'342	859	598	9'133
	N (ungewichtet)	919	1'126	1'772	1'417	1'397	1'008	758	8'397

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränktypen: 'Bier'; 'Wein'; 'suure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'

Anmerkungen: Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränktypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Die Werte der Befragung 2007 enthalten neu die Angaben zum Konsum von Alcopops und sind nicht direkt mit den Werten der vorangegangenen Befragungen vergleichbar.
 Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).
 Spaltenprozentage
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Alkohol-Konsumklassen, nach Alter

Frauen, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, 2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	hohes Risiko (>40 g/ Tag)	(1.7)	(0.8)	(0.9)	(0.6)	(0.6)	(0.7)	-	0.9
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	(2.6)	2.9	2.3	3.9	4.1	4.9	4.8	3.5
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	71.7	72.9	74.9	76.5	76.4	71.8	61.3	73.0
	abstinent	24.0	23.4	21.9	19.0	18.9	22.5	33.4	22.7
	N (gewichtet)	1'387	1'453	1'846	1'608	1'366	991	928	9'580
	N (ungewichtet)	887	1'374	2'031	1'585	1'713	1'485	1'240	10'315

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränktypen: 'Bier'; 'Wein'; 'suure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'

Anmerkungen: Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränktypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Die Werte der Befragung 2007 enthalten neu die Angaben zum Konsum von Alcopops und sind nicht direkt mit den Werten der vorangegangenen Befragungen vergleichbar.
 Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).
 Spaltenprozent
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion

Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, 2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	hohes Risiko	1.3	2.0	1.7	1.5
	mittleres Risiko	2.8	4.5	5.5	3.3
	geringes Risiko	80.7	74.1	58.6	78.1
	abstinent	15.2	19.4	34.2	17.1
	N (gewichtet)	13'464	4'399	851	18'713
	N (ungewichtet)	11'465	5'709	1'538	18'712

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränktypen: 'Bier'; 'Wein'; 'suure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'

Anmerkungen: Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränktypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Die Werte der Befragung 2007 enthalten neu die Angaben zum Konsum von Alcopops und sind nicht direkt mit den Werten der vorangegangenen Befragungen vergleichbar.
 Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).
 Spaltenprozentage
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion

Männer, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, 2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	hohes Risiko (>60 g/Tag)	1.7	3.3	(3.5)	2.1
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	2.8	4.1	(4.6)	3.2
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	85.5	79.9	70.4	83.5
	abstinent	10.0	12.7	21.5	11.1
	N (gewichtet)	6'581	2'152	400	9'133
	N (ungewichtet)	5'188	2'549	660	8'397

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränktypen: 'Bier'; 'Wein'; 'suure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'

Anmerkungen: Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränktypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Die Werte der Befragung 2007 enthalten neu die Angaben zum Konsum von Alcopops und sind nicht direkt mit den Werten der vorangegangenen Befragungen vergleichbar.
 Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).
 Spaltenprozente
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion

Frauen, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, 2007


Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	hohes Risiko (>40 g/ Tag)	0.9	0.8	-	0.9
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	2.8	4.9	6.2	3.5
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	76.0	68.5	48.2	73.0
	abstinent	20.2	25.8	45.4	22.7
	N (gewichtet)	6'882	2'247	451	9'580
	N (ungewichtet)	6'277	3'160	878	10'315

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränktypen: 'Bier'; 'Wein'; 'suure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'

Anmerkungen: Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränktypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Die Werte der Befragung 2007 enthalten neu die Angaben zum Konsum von Alcopops und sind nicht direkt mit den Werten der vorangegangenen Befragungen vergleichbar.
 Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).
 Spaltenprozente
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Alkohol-Konsumklassen, nach Alter

Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2007



Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'

*Getränktypen: 'Bier'; 'Wein'; 'saure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'

Anmerkungen: Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränktypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich: hohes Risiko: >60 g/Tag für Männer und >40 g/Tag für Frauen; mittleres Risiko: 40-60 g/Tag für Männer und 20-40 g/Tag für Frauen; geringes Risiko: <40 g/Tag für Männer und <20 g/Tag für Frauen. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).
 Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 2.5% werden nicht berichtet.

Alkohol-Konsumklassen, nach Alter

Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	hohes Risiko	2.2	1.1	1.4	1.0	1.8	1.6	(0.7)	1.4
	mittleres Risiko	1.7	2.5	2.2	3.4	4.2	4.9	4.1	3.1
	geringes Risiko	75.4	79.3	81.3	81.1	79.3	77.2	70.9	78.5
	abstinent	20.8	17.1	15.2	14.6	14.7	16.2	24.4	17.0
	N (gewichtet)	2'853	2'872	3'687	3'218	2'708	1'850	1'527	18'714
	N (ungewichtet)	1'805	2'503	3'803	3'002	3'110	2'493	1'998	18'714
2002	hohes Risiko	(1.5)	1.3	1.7	2.1	2.8	1.9	1.9	1.9
	mittleres Risiko	1.7	2.4	3.3	4.0	5.7	5.3	2.9	3.5
	geringes Risiko	70.2	73.6	75.2	75.2	72.7	66.9	63.3	72.1
	abstinent	26.6	22.8	19.8	18.7	18.9	25.9	31.8	22.6
	N (gewichtet)	2'755	3'356	3'927	3'242	2'725	2'101	1'551	19'657
	N (ungewichtet)	1'692	3'016	4'196	3'169	3'236	2'532	1'819	19'660
1997	hohes Risiko	(1.5)	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	(1.5)	2.0
	mittleres Risiko	(1.5)	3.3	4.2	5.1	4.4	3.2	4.3	3.7
	geringes Risiko	71.2	78.8	79.3	79.2	76.4	69.9	64.7	75.5
	abstinent	25.9	16.0	14.6	13.7	16.8	24.4	29.5	18.7
	N (gewichtet)	1'782	2'502	2'462	2'197	1'635	1'390	1'015	12'984
	N (ungewichtet)	1'410	2'867	2'507	1'957	1'680	1'509	1'057	12'987

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränktypen: 'Bier'; 'Wein'; 'saure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'

Anmerkungen: Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränktypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich: hohes Risiko: >60 g/Tag für Männer und >40 g/Tag für Frauen; mittleres Risiko: 40-60 g/Tag für Männer und 20-40 g/Tag für Frauen; geringes Risiko: <40 g/Tag für Männer und <20 g/Tag für Frauen. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).
 Spaltenprozentage
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Alkohol-Konsumklassen, nach Alter

Männer, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	hohes Risiko (>60 g/ Tag)	(2.7)	(1.6)	1.8	1.5	2.9	2.7	-	2.0
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	(1.7)	2.4	2.3	3.1	4.5	4.9	(3.0)	3.0
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	77.9	85.2	87.1	85.3	82.2	83.5	85.5	83.9
	abstinent	17.7	10.8	8.8	10.1	10.3	8.9	10.5	11.1
	N (gewichtet)	1'470	1'418	1'840	1'610	1'342	859	598	9'137
	N (ungewichtet)	920	1'128	1'772	1'417	1'397	1'008	758	8'400
2002	hohes Risiko (>60 g/ Tag)	(2.3)	(1.8)	2.5	3.0	3.9	3.3	(3.9)	2.8
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	(1.7)	2.9	4.3	4.7	5.9	6.3	(2.9)	4.1
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	73.8	82.8	81.4	78.6	78.2	76.2	79.1	79.0
	abstinent	22.2	12.5	11.8	13.6	12.0	14.2	14.1	14.2
	N (gewichtet)	1'402	1'661	1'983	1'635	1'344	896	587	9'508
	N (ungewichtet)	852	1'361	2'057	1'448	1'404	1'060	707	8'889
1997	hohes Risiko (>60 g/ Tag)	(2.4)	3.2	3.5	3.3	4.0	4.3	(2.4)	3.3
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	(1.5)	3.9	4.5	6.1	4.1	(3.8)	(3.4)	4.0
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	74.1	83.9	82.8	83.2	83.0	79.8	80.4	81.4
	abstinent	22.1	9.0	9.2	7.4	8.8	12.2	13.8	11.2
	N (gewichtet)	898	1'241	1'241	1'090	809	595	367	6'241
	N (ungewichtet)	684	1'349	1'153	894	729	586	354	5'749

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränktypen: 'Bier'; 'Wein'; 'saure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'

Anmerkungen: Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränktypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).
 Spaltenprozentage
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Konsumklassen, nach Alter

Frauen, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2007


Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	hohes Risiko (>40 g/ Tag)	(1.6)	(0.7)	(0.9)	(0.5)	(0.6)	(0.7)	-	0.8
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	(1.6)	2.6	2.0	3.6	4.0	4.9	4.8	3.2
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	72.8	73.4	75.4	76.8	76.5	71.8	61.4	73.4
	abstinent	24.0	23.2	21.7	19.0	18.9	22.5	33.3	22.6
	N (gewichtet)	1'382	1'455	1'846	1'608	1'366	991	928	9'577
	N (ungewichtet)	885	1'375	2'031	1'585	1'713	1'485	1'240	10'314
2002	hohes Risiko (>40 g/ Tag)	-	(0.8)	(0.8)	(1.2)	(1.7)	(0.9)	(0.8)	1.0
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	(1.6)	1.8	2.2	3.2	5.4	4.5	2.9	3.0
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	66.6	64.6	68.9	71.7	67.3	60.1	53.7	65.6
	abstinent	31.2	32.8	28.0	23.9	25.6	34.6	42.6	30.4
	N (gewichtet)	1'352	1'695	1'945	1'607	1'381	1'205	965	10'149
	N (ungewichtet)	840	1'655	2'139	1'721	1'832	1'472	1'112	10'771
1997	hohes Risiko (>40 g/ Tag)	-	(0.7)	-	-	-	(1.2)	-	0.8
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	(1.5)	2.7	4.0	4.2	4.6	2.8	4.8	3.5
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	68.2	73.7	75.7	75.2	69.8	62.6	55.9	70.1
	abstinent	29.8	22.9	20.0	19.8	24.5	33.5	38.3	25.7
	N (gewichtet)	884	1'261	1'221	1'107	826	795	648	6'743
	N (ungewichtet)	726	1'518	1'354	1'063	951	923	703	7'238

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränktypen: 'Bier'; 'Wein'; 'saure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'

Anmerkungen: Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränktypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).
 Spaltenprozentage
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion

Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2007



Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränktypen: 'Bier'; 'Wein'; 'suure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'

Anmerkungen: Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränktypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich: hohes Risiko: >60 g/Tag für Männer und >40 g/Tag für Frauen; mittleres Risiko: 40-60 g/Tag für Männer und 20-40 g/Tag für Frauen; geringes Risiko: <40 g/Tag für Männer und <20 g/Tag für Frauen. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).
 Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 2.5% werden nicht berichtet.

Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion

Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	hohes Risiko	1.2	2.0	1.7	1.4
	mittleres Risiko	2.6	4.1	5.4	3.1
	geringes Risiko	81.0	74.7	58.8	78.5
	abstinent	15.2	19.3	34.0	17.0
	N (gewichtet)	13'461	4'402	852	18'714
	N (ungewichtet)	11'464	5'711	1'539	18'714
2002	hohes Risiko	1.5	2.7	3.1	1.9
	mittleres Risiko	3.2	4.1	6.0	3.5
	geringes Risiko	75.2	65.8	54.1	72.1
	abstinent	20.1	27.4	36.8	22.6
	N (gewichtet)	14'189	4'563	905	19'657
	N (ungewichtet)	13'186	4'927	1'547	19'660
1997	hohes Risiko	1.7	2.7	3.6	2.0
	mittleres Risiko	3.1	5.2	6.2	3.7
	geringes Risiko	77.5	73.0	59.1	75.5
	abstinent	17.8	19.2	31.0	18.7
	N (gewichtet)	9'283	3'082	619	12'984
	N (ungewichtet)	8'254	3'608	1'125	12'987

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränktypen: 'Bier'; 'Wein'; 'saure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'

Anmerkungen: Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränktypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich: hohes Risiko: >60 g/Tag für Männer und >40 g/Tag für Frauen; mittleres Risiko: 40-60 g/Tag für Männer und 20-40 g/Tag für Frauen; geringes Risiko: <40 g/Tag für Männer und <20 g/Tag für Frauen. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).
 Spaltenprozent
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion

Männer, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	hohes Risiko (>60 g/ Tag)	1.6	3.2	(3.5)	2.0
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	2.6	3.7	(4.6)	3.0
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	85.8	80.4	70.7	83.9
	abstinent	10.0	12.7	21.3	11.1
	N (gewichtet)	6'581	2'155	401	9'137
	N (ungewichtet)	5'188	2'551	661	8'400
2002	hohes Risiko (>60 g/ Tag)	2.2	4.4	4.2	2.8
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	3.6	5.0	7.3	4.1
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	81.5	73.2	66.7	79.0
	abstinent	12.7	17.4	21.8	14.2
	N (gewichtet)	6'972	2'114	422	9'508
	N (ungewichtet)	6'093	2'118	678	8'889
1997	hohes Risiko (>60 g/ Tag)	2.7	4.6	7.2	3.3
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	3.4	5.7	(5.8)	4.0
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	83.1	78.5	70.1	81.4
	abstinent	10.9	11.3	16.9	11.2
	N (gewichtet)	4'525	1'441	274	6'241
	N (ungewichtet)	3'736	1'549	464	5'749

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränktypen: 'Bier'; 'Wein'; 'saure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'

Anmerkungen: Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränktypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).
 Spaltenprozent
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion

Frauen, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	hohes Risiko (>40 g/ Tag)	0.9	0.7	-	0.8
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	2.6	4.4	6.1	3.2
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	76.4	69.2	48.3	73.4
	abstinent	20.1	25.7	45.4	22.6
	N (gewichtet)	6'879	2'247	451	9'577
	N (ungewichtet)	6'276	3'160	878	10'314
2002	hohes Risiko (>40 g/ Tag)	0.8	1.3	(2.2)	1.0
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	2.8	3.3	4.8	3.0
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	69.2	59.4	43.2	65.6
	abstinent	27.2	36.0	49.8	30.4
	N (gewichtet)	7'217	2'449	483	10'149
	N (ungewichtet)	7'093	2'809	869	10'771
1997	hohes Risiko (>40 g/ Tag)	0.7	(1.0)	-	0.8
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	2.8	4.7	6.6	3.5
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	72.2	68.1	50.4	70.1
	abstinent	24.3	26.2	42.3	25.7
	N (gewichtet)	4'758	1'641	344	6'743
	N (ungewichtet)	4'518	2'059	661	7'238

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränktypen: 'Bier'; 'Wein'; 'saure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'

Anmerkungen: Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränktypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).
 Spaltenprozentage
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des gelegentlichesbezogenen übermässigen Trinkens, nach Alter
Gesamtpopulation, im letzten Jahr, 2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	mindestens jede Woche	6.5	3.6	1.8	2.3	2.5	1.3	(0.7)	2.9
	jeden Monat	14.6	12.8	7.3	6.8	6.0	3.4	(1.2)	8.1
	< 1 mal im Monat / nie	59.4	68.1	77.1	77.9	78.4	80.6	76.4	73.6
	abstinent	19.5	15.5	13.8	13.0	13.1	14.7	21.7	15.4
	N (gewichtet)	2'654	2'692	3'462	3'011	2'564	1'745	1'360	17'488
	N (ungewichtet)	1'704	2'386	3'648	2'873	3'001	2'407	1'824	17'843

Fragen: 'Wie häufig im letzten Jahr haben Sie 5 Gläser (für Männer) / 4 Gläser (für Frauen) Bier, Wein, Schnaps oder irgendeinen Alkohol auf einmal getrunken?'
Falls keine Angabe: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebranntes Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinent" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe zum übermässigen Trinken entweder durch die kombinierte Option "weniger als 1 mal im Monat / nie" (für die Antworten zur Hauptfrage "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich") oder durch die Option "abstinent" ersetzt (Antwort zur Hauptfrage: "nie, abstinent"). Diese Frage wurde in den Befragungen vor 2007 nicht gestellt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Rauschtrinkens.
 Spaltenprozent
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Häufigkeit des gelegenschaftsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Alter
Männer, im letzten Jahr, 2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	mindestens jede Woche	10.1	5.1	2.1	3.4	4.3	(2.4)	-	4.4
	jeden Monat	19.5	18.0	10.3	7.9	9.4	5.6	(2.0)	11.5
	< 1 mal im Monat / nie	53.9	67.6	79.3	79.2	78.9	84.2	88.4	74.3
	abstinent	16.5	9.3	8.2	9.5	7.4	7.9	8.3	9.8
	N (gewichtet)	1'366	1'324	1'729	1'501	1'233	813	520	8'485
	N (ungewichtet)	861	1'072	1'688	1'344	1'316	961	659	7'901

Fragen: **'Wie häufig im letzten Jahr haben Sie 5 Gläser (für Männer) / 4 Gläser (für Frauen) Bier, Wein, Schnaps oder irgendeinen Alkohol auf einmal getrunken?'**
Falls keine Angabe: **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinent" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe zum übermässigen Trinken entweder durch die kombinierte Option "weniger als 1 mal im Monat / nie" (für die Antworten zur Hauptfrage "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich") oder durch die Option "abstinent" ersetzt (Antwort zur Hauptfrage: "nie, abstinent"). Diese Frage wurde in den Befragungen vor 2007 nicht gestellt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Rauschtrinkens.
 Spaltenprozent
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des gelegenschaftsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Alter
Frauen, im letzten Jahr, 2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	mindestens jede Woche	(2.7)	(2.2)	(1.6)	(1.2)	(0.9)	-	-	1.4
	jeden Monat	9.3	7.7	4.4	5.7	2.8	(1.5)	-	4.9
	< 1 mal im Monat / nie	65.3	68.6	74.8	76.5	77.9	77.5	69.0	73.0
	abstinent	22.8	21.5	19.3	16.5	18.4	20.7	30.0	20.7
	N (gewichtet)	1'288	1'368	1'734	1'510	1'331	932	840	9'003
	N (ungewichtet)	843	1'314	1'960	1'529	1'685	1'446	1'165	9'942

Fragen: 'Wie häufig im letzten Jahr haben Sie 5 Gläser (für Männer) / 4 Gläser (für Frauen) Bier, Wein, Schnaps oder irgendeinen Alkohol auf einmal getrunken?'
Falls keine Angabe: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebranntes Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinent" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe zum übermässigen Trinken entweder durch die kombinierte Option "weniger als 1 mal im Monat / nie" (für die Antworten zur Hauptfrage "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich") oder durch die Option "abstinent" ersetzt (Antwort zur Hauptfrage: "nie, abstinent"). Diese Frage wurde in den Befragungen vor 2007 nicht gestellt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Rauschtrinkens.
 Spaltenprozentage
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des gelegenschaftsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, im letzten Jahr, 2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	mindestens jede Woche	2.7	3.6	(1.4)	2.9
	jeden Monat	8.3	8.2	4.6	8.1
	< 1 mal im Monat / nie	75.5	70.2	61.3	73.6
	abstinent	13.4	18.1	32.7	15.4
	N (gewichtet)	12'626	4'069	793	17'488
	N (ungewichtet)	10'991	5'399	1'453	17'843

Fragen: 'Wie häufig im letzten Jahr haben Sie 5 Gläser (für Männer) / 4 Gläser (für Frauen) Bier, Wein, Schnaps oder irgendeinen Alkohol auf einmal getrunken?'
Falls keine Angabe: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebranntes Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinent" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe zum übermässigen Trinken entweder durch die kombinierte Option "weniger als 1 mal im Monat / nie" (für die Antworten zur Hauptfrage "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich") oder durch die Option "abstinent" ersetzt (Antwort zur Hauptfrage: "nie, abstinent"). Diese Frage wurde in den Befragungen vor 2007 nicht gestellt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Rauschtrinkens.
 Spaltenprozente
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Häufigkeit des gelegenschaftsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Sprachregion
Männer, im letzten Jahr, 2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	mindestens jede Woche	4.1	5.8	(2.1)	4.4
	jeden Monat	11.8	11.0	7.6	11.5
	< 1 mal im Monat / nie	75.4	71.5	70.9	74.3
	abstinent	8.6	11.7	19.4	9.8
	N (gewichtet)	6'154	1'966	365	8'485
	N (ungewichtet)	4'927	2'367	607	7'901

Fragen: **'Wie häufig im letzten Jahr haben Sie 5 Gläser (für Männer) / 4 Gläser (für Frauen) Bier, Wein, Schnaps oder irgendeinen Alkohol auf einmal getrunken?'**
Falls keine Angabe: **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebranntes Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinent" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe zum übermässigen Trinken entweder durch die kombinierte Option "weniger als 1 mal im Monat / nie" (für die Antworten zur Hauptfrage "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich") oder durch die Option "abstinent" ersetzt (Antwort zur Hauptfrage: "nie, abstinent"). Diese Frage wurde in den Befragungen vor 2007 nicht gestellt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Rauschtrinkens.
 Spaltenprozent
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Häufigkeit des gelegenschaftsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Sprachregion
Frauen, im letzten Jahr, 2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	mindestens jede Woche	1.4	1.6	-	1.4
	jeden Monat	4.9	5.5	(2.0)	4.9
	< 1 mal im Monat / nie	75.6	68.9	53.2	73.0
	abstinent	18.0	24.1	44.0	20.7
	N (gewichtet)	6'472	2'103	428	9'003
	N (ungewichtet)	6'064	3'032	846	9'942

Fragen: 'Wie häufig im letzten Jahr haben Sie 5 Gläser (für Männer) / 4 Gläser (für Frauen) Bier, Wein, Schnaps oder irgendeinen Alkohol auf einmal getrunken?'
Falls keine Angabe: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebranntes Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinent" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe zum übermässigen Trinken entweder durch die kombinierte Option "weniger als 1 mal im Monat / nie" (für die Antworten zur Hauptfrage "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich") oder durch die Option "abstinent" ersetzt (Antwort zur Hauptfrage: "nie, abstinent"). Diese Frage wurde in den Befragungen vor 2007 nicht gestellt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Rauschtrinkens.
 Spaltenprozentage
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Rauschtrinkens, nach Alter
Gesamtpopulation, im letzten Jahr, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	mindestens jede Woche	2.4	(1.2)	(0.5)	(0.5)	(0.4)	-	-	0.8
	jeden Monat	7.0	4.4	2.0	1.2	(1.0)	(0.8)	-	2.6
	< 1 mal im Monat / nie	71.1	78.9	83.7	85.2	85.5	84.5	78.1	81.2
	abstinent	19.5	15.5	13.8	13.0	13.1	14.7	21.7	15.4
	N (gewichtet)	2'664	2'694	3'463	3'015	2'566	1'749	1'360	17'511
	N (ungewichtet)	1'708	2'387	3'644	2'877	3'003	2'410	1'824	17'853
2002	mindestens jede Woche	2.7	(0.8)	0.7	(0.5)	(0.6)	-	-	0.9
	jeden Monat	7.2	5.4	2.8	2.4	1.0	(0.7)	-	3.2
	< 1 mal im Monat / nie	64.4	71.8	77.4	79.2	79.7	73.6	67.2	74.1
	abstinent	25.7	22.1	19.1	17.9	18.7	25.5	32.0	21.9
	N (gewichtet)	2'593	3'155	3'709	3'051	2'581	1'995	1'369	18'452
	N (ungewichtet)	1'594	2'888	4'027	3'026	3'104	2'428	1'659	18'726
1997	mindestens jede Woche	(1.2)	1.0	(0.8)	-	(0.7)	-	-	0.7
	jeden Monat	6.3	4.4	2.2	2.3	(1.1)	-	-	2.7
	< 1 mal im Monat / nie	67.2	79.5	83.2	83.9	81.8	75.2	71.2	78.5
	abstinent	25.3	15.2	13.8	13.4	16.5	23.8	28.5	18.1
	N (gewichtet)	1'763	2'449	2'410	2'157	1'597	1'337	930	12'643
	N (ungewichtet)	1'393	2'830	2'470	1'931	1'655	1'460	985	12'724

Fragen: 'Wie häufig im letzten Jahr haben Sie 8 Gläser (für Männer) / 6 Gläser (für Frauen) Bier, Wein, Schnaps oder irgendeinen Alkohol auf einmal getrunken?'
Falls keine Angabe: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebranntes Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinent" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe zum Rauschtrinken entweder durch die kombinierte Option "weniger als 1 mal im Monat / nie" (für die Antworten zur Hauptfrage "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich") oder durch die Option "abstinent" ersetzt (Antwort zur Hauptfrage: "nie, abstinent"). 1997 wurde keine Differenzierung zwischen Männern und Frauen vorgenommen und bei allen Personen der Grenzwert von 8 Gläsern verwendet.
 Die Vergleichbarkeit zwischen den Antworten der drei Befragungen ist aufgrund der verschiedenen Varianten eingeschränkt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Rauschtrinkens.
 Spaltenprozent
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Rauschtrinkens, nach Alter
Männer, im letzten Jahr, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	mindestens jede Woche	3.3	(1.9)	(0.6)	(0.6)	(0.9)	-	-	1.2
	jeden Monat	10.7	6.5	2.9	2.0	(1.6)	(1.4)	-	4.1
	< 1 mal im Monat / nie	69.5	82.2	88.3	87.9	90.1	90.6	91.3	84.9
	abstinent	16.5	9.3	8.2	9.5	7.4	7.9	8.3	9.8
	N (gewichtet)	1'367	1'326	1'726	1'501	1'233	813	520	8'486
	N (ungewichtet)	861	1'073	1'685	1'344	1'314	962	659	7'898
2002	mindestens jede Woche	4.6	(1.2)	(0.9)	(0.6)	-	-	-	1.4
	jeden Monat	10.9	8.8	4.5	4.2	(1.8)	(1.4)	-	5.4
	< 1 mal im Monat / nie	63.1	77.9	83.3	81.8	85.6	85.1	84.0	79.6
	abstinent	21.4	12.1	11.3	13.3	11.6	13.2	13.7	13.7
	N (gewichtet)	1'315	1'540	1'848	1'506	1'218	819	480	8'726
	N (ungewichtet)	797	1'284	1'946	1'353	1'292	984	604	8'260
1997	mindestens jede Woche	(2.3)	(1.7)	(1.3)	-	-	-	-	1.3
	jeden Monat	10.6	7.7	3.9	3.7	(2.0)	-	-	4.9
	< 1 mal im Monat / nie	65.6	82.5	86.2	88.2	88.7	87.2	88.6	83.3
	abstinent	21.5	8.1	8.6	7.4	8.4	10.7	10.9	10.5
	N (gewichtet)	886	1'213	1'216	1'071	783	562	329	6'059
	N (ungewichtet)	674	1'331	1'136	881	711	557	322	5'612

Fragen: 'Wie häufig im letzten Jahr haben Sie 8 Gläser (für Männer) / 6 Gläser (für Frauen) Bier, Wein, Schnaps oder irgendeinen Alkohol auf einmal getrunken?'
Falls keine Angabe: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinent" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe zum Rauschtrinken entweder durch die kombinierte Option "weniger als 1 mal im Monat / nie" (für die Antworten zur Hauptfrage "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich") oder durch die Option "abstinent" ersetzt (Antwort zur Hauptfrage: "nie, abstinent"). 1997 wurde keine Differenzierung zwischen Männern und Frauen vorgenommen und bei allen Personen der Grenzwert von 8 Gläsern verwendet.
 Die Vergleichbarkeit zwischen den Antworten der drei Befragungen ist aufgrund der verschiedenen Varianten eingeschränkt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Rauschtrinkens.
 Spaltenprozent
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Rauschtrinkens, nach Alter
Frauen, im letzten Jahr, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	mindestens jede Woche	(1.4)	-	-	-	-	-	-	0.5
	jeden Monat	3.2	2.4	(1.1)	(0.5)	-	-	-	1.2
	< 1 mal im Monat / nie	72.8	75.6	79.3	82.6	81.3	79.2	69.9	77.8
	abstinenter	22.6	21.5	19.2	16.5	18.3	20.6	30.0	20.6
	N (gewichtet)	1'297	1'369	1'736	1'514	1'333	936	840	9'026
	N (ungewichtet)	847	1'314	1'959	1'533	1'689	1'448	1'165	9'955
2002	mindestens jede Woche	-	-	-	-	-	-	-	0.4
	jeden Monat	3.4	2.1	1.1	(0.6)	(0.3)	-	-	1.2
	< 1 mal im Monat / nie	65.7	65.9	71.5	76.8	74.4	65.6	58.1	69.1
	abstinenter	30.1	31.6	26.8	22.3	25.0	34.1	41.8	29.3
	N (gewichtet)	1'278	1'614	1'861	1'545	1'363	1'176	889	9'727
	N (ungewichtet)	797	1'604	2'081	1'673	1'812	1'444	1'055	10'466
1997	mindestens jede Woche	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	jeden Monat	(1.9)	(1.1)	-	-	-	-	-	0.8
	< 1 mal im Monat / nie	68.8	76.5	80.1	79.7	75.1	66.5	61.7	74.0
	abstinenter	29.2	22.1	19.2	19.3	24.3	33.4	38.1	25.1
	N (gewichtet)	877	1'236	1'194	1'086	814	775	601	6'583
	N (ungewichtet)	719	1'499	1'334	1'050	944	903	663	7'112

Fragen: 'Wie häufig im letzten Jahr haben Sie 8 Gläser (für Männer) / 6 Gläser (für Frauen) Bier, Wein, Schnaps oder irgendeinen Alkohol auf einmal getrunken?'
Falls keine Angabe: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebranntes Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinenter" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe zum Rauschtrinken entweder durch die kombinierte Option "weniger als 1 mal im Monat / nie" (für die Antworten zur Hauptfrage "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich") oder durch die Option "abstinenter" ersetzt (Antwort zur Hauptfrage: "nie, abstinenter"). 1997 wurde keine Differenzierung zwischen Männern und Frauen vorgenommen und bei allen Personen der Grenzwert von 8 Gläsern verwendet.
 Die Vergleichbarkeit zwischen den Antworten der drei Befragungen ist aufgrund der verschiedenen Varianten eingeschränkt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Rauschtrinkens.
 Spaltenprozente
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Rauschtrinkens, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, im letzten Jahr, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	mindestens jede Woche	0.7	1.1	-	0.8
	jeden Monat	2.5	3.2	(1.2)	2.6
	< 1 mal im Monat / nie	83.4	77.6	65.5	81.2
	abstinent	13.4	18.1	32.6	15.4
	N (gewichtet)	12'641	4'075	795	17'511
	N (ungewichtet)	10'993	5'403	1'457	17'853
2002	mindestens jede Woche	0.7	1.5	-	0.9
	jeden Monat	3.0	4.0	(1.6)	3.2
	< 1 mal im Monat / nie	77.1	67.1	60.7	74.1
	abstinent	19.2	27.4	37.0	21.9
	N (gewichtet)	13'305	4'318	830	18'452
	N (ungewichtet)	12'577	4'710	1'439	18'726
1997	mindestens jede Woche	0.6	1.1	-	0.7
	jeden Monat	2.7	3.1	(2.1)	2.7
	< 1 mal im Monat / nie	79.7	77.1	66.8	78.5
	abstinent	17.1	18.7	30.4	18.1
	N (gewichtet)	9'000	3'032	610	12'643
	N (ungewichtet)	8'052	3'559	1'113	12'724

Fragen: 'Wie häufig im letzten Jahr haben Sie 8 Gläser (für Männer) / 6 Gläser (für Frauen) Bier, Wein, Schnaps oder irgendeinen Alkohol auf einmal getrunken?'
Falls keine Angabe: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebranntes Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinent" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe zum Rauschtrinken entweder durch die kombinierte Option "weniger als 1 mal im Monat / nie" (für die Antworten zur Hauptfrage "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich") oder durch die Option "abstinent" ersetzt (Antwort zur Hauptfrage: "nie, abstinent"). 1997 wurde keine Differenzierung zwischen Männern und Frauen vorgenommen und bei allen Personen der Grenzwert von 8 Gläsern verwendet.
 Die Vergleichbarkeit zwischen den Antworten der drei Befragungen ist aufgrund der verschiedenen Varianten eingeschränkt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Rauschtrinkens.
 Spaltenprozentage
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Rauschtrinkens, nach Sprachregion
Männer, im letzten Jahr, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	mindestens jede Woche	1.0	1.8	-	1.2
	jeden Monat	4.0	4.6	(1.8)	4.1
	< 1 mal im Monat / nie	86.3	82.0	77.9	84.9
	abstinent	8.6	11.7	19.3	9.8
	N (gewichtet)	6'151	1'968	367	8'486
	N (ungewichtet)	4'920	2'368	610	7'898
2002	mindestens jede Woche	1.1	2.7	-	1.4
	jeden Monat	5.0	7.0	(3.0)	5.4
	< 1 mal im Monat / nie	82.0	72.5	74.9	79.6
	abstinent	12.0	17.7	21.8	13.7
	N (gewichtet)	6'406	1'950	370	8'726
	N (ungewichtet)	5'685	1'972	603	8'260
1997	mindestens jede Woche	1.1	1.9	-	1.28
	jeden Monat	4.6	6.1	(3.8)	4.9
	< 1 mal im Monat / nie	84.3	81.4	78.6	83.3
	abstinent	10.1	10.6	16.3	10.5
	N (gewichtet)	4'376	1'412	271	6'059
	N (ungewichtet)	3'633	1'520	459	5'612

Fragen: 'Wie häufig im letzten Jahr haben Sie 8 Gläser (für Männer) / 6 Gläser (für Frauen) Bier, Wein, Schnaps oder irgendeinen Alkohol auf einmal getrunken?'
Falls keine Angabe: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinent" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe zum Rauschtrinken entweder durch die kombinierte Option "weniger als 1 mal im Monat / nie" (für die Antworten zur Hauptfrage "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich") oder durch die Option "abstinent" ersetzt (Antwort zur Hauptfrage: "nie, abstinent"). 1997 wurde keine Differenzierung zwischen Männern und Frauen vorgenommen und bei allen Personen der Grenzwert von 8 Gläsern verwendet.
 Die Vergleichbarkeit zwischen den Antworten der drei Befragungen ist aufgrund der verschiedenen Varianten eingeschränkt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Rauschtrinkens.
 Spaltenprozent
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Rauschtrinkens, nach Sprachregion
Frauen, im letzten Jahr, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	mindestens jede Woche	(0.4)	(0.5)	-	0.5
	jeden Monat	0.9	2.0	-	1.2
	< 1 mal im Monat / nie	80.7	73.5	54.9	77.8
	abstinent	18.0	24.0	44.0	20.6
	N (gewichtet)	6'491	2'106	428	9'026
	N (ungewichtet)	6'073	3'035	847	9'955
2002	mindestens jede Woche	(0.3)	(0.4)	-	0.4
	jeden Monat	1.1	1.5	-	1.2
	< 1 mal im Monat / nie	72.7	62.6	49.4	69.1
	abstinent	25.9	35.4	49.2	29.3
	N (gewichtet)	6'899	2'367	460	9'727
	N (ungewichtet)	6'892	2'738	836	10'466
1997	mindestens jede Woche	-	-	-	(0.2)
	jeden Monat	0.8	(0.6)	-	0.8
	< 1 mal im Monat / nie	75.4	73.4	57.3	74.0
	abstinent	23.7	25.7	41.7	25.1
	N (gewichtet)	4'624	1'620	340	6'583
	N (ungewichtet)	4'419	2'039	654	7'112

Fragen: 'Wie häufig im letzten Jahr haben Sie 8 Gläser (für Männer) / 6 Gläser (für Frauen) Bier, Wein, Schnaps oder irgendeinen Alkohol auf einmal getrunken?'
Falls keine Angabe: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebranntes Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinent" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe zum Rauschtrinken entweder durch die kombinierte Option "weniger als 1 mal im Monat / nie" (für die Antworten zur Hauptfrage "1-3 mal monatlich" und "seltener als monatlich") oder durch die Option "abstinent" ersetzt (Antwort zur Hauptfrage: "nie, abstinent"). 1997 wurde keine Differenzierung zwischen Männern und Frauen vorgenommen und bei allen Personen der Grenzwert von 8 Gläsern verwendet.
 Die Vergleichbarkeit zwischen den Antworten der drei Befragungen ist aufgrund der verschiedenen Varianten eingeschränkt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Rauschtrinkens.
 Spaltenprozent
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Alter
Gesamtpopulation, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, 2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	20-40 (behandlungsbedürftig)	(0.7)	-	-	-	-	-	-	0.2
	16-19 (schädigend)	(1.3)	(0.7)	(0.1)	-	-	-	-	0.4
	8-15 (übermässig, riskant)	15.4	11.1	5.3	5.3	3.7	3.3	(1.2)	7.0
	0-7 (unauffällig)	82.6	88.0	94.4	94.6	96.0	96.6	98.8	92.4
	<i>N (gewichtet)</i>	2'657	2'687	3'458	3'007	2'559	1'744	1'357	17'468
	<i>N (ungewichtet)</i>	1'704	2'380	3'638	2'871	2'997	2'401	1'820	17'811

Fragen: Die zur Schätzung der AUDIT-Scores benutzten Fragen werden separat aufgelistet.

Anmerkungen: Die Antworten zu den zwei ersten Fragen des originalen AUDIT-Tests werden über die detaillierten Fragen zur Konsumhäufigkeit und Menge geschätzt. Gegenüber der dritten Frage des originalen Verfahrens weicht die Schwelle der Anzahl Gläser ab (bei Männern 8 anstatt 6). Die AUDIT-Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinient" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde eine Einteilung in die Kategorie "0-7 (unauffällig)" vorgenommen. ALCOPOPS?
Die Einteilung in die vier Risikoklassen entspricht den Empfehlungen zum originalen Verfahren (Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., Monteiro, M.G. (2001), AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for use in primary care (2nd Ed.). Geneva: World Health Organization).
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zu den AUDIT-Fragen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Alter
Männer, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, 2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	20-40 (behandlungsbedürftig)	-	-	-	-	-	-	-	0.3
	16-19 (schädigend)	(2.2)	(1.1)	-	-	-	-	-	0.7
	8-15 (übermässig, riskant)	23.6	18.2	8.5	8.4	6.8	6.5	(2.2)	11.6
	0-7 (unauffällig)	73.2	80.5	91.0	91.5	92.6	93.2	97.8	87.4
	N (gewichtet)	1'362	1'323	1'722	1'496	1'229	809	517	8'459
	N (ungewichtet)	858	1'071	1'680	1'339	1'310	956	657	7'871

Fragen: Die zur Schätzung der AUDIT-Scores benutzten Fragen werden separat aufgelistet.

Anmerkungen: Die Antworten zu den zwei ersten Fragen des originalen AUDIT-Tests werden über die detaillierten Fragen zur Konsumhäufigkeit und Menge geschätzt. Gegenüber der dritten Frage des originalen Verfahrens weicht die Schwelle der Anzahl Gläser ab (bei Männern 8 anstatt 6). Die AUDIT-Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinente" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde eine Einteilung in die Kategorie "0-7 (unauffällig)" vorgenommen. ALCOPOPS?

Die Einteilung in die vier Risikoklassen entspricht den Empfehlungen zum originalen Verfahren (Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., Monteiro, M.G. (2001), AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for use in primary care (2nd Ed.). Geneva: World Health Organization).

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zu den AUDIT-Fragen.

Spaltenprozentage

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Alter
Frauen, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, 2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	20-40 (behandlungsbedürftig)	-	-	-	-	-	-	-	0.1
	16-19 (schädigend)	-	-	-	-	-	-	-	0.1
	8-15 (übermässig, riskant)	6.8	4.3	2.0	2.3	(0.8)	-	-	2.6
	0-7 (unauffällig)	92.6	95.3	97.7	97.6	99.2	99.5	99.5	97.2
	N (gewichtet)	1'295	1'364	1'736	1'511	1'330	935	840	9'009
	N (ungewichtet)	846	1'309	1'958	1'532	1'687	1'445	1'163	9'940

Fragen: Die zur Schätzung der AUDIT-Scores benutzten Fragen werden separat aufgelistet.

Anmerkungen: Die Antworten zu den zwei ersten Fragen des originalen AUDIT-Tests werden über die detaillierten Fragen zur Konsumhäufigkeit und Menge geschätzt. Gegenüber der dritten Frage des originalen Verfahrens weicht die Schwelle der Anzahl Gläser ab (bei Männern 8 anstatt 6). Die AUDIT-Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinente" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde eine Einteilung in die Kategorie "0-7 (unauffällig)" vorgenommen. ALCOPOPS?
Die Einteilung in die vier Risikoklassen entspricht den Empfehlungen zum originalen Verfahren (Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., Monteiro, M.G. (2001), AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for use in primary care (2nd Ed.). Geneva: World Health Organization).
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zu den AUDIT-Fragen.
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, 2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	20-40 (behandlungsbedürftig)	(0.2)	(0.2)	-	(0.2)
	16-19 (schädigend)	0.4	(0.3)	-	0.4
	8-15 (übermässig, riskant)	6.7	8.2	5.5	7.0
	0-7 (unauffällig)	92.7	91.2	94.3	92.4
	N (gewichtet)	12'608	4'065	795	17'468
	N (ungewichtet)	10'963	5'391	1'457	17'811

Fragen: Die zur Schätzung der AUDIT-Scores benutzten Fragen werden separat aufgelistet.

Anmerkungen: Die Antworten zu den zwei ersten Fragen des originalen AUDIT-Tests werden über die detaillierten Fragen zur Konsumhäufigkeit und Menge geschätzt. Gegenüber der dritten Frage des originalen Verfahrens weicht die Schwelle der Anzahl Gläser ab (bei Männern 8 anstatt 6). Die AUDIT-Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinenter" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde eine Einteilung in die Kategorie "0-7 (unauffällig)" vorgenommen. ALCOPOPS?
Die Einteilung in die vier Risikoklassen entspricht den Empfehlungen zum originalen Verfahren (Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., Monteiro, M.G. (2001), AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for use in primary care (2nd Ed.). Geneva: World Health Organization).
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zu den AUDIT-Fragen.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Sprachregion
Männer, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, 2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	20-40 (behandlungsbedürftig)	-	-	-	(0.3)
	16-19 (schädigend)	0.8	(0.5)	-	0.7
	8-15 (übermässig, riskant)	11.2	13.4	9.9	11.6
	0-7 (unauffällig)	87.8	85.8	89.9	87.4
	N (gewichtet)	6'129	1'963	367	8'459
	N (ungewichtet)	4'899	2'362	610	7'871

Fragen: Die zur Schätzung der AUDIT-Scores benutzten Fragen werden separat aufgelistet.

Anmerkungen: Die Antworten zu den zwei ersten Fragen des originalen AUDIT-Tests werden über die detaillierten Fragen zur Konsumhäufigkeit und Menge geschätzt. Gegenüber der dritten Frage des originalen Verfahrens weicht die Schwelle der Anzahl Gläser ab (bei Männern 8 anstatt 6). Die AUDIT-Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinente" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde eine Einteilung in die Kategorie "0-7 (unauffällig)" vorgenommen. ALCOPOPS?
Die Einteilung in die vier Risikoklassen entspricht den Empfehlungen zum originalen Verfahren (Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., Monteiro, M.G. (2001), AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for use in primary care (2nd Ed.). Geneva: World Health Organization).
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zu den AUDIT-Fragen.
Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Sprachregion
Frauen, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, 2007


Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	20-40 (behandlungsbedürftig)	-	-	-	(0.1)
	16-19 (schädigend)	-	-	-	(0.1)
	8-15 (übermässig, riskant)	2.4	3.4	(1.7)	2.6
	0-7 (unauffällig)	97.4	96.2	98.0	97.2
	N (gewichtet)	6'479	2'102	428	9'009
	N (ungewichtet)	6'064	3'029	847	9'940

Fragen: Die zur Schätzung der AUDIT-Scores benutzten Fragen werden separat aufgelistet.

Anmerkungen: Die Antworten zu den zwei ersten Fragen des originalen AUDIT-Tests werden über die detaillierten Fragen zur Konsumhäufigkeit und Menge geschätzt. Gegenüber der dritten Frage des originalen Verfahrens weicht die Schwelle der Anzahl Gläser ab (bei Männern 8 anstatt 6). Die AUDIT-Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinente" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde eine Einteilung in die Kategorie "0-7 (unauffällig)" vorgenommen. ALCOPOPS?
Die Einteilung in die vier Risikoklassen entspricht den Empfehlungen zum originalen Verfahren (Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., Monteiro, M.G. (2001), AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for use in primary care (2nd Ed.). Geneva: World Health Organization).
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zu den AUDIT-Fragen.
Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Alter

Gesamtpopulation, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, Vergleich 1997-2007



Fragen: Die zur Schätzung der AUDIT-Scores benutzten Fragen werden separat aufgelistet.

Anmerkungen: Die Antworten zu den zwei ersten Fragen des originalen AUDIT-Tests werden über die detaillierten Fragen zur Konsumhäufigkeit und Menge geschätzt. Gegenüber der dritten Frage des originalen Verfahrens weicht die Schwelle der Anzahl Gläser ab (8 anstatt 6, 2002 und 2007 nur bei Männern). Die AUDIT-Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinente" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde eine Einteilung in die Kategorie "0-7 (unauffällig)" vorgenommen. Dasselbe gilt für die Personen, die 1997 und 2002 zur Hauptfrage "nie, abstinente" angegeben haben.

Alcopops wurden nur in der Befragung 2007 erhoben und werden für den Vergleich ausgeschlossen.

Die Einteilung in die vier Risikoklassen entspricht den Empfehlungen zum originalen Verfahren (Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., Monteiro, M.G. (2001), AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for use in primary care (2nd Ed.). Geneva: World Health Organization).

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zu den AUDIT-Fragen.

Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 2.5% werden nicht berichtet.

Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Alter

Gesamtpopulation, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	20-40 (behandlungsbedürftig)	(0.6)	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	16-19 (schädigend)	(1.3)	(0.7)	(0.1)	-	-	-	-	0.4
	8-15 (übermässig, riskant)	14.7	11.0	5.2	5.3	3.7	3.3	(1.2)	6.8
	0-7 (unauffällig)	83.4	88.1	94.4	94.6	96.0	96.6	98.8	92.6
	<i>N (gewichtet)</i>	2'657	2'687	3'458	3'007	2'559	1'744	1'357	17'468
	<i>N (ungewichtet)</i>	1'704	2'380	3'638	2'871	2'997	2'401	1'820	17'811
2002	20-40 (behandlungsbedürftig)	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	16-19 (schädigend)	(0.4)	-	(0.3)	-	-	-	-	0.2
	8-15 (übermässig, riskant)	13.0	7.7	6.2	5.6	3.7	3.0	(1.3)	6.3
	0-7 (unauffällig)	86.3	92.2	93.4	94.2	96.0	96.9	98.7	93.5
	<i>N (gewichtet)</i>	2'593	3'161	3'722	3'049	2'580	1'989	1'372	18'465
	<i>N (ungewichtet)</i>	1'594	2'890	4'033	3'019	3'099	2'421	1'665	18'721
1997	20-40 (behandlungsbedürftig)	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	16-19 (schädigend)	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	8-15 (übermässig, riskant)	10.9	9.1	5.8	6.4	4.8	2.5	(1.1)	6.4
	0-7 (unauffällig)	88.7	90.5	93.9	93.4	94.9	97.5	98.8	93.3
	<i>N (gewichtet)</i>	1'758	2'448	2'406	2'155	1'596	1'335	936	12'633
	<i>N (ungewichtet)</i>	1'390	2'829	2'467	1'928	1'653	1'458	993	12'718

Fragen: Die zur Schätzung der AUDIT-Scores benutzten Fragen werden separat aufgelistet.

Anmerkungen: Die Antworten zu den zwei ersten Fragen des originalen AUDIT-Tests werden über die detaillierten Fragen zur Konsumhäufigkeit und Menge geschätzt. Gegenüber der dritten Frage des originalen Verfahrens weicht die Schwelle der Anzahl Gläser ab (8 anstatt 6, 2002 und 2007 nur bei Männern). Die AUDIT-Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinent" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde eine Einteilung in die Kategorie "0-7 (unauffällig)" vorgenommen. Dasselbe gilt für die Personen, die 1997 und 2002 zur Hauptfrage "nie, abstinent" angegeben haben.

Alcopops wurden nur in der Befragung 2007 erhoben und werden für den Vergleich ausgeschlossen.

Die Einteilung in die vier Risikoklassen entspricht den Empfehlungen zum originalen Verfahren (Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., Monteiro, M.G. (2001), AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for use in primary care (2nd Ed.). Geneva: World Health Organization).

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zu den AUDIT-Fragen.

Spaltenprozente

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Alter

Männer, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	20-40 (behandlungsbedürftig)	-	-	-	-	-	-	-	(0.3)
	16-19 (schädigend)	(2.2)	(1.1)	-	-	-	-	-	0.7
	8-15 (übermässig, riskant)	22.7	18.2	8.5	8.4	6.8	6.5	(2.2)	11.5
	0-7 (unauffällig)	74.0	80.5	91.0	91.5	92.6	93.2	97.8	87.6
	N (gewichtet)	1'362	1'323	1'722	1'496	1'229	809	517	8'459
	N (ungewichtet)	858	1'071	1'680	1'339	1'310	956	657	7'871
2002	20-40 (behandlungsbedürftig)	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	16-19 (schädigend)	-	-	-	-	-	-	-	0.3
	8-15 (übermässig, riskant)	19.8	13.7	10.2	9.5	6.3	5.9	(3.4)	10.8
	0-7 (unauffällig)	79.1	86.2	89.1	90.2	93.1	93.9	96.6	88.7
	N (gewichtet)	1'310	1'543	1'858	1'504	1'216	812	484	8'728
	N (ungewichtet)	796	1'286	1'950	1'350	1'287	977	610	8'256
1997	20-40 (behandlungsbedürftig)	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	16-19 (schädigend)	-	-	-	-	-	-	-	(0.3)
	8-15 (übermässig, riskant)	19.0	16.4	9.5	11.1	8.6	5.1	-	11.6
	0-7 (unauffällig)	80.3	82.9	89.9	88.5	90.8	94.8	97.6	87.8
	N (gewichtet)	884	1'213	1'212	1'069	782	560	327	6'047
	N (ungewichtet)	672	1'331	1'134	878	709	556	322	5'602

Fragen: Die zur Schätzung der AUDIT-Scores benutzten Fragen werden separat aufgelistet.

Anmerkungen: Die Antworten zu den zwei ersten Fragen des originalen AUDIT-Tests werden über die detaillierten Fragen zur Konsumhäufigkeit und Menge geschätzt. Gegenüber der dritten Frage des originalen Verfahrens weicht die Schwelle der Anzahl Gläser ab (8 anstatt 6, 2002 und 2007 nur bei Männern). Die AUDIT-Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinent" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde eine Einteilung in die Kategorie "0-7 (unauffällig)" vorgenommen. Dasselbe gilt für die Personen, die 1997 und 2002 zur Hauptfrage "nie, abstinent" angegeben haben.

Alcopops wurden nur in der Befragung 2007 erhoben und werden für den Vergleich ausgeschlossen.

Die Einteilung in die vier Risikoklassen entspricht den Empfehlungen zum originalen Verfahren (Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., Monteiro, M.G. (2001), AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for use in primary care (2nd Ed.). Geneva: World Health Organization).

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zu den AUDIT-Fragen.

Spaltenprozente

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Alter

Frauen, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	20-40 (behandlungsbedürftig)	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	16-19 (schädigend)	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	8-15 (übermässig, riskant)	6.2	4.1	2.0	2.3	(0.8)	-	-	2.5
	0-7 (unauffällig)	93.2	95.5	97.7	97.6	99.2	99.5	99.5	97.3
	N (gewichtet)	1'295	1'364	1'736	1'511	1'330	935	840	9'009
	N (ungewichtet)	846	1'309	1'958	1'532	1'687	1'445	1'163	9'940
2002	20-40 (behandlungsbedürftig)	-	-	-	-	-	-	-	-
	16-19 (schädigend)	-	-	-	-	-	-	-	-
	8-15 (übermässig, riskant)	6.0	2.0	2.2	1.9	(1.4)	(1.0)	-	2.2
	0-7 (unauffällig)	93.6	97.9	97.7	98.0	98.5	99.0	99.8	97.7
	N (gewichtet)	1'282	1'618	1'863	1'545	1'364	1'177	888	9'737
	N (ungewichtet)	798	1'604	2'083	1'669	1'812	1'444	1'055	10'465
1997	20-40 (behandlungsbedürftig)	-	-	-	-	-	-	-	-
	16-19 (schädigend)	-	-	-	-	-	-	-	-
	8-15 (übermässig, riskant)	(2.7)	(1.9)	(1.9)	(1.7)	(1.1)	-	-	1.6
	0-7 (unauffällig)	97.2	98.0	97.9	98.3	98.9	99.4	99.4	98.3
	N (gewichtet)	875	1'235	1'194	1'086	814	774	608	6'586
	N (ungewichtet)	718	1'498	1'333	1'050	944	902	671	7'116

Fragen: Die zur Schätzung der AUDIT-Scores benutzten Fragen werden separat aufgelistet.

Anmerkungen: Die Antworten zu den zwei ersten Fragen des originalen AUDIT-Tests werden über die detaillierten Fragen zur Konsumhäufigkeit und Menge geschätzt. Gegenüber der dritten Frage des originalen Verfahrens weicht die Schwelle der Anzahl Gläser ab (8 anstatt 6, 2002 und 2007 nur bei Männern). Die AUDIT-Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinente" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde eine Einteilung in die Kategorie "0-7 (unauffällig)" vorgenommen. Dasselbe gilt für die Personen, die 1997 und 2002 zur Hauptfrage "nie, abstinente" angegeben haben.

Alcopops wurden nur in der Befragung 2007 erhoben und werden für den Vergleich ausgeschlossen.

Die Einteilung in die vier Risikoklassen entspricht den Empfehlungen zum originalen Verfahren (Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., Monteiro, M.G. (2001), AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for use in primary care (2nd Ed.). Geneva: World Health Organization).

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zu den AUDIT-Fragen.


Spaltenprozente

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Sprachregion

Gesamtpopulation, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, Vergleich 1997-2007



Fragen: Die zur Schätzung der AUDIT-Scores benutzten Fragen werden separat aufgelistet.

Anmerkungen: Die Antworten zu den zwei ersten Fragen des originalen AUDIT-Tests werden über die detaillierten Fragen zur Konsumhäufigkeit und Menge geschätzt. Gegenüber der dritten Frage des originalen Verfahrens weicht die Schwelle der Anzahl Gläser ab (8 anstatt 6, 2002 und 2007 nur bei Männern). Die AUDIT-Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinent" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde eine Einteilung in die Kategorie "0-7 (unauffällig)" vorgenommen. Dasselbe gilt für die Personen, die 1997 und 2002 zur Hauptfrage "nie, abstinent" angegeben haben.

Alcopops wurden nur in der Befragung 2007 erhoben und werden für den Vergleich ausgeschlossen.

Die Einteilung in die vier Risikoklassen entspricht den Empfehlungen zum originalen Verfahren (Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., Monteiro, M.G. (2001), AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for use in primary care (2nd Ed.). Geneva: World Health Organization).

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zu den AUDIT-Fragen.

Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 2.5% werden nicht berichtet.

Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	20-40 (behandlungsbedürftig)	(0.2)	(0.2)	-	(0.2)
	16-19 (schädigend)	0.4	(0.4)	-	0.4
	8-15 (übermässig, riskant)	6.6	7.9	5.4	6.8
	0-7 (unauffällig)	92.8	91.5	94.3	92.6
	<i>N (gewichtet)</i>	12'608	4'065	795	17'468
	N (ungewichtet)	10'963	5'391	1'457	17'811
2002	20-40 (behandlungsbedürftig)	-	-	-	(0.1)
	16-19 (schädigend)	(0.2)	(0.3)	-	0.2
	8-15 (übermässig, riskant)	6.1	7.1	3.9	6.3
	0-7 (unauffällig)	93.7	92.4	95.7	93.5
	<i>N (gewichtet)</i>	13'318	4'318	829	18'465
	N (ungewichtet)	12'578	4'707	1'436	18'721
1997	20-40 (behandlungsbedürftig)	(0.1)	-	-	(0.1)
	16-19 (schädigend)	(0.2)	-	-	(0.2)
	8-15 (übermässig, riskant)	5.8	8.3	5.6	6.4
	0-7 (unauffällig)	93.8	91.6	94.1	93.3
	<i>N (gewichtet)</i>	8'999	3'027	607	12'633
	N (ungewichtet)	8'055	3'555	1'108	12'718

Fragen: Die zur Schätzung der AUDIT-Scores benutzten Fragen werden separat aufgelistet.

Anmerkungen: Die Antworten zu den zwei ersten Fragen des originalen AUDIT-Tests werden über die detaillierten Fragen zur Konsumhäufigkeit und Menge geschätzt. Gegenüber der dritten Frage des originalen Verfahrens weicht die Schwelle der Anzahl Gläser ab (8 anstatt 6, 2002 und 2007 nur bei Männern). Die AUDIT-Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinenter" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde eine Einteilung in die Kategorie "0-7 (unauffällig)" vorgenommen. Dasselbe gilt für die Personen, die 1997 und 2002 zur Hauptfrage "nie, abstinenter" angegeben haben.

Alcopops wurden nur in der Befragung 2007 erhoben und werden für den Vergleich ausgeschlossen.

Die Einteilung in die vier Risikoklassen entspricht den Empfehlungen zum originalen Verfahren (Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., Monteiro, M.G. (2001), AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for use in primary care (2nd Ed.). Geneva: World Health Organization).

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zu den AUDIT-Fragen.

Spaltenprozent

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Sprachregion

Männer, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	20-40 (behandlungsbedürftig)	-	-	-	(0.3)
	16-19 (schädigend)	0.8	(0.5)	-	0.7
	8-15 (übermässig, riskant)	11.0	13.2	9.9	11.5
	0-7 (unauffällig)	87.9	86.0	89.9	87.6
	N (gewichtet)	6'129	1'963	367	8'459
	N (ungewichtet)	4'899	2'362	610	7'871
2002	20-40 (behandlungsbedürftig)	-	-	-	(0.2)
	16-19 (schädigend)	(0.3)	(0.5)	-	0.3
	8-15 (übermässig, riskant)	10.3	13.0	7.1	10.8
	0-7 (unauffällig)	89.3	85.9	92.9	88.7
	N (gewichtet)	6'407	1'951	370	8'728
	N (ungewichtet)	5'683	1'971	602	8'256
1997	20-40 (behandlungsbedürftig)	(0.3)	-	-	(0.2)
	16-19 (schädigend)	(0.4)	-	-	(0.3)
	8-15 (übermässig, riskant)	10.4	15.6	11.1	11.6
	0-7 (unauffällig)	89.0	84.2	88.4	87.8
	N (gewichtet)	4'370	1'409	268	6'047
	N (ungewichtet)	3'629	1'518	455	5'602

Fragen: Die zur Schätzung der AUDIT-Scores benutzten Fragen werden separat aufgelistet.

Anmerkungen: Die Antworten zu den zwei ersten Fragen des originalen AUDIT-Tests werden über die detaillierten Fragen zur Konsumhäufigkeit und Menge geschätzt. Gegenüber der dritten Frage des originalen Verfahrens weicht die Schwelle der Anzahl Gläser ab (8 anstatt 6, 2002 und 2007 nur bei Männern). Die AUDIT-Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinente" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde eine Einteilung in die Kategorie "0-7 (unauffällig)" vorgenommen. Dasselbe gilt für die Personen, die 1997 und 2002 zur Hauptfrage "nie, abstinente" angegeben haben.

Alcopops wurden nur in der Befragung 2007 erhoben und werden für den Vergleich ausgeschlossen.

Die Einteilung in die vier Risikoklassen entspricht den Empfehlungen zum originalen Verfahren (Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., Monteiro, M.G. (2001), AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for use in primary care (2nd Ed.). Geneva: World Health Organization).

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zu den AUDIT-Fragen.

Spaltenprozent

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkoholprobleme gemäss AUDIT, nach Sprachregion
Frauen, AUDIT-Scores eingeteilt nach Risikoklassen, Vergleich 1997-2007

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	20-40 (behandlungsbedürftig)	-	-	-	(0.1)
	16-19 (schädigend)	-	-	-	(0.1)
	8-15 (übermässig, riskant)	2.4	3.0	(1.6)	2.5
	0-7 (unauffällig)	97.4	96.6	98.1	97.3
	N (gewichtet)	6'479	2'102	428	9'009
	N (ungewichtet)	6'064	3'029	847	9'940
2002	20-40 (behandlungsbedürftig)	-	-	-	-
	16-19 (schädigend)	-	-	-	-
	8-15 (übermässig, riskant)	2.2	2.2	-	2.2
	0-7 (unauffällig)	97.7	97.7	98.0	97.7
	N (gewichtet)	6'911	2'366	459	9'737
	N (ungewichtet)	6'895	2'736	834	10'465
1997	20-40 (behandlungsbedürftig)	-	-	-	-
	16-19 (schädigend)	-	-	-	-
	8-15 (übermässig, riskant)	1.5	1.9	(1.3)	1.6
	0-7 (unauffällig)	98.4	98.0	98.6	98.3
	N (gewichtet)	4'629	1'618	339	6'586
	N (ungewichtet)	4'426	2'037	653	7'116

Fragen: Die zur Schätzung der AUDIT-Scores benutzten Fragen werden separat aufgelistet.

Anmerkungen: Die Antworten zu den zwei ersten Fragen des originalen AUDIT-Tests werden über die detaillierten Fragen zur Konsumhäufigkeit und Menge geschätzt. Gegenüber der dritten Frage des originalen Verfahrens weicht die Schwelle der Anzahl Gläser ab (8 anstatt 6, 2002 und 2007 nur bei Männern). Die AUDIT-Fragen wurden 2007 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken "1-3 mal monatlich", "seltener als monatlich" oder "nie, abstinenter" angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde eine Einteilung in die Kategorie "0-7 (unauffällig)" vorgenommen. Dasselbe gilt für die Personen, die 1997 und 2002 zur Hauptfrage "nie, abstinenter" angegeben haben.

Alcopops wurden nur in der Befragung 2007 erhoben und werden für den Vergleich ausgeschlossen.

Die Einteilung in die vier Risikoklassen entspricht den Empfehlungen zum originalen Verfahren (Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., Monteiro, M.G. (2001), AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for use in primary care (2nd Ed.). Geneva: World Health Organization).

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zu den AUDIT-Fragen.

Spaltenprozent

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Fragen zur Berechnung der AUDIT-Scores:

Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa? und /oder 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?' Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?' *Getränktypen: 'Bier'; 'Wein'; 'suure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.' (AUDIT1 und AUDIT2: Berechnungen für die Testpunkte (je max. 4) gemäss Gmel, G., Heeb, J.-L., Rehm, J. (2001). Is frequency of drinking an indicator of problem drinking? A psychometric analysis of a modified version of the alcohol use disorders identification test in Switzerland. Drug and Alcohol Dependence 64:151–163)

Hat ein Verwandter, ein Freund oder ein Arzt Bedenken geäussert wegen Ihrem Alkoholkonsum oder Ihnen angeraten, den Konsum einzuschränken?

Testpunkte: 0 nein
2 ja, aber nicht im letzten Jahr
4 ja, im letzten Jahr (AUDIT10)

Sind Sie oder jemand anders im Zusammenhang mit Ihrem Alkoholkonsum körperlich verletzt worden?

Testpunkte: 0 nein
2 ja, aber nicht im letzten Jahr
4 ja, im letzten Jahr (AUDIT9)

Wie häufig im letzten Jahr haben Sie 8 Gläser (für Männer) / 6 Gläser (für Frauen) Bier, Wein, Schnaps oder irgendeinen Alkohol auf einmal getrunken?*

Testpunkte: 0 nie
1 weniger als 1 mal im Monat
2 jeden Monat
3 jede Woche
4 jeden Tag oder fast jeden Tag (AUDIT3)

Wie häufig im letzten Jahr haben Sie den Eindruck gehabt, das Sie nicht aufhören können mit Trinken, wenn Sie einmal damit angefangen haben?

Testpunkte: 0 nie
1 weniger als 1 mal im Monat
2 jeden Monat
3 jede Woche
4 jeden Tag oder fast jeden Tag (AUDIT4)

Wie häufig im letzten Jahr sind Sie wegen dem Trinken nicht fähig gewesen, das zu machen, was normalerweise von Ihnen erwartet wird?

Testpunkte: 0 nie
1 weniger als 1 mal im Monat
2 jeden Monat
3 jede Woche
4 jeden Tag oder fast jeden Tag (AUDIT5)

Wie häufig im letzten Jahr haben Sie am Morgen Alkohol getrunken, um wieder in Schwung zu kommen nach ein paar Gläsern zuviel am Abend vorher?

Testpunkte: 0 nie
1 weniger als 1 mal im Monat
2 jeden Monat
3 jede Woche
4 jeden Tag oder fast jeden Tag (AUDIT6)

Wie häufig im letzten Jahr haben Sie sich nicht mehr an das erinnern können, was in der Nacht vorher passiert ist, weil Sie getrunken haben?

Testpunkte: 0 nie
1 weniger als 1 mal im Monat
2 jeden Monat
3 jede Woche
4 jeden Tag oder fast jeden Tag (AUDIT8)


Wie häufig im letzten Jahr haben Sie Schuldgefühle oder Gewissensbisse gehabt wegen Ihrem Alkoholkonsum?

Testpunkte: 0 nie
1 weniger als 1 mal im Monat
2 jeden Monat
3 jede Woche
4 jeden Tag oder fast jeden Tag (AUDIT7)

*Gegenüber dem originalen Verfahren weicht die Schwelle der Anzahl Gläser ab (8 anstatt 6, 2002 und 2007 nur bei Männern)

MEDIKAMENTE

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007



Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'

Anmerkung: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007

Schlafmittel		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	-	(0.4)	1.1	2.2	3.2	6.3	13.4	2.8
	mehrmals pro Woche	-	-	(0.6)	1.3	1.5	2.6	3.1	1.2
	etwa einmal pro Woche	-	(0.7)	(0.9)	1.1	2.0	2.4	2.6	1.3
	nie	99.5	98.5	97.4	95.4	93.4	88.6	80.8	94.8
	N (gewichtet)	2'853	2'871	3'685	3'213	2'703	1'848	1'525	18'699
	N (ungewichtet)	1'807	2'503	3'805	2'999	3'112	2'491	1'997	18'714
2002	täglich	-	(0.3)	0.7	1.9	2.2	5.3	11.4	2.3
	mehrmals pro Woche	-	-	(0.5)	0.9	1.0	2.1	3.4	0.9
	etwa einmal pro Woche	-	(0.3)	(0.4)	(0.6)	1.3	2.1	2.8	0.9
	nie	99.5	99.3	98.4	96.6	95.5	90.5	82.5	95.9
	N (gewichtet)	2'754	3'362	3'930	3'249	2'730	2'100	1'550	19'676
	N (ungewichtet)	1'695	3'020	4'199	3'173	3'240	2'533	1'820	19'680
1997	täglich	-	(0.7)	(0.6)	1.6	3.7	6.9	17.3	3.1
	mehrmals pro Woche	-	(0.3)	(0.7)	1.3	1.6	3.1	3.9	1.2
	etwa einmal pro Woche	-	(0.4)	(0.6)	(1.1)	(1.0)	2.0	3.3	1.0
	nie	99.5	98.6	98.2	96.0	93.7	87.9	75.5	94.6
	N (gewichtet)	1'785	2'502	2'466	2'195	1'638	1'391	1'014	12'992
	N (ungewichtet)	1'411	2'867	2'509	1'957	1'682	1'511	1'058	12'995
1992	täglich	-	-	(0.8)	2.1	3.9	6.8	17.9	2.9
	mehrmals pro Woche	-	(0.3)	(0.3)	(1.2)	1.8	2.2	4.1	1.1
	etwa einmal pro Woche	-	(0.3)	(0.7)	1.0	1.6	1.8	3.9	1.0
	nie	99.3	99.2	98.2	95.7	92.7	89.1	74.1	95.0
	N (gewichtet)	2'302	3'185	2'777	2'526	1'797	1'767	914	15'267
	N (ungewichtet)	1'802	3'541	2'868	2'397	2'000	1'707	955	15'270

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007

Schlafmittel		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	-	-	(0.8)	(2.0)	2.7	4.4	8.1	1.9
	mehrmals pro Woche	-	-	-	-	(1.2)	(2.3)	(2.1)	0.8
	etwa einmal pro Woche	-	-	(0.9)	(0.7)	(1.2)	(1.3)	(1.8)	0.9
	nie	99.5	98.5	97.8	96.9	95.0	92.0	88.0	96.4
	N (gewichtet)	1'464	1'416	1'841	1'608	1'340	860	600	9'128
	N (ungewichtet)	918	1'126	1'774	1'416	1'398	1'008	758	8'398
2002	täglich	-	-	(0.4)	(1.1)	1.5	3.2	8.7	1.3
	mehrmals pro Woche	-	-	-	(0.6)	(0.8)	(1.6)	(2.0)	0.6
	etwa einmal pro Woche	-	-	-	-	(1.0)	(1.5)	(3.0)	0.7
	nie	99.1	99.8	98.8	98.0	96.7	93.7	86.3	97.3
	N (gewichtet)	1'400	1'661	1'983	1'634	1'350	898	583	9'509
	N (ungewichtet)	852	1'361	2'057	1'447	1'407	1'064	707	8'895
1997	täglich	-	-	-	(1.3)	(2.0)	(3.9)	13.4	1.8
	mehrmals pro Woche	-	-	-	-	(1.0)	(2.0)	-	0.8
	etwa einmal pro Woche	-	-	(0.7)	-	-	(2.3)	-	0.7
	nie	99.7	99.2	98.5	97.2	96.7	91.9	81.7	96.7
	N (gewichtet)	900	1'241	1'245	1'090	812	596	367	6'251
	N (ungewichtet)	685	1'349	1'155	895	731	587	356	5'758
1992	täglich	-	-	(0.7)	(0.9)	2.9	4.6	9.6	1.7
	mehrmals pro Woche	-	-	-	-	(1.4)	(1.3)	(2.7)	0.7
	etwa einmal pro Woche	-	-	-	-	-	-	-	0.6
	nie	99.3	99.7	98.5	97.4	94.7	92.9	85.0	96.9
	N (gewichtet)	1'164	1'535	1'370	1'208	858	823	388	7'347
	N (ungewichtet)	857	1'641	1'391	1'090	858	676	332	6'845

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.


Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007

Schlafmittel		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	-	-	(1.4)	2.4	3.7	8.0	16.9	3.8
	mehrmals pro Woche	-	-	(0.6)	(2.2)	1.8	2.9	3.8	1.5
	etwa einmal pro Woche	-	-	(0.9)	(1.5)	2.7	3.4	3.2	1.6
	nie	99.5	98.6	97.0	93.9	91.9	85.7	76.1	93.2
	N (gewichtet)	1'389	1'456	1'844	1'606	1'363	988	925	9'571
	N (ungewichtet)	889	1'377	2'031	1'583	1'714	1'483	1'239	10'316
2002	täglich	-	(0.5)	(1.1)	2.7	2.9	6.8	13.0	3.2
	mehrmals pro Woche	-	-	(0.5)	(1.1)	(1.1)	2.5	4.2	1.2
	etwa einmal pro Woche	-	-	(0.4)	(1.0)	(1.6)	2.6	2.7	1.1
	nie	99.8	98.9	98.0	95.2	94.3	88.1	80.2	94.6
	N (gewichtet)	1'355	1'701	1'947	1'615	1'381	1'202	967	10'167
	N (ungewichtet)	843	1'659	2'142	1'726	1'833	1'469	1'113	10'785
1997	täglich	-	(0.9)	(1.1)	(1.9)	5.4	9.2	19.5	4.3
	mehrmals pro Woche	-	-	(0.7)	(1.7)	(2.1)	3.9	4.8	1.7
	etwa einmal pro Woche	-	(0.7)	-	(1.5)	(1.7)	(1.9)	(3.8)	1.3
	nie	99.3	98.0	97.8	94.9	90.8	85.0	71.9	92.7
	N (gewichtet)	885	1'261	1'221	1'104	826	795	647	6'741
	N (ungewichtet)	726	1'518	1'354	1'062	951	924	702	7'237
1992	täglich	-	-	(0.8)	3.2	4.9	8.8	24.0	4.0
	mehrmals pro Woche	-	-	-	(1.2)	(2.1)	3.0	5.1	1.3
	etwa einmal pro Woche	-	-	(1.0)	(1.5)	(2.2)	(2.4)	(4.8)	1.4
	nie	99.3	98.8	98.0	94.1	90.7	85.8	66.1	93.3
	N (gewichtet)	1'138	1'649	1'407	1'318	939	944	525	7'920
	N (ungewichtet)	945	1'900	1'477	1'307	1'142	1'031	623	8'425

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007



Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 2.5% werden nicht berichtet.

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007

Schlafmittel		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	2.4	3.7	4.4	2.8
	mehrmals pro Woche	1.0	1.6	(0.8)	1.2
	etwa einmal pro Woche	1.2	1.5	(1.3)	1.3
	nie	95.4	93.2	93.5	94.8
	<i>N (gewichtet)</i>	13'452	4'397	850	18'699
	N (ungewichtet)	11'466	5'713	1'535	18'714
2002	täglich	1.8	3.6	3.5	2.3
	mehrmals pro Woche	0.8	1.2	(1.7)	0.9
	etwa einmal pro Woche	0.8	1.0	(1.4)	0.9
	nie	96.6	94.2	93.4	95.9
	<i>N (gewichtet)</i>	14'206	4'563	906	19'676
	N (ungewichtet)	13'201	4'930	1'549	19'680
1997	täglich	2.5	4.4	5.3	3.1
	mehrmals pro Woche	1.2	1.4	(1.3)	1.2
	etwa einmal pro Woche	0.9	1.4	(1.1)	1.0
	nie	95.4	92.8	92.3	94.6
	<i>N (gewichtet)</i>	9'285	3'084	622	12'992
	N (ungewichtet)	8'255	3'609	1'131	12'995
1992	täglich	2.1	5.3	4.2	2.9
	mehrmals pro Woche	0.9	1.4	(1.2)	1.1
	etwa einmal pro Woche	0.9	1.4	(0.9)	1.0
	nie	96.1	92.0	93.8	95.0
	<i>N (gewichtet)</i>	10'965	3'585	716	15'267
	N (ungewichtet)	10'332	4'108	830	15'270

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007

Schlafmittel		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	1.6	2.5	(3.2)	1.9
	mehrmals pro Woche	0.7	1.0	-	0.8
	etwa einmal pro Woche	0.8	1.2	-	0.9
	nie	96.9	95.3	95.0	96.4
	<i>N (gewichtet)</i>	6'577	2'152	399	9'128
	N (ungewichtet)	5'190	2'550	658	8'398
2002	täglich	0.9	2.4	(3.0)	1.3
	mehrmals pro Woche	0.5	(1.0)	(1.3)	0.6
	etwa einmal pro Woche	0.7	(0.7)	-	0.7
	nie	97.9	95.9	94.9	97.3
	<i>N (gewichtet)</i>	6'977	2'108	424	9'509
	N (ungewichtet)	6'099	2'116	680	8'895
1997	täglich	1.4	2.8	(3.3)	1.8
	mehrmals pro Woche	(0.7)	(1.1)	-	0.8
	etwa einmal pro Woche	(0.6)	(1.2)	-	0.7
	nie	97.4	94.9	95.1	96.7
	<i>N (gewichtet)</i>	4'533	1'441	277	6'251
	N (ungewichtet)	3'740	1'549	469	5'758
1992	täglich	1.1	3.2	(3.8)	1.7
	mehrmals pro Woche	0.6	(1.2)	-	0.7
	etwa einmal pro Woche	(0.5)	(0.8)	-	0.6
	nie	97.7	94.7	95.4	96.9
	<i>N (gewichtet)</i>	5'307	1'702	338	7'347
	N (ungewichtet)	4'664	1'847	334	6'845

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.


Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007

Schlafmittel		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	3.3	4.9	5.4	3.8
	mehrmals pro Woche	1.4	2.1	-	1.5
	etwa einmal pro Woche	1.5	1.8	(1.8)	1.6
	nie	93.9	91.1	92.2	93.2
	<i>N (gewichtet)</i>	6'875	2'245	451	9'571
	N (ungewichtet)	6'276	3'163	877	10'316
2002	täglich	2.6	4.7	3.9	3.2
	mehrmals pro Woche	1.1	1.4	(2.0)	1.2
	etwa einmal pro Woche	1.0	1.2	(2.0)	1.1
	nie	95.4	92.7	92.1	94.6
	<i>N (gewichtet)</i>	7'230	2'455	483	10'167
	N (ungewichtet)	7'102	2'814	869	10'785
1997	täglich	3.6	5.8	6.8	4.3
	mehrmals pro Woche	1.7	1.7	(1.8)	1.7
	etwa einmal pro Woche	1.2	1.6	-	1.3
	nie	93.5	90.9	90.2	92.7
	<i>N (gewichtet)</i>	4'753	1'643	345	6'741
	N (ungewichtet)	4'515	2'060	662	7'237
1992	täglich	3.0	7.1	(4.6)	4.0
	mehrmals pro Woche	1.2	1.6	-	1.3
	etwa einmal pro Woche	1.2	1.8	-	1.4
	nie	94.6	89.4	92.2	93.3
	<i>N (gewichtet)</i>	5'659	1'884	378	7'920
	N (ungewichtet)	5'668	2'261	496	8'425

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Beruhigungsmittelaufnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007



Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 2.5% werden nicht berichtet.

Häufigkeit der Beruhigungsmittleinnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007

Beruhigungsmittel		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	täglich	(0.6)	1.2	2.0	2.7	4.3	4.2	5.1	2.6
	mehrmals pro Woche	-	(0.4)	(0.4)	(0.9)	1.2	1.2	1.9	0.8
	etwa einmal pro Woche	(0.9)	(0.3)	(0.5)	(1.0)	1.2	1.5	2.3	1.0
	nie	98.5	98.1	97.0	95.3	93.3	93.2	90.7	95.7
	<i>N (gewichtet)</i>	2'853	2'871	3'685	3'206	2'702	1'849	1'527	18'692
	<i>N (ungewichtet)</i>	1'807	2'502	3'804	2'995	3'113	2'489	1'996	18'706
2002	täglich	(0.4)	1.1	2.0	2.8	3.8	4.3	4.3	2.4
	mehrmals pro Woche	-	(0.5)	(0.3)	(0.6)	0.9	(1.2)	(1.6)	0.7
	etwa einmal pro Woche	-	(0.3)	(0.3)	(0.7)	1.1	(1.3)	(1.6)	0.7
	nie	98.8	98.1	97.5	95.8	94.3	93.3	92.5	96.2
	<i>N (gewichtet)</i>	2'754	3'361	3'930	3'248	2'731	2'101	1'547	19'672
	<i>N (ungewichtet)</i>	1'695	3'019	4'198	3'172	3'241	2'534	1'815	19'674
1997	täglich	-	1.5	1.8	3.2	3.8	3.6	5.6	2.6
	mehrmals pro Woche	-	(0.3)	(1.0)	(0.9)	(1.4)	(0.9)	(2.1)	0.9
	etwa einmal pro Woche	-	(0.4)	(0.7)	(0.7)	(0.6)	(2.0)	(2.2)	0.8
	nie	98.8	97.8	96.5	95.2	94.1	93.4	90.1	95.7
	<i>N (gewichtet)</i>	1'785	2'502	2'465	2'197	1'638	1'391	1'013	12'991
	<i>N (ungewichtet)</i>	1'411	2'867	2'508	1'958	1'681	1'511	1'057	12'993
1992	täglich	(1.1)	1.4	1.5	2.7	4.3	5.1	6.7	2.7
	mehrmals pro Woche	(0.8)	(0.4)	(0.3)	(0.7)	(1.2)	(1.4)	(1.9)	0.8
	etwa einmal pro Woche	-	(0.6)	(0.4)	(0.4)	(1.2)	(0.7)	(2.4)	0.7
	nie	97.8	97.6	97.7	96.3	93.4	92.7	88.9	95.9
	<i>N (gewichtet)</i>	2'302	3'185	2'777	2'526	1'797	1'767	917	15'271
	<i>N (ungewichtet)</i>	1'802	3'541	2'868	2'397	2'000	1'707	956	15'271

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Beruhigungsmittelleinnahme, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007

Beruhigungsmittel		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	-	(1.0)	1.8	1.9	3.7	2.9	(3.3)	2.0
	mehrmals pro Woche	-	-	-	(0.7)	(1.0)	-	(2.2)	0.6
	etwa einmal pro Woche	-	-	-	-	(0.7)	(0.8)	(2.1)	0.7
	nie	98.5	98.3	97.3	96.7	94.6	95.7	92.4	96.7
	N (gewichtet)	1'464	1'416	1'841	1'601	1'337	859	600	9'118
	N (ungewichtet)	918	1'126	1'773	1'413	1'398	1'007	758	8'393
2002	täglich	-	(0.7)	(1.4)	2.2	2.6	3.7	(3.8)	1.8
	mehrmals pro Woche	-	-	(0.4)	-	-	-	-	0.5
	etwa einmal pro Woche	-	-	-	-	(1.0)	(1.4)	-	0.5
	nie	98.7	98.8	98.0	97.2	95.9	94.0	94.3	97.2
	N (gewichtet)	1'400	1'661	1'983	1'634	1'350	898	582	9'507
	N (ungewichtet)	852	1'360	2'057	1'447	1'408	1'064	705	8'893
1997	täglich	-	(1.3)	(1.8)	(1.7)	(2.7)	-	(2.6)	1.6
	mehrmals pro Woche	-	-	-	-	-	-	-	0.6
	etwa einmal pro Woche	-	-	-	-	-	(2.6)	-	0.7
	nie	99.2	98.1	96.7	97.4	95.9	96.2	93.6	97.1
	N (gewichtet)	900	1'241	1'245	1'090	812	596	367	6'251
	N (ungewichtet)	685	1'349	1'155	895	731	587	356	5'758
1992	täglich	(1.1)	(1.2)	(1.2)	(1.4)	3.4	(2.7)	(4.9)	1.8
	mehrmals pro Woche	-	-	-	-	-	-	-	0.6
	etwa einmal pro Woche	-	-	-	-	-	-	-	0.6
	nie	98.0	97.8	98.1	97.5	95.0	95.6	92.7	97.0
	N (gewichtet)	1'164	1'535	1'370	1'208	858	823	388	7'347
	N (ungewichtet)	857	1'641	1'391	1'090	858	676	332	6'845

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozentage
Prozentage werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.


Häufigkeit der Beruhigungsmiteleinnahme, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007

Beruhigungsmittel		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	-	(1.5)	2.3	3.5	4.9	5.2	6.2	3.1
	mehrmals pro Woche	-	-	(0.4)	(1.2)	(1.3)	(1.7)	(1.7)	0.9
	etwa einmal pro Woche	-	-	(0.6)	(1.4)	(1.7)	(2.1)	(2.5)	1.3
	nie	98.4	97.8	96.7	94.0	92.0	91.0	89.7	94.7
	<i>N (gewichtet)</i>	1'389	1'455	1'844	1'604	1'365	989	926	9'574
	<i>N (ungewichtet)</i>	889	1'376	2'031	1'582	1'715	1'482	1'238	10'313
2002	täglich	-	(1.5)	2.5	3.4	4.9	4.7	4.6	3.0
	mehrmals pro Woche	-	-	-	(1.1)	(1.3)	(1.5)	(1.7)	0.9
	etwa einmal pro Woche	-	-	-	(1.1)	(1.1)	(1.2)	(2.2)	0.9
	nie	98.9	97.3	96.9	94.4	92.7	92.7	91.5	95.3
	<i>N (gewichtet)</i>	1'355	1'701	1'947	1'614	1'381	1'203	966	10'165
	<i>N (ungewichtet)</i>	843	1'659	2'141	1'725	1'833	1'470	1'110	10'781
1997	täglich	-	(1.8)	(1.8)	4.7	4.8	5.7	7.4	3.5
	mehrmals pro Woche	-	-	(1.4)	(1.3)	(2.0)	(1.4)	(2.1)	1.2
	etwa einmal pro Woche	-	-	-	(1.0)	-	(1.6)	(2.4)	1.0
	nie	98.3	97.4	96.3	93.0	92.4	91.4	88.1	94.4
	<i>N (gewichtet)</i>	885	1'261	1'219	1'107	826	795	645	6'740
	<i>N (ungewichtet)</i>	726	1'518	1'353	1'063	950	924	701	7'235
1992	täglich	(1.1)	(1.5)	1.8	3.8	5.1	7.3	8.0	3.4
	mehrmals pro Woche	(1.0)	(0.5)	-	(0.6)	(1.6)	(1.8)	(2.9)	1.0
	etwa einmal pro Woche	-	(0.5)	-	-	(1.5)	-	(2.9)	0.8
	nie	97.6	97.5	97.3	95.1	91.8	90.1	86.2	94.8
	<i>N (gewichtet)</i>	1'138	1'649	1'407	1'318	939	944	529	7'924
	<i>N (ungewichtet)</i>	945	1'900	1'477	1'307	1'142	1'031	624	8'426

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Beruhigungsmittelaufnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007



Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 2.5% werden nicht berichtet.

Häufigkeit der Beruhigungsmittleinnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007

Beruhigungsmittel		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	2.0	4.0	3.9	2.6
	mehrmals pro Woche	0.6	1.0	(1.2)	0.8
	etwa einmal pro Woche	0.8	1.6	(0.7)	1.0
	nie	96.5	93.4	94.2	95.7
	<i>N (gewichtet)</i>	13'449	4'393	850	18'692
	N (ungewichtet)	11'466	5'705	1'535	18'706
2002	täglich	1.6	4.9	3.0	2.4
	mehrmals pro Woche	0.6	0.9	(0.9)	0.7
	etwa einmal pro Woche	0.7	0.8	(0.9)	0.7
	nie	97.2	93.4	95.2	96.2
	<i>N (gewichtet)</i>	14'206	4'561	906	19'672
	N (ungewichtet)	13'199	4'927	1'548	19'674
1997	täglich	1.9	4.0	5.1	2.6
	mehrmals pro Woche	0.7	1.2	(1.4)	0.9
	etwa einmal pro Woche	0.8	1.2	-	0.8
	nie	96.6	93.6	93.0	95.7
	<i>N (gewichtet)</i>	9'288	3'081	622	12'991
	N (ungewichtet)	8'255	3'607	1'131	12'993
1992	täglich	2.2	4.0	3.7	2.7
	mehrmals pro Woche	0.6	1.2	(1.2)	0.8
	etwa einmal pro Woche	0.5	1.1	-	0.7
	nie	96.7	93.7	94.6	95.9
	<i>N (gewichtet)</i>	10'969	3'586	716	15'271
	N (ungewichtet)	10'333	4'108	830	15'271

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Beruhigungsmiteleinnahme, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007

Beruhigungsmittel		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	1.7	2.8	(2.4)	2.0
	mehrmals pro Woche	(0.5)	1.0	-	0.6
	etwa einmal pro Woche	(0.5)	1.3	-	0.7
	nie	97.3	95.0	95.8	96.7
	<i>N (gewichtet)</i>	6'569	2'150	399	9'118
	N (ungewichtet)	5'188	2'547	658	8'393
2002	täglich	1.2	3.8	(1.2)	1.8
	mehrmals pro Woche	(0.4)	(0.7)	-	0.5
	etwa einmal pro Woche	(0.5)	-	-	0.5
	nie	97.9	95.1	97.0	97.2
	<i>N (gewichtet)</i>	6'977	2'107	424	9'507
	N (ungewichtet)	6'099	2'114	680	8'893
1997	täglich	1.2	2.7	(3.0)	1.6
	mehrmals pro Woche	(0.4)	(0.9)	-	0.6
	etwa einmal pro Woche	(0.6)	(1.1)	-	0.7
	nie	97.7	95.3	96.5	97.1
	<i>N (gewichtet)</i>	4'533	1'441	277	6'251
	N (ungewichtet)	3'740	1'549	469	5'758
1992	täglich	1.4	3.0	(2.7)	1.8
	mehrmals pro Woche	(0.4)	(0.8)	-	0.6
	etwa einmal pro Woche	(0.4)	(1.1)	-	0.6
	nie	97.7	95.1	95.7	97.0
	<i>N (gewichtet)</i>	5'307	1'702	338	7'347
	N (ungewichtet)	4'664	1'847	334	6'845

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.


Häufigkeit der Beruhigungsmiteleinnahme, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007

Beruhigungsmittel		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	2.3	5.2	5.2	3.1
	mehrmals pro Woche	0.8	1.1	(1.3)	0.9
	etwa einmal pro Woche	1.1	1.8	-	1.3
	nie	95.7	91.9	92.8	94.7
	<i>N (gewichtet)</i>	6'881	2'243	451	9'574
	N (ungewichtet)	6'278	3'158	877	10'313
2002	täglich	1.9	5.8	4.6	3.0
	mehrmals pro Woche	0.8	1.1	-	0.9
	etwa einmal pro Woche	0.8	1.1	(1.1)	0.9
	nie	96.5	92.0	93.6	95.3
	<i>N (gewichtet)</i>	7'229	2'454	482	10'165
	N (ungewichtet)	7'100	2'813	868	10'781
1997	täglich	2.6	5.2	6.7	3.5
	mehrmals pro Woche	1.0	1.5	(2.1)	1.2
	etwa einmal pro Woche	0.9	(1.2)	-	1.0
	nie	95.5	92.1	90.3	94.4
	<i>N (gewichtet)</i>	4'755	1'640	345	6'740
	N (ungewichtet)	4'515	2'058	662	7'235
1992	täglich	2.9	4.9	(4.6)	3.4
	mehrmals pro Woche	0.8	1.6	-	1.0
	etwa einmal pro Woche	0.6	(1.2)	-	0.8
	nie	95.7	92.4	93.6	94.8
	<i>N (gewichtet)</i>	5'662	1'884	378	7'924
	N (ungewichtet)	5'669	2'261	496	8'426

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007



Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 2.5% werden nicht berichtet.

Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007

Schmerzmittel		Altersgruppe							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	täglich	2.5	3.3	4.4	5.9	7.9	8.3	13.1	5.8
	mehrmals pro Woche	3.1	5.0	5.1	6.5	5.3	6.8	8.3	5.5
	etwa einmal pro Woche	8.3	9.9	10.2	9.3	8.4	6.8	7.4	8.9
	nie	86.1	81.8	80.3	78.4	78.4	78.1	71.2	79.9
	<i>N (gewichtet)</i>	2'853	2'871	3'685	3'207	2'705	1'848	1'528	18'697
	<i>N (ungewichtet)</i>	1'807	2'502	3'804	2'996	3'112	2'490	2'000	18'711
2002	täglich	2.3	2.9	3.9	4.4	5.1	5.6	8.7	4.3
	mehrmals pro Woche	2.4	4.4	4.2	4.4	4.6	5.1	4.9	4.2
	etwa einmal pro Woche	6.9	6.6	6.9	5.2	4.4	5.8	5.9	6.0
	nie	88.4	86.1	85.0	86.1	85.9	83.6	80.5	85.5
	<i>N (gewichtet)</i>	2'754	3'357	3'928	3'245	2'726	2'101	1'548	19'659
	<i>N (ungewichtet)</i>	1'694	3'017	4'198	3'168	3'238	2'534	1'817	19'666
1997	täglich	2.9	2.1	3.6	3.5	3.8	6.2	11.4	4.1
	mehrmals pro Woche	4.0	3.9	5.4	6.7	4.9	3.8	5.4	4.9
	etwa einmal pro Woche	8.8	8.5	9.3	7.2	6.3	5.5	5.4	7.7
	nie	84.3	85.4	81.7	82.5	84.9	84.5	77.7	83.3
	<i>N (gewichtet)</i>	1'785	2'502	2'466	2'197	1'638	1'391	1'014	12'994
	<i>N (ungewichtet)</i>	1'411	2'867	2'509	1'958	1'682	1'511	1'057	12'995
1992	täglich	3.7	3.7	3.5	3.4	5.6	4.7	7.9	4.2
	mehrmals pro Woche	2.5	3.2	2.8	3.7	3.5	3.2	4.3	3.2
	etwa einmal pro Woche	5.4	5.6	5.1	4.9	4.2	4.0	5.5	5.0
	nie	88.3	87.6	88.7	88.0	86.7	88.1	82.2	87.6
	<i>N (gewichtet)</i>	2'302	3'185	2'777	2'526	1'797	1'767	918	15'272
	<i>N (ungewichtet)</i>	1'802	3'541	2'869	2'397	2'000	1'707	956	15'272

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007

Schmerzmittel		Altersgruppe							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	(2.2)	3.2	3.8	4.7	7.3	6.3	7.2	4.6
	mehrmals pro Woche	(2.1)	3.4	3.7	4.6	4.7	5.1	6.5	4.0
	etwa einmal pro Woche	6.7	8.7	8.3	7.0	5.8	5.1	6.3	7.1
	nie	89.0	84.7	84.2	83.7	82.3	83.5	80.0	84.3
	N (gewichtet)	1'464	1'416	1'841	1'602	1'338	857	601	9'118
	N (ungewichtet)	918	1'126	1'774	1'414	1'397	1'006	759	8'394
2002	täglich	(1.7)	2.7	4.0	3.2	4.4	3.8	5.6	3.4
	mehrmals pro Woche	(1.3)	2.6	2.9	2.7	3.8	4.3	(3.5)	2.9
	etwa einmal pro Woche	5.2	4.1	4.9	4.0	3.9	4.3	5.3	4.5
	nie	91.8	90.7	88.2	90.1	87.9	87.6	85.6	89.2
	N (gewichtet)	1'400	1'659	1'983	1'634	1'347	898	582	9'502
	N (ungewichtet)	852	1'359	2'057	1'447	1'405	1'063	705	8'888
1997	täglich	(2.6)	(1.5)	3.7	(2.4)	(2.7)	(3.5)	(7.7)	3.0
	mehrmals pro Woche	(3.4)	3.8	3.5	4.9	(3.8)	(3.2)	(4.1)	3.8
	etwa einmal pro Woche	7.2	6.9	7.1	5.0	5.0	6.3	(3.3)	6.1
	nie	86.8	87.9	85.7	87.7	88.5	87.0	84.9	87.1
	N (gewichtet)	900	1'241	1'245	1'090	812	596	368	6'252
	N (ungewichtet)	685	1'349	1'155	895	731	587	357	5'759
1992	täglich	3.8	3.4	3.0	2.8	6.5	(4.4)	(5.3)	3.9
	mehrmals pro Woche	(1.7)	2.2	1.9	(2.9)	(1.8)	(2.9)	(2.4)	2.2
	etwa einmal pro Woche	5.2	3.8	4.0	3.4	(3.0)	(2.9)	(3.6)	3.8
	nie	89.3	90.6	91.1	90.9	88.7	89.8	88.8	90.1
	N (gewichtet)	1'164	1'535	1'370	1'208	858	823	389	7'348
	N (ungewichtet)	857	1'641	1'392	1'090	858	676	332	6'846

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.


Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007

Schmerzmittel		Altersgruppe							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	täglich	2.8	3.3	5.0	7.0	8.5	10.0	16.9	6.9
	mehrmals pro Woche	4.2	6.6	6.4	8.4	5.9	8.2	9.5	6.9
	etwa einmal pro Woche	9.9	11.0	12.2	11.6	10.9	8.3	8.2	10.6
	nie	83.2	79.0	76.5	73.0	74.7	73.4	65.5	75.6
	<i>N gewichtet</i>	1'389	1'455	1'844	1'605	1'367	991	928	9'579
	N (ungewichtet)	889	1'376	2'030	1'582	1'715	1'484	1'241	10'317
2002	täglich	(3.0)	3.1	3.7	5.6	5.9	6.9	10.6	5.1
	mehrmals pro Woche	3.6	6.2	5.5	6.1	5.3	5.6	5.7	5.5
	etwa einmal pro Woche	8.6	9.0	8.9	6.4	4.8	6.9	6.3	7.4
	nie	84.8	81.7	81.9	82.0	84.0	80.6	77.4	82.0
	<i>N gewichtet</i>	1'354	1'698	1'946	1'611	1'380	1'203	966	10'158
	N (ungewichtet)	842	1'658	2'141	1'721	1'833	1'471	1'112	10'778
1997	täglich	(3.3)	2.8	3.5	4.6	4.9	8.2	13.6	5.2
	mehrmals pro Woche	4.6	4.0	7.3	8.5	6.1	4.4	6.2	5.9
	etwa einmal pro Woche	10.4	10.2	11.7	9.4	7.5	4.9	6.6	9.1
	nie	81.7	83.0	77.6	77.5	81.4	82.5	73.6	79.8
	<i>N gewichtet</i>	885	1'261	1'221	1'107	826	796	646	6'742
	N (ungewichtet)	726	1'518	1'354	1'063	951	924	700	7'236
1992	täglich	3.7	3.9	3.9	3.9	4.8	5.0	9.9	4.5
	mehrmals pro Woche	3.4	4.1	3.6	4.5	5.0	3.3	5.8	4.1
	etwa einmal pro Woche	5.7	7.2	6.1	6.4	5.3	5.1	7.0	6.2
	nie	87.3	84.8	86.3	85.2	84.8	86.6	77.4	85.2
	<i>N gewichtet</i>	1'138	1'649	1'407	1'318	939	944	529	7'924
	N (ungewichtet)	945	1'900	1'477	1'307	1'142	1'031	624	8'426

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007



Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Prozente werden gewichtet berechnet.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007

Schmerzmittel		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	5.0	8.2	6.3	5.8
	mehrmals pro Woche	5.3	6.2	4.9	5.5
	etwa einmal pro Woche	8.4	10.8	6.8	8.9
	nie	81.4	74.8	82.1	79.9
	<i>N (gewichtet)</i>	13'450	4'396	850	18'697
	N (ungewichtet)	11'464	5'711	1'536	18'711
2002	täglich	3.6	6.5	4.7	4.3
	mehrmals pro Woche	3.6	5.6	6.2	4.2
	etwa einmal pro Woche	5.4	8.0	5.0	6.0
	nie	87.4	79.9	84.1	85.5
	<i>N (gewichtet)</i>	14'192	4'561	906	19'659
	N (ungewichtet)	13'189	4'928	1'549	19'666
1997	täglich	3.6	5.6	4.7	4.1
	mehrmals pro Woche	4.2	6.9	6.2	4.9
	etwa einmal pro Woche	7.0	9.6	7.2	7.7
	nie	85.2	77.9	82.0	83.3
	<i>N (gewichtet)</i>	9'289	3'084	621	12'994
	N (ungewichtet)	8'256	3'609	1'130	12'995
1992	täglich	3.8	5.3	5.2	4.2
	mehrmals pro Woche	2.7	4.6	(2.8)	3.2
	etwa einmal pro Woche	4.9	5.9	(3.0)	5.0
	nie	88.6	84.2	89.1	87.6
	<i>N (gewichtet)</i>	10'968	3'588	716	15'272
	N (ungewichtet)	10'332	4'110	830	15'272

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007

Schmerzmittel		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	4.1	6.2	4.8	4.6
	mehrmals pro Woche	3.8	4.5	4.0	4.0
	etwa einmal pro Woche	6.8	8.4	4.8	7.1
	nie	85.3	80.9	86.5	84.3
	<i>N (gewichtet)</i>	6'569	2'149	400	9'118
	N (ungewichtet)	5'187	2'547	660	8'394
2002	täglich	2.8	5.5	(3.5)	3.4
	mehrmals pro Woche	2.6	3.5	4.2	2.9
	etwa einmal pro Woche	4.1	6.0	(3.5)	4.5
	nie	90.5	85.0	88.8	89.2
	<i>N (gewichtet)</i>	6'971	2'107	423	9'502
	N (ungewichtet)	6'094	2'115	679	8'888
1997	täglich	2.6	4.3	(2.3)	3.0
	mehrmals pro Woche	3.3	5.1	(5.9)	3.8
	etwa einmal pro Woche	5.5	8.1	(6.3)	6.1
	nie	88.7	82.4	85.5	87.1
	<i>N (gewichtet)</i>	4'534	1'441	277	6'252
	N (ungewichtet)	3'741	1'549	469	5'759
1992	täglich	3.4	4.9	(6.3)	3.9
	mehrmals pro Woche	1.9	3.1	(2.8)	2.2
	etwa einmal pro Woche	3.7	4.2	-	3.8
	nie	91.0	87.8	88.7	90.1
	<i>N (gewichtet)</i>	5'306	1'704	338	7'348
	N (ungewichtet)	4'663	1'849	334	6'846

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.


Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2007

Schmerzmittel		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	täglich	5.9	10.1	7.6	6.9
	mehrmals pro Woche	6.6	7.9	5.7	6.9
	etwa einmal pro Woche	9.9	13.1	8.5	10.6
	nie	77.6	68.9	78.2	75.6
	<i>N (gewichtet)</i>	6'881	2'247	450	9'579
	N (ungewichtet)	6'277	3'164	876	10'317
2002	täglich	4.3	7.3	5.7	5.1
	mehrmals pro Woche	4.6	7.5	7.9	5.5
	etwa einmal pro Woche	6.8	9.7	6.3	7.4
	nie	84.3	75.5	80.0	82.0
	<i>N (gewichtet)</i>	7'221	2'454	483	10'158
	N (ungewichtet)	7'095	2'813	870	10'778
1997	täglich	4.6	6.7	6.7	5.2
	mehrmals pro Woche	5.0	8.4	6.4	5.9
	etwa einmal pro Woche	8.5	10.9	7.8	9.1
	nie	81.9	74.0	79.1	79.8
	<i>N (gewichtet)</i>	4'755	1'643	344	6'742
	N (ungewichtet)	4'515	2'060	661	7'236
1992	täglich	4.2	5.6	(4.1)	4.5
	mehrmals pro Woche	3.5	6.0	(2.7)	4.1
	etwa einmal pro Woche	5.9	7.3	(3.8)	6.2
	nie	86.3	81.0	89.4	85.2
	<i>N (gewichtet)</i>	5'662	1'884	378	7'924
	N (ungewichtet)	5'669	2'261	496	8'426

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007



Frage: 1992-2002 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?' 2007 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'

Anmerkungen: Prozente werden gewichtet berechnet.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007

Schlafmittel		Häufigkeit			Gesamt %
		täglich %	mehrmals pro Woche %	etwa einmal pro Woche %	
2007	vom Arzt verordnet	95.2	80.2	71.4	86.3
	nicht vom Arzt verordnet	4.8	19.8	28.6	13.7
	<i>N (gewichtet)</i>	531	215	232	977
	N (ungewichtet)	753	254	268	1'275
2002	vom Arzt verordnet	94.0	81.4	77.4	87.6
	selber gekauft	(6.0)	18.6	22.6	12.4
	<i>N (gewichtet)</i>	450	181	171	802
	N (ungewichtet)	584	216	197	997
1997	vom Arzt verordnet	94.8	81.7	72.7	87.6
	selber gekauft	(5.2)	18.3	27.3	12.4
	<i>N (gewichtet)</i>	403	162	131	696
	N (ungewichtet)	453	184	142	779
1992	vom Arzt verordnet	92.4	82.9	63.7	84.6
	selber gekauft	7.6	17.1	36.3	15.4
	<i>N (gewichtet)</i>	445	161	153	760
	N (ungewichtet)	541	191	171	903

Frage: 1992-2002 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?' 2007 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'

Anmerkungen: Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Männer, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007

Schlafmittel		Häufigkeit			Gesamt %
		täglich %	mehrmals pro Woche %	etwa einmal pro Woche %	
2007	vom Arzt verordnet	98.5	82.6	64.2	86.2
	nicht vom Arzt verordnet	-	(17.4)	(35.8)	13.8
	N (gewichtet)	170	70	83	323
	N (ungewichtet)	231	80	83	394
2002	vom Arzt verordnet	96.0	82.8	84.9	90.0
	selber gekauft	-	(17.2)	(15.1)	(10.0)
	N (gewichtet)	128	61	63	252
	N (ungewichtet)	166	62	68	296
1997	vom Arzt verordnet	98.2	92.4	68.7	90.4
	selber gekauft	-	-	(31.3)	(9.6)
	N (gewichtet)	113	48	44	205
	N (ungewichtet)	113	50	44	207
1992	vom Arzt verordnet	87.1	82.7	(69.3)	82.6
	selber gekauft	(12.9)	(17.3)	(30.7)	17.4
	N (gewichtet)	127	55	44	225
	N (ungewichtet)	136	56	44	236

Frage: 1992-2002 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?' 2007 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'

Anmerkungen: Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.


Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Frauen, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007

Schlafmittel		Häufigkeit			Gesamt %
		täglich %	mehrmals pro Woche %	etwa einmal pro Woche %	
2007	vom Arzt verordnet	93.7	79.0	75.3	86.3
	nicht vom Arzt verordnet	6.3	21.0	24.7	13.7
	N (gewichtet)	360	145	149	654
	N (ungewichtet)	522	174	185	881
2002	vom Arzt verordnet	93.2	80.7	72.9	86.5
	selber gekauft	(6.8)	(19.3)	27.1	13.5
	N (gewichtet)	322	120	108	550
	N (ungewichtet)	418	154	129	701
1997	vom Arzt verordnet	93.5	77.2	74.7	86.4
	selber gekauft	(6.5)	(22.8)	(25.3)	13.6
	N (gewichtet)	290	114	87	491
	N (ungewichtet)	340	134	98	572
1992	vom Arzt verordnet	94.5	83.1	61.5	85.5
	selber gekauft	(5.5)	(16.9)	38.5	14.5
	N (gewichtet)	318	106	110	534
	N (ungewichtet)	405	135	127	667

Frage: 1992-2002 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?' 2007 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'

Anmerkungen: Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007



Frage: 1992-2002 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?' 2007 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'

Anmerkungen: Prozente werden gewichtet berechnet.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007

Beruhigungsmittel		Häufigkeit			Gesamt %
		täglich %	mehrmals pro Woche %	etwa einmal pro Woche %	
2007	vom Arzt verordnet	92.5	69.8	66.7	82.8
	nicht vom Arzt verordnet	7.5	30.2	33.3	17.2
	<i>N (gewichtet)</i>	484	141	178	803
	N (ungewichtet)	633	183	192	1'008
2002	vom Arzt verordnet	95.2	70.3	65.8	85.3
	selber gekauft	(4.8)	29.7	34.2	14.7
	<i>N (gewichtet)</i>	475	135	136	747
	N (ungewichtet)	570	145	145	860
1997	vom Arzt verordnet	92.7	75.2	68.6	84.4
	selber gekauft	(7.3)	24.8	31.4	15.6
	<i>N (gewichtet)</i>	332	115	110	557
	N (ungewichtet)	368	130	114	612
1992	vom Arzt verordnet	89.6	69.2	60.0	80.9
	selber gekauft	10.4	30.8	40.0	19.1
	<i>N (gewichtet)</i>	407	122	102	632
	N (ungewichtet)	465	137	116	718

Frage: 1992-2002 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?' 2007 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'

Anmerkungen: Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Männer, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007

Beruhigungsmittel		Häufigkeit			Gesamt %
		täglich %	mehrmals pro Woche %	etwa einmal pro Woche %	
2007	vom Arzt verordnet	96.2	79.3	64.9	87.0
	nicht vom Arzt verordnet	-	(20.7)	(35.1)	13.0
	N (gewichtet)	184	56	57	297
	N (ungewichtet)	218	60	64	342
2002	vom Arzt verordnet	95.1	67.6	(71.4)	86.0
	selber gekauft	-	(32.4)	(28.6)	14.0
	N (gewichtet)	171	46	47	264
	N (ungewichtet)	182	47	41	270
1997	vom Arzt verordnet	93.5	(80.4)	(70.1)	85.1
	selber gekauft	-	-	(29.9)	(14.9)
	N (gewichtet)	99	35	45	179
	N (ungewichtet)	99	35	39	173
1992	vom Arzt verordnet	89.9	70.8	(56.5)	79.9
	selber gekauft	(10.1)	-	(43.5)	20.1
	N (gewichtet)	136	41	42	219
	N (ungewichtet)	149	42	41	232

Frage: 1992-2002 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?' 2007 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'

Anmerkungen: Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.


Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Frauen, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007

Beruhigungsmittel		Häufigkeit			Gesamt %
		täglich %	mehrmals pro Woche %	etwa einmal pro Woche %	
2007	vom Arzt verordnet	90.3	63.5	67.5	80.3
	nicht vom Arzt verordnet	9.7	36.5	32.5	19.7
	N (gewichtet)	300	85	122	506
	N (ungewichtet)	415	123	128	666
2002	vom Arzt verordnet	95.3	71.7	62.9	84.9
	selber gekauft	(4.7)	(28.3)	37.1	15.1
	N (gewichtet)	304	89	90	482
	N (ungewichtet)	388	98	104	590
1997	vom Arzt verordnet	92.4	72.9	67.6	84.0
	selber gekauft	(7.6)	(27.1)	(32.4)	16.0
	N (gewichtet)	233	80	65	378
	N (ungewichtet)	269	95	75	439
1992	vom Arzt verordnet	89.5	68.4	62.4	81.4
	selber gekauft	10.5	(31.6)	(37.6)	18.6
	N (gewichtet)	271	81	60	413
	N (ungewichtet)	316	95	75	486

Frage: 1992-2002 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?' 2007 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'

Anmerkungen: Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007



Frage: 1992-2002 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?' 2007 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'

Anmerkungen: Prozente werden gewichtet berechnet.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007

Schmerzmittel		Häufigkeit			Gesamt %
		täglich %	mehrmals pro Woche %	etwa einmal pro Woche %	
2007	vom Arzt verordnet	90.8	57.3	29.8	54.8
	nicht vom Arzt verordnet	9.2	42.7	70.2	45.2
	N (gewichtet)	1'081	1'022	1'659	3'763
	N (ungewichtet)	1'243	1'087	1'674	4'004
2002	vom Arzt verordnet	88.1	56.3	32.6	55.9
	selber gekauft	11.9	43.7	67.4	44.1
	N (gewichtet)	846	826	1'182	2'854
	N (ungewichtet)	905	872	1'237	3'014
1997	vom Arzt verordnet	86.6	45.6	23.2	45.4
	selber gekauft	13.4	54.4	76.8	54.6
	N (gewichtet)	534	638	995	2'166
	N (ungewichtet)	561	674	1'022	2'257
1992	vom Arzt verordnet	73.1	47.8	25.2	47.3
	selber gekauft	26.9	52.2	74.8	52.7
	N (gewichtet)	643	487	766	1'896
	N (ungewichtet)	670	515	783	1'968

Frage: 1992-2002 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?' 2007 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'

Anmerkungen: Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet.

Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Männer, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007

Schmerzmittel		Häufigkeit			Gesamt %
		täglich %	mehrmals pro Woche %	etwa einmal pro Woche %	
2007	vom Arzt verordnet	92.8	57.1	28.8	54.8
	nicht vom Arzt verordnet	7.2	42.9	71.2	45.2
	N (gewichtet)	418	365	645	1'428
	N (ungewichtet)	450	348	573	1'371
2002	vom Arzt verordnet	88.0	56.7	29.7	55.4
	selber gekauft	12.0	43.3	70.3	44.6
	N (gewichtet)	326	272	426	1'024
	N (ungewichtet)	319	275	417	1'011
1997	vom Arzt verordnet	86.6	45.2	18.9	42.1
	selber gekauft	(13.4)	54.8	81.1	57.9
	N (gewichtet)	184	239	384	807
	N (ungewichtet)	175	226	365	766
1992	vom Arzt verordnet	73.6	51.0	22.1	48.8
	selber gekauft	26.4	49.0	77.9	51.2
	N (gewichtet)	284	163	277	724
	N (ungewichtet)	263	170	268	701

Frage: 1992-2002 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?' 2007 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'

Anmerkungen: Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Frauen, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2007

Schmerzmittel		Häufigkeit			Gesamt %
		täglich %	mehrmals pro Woche %	etwa einmal pro Woche %	
2007	vom Arzt verordnet	89.5	57.4	30.5	54.8
	nicht vom Arzt verordnet	10.5	42.6	69.5	45.2
	<i>N (gewichtet)</i>	663	657	1'015	2'335
	N (ungewichtet)	793	739	1'101	2'633
2002	vom Arzt verordnet	88.2	56.1	34.2	56.2
	selber gekauft	11.8	43.9	65.8	43.8
	<i>N (gewichtet)</i>	520	554	756	1'830
	N (ungewichtet)	586	597	820	2'003
1997	vom Arzt verordnet	86.7	45.8	25.9	47.4
	selber gekauft	13.3	54.2	74.1	52.6
	<i>N (gewichtet)</i>	349	399	611	1'359
	N (ungewichtet)	386	448	657	1'491
1992	vom Arzt verordnet	72.7	46.2	27.0	46.3
	selber gekauft	27.3	53.8	73.0	53.7
	<i>N (gewichtet)</i>	359	324	488	1'171
	N (ungewichtet)	407	345	515	1'267

Frage: 1992-2002 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?' 2007 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'


Anmerkungen: Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet.

ILLEGALE DROGEN

Allgemeiner Hinweis:

Personen, die illegale Drogen einnehmen, können je nach Schweregrad der Problematik, nur bedingt über die Modalitäten einer Bevölkerungsbefragung wie die SGB erreicht werden. Zudem kann der illegale Charakter der Substanzen und ihre mehr oder weniger negative soziale Wahrnehmung häufiger als bei anderen Substanzen wie Tabak oder Alkohol zu Antworten im Sinne der sozialen Erwünschtheit führen. Somit stellen die ermittelten Prävalenzen vermutlich Unterschätzungen dar und sind folglich mit Vorsicht zu interpretieren. Diese Antworttendenzen sind wahrscheinlich je nach Substanz unterschiedlich stark ausgeprägt.

Gebrauch von illegalen Drogen, nach Alter
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2007



Frage: 1992: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'
1997-2007: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 und 1997 nur unter 60-Jährigen gestellt; 2002 wurde sie nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 2.5% werden nicht berichtet.

Gebrauch von illegalen Drogen, nach Alter

Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2007

illegale Drogen		Altersgruppen							Gesamt
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	ja	23.6	38.8	38.6	33.6	28.0	22.7	6.4	19.7
	nein	76.4	61.2	61.4	66.4	72.0	77.3	93.6	80.3
	N (gewichtet)	1'582	1'273	1'375	1'487	1'717	3'626	7'634	18'695
	N (ungewichtet)	964	843	1'111	1'389	1'837	3'532	9'036	18'712
2002	ja	26.0	38.3	29.2	28.3	23.6	19.0	2.7	16.2
	nein	74.0	61.7	70.8	71.7	76.4	81.0	97.3	83.8
	N (gewichtet)	1'637	1'120	1'347	2'013	2'030	3'552	7'985	19'682
	N (ungewichtet)	916	779	1'142	1'877	2'277	3'526	9'169	19'686
1997	ja	26.8	35.6	29.0	25.1	22.1	12.9	1.3	14.5
	nein	73.2	64.4	71.0	74.9	77.9	87.1	98.7	85.5
	N (gewichtet)	861	925	1'108	1'391	1'328	2'255	5'128	12'996
	N (ungewichtet)	577	834	1'255	1'608	1'427	2'052	5'241	12'994
1992	ja	14.5	21.3	19.1	17.1	11.2	6.0	(0.3)	8.7
	nein	85.5	78.7	80.9	82.9	88.8	94.0	99.7	91.3
	N (gewichtet)	1'062	1'228	1'623	1'552	1'422	2'698	5'662	15'246
	N (ungewichtet)	681	1'111	1'801	1'728	1'533	2'593	5'801	15'248

Frage: 1992: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'
 1997-2007: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Die Frage wurde 1992 und 1997 nur unter 60-Jährigen gestellt; 2002 wurde sie nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
 Spaltenprozent
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Gebrauch von illegalen Drogen, nach Alter
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2007

illegale Drogen		Altersgruppen							Gesamt
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	ja	30.1	47.5	47.9	43.1	34.7	26.4	8.0	24.7
	nein	69.9	52.5	52.1	56.9	65.3	73.6	92.0	75.3
	N (gewichtet)	816	658	692	716	847	1'801	3'597	9'127
	N (ungewichtet)	505	416	496	629	827	1'691	3'833	8'397
2002	ja	31.1	45.7	38.3	36.3	28.2	24.0	3.2	20.8
	nein	68.9	54.3	61.7	63.7	71.8	76.0	96.8	79.2
	N (gewichtet)	844	560	655	1'004	1'047	1'802	3'599	9'510
	N (ungewichtet)	470	383	501	858	1'125	1'709	3'846	8'892
1997	ja	30.9	43.6	38.3	30.8	28.7	18.1	1.8	19.2
	nein	69.1	56.4	61.7	69.2	71.3	81.9	98.2	80.8
	N (gewichtet)	442	457	544	695	674	1'140	2'297	6'249
	N (ungewichtet)	296	388	589	757	651	973	2'099	5'753
1992	ja	19.2	28.8	24.6	21.8	15.2	8.0	(0.5)	11.8
	nein	80.8	71.2	75.4	78.2	84.8	92.0	99.5	88.2
	N (gewichtet)	518	635	805	728	714	1'298	2'640	7'338
	N (ungewichtet)	337	512	849	788	752	1'204	2'393	6'835

Frage: 1992: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'
1997-2007: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Die Frage wurde 1992 und 1997 nur unter 60-Jährigen gestellt; 2002 wurde sie nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.


Gebrauch von illegalen Drogen, nach Alter
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2007

illegale Drogen		Altersgruppen							Gesamt
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	ja	16.8	29.4	29.1	24.8	21.5	18.9	4.9	15.0
	nein	83.2	70.6	70.9	75.2	78.5	81.1	95.1	85.0
	N (gewichtet)	766	616	682	771	869	1'826	4'037	9'567
	N (ungewichtet)	459	427	615	760	1'010	1'841	5'203	10'315
2002	ja	20.5	30.9	20.5	20.4	18.7	13.8	2.2	11.8
	nein	79.5	69.1	79.5	79.6	81.3	86.2	97.8	88.2
	N (gewichtet)	793	560	692	1'009	983	1'750	4'386	10'172
	N (ungewichtet)	446	396	641	1'019	1'152	1'817	5'323	10'794
1997	ja	22.4	27.8	20.0	19.3	15.3	7.6	1.0	10.1
	nein	77.6	72.2	80.0	80.7	84.7	92.4	99.0	89.9
	N (gewichtet)	419	468	564	696	654	1'115	2'831	6'747
	N (ungewichtet)	281	446	666	851	776	1'079	3'142	7'241
1992	ja	10.0	13.2	13.6	12.9	7.3	4.2	(0.2)	5.9
	nein	90.0	86.8	86.4	87.1	92.7	95.8	99.8	94.1
	N (gewichtet)	544	593	818	824	708	1'400	3'022	7'908
	N (ungewichtet)	344	599	952	940	781	1'389	3'408	8'413

Frage: 1992: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'
1997-2007: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Die Frage wurde 1992 und 1997 nur unter 60-Jährigen gestellt; 2002 wurde sie nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Gebrauch von illegalen Drogen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2007



Frage: 1992: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'
1997-2007: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Die Frage wurde 1992 und 1997 nur unter 60-Jährigen gestellt; 2002 wurde sie nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 2.5% werden nicht berichtet.

Gebrauch von illegalen Drogen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2007

illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt %
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2007	ja	19.6	21.8	10.9	19.7
	nein	80.4	78.2	89.1	80.3
	N (gewichtet)	13'443	4'397	854	18'695
	N (ungewichtet)	11'454	5'717	1'541	18'712
2002	ja	15.8	18.8	8.3	16.2
	nein	84.2	81.2	91.7	83.8
	N (gewichtet)	14'211	4'564	907	19'682
	N (ungewichtet)	13'204	4'931	1'551	19'686
1997	ja	14.8	14.8	8.6	14.5
	nein	85.2	85.2	91.4	85.5
	N (gewichtet)	9'289	3'085	622	12'996
	N (ungewichtet)	8'254	3'609	1'131	12'994
1992	ja	8.8	9.5	4.5	8.7
	nein	91.2	90.5	95.5	91.3
	N (gewichtet)	10'946	3'583	716	15'246
	N (ungewichtet)	10'312	4'106	830	15'248

Frage: 1992: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'
1997-2007: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Die Frage wurde 1992 und 1997 nur unter 60-Jährigen gestellt; 2002 wurde sie nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Gebrauch von illegalen Drogen, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2007

illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	ja	24.4	27.5	14.5	24.7
	nein	75.6	72.5	85.5	75.3
	N (gewichtet)	6'572	2'152	403	9'127
	N (ungewichtet)	5'181	2'552	664	8'397
2002	ja	19.9	25.6	11.0	20.8
	nein	80.1	74.4	89.0	79.2
	N (gewichtet)	6'976	2'111	423	9'510
	N (ungewichtet)	6'096	2'117	679	8'892
1997	ja	19.1	21.3	10.5	19.2
	nein	80.9	78.7	89.5	80.8
	N (gewichtet)	4'531	1'441	277	6'249
	N (ungewichtet)	3'736	1'548	469	5'753
1992	ja	12.2	11.6	(6.1)	11.8
	nein	87.8	88.4	93.9	88.2
	N (gewichtet)	5'298	1'701	338	7'338
	N (ungewichtet)	4'655	1'846	334	6'835

Frage: 1992: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'
1997-2007: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Die Frage wurde 1992 und 1997 nur unter 60-Jährigen gestellt; 2002 wurde sie nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Gebrauch von illegalen Drogen, nach Sprachregion
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2007


illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	ja	15.0	16.3	7.8	15.0
	nein	85.0	83.7	92.2	85.0
	N (gewichtet)	6'871	2'245	451	9'567
	N (ungewichtet)	6'273	3'165	877	10'315
2002	ja	11.8	13.0	5.9	11.8
	nein	88.2	87.0	94.1	88.2
	N (gewichtet)	7'235	2'453	484	10'172
	N (ungewichtet)	7'108	2'814	872	10'794
1997	ja	10.7	9.2	7.0	10.1
	nein	89.3	90.8	93.0	89.9
	N (gewichtet)	4'759	1'644	345	6'747
	N (ungewichtet)	4'518	2'061	662	7'241
1992	ja	5.5	7.7	(3.1)	5.9
	nein	94.5	92.3	96.9	94.1
	N (gewichtet)	5'648	1'882	378	7'908
	N (ungewichtet)	5'657	2'260	496	8'413

Frage: 1992: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'
1997-2007: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Die Frage wurde 1992 und 1997 nur unter 60-Jährigen gestellt; 2002 wurde sie nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Cannabisgebrauch, nach Alter

Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007



Fragen: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Haschisch/ Marijuana?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt. 1997 wurde die Frage nur unter 60-Jährigen gestellt, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozent

Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 2.5% werden nicht berichtet.

Cannabisgebrauch, nach Alter

Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007

Cannabis		Altersgruppen							Gesamt
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	6.9	10.3	10.4	5.3	2.7	2.3	0.5	3.4
	ehemaliger Gebrauch	16.8	27.6	27.8	27.9	25.0	20.0	5.7	16.1
	nie	76.4	62.1	61.9	66.8	72.2	77.7	93.8	80.6
	<i>N (gewichtet)</i>	1'582	1'272	1'373	1'487	1'716	3'624	7'632	18'687
	N (ungewichtet)	964	842	1'109	1'389	1'836	3'527	9'035	18'702
2002	aktueller Gebrauch	11.4	13.0	8.0	5.1	3.4	2.8	(0.3)	3.7
	ehemaliger Gebrauch	13.7	24.6	21.0	22.8	19.8	15.5	2.2	12.1
	nie	74.9	62.4	71.0	72.1	76.8	81.6	97.5	84.2
	<i>N (gewichtet)</i>	1'632	1'120	1'345	2'012	2'028	3'548	7'985	19'668
	N (ungewichtet)	914	779	1'141	1'876	2'275	3'524	9'169	19'678
1997	aktueller Gebrauch	11.1	13.6	7.0	3.9	3.2	1.6	-	3.4
	ehemaliger Gebrauch	15.1	21.4	21.2	21.0	18.5	11.1	1.2	10.9
	nie	73.8	65.1	71.8	75.0	78.3	87.3	98.7	85.8
	<i>N (gewichtet)</i>	861	923	1'108	1'391	1'327	2'254	5'128	12'991
	N (ungewichtet)	577	833	1'255	1'607	1'426	2'050	5'241	12'989
1992	aktueller Gebrauch	6.5	7.6	4.0	3.5	(1.3)			
	ehemaliger Gebrauch	7.8	13.1	14.9	13.1	9.3			
	nie	85.8	79.3	81.1	83.4	89.4			
	<i>N (gewichtet)</i>	1'060	1'224	1'623	1'549	1'414			
	N (ungewichtet)	679	1'108	1'801	1'725	1'525			

Fragen: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Haschisch/ Marijuana?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt. 1997 wurden sie nur unter 60-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozent

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007

Cannabis		Altersgruppen							Gesamt
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	9.8	13.6	17.1	7.9	3.5	3.3	(0.8)	5.1
	ehemaliger Gebrauch	20.3	32.5	30.3	34.6	30.9	22.7	7.1	19.3
	nie	69.9	53.9	52.6	57.5	65.6	74.0	92.1	75.6
	N (gewichtet)	816	657	691	716	847	1'799	3'597	9'122
	N (ungewichtet)	505	415	494	629	826	1'687	3'833	8'389
2002	aktueller Gebrauch	14.1	19.5	11.8	7.9	4.3	4.0	(0.4)	5.4
	ehemaliger Gebrauch	16.1	24.9	26.2	28.1	23.3	19.4	2.7	14.9
	nie	69.8	55.6	62.0	64.0	72.3	76.6	96.9	79.7
	N (gewichtet)	839	560	653	1'003	1'045	1'802	3'599	9'500
	N (ungewichtet)	469	383	500	857	1'123	1'709	3'846	8'887
1997	aktueller Gebrauch	13.3	18.5	9.7	5.6	4.8	2.6	-	4.8
	ehemaliger Gebrauch	17.2	24.3	27.7	25.0	23.6	15.2	1.6	14.1
	nie	69.5	57.2	62.5	69.4	71.6	82.1	98.3	81.1
	N (gewichtet)	442	457	544	695	673	1'139	2'297	6'246
	N (ungewichtet)	296	388	589	757	650	971	2'099	5'750
1992	aktueller Gebrauch	(8.1)	11.2	5.4	5.5	(1.9)			
	ehemaliger Gebrauch	11.0	17.4	18.9	15.6	12.4			
	nie	80.9	71.4	75.7	79.0	85.7			
	N (gewichtet)	518	634	805	725	708			
	N (ungewichtet)	337	511	849	786	746			

Fragen: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Haschisch/ Marijuana?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt. 1997 wurden sie nur unter 60-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozent

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007

Cannabis		Altersgruppen							Gesamt
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	aktueller Gebrauch	(3.8)	6.8	(3.6)	(2.9)	(2.0)	1.2	(0.3)	1.8
	ehemaliger Gebrauch	13.0	22.4	25.2	21.7	19.3	17.4	4.5	13.0
	nie	83.3	70.8	71.3	75.4	78.7	81.3	95.2	85.2
	N (gewichtet)	766	616	682	771	869	1'825	4'035	9'565
	N (ungewichtet)	459	427	615	760	1'010	1'840	5'202	10'313
2002	aktueller Gebrauch	8.5	(6.5)	4.4	(2.4)	2.4	1.7	(0.2)	2.2
	ehemaliger Gebrauch	11.2	24.3	16.2	17.5	16.0	11.5	1.9	9.4
	nie	80.2	69.2	79.5	80.1	81.6	86.8	97.9	88.4
	N (gewichtet)	792	560	692	1'009	983	1'746	4'386	10'168
	N (ungewichtet)	445	396	641	1'019	1'152	1'815	5'323	10'791
1997	aktueller Gebrauch	(8.6)	8.7	(4.3)	(2.2)	(1.6)	(0.5)	-	2.0
	ehemaliger Gebrauch	12.9	18.5	14.9	17.1	13.2	6.8	(0.9)	7.9
	nie	78.4	72.8	80.7	80.7	85.2	92.6	99.1	90.1
	N (gewichtet)	419	466	564	696	654	1'115	2'831	6'745
	N (ungewichtet)	281	445	666	850	776	1'079	3'142	7'239
1992	aktueller Gebrauch	(4.9)	(3.7)	2.6	(1.8)	-			
	ehemaliger Gebrauch	(4.7)	8.4	11.0	10.8	6.2			
	nie	90.4	87.9	86.4	87.3	93.2			
	N (gewichtet)	542	590	818	823	706			
	N (ungewichtet)	342	597	952	939	779			

Fragen: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Haschisch/ Marijuana?'


Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt. 1997 wurden sie nur unter 60-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozente

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007



Fragen: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Haschisch/ Marijuana?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt, deshalb sind die Werte von 1992 nicht mit jenen der anderen Jahre vergleichbar und hier nicht aufgeführt. 1997 wurden die Fragen nur unter 60-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 2.5% werden nicht berichtet.

Cannabisgebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Cannabis		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	3.3	3.8	(1.7)	3.4
	ehemaliger Gebrauch	16.0	17.7	9.1	16.1
	nie	80.7	78.5	89.2	80.6
	<i>N (gewichtet)</i>	13'436	4'397	853	18'687
	N (ungewichtet)	11'445	5'717	1'540	18'702
2002	aktueller Gebrauch	3.7	4.4	(0.7)	3.7
	ehemaliger Gebrauch	11.8	14.0	7.2	12.1
	nie	84.5	81.6	92.1	84.2
	<i>N (gewichtet)</i>	14'201	4'560	907	19'668
	N (ungewichtet)	13'199	4'928	1'551	19'678
1997	aktueller Gebrauch	3.6	2.9	(2.0)	3.4
	ehemaliger Gebrauch	10.9	11.5	6.5	10.9
	nie	85.5	85.5	91.5	85.8
	<i>N (gewichtet)</i>	9'285	3'084	622	12'991
	N (ungewichtet)	8'250	3'608	1'131	12'989

Fragen: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Haschisch/ Marijuana?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt, deshalb sind die Werte von 1992 nicht mit jenen der anderen Jahre vergleichbar und hier nicht aufgeführt. 1997 wurde die Frage nur unter 60-Jährigen gestellt, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Cannabisgebrauch, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Cannabis		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	5.1	5.6	(2.3)	5.1
	ehemaliger Gebrauch	19.0	21.6	12.0	19.3
	nie	75.9	72.8	85.7	75.6
	<i>N (gewichtet)</i>	6'567	2'152	403	9'122
	N (ungewichtet)	5'174	2'552	663	8'389
2002	aktueller Gebrauch	5.3	6.6	-	5.4
	ehemaliger Gebrauch	14.3	18.3	9.1	14.9
	nie	80.4	75.1	89.6	79.7
	<i>N (gewichtet)</i>	6'970	2'107	423	9'500
	N (ungewichtet)	6'094	2'114	679	8'887
1997	aktueller Gebrauch	5.0	4.6	(2.5)	4.8
	ehemaliger Gebrauch	13.7	16.3	8.0	14.1
	nie	81.2	79.0	89.5	81.1
	<i>N (gewichtet)</i>	4'529	1'440	277	6'246
	N (ungewichtet)	3'734	1'547	469	5'750

Fragen: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Haschisch/ Marijuana?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt, deshalb sind die Werte von 1992 nicht mit jenen der anderen Jahre vergleichbar und hier nicht aufgeführt. 1997 wurde die Frage nur unter 60-Jährigen gestellt, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Cannabis		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	1.7	2.0	(1.2)	1.8
	ehemaliger Gebrauch	13.1	14.0	6.6	13.0
	nie	85.2	83.9	92.3	85.2
	<i>N (gewichtet)</i>	6'869	2'245	451	9'565
	N (ungewichtet)	6'271	3'165	877	10'313
2002	aktueller Gebrauch	2.2	2.5	-	2.2
	ehemaliger Gebrauch	9.3	10.2	5.5	9.4
	nie	88.5	87.3	94.2	88.4
	<i>N (gewichtet)</i>	7'231	2'453	484	10'168
	N (ungewichtet)	7'105	2'814	872	10'791
1997	aktueller Gebrauch	2.2	1.5	(1.5)	2.0
	ehemaliger Gebrauch	8.2	7.3	5.4	7.9
	nie	89.6	91.2	93.1	90.1
	<i>N (gewichtet)</i>	4'756	1'644	345	6'745
	N (ungewichtet)	4'516	2'061	662	7'239

Fragen: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Haschisch/ Marijuana?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt, deshalb sind die Werte von 1992 nicht mit jenen der anderen Jahre vergleichbar und hier nicht aufgeführt. 1997 wurde die Frage nur unter 60-Jährigen gestellt, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Cannabisgebrauchs, nach Alter

Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, Vergleich (1992) 1997-2007

Cannabis		Altersgruppen							Gesamt
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50+	
		%	%	%	%	%	%	%	
2007	1 mal wöchentlich oder mehr	(2.1)	5.0	3.9	2.2	(0.8)	1.0	(0.2)	1.3
	1 bis 3 mal im Monat	(2.1)	(2.3)	(2.4)	(1.3)	(0.8)	(0.5)	-	0.8
	weniger als 1 mal im Monat	(2.6)	(2.4)	3.8	(1.8)	(1.1)	0.8	(0.2)	1.2
	kein Gebrauch	93.1	90.3	89.9	94.7	97.3	97.8	99.5	96.7
	<i>N (gewichtet)</i>	1'582	1'263	1'369	1'487	1'715	3'622	7'630	18'667
	<i>N (ungewichtet)</i>	964	837	1'106	1'389	1'835	3'525	9'033	18'689
2002	1 mal wöchentlich oder mehr	6.7	6.4	3.3	2.2	1.6	0.9	(0.1)	1.7
	1 bis 3 mal im Monat	(2.1)	(3.3)	(1.1)	(1.2)	(0.8)	(0.5)	-	0.7
	weniger als 1 mal im Monat	(2.5)	(3.0)	2.8	1.7	1.0	1.4	(0.1)	1.2
	kein Gebrauch	88.7	87.3	92.7	95.0	96.6	97.2	99.7	96.4
	<i>N (gewichtet)</i>	1'630	1'115	1'335	2'009	2'027	3'546	7'984	19'646
	<i>N (ungewichtet)</i>	913	775	1'136	1'874	2'274	3'523	9'168	19'663
1997	1 mal wöchentlich oder mehr	5.9	6.3	2.3	(1.3)	(1.0)	-	-	1.3
	1 bis 3 mal im Monat	(3.3)	(3.6)	(1.0)	(0.7)	(0.6)	-	-	0.7
	weniger als 1 mal im Monat	(1.9)	3.7	3.6	1.8	(1.6)	(1.1)	-	1.3
	kein Gebrauch	88.9	86.4	93.1	96.2	96.8	98.4	99.9	96.7
	<i>N (gewichtet)</i>	861	923	1'108	1'389	1'327	2'254	5'128	12'989
	<i>N (ungewichtet)</i>	577	833	1'254	1'606	1'426	2'050	5'241	12'987
1992	1 mal wöchentlich oder mehr	(2.6)	2.9	1.5	(1.3)	-			
	1 bis 3 mal im Monat	(2.2)	(1.8)	(1.1)	(0.8)	-			
	weniger als 1 mal im Monat	(1.7)	(2.9)	1.4	(1.4)	(0.5)			
	kein Gebrauch	93.5	92.4	96.0	96.5	98.7			
	<i>N (gewichtet)</i>	1'060	1'224	1'623	1'549	1'414			
	<i>N (ungewichtet)</i>	679	1'108	1'801	1'725	1'525			

Frage: 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Haschisch / Marijuana konsumiert?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt. 1997 wurde die Frage nur unter 60-Jährigen gestellt, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen; für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozent

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Heroingebrauch, nach Alter

Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007

Heroin		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	0.9	0.6	0.7
	nie	99.1	99.4	99.3
	<i>N (gewichtet)</i>	7'428	11'255	18'683
	N (ungewichtet)	6'138	12'562	18'700
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	0.8	0.3	0.5
	nie	99.1	99.7	99.4
	<i>N (gewichtet)</i>	8'142	11'536	19'678
	N (ungewichtet)	6'988	12'694	19'682
1997	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	1.0	(0.1)	0.5
	nie	99.0	99.9	99.5
	<i>N (gewichtet)</i>	5'611	7'379	12'990
	N (ungewichtet)	5'699	7'287	12'986
1992	aktueller Gebrauch	-		
	ehemaliger Gebrauch	1.2		
	nie	98.7		
	<i>N (gewichtet)</i>	6'869		
	N (ungewichtet)	6'838		

Fragen: 'Haben Sie schon Heroin genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Heroin?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozent

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für $n < 30$ stehen Werte in Klammern, für $n < 10$ werden keine Werte berichtet.

Heroingebrauch, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007

Heroin		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	1.3	0.8	1.0
	nie	98.6	99.2	98.9
	<i>N (gewichtet)</i>	3'724	5'394	9'118
	N (ungewichtet)	2'868	5'519	8'387
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	1.1	0.5	0.8
	nie	98.7	99.5	99.1
	<i>N (gewichtet)</i>	4'106	5'400	9'506
	N (ungewichtet)	3'334	5'554	8'888
1997	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	1.4	-	0.7
	nie	98.6	99.9	99.3
	<i>N (gewichtet)</i>	2'810	3'435	6'245
	N (ungewichtet)	2'680	3'070	5'750
1992	aktueller Gebrauch	-		
	ehemaliger Gebrauch	1.8		
	nie	98.1		
	<i>N (gewichtet)</i>	3'390		
	N (ungewichtet)	3'229		

Fragen: 'Haben Sie schon Heroin genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Heroin?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozent

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<10 werden keine Werte berichtet.

Heroingebrauch, nach Alter

Frauen, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007

Heroin		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	(0.5)	(0.3)	0.4
	nie	99.5	99.7	99.6
	<i>N (gewichtet)</i>	3'704	5'861	9'565
	N (ungewichtet)	3'270	7'043	10'313
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	(0.4)	(0.2)	0.3
	nie	99.5	99.8	99.7
	<i>N (gewichtet)</i>	4'036	6'136	10'172
	N (ungewichtet)	3'654	7'140	10'794
1997	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	(0.6)	-	(0.3)
	nie	99.3	99.9	99.7
	<i>N (gewichtet)</i>	2'801	3'944	6'745
	N (ungewichtet)	3'019	4'217	7'236
1992	aktueller Gebrauch	-		
	ehemaliger Gebrauch	(0.5)		
	nie	99.3		
	<i>N (gewichtet)</i>	3'479		
	N (ungewichtet)	3'609		

Fragen: 'Haben Sie schon Heroin genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Heroin?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozent

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für $n < 30$ stehen Werte in Klammern, für $n < 10$ werden keine Werte berichtet.

Heroingebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Heroin		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	0.6	1.2	-	0.7
	nie	99.4	98.8	99.7	99.3
	<i>N (gewichtet)</i>	13'437	4'394	852	18'683
	N (ungewichtet)	11'447	5'715	1'538	18'700
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	0.5	0.7	-	0.5
	nie	99.5	99.3	99.6	99.4
	<i>N (gewichtet)</i>	14'210	4'562	907	19'678
	N (ungewichtet)	13'203	4'929	1'550	19'682
1997	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	0.4	0.7	-	0.5
	nie	99.6	99.3	99.5	99.5
	<i>N (gewichtet)</i>	9'286	3'082	622	12'990
	N (ungewichtet)	8'251	3'604	1'131	12'986

Fragen: 'Haben Sie schon Heroin genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Heroin?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt, deshalb sind die Werte von 1992 nicht mit jenen der anderen Jahre vergleichbar und hier nicht aufgeführt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<10 werden keine Werte berichtet.

Heroingebrauch, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Heroin		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	0.8	1.6	-	1.0
	nie	99.1	98.4	99.3	98.9
	<i>N (gewichtet)</i>	6'568	2'149	401	9'118
	N (ungewichtet)	5'176	2'550	661	8'387
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	0.7	(1.1)	-	0.8
	nie	99.2	98.9	99.5	99.1
	<i>N (gewichtet)</i>	6'975	2'109	423	9'506
	N (ungewichtet)	6'095	2'115	678	8'888
1997	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	(0.5)	(1.1)	-	0.7
	nie	99.5	98.8	99.0	99.3
	<i>N (gewichtet)</i>	4'528	1'440	277	6'245
	N (ungewichtet)	3'735	1'546	469	5'750

Fragen: 'Haben Sie schon Heroin genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Heroin?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt, deshalb sind die Werte von 1992 nicht mit jenen der anderen Jahre vergleichbar und hier nicht aufgeführt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Heroingebrauch, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Heroin		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	(0.3)	(0.7)	-	0.4
	nie	99.7	99.3	100.0	99.6
	<i>N (gewichtet)</i>	6'869	2'245	451	9'565
	N (ungewichtet)	6'271	3'165	877	10'313
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	(0.3)	(0.4)	-	0.3
	nie	99.7	99.6	99.8	99.7
	<i>N (gewichtet)</i>	7'235	2'453	484	10'172
	N (ungewichtet)	7'108	2'814	872	10'794
1997	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	(0.3)	(0.3)	-	(0.3)
	nie	99.7	99.7	99.8	99.7
	<i>N (gewichtet)</i>	4'758	1'642	345	6'745
	N (ungewichtet)	4'516	2'058	662	7'236

Fragen: 'Haben Sie schon Heroin genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Heroin?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt, deshalb sind die Werte von 1992 nicht mit jenen der anderen Jahre vergleichbar und hier nicht aufgeführt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Alter

Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007

Kokain		Altersgruppen		
		15-39	40+	
		%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	0.4	(0.1)	0.2
	ehemaliger Gebrauch	4.0	1.6	2.6
	nie	95.6	98.3	97.2
	<i>N (gewichtet)</i>	7'428	11'251	18'678
	N (ungewichtet)	6'138	12'560	18'698
2002	aktueller Gebrauch	(0.2)	-	(0.1)
	ehemaliger Gebrauch	2.7	0.9	1.6
	nie	97.1	99.1	98.3
	<i>N (gewichtet)</i>	8'141	11'536	19'676
	N (ungewichtet)	6'987	12'693	19'680
1997	aktueller Gebrauch	(0.4)	-	(0.2)
	ehemaliger Gebrauch	2.9	(0.3)	1.4
	nie	96.7	99.7	98.4
	<i>N (gewichtet)</i>	5'611	7'378	12'988
	N (ungewichtet)	5'699	7'286	12'985
1992	aktueller Gebrauch	(0.3)		
	ehemaliger Gebrauch	2.3		
	nie	97.3		
	<i>N (gewichtet)</i>	6'868		
	N (ungewichtet)	6'837		

Fragen: 'Haben Sie schon Kokain genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Kokain?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozent

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für $n < 30$ stehen Werte in Klammern, für $n < 10$ werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Alter

Männer, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007

Kokain		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2007	aktueller Gebrauch	(0.7)	-	0.3
	ehemaliger Gebrauch	5.4	2.1	3.5
	nie	93.9	97.8	96.2
	<i>N (gewichtet)</i>	3'724	5'390	9'114
	N (ungewichtet)	2'868	5'518	8'386
2002	aktueller Gebrauch	-	-	(0.2)
	ehemaliger Gebrauch	3.6	1.3	2.3
	nie	96.0	98.7	97.5
	<i>N (gewichtet)</i>	4'104	5'400	9'505
	N (ungewichtet)	3'333	5'554	8'887
1997	aktueller Gebrauch	(0.5)	-	(0.3)
	ehemaliger Gebrauch	3.8	(0.4)	1.9
	nie	95.7	99.6	97.8
	<i>N (gewichtet)</i>	2'810	3'434	6'244
	N (ungewichtet)	2'680	3'069	5'749
1992	aktueller Gebrauch	(0.5)		
	ehemaliger Gebrauch	3.1		
	nie	96.5		
	<i>N (gewichtet)</i>	3'389		
	N (ungewichtet)	3'228		

Fragen: 'Haben Sie schon Kokain genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Kokain?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozent

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Alter

Frauen, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007

Kokain		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	2.6	1.1	1.7
	nie	97.3	98.8	98.2
	<i>N (gewichtet)</i>	3'704	5'860	9'564
	N (ungewichtet)	3'270	7'042	10'312
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	1.7	0.5	1.0
	nie	98.1	99.5	98.9
	<i>N (gewichtet)</i>	4'036	6'135	10'171
	N (ungewichtet)	3'654	7'139	10'793
1997	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	1.9	(0.2)	0.9
	nie	97.8	99.8	99.0
	<i>N (gewichtet)</i>	2'801	3'944	6'745
	N (ungewichtet)	3'019	4'217	7'236
1992	aktueller Gebrauch	-		
	ehemaliger Gebrauch	1.6		
	nie	98.2		
	<i>N (gewichtet)</i>	3'479		
	N (ungewichtet)	3'609		

Fragen: 'Haben Sie schon Kokain genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Kokain?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozent

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für $n < 30$ stehen Werte in Klammern, für $n < 10$ werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Kokain		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	(0.2)	(0.2)	-	0.2
	ehemaliger Gebrauch	2.2	3.8	2.0	2.6
	nie	97.6	96.0	98.0	97.2
	<i>N (gewichtet)</i>	13'433	4'394	852	18'678
	N (ungewichtet)	11'445	5'715	1'538	18'698
2002	aktueller Gebrauch	(0.1)	-	-	(0.1)
	ehemaliger Gebrauch	1.4	2.5	(1.1)	1.6
	nie	98.5	97.4	98.8	98.3
	<i>N (gewichtet)</i>	14'209	4'560	907	19'676
	N (ungewichtet)	13'202	4'928	1'550	19'680
1997	aktueller Gebrauch	(0.2)	-	-	(0.2)
	ehemaliger Gebrauch	1.3	1.7	(1.6)	1.4
	nie	98.5	98.1	98.2	98.4
	<i>N (gewichtet)</i>	9'284	3'082	622	12'988
	N (ungewichtet)	8'250	3'604	1'131	12'985

Fragen: 'Haben Sie schon Kokain genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Kokain?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt, deshalb sind die Werte von 1992 nicht mit jenen der anderen Jahre vergleichbar und hier nicht aufgeführt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Kokain		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	(0.4)	(0.3)	-	0.3
	ehemaliger Gebrauch	2.8	5.5	(3.0)	3.5
	nie	96.8	94.3	97.0	96.2
	<i>N (gewichtet)</i>	6'564	2'149	401	9'114
	N (ungewichtet)	5'175	2'550	661	8'386
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-	(0.2)
	ehemaliger Gebrauch	1.9	3.7	(1.5)	2.3
	nie	97.9	96.2	98.5	97.5
	<i>N (gewichtet)</i>	6'975	2'108	423	9'505
	N (ungewichtet)	6'095	2'114	678	8'887
1997	aktueller Gebrauch	(0.3)	-	-	(0.3)
	ehemaliger Gebrauch	1.7	2.6	(2.2)	1.9
	nie	98.0	97.2	97.6	97.8
	<i>N (gewichtet)</i>	4'527	1'440	277	6'244
	N (ungewichtet)	3'734	1'546	469	5'749

Fragen: 'Haben Sie schon Kokain genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Kokain?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt, deshalb sind die Werte von 1992 nicht mit jenen der anderen Jahre vergleichbar und hier nicht aufgeführt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Kokain		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	1.6	2.2	(1.0)	1.7
	nie	98.4	97.6	99.0	98.2
	<i>N (gewichtet)</i>	6'869	2'245	451	9'564
	N (ungewichtet)	6'270	3'165	877	10'312
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	0.8	1.6	-	1.0
	nie	99.1	98.4	99.1	98.9
	<i>N (gewichtet)</i>	7'234	2'453	484	10'171
	N (ungewichtet)	7'107	2'814	872	10'793
1997	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	0.9	(1.0)	-	0.9
	nie	99.0	99.0	98.6	99.0
	<i>N (gewichtet)</i>	4'758	1'642	345	6'745
	N (ungewichtet)	4'516	2'058	662	7'236

Fragen: 'Haben Sie schon Kokain genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Kokain?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt, deshalb sind die Werte von 1992 nicht mit jenen der anderen Jahre vergleichbar und hier nicht aufgeführt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet..

Gebrauch von Methadon, nach Alter

Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007

Methadon		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2007	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	(0.3)	(0.2)	0.2
	nie	99.6	99.8	99.8
	<i>N (gewichtet)</i>	7'428	11'251	18'679
	N (ungewichtet)	6'138	12'561	18'699
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	(0.2)	(0.1)	(0.1)
	nie	99.8	99.9	99.9
	<i>N (gewichtet)</i>	8'142	11'536	19'678
	N (ungewichtet)	6'988	12'693	19'681
1997	aktueller Gebrauch	(0.2)	-	(0.1)
	ehemaliger Gebrauch	(0.2)	-	(0.1)
	nie	99.6	100.0	99.8
	<i>N (gewichtet)</i>	5'611	7'379	12'990
	N (ungewichtet)	5'699	7'287	12'986
1992	aktueller Gebrauch	-		
	ehemaliger Gebrauch	(0.3)		
	nie	99.6		
	<i>N (gewichtet)</i>	6'868		
	N (ungewichtet)	6'837		

Fragen: 'Haben Sie schon Methadon genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Methadon?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozent

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für $n < 30$ stehen Werte in Klammern, für $n < 10$ werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von Methadon, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007

Methadon		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2007	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	(0.5)	(0.3)	(0.4)
	nie	99.4	99.7	99.6
	<i>N (gewichtet)</i>	3'724	5'390	9'114
	N (ungewichtet)	2'868	5'518	8'386
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	-	(0.1)	(0.2)
	nie	99.7	99.9	99.8
	<i>N (gewichtet)</i>	4'106	5'400	9'506
	N (ungewichtet)	3'334	5'554	8'888
1997	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	-	-	-
	nie	99.5	100.0	99.8
	<i>N (gewichtet)</i>	2'810	3'435	6'245
	N (ungewichtet)	2'680	3'070	5'750
1992	aktueller Gebrauch	-		
	ehemaliger Gebrauch	(0.5)		
	nie	99.5		
	<i>N (gewichtet)</i>	3'389		
	N (ungewichtet)	3'228		

Fragen: 'Haben Sie schon Methadon genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Methadon?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozent

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von Methadon, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich (1992) 1997-2007

Methadon		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	-	-	(0.1)
	nie	99.9	99.9	99.9
	<i>N (gewichtet)</i>	3'704	5'861	9'565
	N (ungewichtet)	3'270	7'043	10'313
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	-	-	-
	nie	99.8	99.9	99.9
	<i>N (gewichtet)</i>	4'036	6'135	10'171
	N (ungewichtet)	3'654	7'139	10'793
1997	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	-	-	-
	nie	99.7	100.0	99.8
	<i>N (gewichtet)</i>	2'801	3'944	6'745
	N (ungewichtet)	3'019	4'217	7'236
1992	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	-	-	-
	nie	99.7	-	-
	<i>N (gewichtet)</i>	3'479	-	-
	N (ungewichtet)	3'609	-	-

Fragen: 'Haben Sie schon Methadon genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Methadon?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozent

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für $n < 30$ stehen Werte in Klammern, für $n < 10$ werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von Methadon, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Methadon		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2007	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	(0.2)	(0.3)	-	0.2
	nie	99.8	99.7	99.8	99.8
	<i>N (gewichtet)</i>	13'433	4'394	852	18'679
	N (ungewichtet)	11'446	5'715	1'538	18'699
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	(0.1)	(0.2)	-	(0.1)
	nie	99.9	99.8	99.7	99.9
	<i>N (gewichtet)</i>	14'209	4'562	907	19'678
	N (ungewichtet)	13'202	4'929	1'550	19'681
1997	aktueller Gebrauch	(0.1)	-	-	(0.1)
	ehemaliger Gebrauch	-	-	-	(0.1)
	nie	99.8	99.8	99.6	99.8
	<i>N (gewichtet)</i>	9'286	3'082	622	12'990
	N (ungewichtet)	8'251	3'604	1'131	12'986

Fragen: 'Haben Sie schon Methadon genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Methadon?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt, deshalb sind die Werte von 1992 nicht mit jenen der anderen Jahre vergleichbar und hier nicht aufgeführt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von Methadon, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Methadon		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	(0.3)	(0.4)	-	(0.4)
	nie	99.6	99.5	99.6	99.6
	<i>N (gewichtet)</i>	6'564	2'149	401	9'114
	N (ungewichtet)	5'175	2'550	661	8'386
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	-	-	-	(0.2)
	nie	99.9	99.7	99.6	99.8
	<i>N (gewichtet)</i>	6'975	2'109	423	9'506
	N (ungewichtet)	6'095	2'115	678	8'888
1997	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	-	-	-	-
	nie	99.8	99.8	99.4	99.8
	<i>N (gewichtet)</i>	4'528	1'440	277	6'245
	N (ungewichtet)	3'735	1'546	469	5'750

Fragen: 'Haben Sie schon Methadon genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Methadon?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt, deshalb sind die Werte von 1992 nicht mit jenen der anderen Jahre vergleichbar und hier nicht aufgeführt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von Methadon, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Methadon		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	-	-	-	(0.1)
	nie	99.9	99.8	100.0	99.9
	<i>N (gewichtet)</i>	6'869	2'245	451	9'565
	N (ungewichtet)	6'271	3'165	877	10'313
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	-	-	-	-
	nie	99.9	99.9	99.8	99.9
	<i>N (gewichtet)</i>	7'234	2'453	484	10'171
	N (ungewichtet)	7'107	2'814	872	10'793
1997	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	-	-	-	-
	nie	99.8	99.9	99.8	99.8
	<i>N (gewichtet)</i>	4'758	1'642	345	6'745
	N (ungewichtet)	4'516	2'058	662	7'236

Fragen: 'Haben Sie schon Methadon genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Methadon?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt, deshalb sind die Werte von 1992 nicht mit jenen der anderen Jahre vergleichbar und hier nicht aufgeführt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von Ecstasy, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Ecstasy		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	(0.2)	-	(0.1)
	ehemaliger Gebrauch	3.4	0.6	1.7
	nie	96.4	99.4	98.2
	<i>N (gewichtet)</i>	<i>7'427</i>	<i>11'251</i>	<i>18'678</i>
	N (ungewichtet)	6'137	12'561	18'698
2002	aktueller Gebrauch	(0.2)	-	(0.1)
	ehemaliger Gebrauch	2.0	0.3	1.0
	nie	97.8	99.6	98.9
	<i>N (gewichtet)</i>	<i>8'142</i>	<i>11'536</i>	<i>19'678</i>
	N (ungewichtet)	6'988	12'693	19'681
1997	aktueller Gebrauch	(0.4)	-	(0.2)
	ehemaliger Gebrauch	1.8	-	0.8
	nie	97.8	99.9	99.0
	<i>N (gewichtet)</i>	<i>5'611</i>	<i>7'379</i>	<i>12'990</i>
	N (ungewichtet)	5'699	7'287	12'986

Fragen: 'Haben Sie schon Ecstasy genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Ecstasy?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nicht gestellt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von Ecstasy, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Ecstasy		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	(0.3)	-	(0.2)
	ehemaliger Gebrauch	4.6	0.8	2.3
	nie	95.0	99.2	97.5
	<i>N (gewichtet)</i>	3'724	5'390	9'114
	N (ungewichtet)	2'868	5'518	8'386
2002	aktueller Gebrauch	-	-	(0.1)
	ehemaliger Gebrauch	2.7	(0.4)	1.4
	nie	97.1	99.5	98.5
	<i>N (gewichtet)</i>	4'106	5'400	9'506
	N (ungewichtet)	3'334	5'554	8'888
1997	aktueller Gebrauch	(0.5)	-	(0.2)
	ehemaliger Gebrauch	2.3	-	1.1
	nie	97.2	99.9	98.7
	<i>N (gewichtet)</i>	2'810	3'435	6'245
	N (ungewichtet)	2'680	3'070	5'750

Fragen: 'Haben Sie schon Ecstasy genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Ecstasy?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nicht gestellt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von Ecstasy, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Ecstasy		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	2.2	0.5	1.2
	nie	97.7	99.5	98.8
	<i>N (gewichtet)</i>	3'703	5'861	9'564
	N (ungewichtet)	3'269	7'043	10'312
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	1.2	(0.2)	0.6
	nie	98.5	99.8	99.3
	<i>N (gewichtet)</i>	4'036	6'135	10'171
	N (ungewichtet)	3'654	7'139	10'793
1997	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	1.3	-	0.6
	nie	98.5	100.0	99.3
	<i>N (gewichtet)</i>	2'801	3'944	6'745
	N (ungewichtet)	3'019	4'217	7'236

Fragen: 'Haben Sie schon Ecstasy genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Ecstasy?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nicht gestellt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von Ecstasy, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Ecstasy		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	(0.1)	-	-	(0.1)
	ehemaliger Gebrauch	1.6	2.3	(0.6)	1.7
	nie	98.3	97.7	99.4	98.2
	<i>N (gewichtet)</i>	13'433	4'393	852	18'678
	N (ungewichtet)	11'446	5'714	1'538	18'698
2002	aktueller Gebrauch	(0.2)	-	-	(0.1)
	ehemaliger Gebrauch	0.9	1.4	-	1.0
	nie	98.9	98.6	99.5	98.9
	<i>N (gewichtet)</i>	14'209	4'562	907	19'678
	N (ungewichtet)	13'202	4'929	1'550	19'681
1997	aktueller Gebrauch	(0.2)	-	-	(0.2)
	ehemaliger Gebrauch	0.8	0.8	(1.0)	0.8
	nie	99.0	99.0	98.7	99.0
	<i>N (gewichtet)</i>	9'286	3'082	622	12'990
	N (ungewichtet)	8'251	3'604	1'131	12'986

Fragen: 'Haben Sie schon Ecstasy genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Ecstasy?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nicht gestellt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von Ecstasy, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Ecstasy		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	(0.2)	-	-	(0.2)
	ehemaliger Gebrauch	2.1	3.4	-	2.3
	nie	97.7	96.5	99.0	97.5
	N (gewichtet)	6'564	2'149	401	9'114
	N (ungewichtet)	5'175	2'550	661	8'386
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-	(0.1)
	ehemaliger Gebrauch	1.3	2.1	-	1.4
	nie	98.6	97.8	99.5	98.5
	N (gewichtet)	6'975	2'109	423	9'506
	N (ungewichtet)	6'095	2'115	678	8'888
1997	aktueller Gebrauch	-	-	-	(0.2)
	ehemaliger Gebrauch	1.1	(1.1)	-	1.1
	nie	98.7	98.6	98.8	98.7
	N (gewichtet)	4'528	1'440	277	6'245
	N (ungewichtet)	3'735	1'546	469	5'750

Fragen: 'Haben Sie schon Ecstasy genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Ecstasy?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nicht gestellt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von Ecstasy, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

Ecstasy		Sprachregion			Gesamt %
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2007	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	1.2	1.2	-	1.2
	nie	98.8	98.8	99.7	98.8
	<i>N (gewichtet)</i>	6'869	2'244	451	9'564
	N (ungewichtet)	6'271	3'164	877	10'312
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	0.6	(0.8)	-	0.6
	nie	99.3	99.2	99.5	99.3
	<i>N (gewichtet)</i>	7'234	2'453	484	10'171
	N (ungewichtet)	7'107	2'814	872	10'793
1997	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	(0.5)	(0.6)	-	0.6
	nie	99.4	99.4	98.7	99.3
	<i>N (gewichtet)</i>	4'758	1'642	345	6'745
	N (ungewichtet)	4'516	2'058	662	7'236

Fragen: 'Haben Sie schon Ecstasy genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Ecstasy?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 1992 nicht gestellt. 1997 wurden sie nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

andere illegale Drogen		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2007	aktueller Gebrauch	(0.2)	(0.1)	(0.2)
	ehemaliger Gebrauch	2.6	1.4	1.9
	nie	97.2	98.5	98.0
	<i>N (gewichtet)</i>	7'427	11'255	18'682
	N (ungewichtet)	6'137	12'562	18'699
2002	aktueller Gebrauch	(0.2)	-	(0.1)
	ehemaliger Gebrauch	2.1	1.0	1.5
	nie	97.7	98.9	98.4
	<i>N (gewichtet)</i>	8'142	11'536	19'678
	N (ungewichtet)	6'988	12'694	19'682
1997	aktueller Gebrauch	(0.3)	-	(0.1)
	ehemaliger Gebrauch	2.6	0.5	1.4
	nie	97.1	99.5	98.5
	<i>N (gewichtet)</i>	5'610	7'379	12'989
	N (ungewichtet)	5'698	7'287	12'985

Fragen: 'Haben Sie schon andere Drogen genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch andere Drogen?'

Anmerkungen: Da 1992 keine Fragen zu Ecstasy gestellt wurden, ist die Kategorie 'andere illegale Drogen' nicht mit derjenigen der späteren Befragungen vergleichbar und wird hier nicht aufgeführt.
1997 wurden diese Fragen nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Unter 'andere illegale Drogen' werden folgende Substanzen zusammengefasst:
1997 und 2002: Amphetamin oder ähnliches, Halluzinogene, andere Rauschgifte
2007: andere Drogen
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für $n < 30$ stehen Werte in Klammern, für $n < 10$ werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

andere illegale Drogen		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	(0.4)	-	(0.3)
	ehemaliger Gebrauch	3.6	1.9	2.6
	nie	96.0	97.9	97.1
	<i>N (gewichtet)</i>	3'724	5'394	9'118
	N (ungewichtet)	2'868	5'519	8'387
2002	aktueller Gebrauch	(0.2)	-	(0.1)
	ehemaliger Gebrauch	3.1	1.6	2.2
	nie	96.7	98.4	97.7
	<i>N (gewichtet)</i>	4'106	5'400	9'506
	N (ungewichtet)	3'334	5'554	8'888
1997	aktueller Gebrauch	(0.4)	-	(0.2)
	ehemaliger Gebrauch	3.4	(0.7)	2.0
	nie	96.1	99.2	97.8
	<i>N (gewichtet)</i>	2'809	3'435	6'244
	N (ungewichtet)	2'679	3'070	5'749

Fragen: 'Haben Sie schon andere Drogen genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch andere Drogen?'

Anmerkungen: Da 1992 keine Fragen zu Ecstasy gestellt wurden, ist die Kategorie 'andere illegale Drogen' nicht mit derjenigen der späteren Befragungen vergleichbar und wird hier nicht aufgeführt.
1997 wurden diese Fragen nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Unter 'andere illegale Drogen' werden folgende Substanzen zusammengefasst:
1997 und 2002: Amphetamin oder ähnliches, Halluzinogene, andere Rauschgifte
2007: andere Drogen
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

andere illegale Drogen		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	1.5	1.0	1.2
	nie	98.4	99.0	98.8
	<i>N (gewichtet)</i>	3'703	5'861	9'564
	N (ungewichtet)	3'269	7'043	10'312
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	1.1	0.6	0.8
	nie	98.6	99.4	99.1
	<i>N (gewichtet)</i>	4'036	6'136	10'172
	N (ungewichtet)	3'654	7'140	10'794
1997	aktueller Gebrauch	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	1.8	(0.3)	0.9
	nie	98.1	99.7	99.0
	<i>N (gewichtet)</i>	2'801	3'944	6'745
	N (ungewichtet)	3'019	4'217	7'236

Fragen: 'Haben Sie schon andere Drogen genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch andere Drogen?'

Anmerkungen: Da 1992 keine Fragen zu Ecstasy gestellt wurden, ist die Kategorie 'andere illegale Drogen' nicht mit derjenigen der späteren Befragungen vergleichbar und wird hier nicht aufgeführt.
1997 wurden diese Fragen nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Unter 'andere illegale Drogen' werden folgende Substanzen zusammengefasst:
1997 und 2002: Amphetamin oder ähnliches, Halluzinogene, andere Rauschgifte
2007: andere Drogen
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

andere illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	(0.2)	-	-	(0.2)
	ehemaliger Gebrauch	1.9	2.1	(0.7)	1.9
	nie	97.9	97.8	99.3	98.0
	<i>N (gewichtet)</i>	13'437	4'393	852	18'682
	N (ungewichtet)	11'447	5'714	1'538	18'699
2002	aktueller Gebrauch	(0.1)	-	-	(0.1)
	ehemaliger Gebrauch	1.5	1.7	(0.6)	1.5
	nie	98.4	98.3	99.3	98.4
	<i>N (gewichtet)</i>	14'210	4'562	907	19'678
	N (ungewichtet)	13'203	4'929	1'550	19'682
1997	aktueller Gebrauch	(0.2)	-	-	(0.1)
	ehemaliger Gebrauch	1.4	1.5	(1.2)	1.4
	nie	98.4	98.4	98.6	98.5
	<i>N (gewichtet)</i>	9'286	3'082	621	12'989
	N (ungewichtet)	8'251	3'604	1'130	12'985

Fragen: 'Haben Sie schon andere Drogen genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch andere Drogen?'

Anmerkungen: Da 1992 keine Fragen zu Ecstasy gestellt wurden, ist die Kategorie 'andere illegale Drogen' nicht mit derjenigen der späteren Befragungen vergleichbar und wird hier nicht aufgeführt.
1997 wurden diese Fragen nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Unter 'andere illegale Drogen' werden folgende Substanzen zusammengefasst:
1997 und 2002: Amphetamin oder ähnliches, Halluzinogene, andere Rauschgifte
2007: andere Drogen
Spaltenprozentage
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

andere illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	(0.3)	-	-	(0.3)
	ehemaliger Gebrauch	2.5	3.1	-	2.6
	nie	97.1	96.7	99.0	97.1
	N (gewichtet)	6'568	2'149	401	9'118
	N (ungewichtet)	5'176	2'550	661	8'387
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-	(0.1)
	ehemaliger Gebrauch	2.2	2.6	-	2.2
	nie	97.7	97.3	99.2	97.7
	N (gewichtet)	6'975	2'109	423	9'506
	N (ungewichtet)	6'095	2'115	678	8'888
1997	aktueller Gebrauch	(0.2)	-	-	(0.2)
	ehemaliger Gebrauch	2.0	2.1	-	2.0
	nie	97.8	97.8	98.4	97.8
	N (gewichtet)	4'528	1'440	276	6'244
	N (ungewichtet)	3'735	1'546	468	5'749

Fragen: 'Haben Sie schon andere Drogen genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch andere Drogen?'

Anmerkungen: Da 1992 keine Fragen zu Ecstasy gestellt wurden, ist die Kategorie 'andere illegale Drogen' nicht mit derjenigen der späteren Befragungen vergleichbar und wird hier nicht aufgeführt.
1997 wurden diese Fragen nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Unter 'andere illegale Drogen' werden folgende Substanzen zusammengefasst:
1997 und 2002: Amphetamin oder ähnliches, Halluzinogene, andere Rauschgifte
2007: andere Drogen
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2007

andere illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2007	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	1.2	1.2	-	1.2
	nie	98.7	98.8	99.7	98.8
	<i>N (gewichtet)</i>	6'869	2'244	451	9'564
	N (ungewichtet)	6'271	3'164	877	10'312
2002	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	0.8	(0.9)	-	0.8
	nie	99.1	99.1	99.4	99.1
	<i>N (gewichtet)</i>	7'235	2'453	484	10'172
	N (ungewichtet)	7'108	2'814	872	10'794
1997	aktueller Gebrauch	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	0.8	(0.9)	-	0.9
	nie	99.1	99.0	98.7	99.0
	<i>N (gewichtet)</i>	4'758	1'642	345	6'745
	N (ungewichtet)	4'516	2'058	662	7'236

Fragen: 'Haben Sie schon andere Drogen genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch andere Drogen?'

Anmerkungen: Da 1992 keine Fragen zu Ecstasy gestellt wurden, ist die Kategorie 'andere illegale Drogen' nicht mit derjenigen der späteren Befragungen vergleichbar und wird hier nicht aufgeführt.
1997 wurden diese Fragen nur unter 50-Jährigen, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Unter 'andere illegale Drogen' werden folgende Substanzen zusammengefasst:
1997 und 2002: Amphetamin oder ähnliches, Halluzinogene, andere Rauschgifte
2007: andere Drogen
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

MULTIPLER SUBSTANZGEBRAUCH

Alkohol-Konsumklassen und durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten* pro Tag Vergleich 1997-2007

Tabak		Gesamtpopulation				Männer				Frauen			
		Nicht-Rauchende	< 10 Einheiten	11-20 Einheiten	> 20 Einheiten	Nicht-Rauchende	< 10 Einheiten	11-20 Einheiten	> 20 Einheiten	Nicht-Rauchende	< 10 Einheiten	11-20 Einheiten	> 20 Einheiten
2007	nie, abstinenter	12.3	1.7	1.1	0.3	7.3	1.2	0.9	0.3	17.1	2.1	1.2	(0.2)
	geringes Risiko	57.2	14.1	7.0	1.7	57.7	15.7	8.7	2.6	56.6	12.5	5.4	0.7
	mittleres Risiko	1.9	0.6	0.5	0.2	1.6	0.7	0.7	(0.3)	2.2	0.6	0.4	(0.1)
	hohes Risiko	0.8	0.3	0.2	(0.2)	1.2	0.4	(0.3)	(0.3)	0.4	(0.2)	(0.2)	-
2002	nie, abstinenter	16.9	2.3	1.7	0.7	9.8	1.5	1.2	0.9	23.3	3.0	2.2	0.6
	geringes Risiko	49.7	12.7	7.8	2.4	50.7	14.8	9.8	3.9	48.8	10.9	6.0	1.0
	mittleres Risiko	2.1	0.6	0.7	0.3	2.3	0.7	0.9	0.6	1.9	0.5	0.5	(0.1)
	hohes Risiko	1.1	0.2	0.4	0.2	1.7	0.4	0.6	0.4	0.6	(0.1)	(0.2)	(0.1)
1997	nie, abstinenter	13.9	1.9	1.6	0.6	7.3	1.1	1.4	0.7	20.0	2.7	1.9	0.5
	geringes Risiko	49.9	13.8	9.0	3.3	50.2	15.6	11.3	5.0	49.7	12.2	6.9	1.8
	mittleres Risiko	1.9	0.6	0.8	0.5	1.8	0.7	0.9	0.7	2.0	0.5	0.7	(0.3)
	hohes Risiko	1.0	0.4	0.3	0.4	1.6	0.5	(0.6)	0.7	0.4	(0.2)	-	-

N (gewichtet) : **Gesamtpopulation:** 2007=17'544; 2002=18'538; 1997=12'656 / **Männer:** 2007=8'507; 2002=8'807; 1997=6'067 / **Frauen:** 2007=9'036; 2002=9'728; 1997=6'592

N (ungewichtet) : **Gesamtpopulation:** 2007=17'882; 2002=18'805; 1997=12'742 / **Männer:** 2007=7'922; 2002=8'332; 1997=5'619 / **Frauen:** 2007=9'960; 2002=10'473; 1997=7'123

ALKOHOL

Fragen:

'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'

Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?'

*Getränktypen: 'Bier'; 'Wein'; 'saure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'

Anmerkungen:

sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.

Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränktypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.

Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.

Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich: hohes Risiko: >60 g/Tag für Männer und >40 g/Tag für Frauen; mittleres Risiko: 40-60 g/Tag für Männer und 20-40 g/Tag für Frauen; geringes Risiko: <40 g/Tag für Männer und <20 g/Tag für Frauen. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).

TABAK

Fragen:

'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen:

Rauchende, welche keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "gelegentlich Rauchende" zugeordnet.

* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteinheiten transformiert: eine Pfeife oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:

< 10 Einheiten = selten bis 10.0 Zigaretteinheiten

11-20 Einheiten = 10.5 bis 20.0 Zigaretteinheiten

> 20 Einheiten = mehr als 20.0 Zigaretteinheiten

Anmerkungen:

Gesamtprozente (prozentuale Anteile der Zellohäufigkeiten am Total aller Befragten)

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Einheiten.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Cannabisgebrauchs in den letzten 12 Monaten und durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten* pro Tag Vergleich 1997-2007

Tabak		Gesamtpopulation				Männer				Frauen			
		Nicht-Rauchende	< 10 Einheiten	11-20 Einheiten	> 20 Einheiten	Nicht-Rauchende	< 10 Einheiten	11-20 Einheiten	> 20 Einheiten	Nicht-Rauchende	< 10 Einheiten	11-20 Einheiten	> 20 Einheiten
2007	kein Gebrauch	71.6	14.9	8.0	2.1	66.8	15.5	9.3	3.2	76.1	14.3	6.7	1.1
	weniger als 1 mal im Monat	0.4	0.5	0.3	(0.1)	0.5	0.6	(0.4)	-	(0.2)	0.4	(0.2)	-
	1 bis 3 mal im Monat	(0.1)	0.5	0.2	-	(0.2)	0.6	(0.4)	-	-	(0.3)	(0.1)	-
	1 mal wöchentlich oder mehr	(0.2)	0.8	0.3	(0.1)	(0.3)	1.3	0.5	(0.3)	-	(0.3)	(0.1)	-
2002	kein Gebrauch	69.1	14.2	9.6	3.3	63.2	15.0	11.0	5.1	74.3	13.4	8.4	1.7
	weniger als 1 mal im Monat	0.4	0.5	0.2	(0.1)	0.6	0.6	(0.3)	-	(0.3)	0.4	(0.2)	-
	1 bis 3 mal im Monat	(0.2)	0.4	(0.2)	(0.1)	(0.3)	0.5	(0.2)	(0.2)	-	(0.3)	-	-
	1 mal wöchentlich oder mehr	0.2	0.9	0.6	0.2	(0.3)	1.4	0.9	(0.3)	-	(0.4)	(0.2)	-
1997	kein Gebrauch	66.3	15.3	10.6	4.4	60.2	16.1	12.3	6.6	71.8	14.7	9.0	2.4
	weniger als 1 mal im Monat	0.2	0.6	0.3	(0.1)	(0.3)	0.7	(0.5)	(0.2)	(0.2)	0.5	(0.2)	-
	1 bis 3 mal im Monat	(0.1)	0.3	0.3	(0.1)	-	(0.4)	(0.4)	-	-	(0.2)	(0.2)	-
	1 mal wöchentlich oder mehr	(0.2)	0.5	0.6	(0.1)	(0.3)	0.7	1.0	(0.2)	-	(0.3)	(0.2)	-

N (gewichtet) : **Gesamtpopulation:** 2007=17'523; 2002=18'542; 1997=12'659 / **Männer:** 2007=8'496; 2002=8'797; 1997=6'065 / **Frauen:** 2007=9'025; 2002=9'745; 1997=6'594

N (ungewichtet) : **Gesamtpopulation:** 2007=17'866; 2002=18'818; 1997=12'742 / **Männer:** 2007=7'910; 2002=8'329; 1997=5'617 / **Frauen:** 2007=9'956; 2002=10'489; 1997=7'125

CANNABIS

Frage: 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Haschisch / Marijuana konsumiert?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt. 1997 wurde die Frage nur unter 60-Jährigen gestellt, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen; für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nie' aufgeführt.

TABAK

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Rauchende, welche keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "gelegentlich Rauchende" zugeordnet.
* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteneinheiten transformiert: eine Pfeiffe oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:
< 10 Einheiten = selten bis 10.0 Zigaretteneinheiten
11-20 Einheiten = 10.5 bis 20.0 Zigaretteneinheiten
> 20 Einheiten = mehr als 20.0 Zigaretteneinheiten

Anmerkungen: Gesamtprozente (prozentuale Anteile der Zelhäufigkeiten am Total aller Befragten)
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Einheiten.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Konsumklassen und Häufigkeit des Cannabisgebrauchs in den letzten 12 Monaten Vergleich 1997-2007

Cannabis		Gesamtpopulation				Männer				Frauen			
		kein Gebrauch	weniger als 1 mal im Monat	1 bis 3 mal im Monat	1 mal wöchentlich oder mehr	kein Gebrauch	weniger als 1 mal im Monat	1 bis 3 mal im Monat	1 mal wöchentlich oder mehr	kein Gebrauch	weniger als 1 mal im Monat	1 bis 3 mal im Monat	1 mal wöchentlich oder mehr
2007	nie, abstinente	15.2	-	-	(0.1)	9.6	-	-	-	20.5	-	-	-
	geringes Risiko	76.9	1.1	0.7	1.2	80.3	1.4	1.1	2.0	73.7	0.8	0.4	0.4
	mittleres Risiko	3.1	(0.1)	(0.0)	(0.1)	2.9	(0.1)	-	(0.1)	3.3	-	-	-
	hohes Risiko	1.3	-	(0.1)	(0.1)	1.9	-	-	(0.2)	0.8	-	-	-
2002	nie, abstinente	21.5	(0.1)	-	0.2	13.1	-	-	(0.3)	29.1	-	-	-
	geringes Risiko	69.4	1.1	0.6	1.5	74.4	1.4	1.0	2.3	64.8	0.8	(0.3)	0.7
	mittleres Risiko	3.5	(0.1)	(0.1)	(0.1)	4.0	-	(0.1)	(0.2)	2.9	-	-	-
	hohes Risiko	1.8	-	-	(0.1)	2.8	-	-	(0.2)	1.0	-	-	-
1997	nie, abstinente	17.9	-	-	(0.1)	10.2	-	-	-	24.9	-	-	-
	geringes Risiko	73.3	1.0	0.6	1.1	78.0	1.3	0.9	1.8	68.9	0.8	0.4	0.5
	mittleres Risiko	3.6	(0.1)	-	-	3.9	(0.1)	-	-	3.3	-	-	-
	hohes Risiko	1.8	(0.1)	-	(0.1)	3.0	(0.2)	-	-	0.8	-	-	-

N (gewichtet) : **Gesamtpopulation:** 2007=17'514; 2002=18'596; 1997=12'657 / **Männer:** 2007=8'489; 2002=8'828; 1997=6'067 / **Frauen:** 2007=9'026; 2002=9'766; 1997=6'594

N (ungewichtet) : **Gesamtpopulation:** 2007=17'858; 2002=18'844; 1997=12'742 / **Männer:** 2007=7'903; 2002=8'346; 1997=5'618 / **Frauen:** 2007=9'955; 2002=10'498; 1997=7'124

ALKOHOL

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränktypen: 'Bier'; 'Wein'; 'suure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'

Anmerkungen: sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränktypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich: hohes Risiko: >60 g/Tag für Männer und >40 g/Tag für Frauen; mittleres Risiko: 40-60 g/Tag für Männer und 20-40 g/Tag für Frauen; geringes Risiko: <40 g/Tag für Männer und <20 g/Tag für Frauen. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).

CANNABIS

Frage: 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Haschisch / Marijuana konsumiert?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt. 1997 wurde die Frage nur unter 60-Jährigen gestellt, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen; für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nie' aufgeführt.

Anmerkungen: Gesamtprozente (prozentuale Anteile der Zelhäufigkeiten am Total aller Befragten)
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Einheiten.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Konsumklassen und Häufigkeit der Medikamenteneinnahme in den letzten 7 Tagen Vergleich 1997-2007

Medikamente		Gesamtpopulation				Männer				Frauen			
		nie	etwa einmal pro Woche	mehrmals pro Woche	täglich	nie	etwa einmal pro Woche	mehrmals pro Woche	täglich	nie	etwa einmal pro Woche	mehrmals pro Woche	täglich
Alkohol	nie, abstinent	13.5	0.3	0.3	1.2	8.8	(0.1)	(0.2)	0.6	17.8	0.5	0.4	1.9
	geringes Risiko	74.5	1.4	1.2	2.8	80.8	1.1	0.9	2.1	68.6	1.6	1.6	3.5
	mittleres Risiko	2.9	(0.1)	(0.1)	0.3	3.0	-	-	(0.1)	2.8	(0.1)	(0.1)	0.4
	hohes Risiko	1.3	(0.1)	-	(0.1)	2.0	-	-	-	0.7	-	-	-
2007	nie, abstinent	19.4	0.3	0.3	1.7	12.4	(0.2)	(0.2)	0.7	25.8	0.3	0.5	2.6
	geringes Risiko	68.8	0.9	0.9	2.0	76.0	0.8	0.7	1.6	62.3	1.1	1.1	2.3
	mittleres Risiko	3.4	(0.0)	(0.1)	0.2	4.1	-	-	(0.2)	2.7	(0.1)	(0.1)	(0.2)
	hohes Risiko	1.8	(0.1)	-	(0.1)	2.8	-	-	(0.1)	0.8	-	-	(0.1)
2002	nie, abstinent	15.9	0.3	0.3	1.5	9.9	-	-	(0.5)	21.5	0.5	0.6	2.5
	geringes Risiko	70.9	1.1	1.2	2.8	78.3	0.8	0.8	2.1	64.1	1.3	1.6	3.6
	mittleres Risiko	3.5	(0.1)	(0.1)	0.2	3.8	-	-	-	3.1	-	-	(0.3)
	hohes Risiko	1.8	-	-	(0.1)	3.2	-	-	(0.2)	0.6	-	-	(0.1)
1997	nie, abstinent	19.4	0.3	0.3	1.7	12.4	(0.2)	(0.2)	0.7	25.8	0.3	0.5	2.6
	geringes Risiko	68.8	0.9	0.9	2.0	76.0	0.8	0.7	1.6	62.3	1.1	1.1	2.3
	mittleres Risiko	3.4	(0.0)	(0.1)	0.2	4.1	-	-	(0.2)	2.7	(0.1)	(0.1)	(0.2)
	hohes Risiko	1.8	(0.1)	-	(0.1)	2.8	-	-	(0.1)	0.8	-	-	(0.1)

N (gewichtet) : **Gesamtpopulation:** 2007=17'556; 2002=18'618; 1997=12'665 / **Männer:** 2007=8'515; 2002=8'843; 1997=6'071 / **Frauen:** 2007=9'040; 2002=9'773; 1997=6'593

N (ungewichtet) : **Gesamtpopulation:** 2007=17'889; 2002=18'859; 1997=12'752 / **Männer:** 2007=7'923; 2002=8'356; 1997=5'626 / **Frauen:** 2007=9'996; 2002=10'503; 1997=7'126

ALKOHOL

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'
 Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?'
 *Getränktypen: 'Bier'; 'Wein'; 'saure Most'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'

Anmerkungen: sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
 Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränktypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich: hohes Risiko: >60 g/Tag für Männer und >40 g/Tag für Frauen; mittleres Risiko: 40-60 g/Tag für Männer und 20-40 g/Tag für Frauen; geringes Risiko: <40 g/Tag für Männer und <20 g/Tag für Frauen. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).

MEDIKAMENTE

Fragen: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?' und 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
 Medikamenteinnahme = Einnahme von Beruhigungsmitteln und/oder Schlafmitteln.
 nie = in den letzten 7 Tagen keine Beruhigungsmittel und keine Schlafmittel genommen
 etwa einmal pro Woche = in den letzten 7 Tagen einmal Beruhigungsmittel und/oder Schlafmittel genommen
 mehrmals pro Woche = in den letzten 7 Tagen mehrmals Beruhigungsmittel und/oder Schlafmittel genommen
 täglich = in den letzten 7 Tagen jeden Tag Beruhigungsmittel und/oder Schlafmittel genommen

Anmerkungen: Gesamtprozente (prozentuale Anteile der Zelhäufigkeiten am Total aller Befragten)
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Einheiten.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Medikamenteneinnahme in den letzten 7 Tagen und durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten* pro Tag Vergleich 1997-2007

Tabak		Gesamtpopulation				Männer				Frauen			
		Nicht-Rauchende	< 10 Einheiten	11-20 Einheiten	> 20 Einheiten	Nicht-Rauchende	< 10 Einheiten	11-20 Einheiten	> 20 Einheiten	Nicht-Rauchende	< 10 Einheiten	11-20 Einheiten	> 20 Einheiten
2007	nie	66.5	15.6	8.1	2.0	64.3	17.1	9.9	3.2	68.4	14.2	6.4	0.9
	etwa einmal pro Woche	1.3	0.3	(0.2)	(0.1)	0.8	(0.3)	(0.2)	-	1.8	(0.3)	(0.1)	-
	mehrmals pro Woche	1.2	0.2	(0.1)	(0.1)	0.8	(0.2)	(0.2)	-	1.6	(0.3)	(0.1)	-
	täglich	3.3	0.5	0.4	0.2	1.9	0.4	0.4	0.2	4.5	0.6	0.5	(0.2)
2002	nie	65.1	15.2	9.9	3.3	61.3	17.0	11.9	5.1	68.5	13.5	8.0	1.6
	etwa einmal pro Woche	0.9	0.2	(0.1)	(0.1)	0.6	(0.2)	-	-	1.2	(0.2)	(0.1)	-
	mehrmals pro Woche	1.0	0.2	0.2	-	0.7	-	-	-	1.2	(0.2)	(0.2)	-
	täglich	2.9	0.4	0.4	0.3	1.8	(0.2)	0.3	0.3	3.9	0.6	0.6	(0.2)
1997	nie	61.0	15.8	11.0	4.3	58.1	17.0	13.5	6.6	63.7	14.7	8.7	2.2
	etwa einmal pro Woche	1.0	(0.2)	(0.2)	(0.1)	0.5	(0.2)	-	(0.1)	1.5	(0.2)	(0.2)	-
	mehrmals pro Woche	1.3	(0.1)	(0.2)	(0.1)	0.7	-	-	-	1.9	(0.2)	(0.2)	-
	täglich	3.4	0.5	0.5	0.3	1.6	(0.5)	0.5	(0.3)	5.0	0.6	0.5	(0.3)

N (gewichtet) : **Gesamtpopulation:** 2007=17'560; 2002=18'563; 1997=12'665 / **Männer:** 2007=8'524; 2002=8'813; 1997=6'069 / **Frauen:** 2007=9'039; 2002=9'751; 1997=6'596

N (ungewichtet) : **Gesamtpopulation:** 2007=17'869; 2002=18'830; 1997=12'751 / **Männer:** 2007=7'929; 2002=8'338; 1997=5'625 / **Frauen:** 2007=9'967; 2002=10'492; 1997=7'126

TABAK

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie "gelegentlich Rauchende" zugeordnet.
* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteneinheiten transformiert: eine Pfeife oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:
< 10 Einheiten = selten bis 10.0 Zigaretteneinheiten
11-20 Einheiten = 10.5 bis 20.0 Zigaretteneinheiten
> 20 Einheiten = mehr als 20.0 Zigaretteneinheiten

MEDIKAMENTE

Fragen: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?' und 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'

Anmerkungen: Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Medikamenteinnahme = Einnahme von Beruhigungsmitteln und/oder Schlafmitteln.
nie = in den letzten 7 Tagen keine Beruhigungsmittel und keine Schlafmittel genommen
etwa einmal pro Woche = in den letzten 7 Tagen einmal Beruhigungsmittel und/oder Schlafmittel genommen
mehrmals pro Woche = in den letzten 7 Tagen mehrmals Beruhigungsmittel und/oder Schlafmittel genommen
täglich = in den letzten 7 Tagen jeden Tag Beruhigungsmittel und/oder Schlafmittel genommen

Anmerkungen: Gesamtprozente (prozentuale Anteile der Zelhäufigkeiten am Total aller Befragten)
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Einheiten.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Medikamenteneinnahme in den letzten 7 Tagen und Häufigkeit des Cannabisgebrauchs in den letzten 12 Monaten

Vergleich 1997-2007

Cannabis		Gesamtpopulation				Männer				Frauen			
		kein Gebrauch	weniger als 1 mal im Monat	1 bis 3 mal im Monat	1 mal wöchentlich oder mehr	kein Gebrauch	weniger als 1 mal im Monat	1 bis 3 mal im Monat	1 mal wöchentlich oder mehr	kein Gebrauch	weniger als 1 mal im Monat	1 bis 3 mal im Monat	1 mal wöchentlich oder mehr
2007	Medikamente												
	nie	88.9	1.2	0.8	1.3	89.7	1.5	1.1	2.3	88.2	0.9	0.5	0.4
	etwa einmal pro Woche	1.7	-	-	-	1.2	-	-	-	2.2	-	-	-
	mehrmals pro Woche	1.6	-	-	-	1.2	-	-	-	2.0	-	-	-
	täglich	4.3	-	-	-	2.8	-	-	-	5.7	-	-	-
2002	Medikamente												
	nie	89.7	1.2	0.8	1.8	89.9	1.5	1.1	2.8	89.5	0.9	0.4	0.8
	etwa einmal pro Woche	1.3	-	-	-	1.0	-	-	-	1.5	-	-	-
	mehrmals pro Woche	1.3	-	-	-	0.9	-	-	-	1.6	-	-	-
	täglich	3.9	-	-	-	2.6	-	-	-	5.1	-	-	-
1997	Medikamente												
	nie	88.9	1.3	0.8	1.3	90.4	1.7	1.0	2.0	87.4	0.9	0.5	0.6
	etwa einmal pro Woche	1.4	-	-	-	1.0	-	-	-	1.8	-	-	-
	mehrmals pro Woche	1.7	-	-	-	1.0	-	-	-	2.3	-	-	-
	täglich	4.6	-	-	-	2.7	-	-	-	6.4	-	-	-

N (gewichtet) : **Gesamtpopulation:** 2007=17'530; 2002=18'623; 1997=12'666 / **Männer:** 2007=8'502; 2002=8'835; 1997=6'073 / **Frauen:** 2007=9'029; 2002=9'788; 1997=6'595

N (ungewichtet) : **Gesamtpopulation:** 2007=17'875; 2002=18'872; 1997=12'751 / **Männer:** 2007=7'912; 2002=8'354; 1997=5'624 / **Frauen:** 2007=9'963; 2002=10'518; 1997=7'127

CANNABIS

Frage: 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Haschisch / Marijuana konsumiert?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nur unter 40-Jährigen gestellt. 1997 wurde die Frage nur unter 60-Jährigen gestellt, 2002 nur unter 65-Jährigen und 2007 nur unter 70-Jährigen; für die Jahre 1997, 2002 und 2007 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozent

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

MEDIKAMENTE

Fragen: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?' und 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.

Medikamenteinnahme = Einnahme von Beruhigungsmitteln und/oder Schlafmitteln.

nie = in den letzten 7 Tagen keine Beruhigungsmittel und keine Schlafmittel genommen

etwa einmal pro Woche = in den letzten 7 Tagen einmal Beruhigungsmittel und/oder Schlafmittel genommen

mehrmals pro Woche = in den letzten 7 Tagen mehrmals Beruhigungsmittel und/oder Schlafmittel genommen

täglich = in den letzten 7 Tagen jeden Tag Beruhigungsmittel und/oder Schlafmittel genommen

Anmerkungen: Gesamtprozente (prozentuale Anteile der Zelhäufigkeiten am Total aller Befragten)

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Einheiten.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

NACHTRAG (ILLEGALE DROGEN)

Cannabisgebrauch, nach Alter Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007

Cannabis		Altersgruppen							Gesamt
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50+	
		%	%	%	%	%	%	%	
	ja	23.6	37.9	38.2	33.2	27.8	22.3	6.2	19.5
	nein	76.4	62.1	61.8	66.8	72.2	77.7	93.8	80.5
	<i>N (gewichtet)</i>	1'582	1'272	1'374	1'487	1'717	3'625	7'632	18'690
	N (ungewichtet)	964	842	1'110	1'389	1'837	3'530	9'035	18'707

Frage: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Cannabisgebrauch, nach Alter Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007

Cannabis		Altersgruppen							Gesamt
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50+	
		%	%	%	%	%	%	%	
	ja	30.1	46.1	47.5	42.5	34.4	26.1	7.9	24.4
	nein	69.9	53.9	52.5	57.5	65.6	73.9	92.1	75.6
	<i>N (gewichtet)</i>	816	657	692	716	847	1'800	3'597	9'124
	N (ungewichtet)	505	415	495	629	827	1'689	3'833	8'393

Frage: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Cannabisgebrauch, nach Alter Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007

Cannabis		Altersgruppen							Gesamt
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50+	
		%	%	%	%	%	%	%	
	ja	16.7	29.2	28.7	24.6	21.3	18.7	4.8	14.8
	nein	83.3	70.8	71.3	75.4	78.7	81.3	95.2	85.2
	<i>N (gewichtet)</i>	766	616	682	771	869	1'826	4'035	9'565
	N (ungewichtet)	459	427	615	760	1'010	1'841	5'202	10'314

Frage: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Cannabisgebrauch, nach Sprachregion Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007

Cannabis		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
	ja	19.3	21.5	10.8	19.5
	nein	80.7	78.5	89.2	80.5
	<i>N (gewichtet)</i>	13'439	4'397	853	18'690
	N (ungewichtet)	11'450	5'717	1'540	18'707

Frage: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Cannabisgebrauch, nach Sprachregion Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007

Cannabis		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
	ja	24.1	27.2	14.3	24.4
	nein	75.9	72.8	85.7	75.6
	<i>N (gewichtet)</i>	6'570	2'152	403	9'124
	N (ungewichtet)	5'178	2'552	663	8'393

Frage: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Cannabisgebrauch, nach Sprachregion Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007

Cannabis		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
	ja	14.8	16.1	7.7	14.8
	nein	85.2	83.9	92.3	85.2
	<i>N (gewichtet)</i>	6'870	2'245	451	9'565
	N (ungewichtet)	6'272	3'165	877	10'314

Frage: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Heroingebrauch, nach Alter
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007

Heroin		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
	ja	0.9	0.6	0.7
	nein	99.1	99.4	99.3
	<i>N (gewichtet)</i>	7'428	11'255	18'683
	N (ungewichtet)	6'138	12'562	18'700

Frage: 'Haben Sie schon Heroin genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Heroingebrauch, nach Alter
Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007

Heroin		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
	ja	1.4	0.8	1.1
	nein	98.6	99.2	98.9
	<i>N (gewichtet)</i>	3'724	5'394	9'118
	N (ungewichtet)	2'868	5'519	8'387

Frage: 'Haben Sie schon Heroin genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Heroingebrauch, nach Alter
Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007

Heroin		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
	ja	(0.5)	(0.3)	0.4
	nein	99.5	99.7	99.6
	<i>N (gewichtet)</i>	3'704	5'861	9'565
	N (ungewichtet)	3'270	7'043	10'313

Frage: 'Haben Sie schon Heroin genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Heroingebrauch, nach Sprachregion Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007

Heroin		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
	ja	0.6	1.2	0.3	0.7
	nein	99.4	98.8	99.7	99.3
	<i>N (gewichtet)</i>	13'437	4'394	852	18'683
	N (ungewichtet)	11'447	5'715	1'538	18'700

Frage: 'Haben Sie schon Heroin genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Heroingebrauch, nach Sprachregion Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007

Heroin		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
	ja	0.9	1.6	-	1.1
	nein	99.1	98.4	99.3	98.9
	<i>N (gewichtet)</i>	6'568	2'149	401	9'118
	N (ungewichtet)	5'176	2'550	661	8'387

Frage: 'Haben Sie schon Heroin genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<10 werden keine Werte berichtet.

Heroingebrauch, nach Sprachregion Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007

Heroin		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
	ja	(0.3)	(0.7)	-	0.4
	nein	99.7	99.3	100.0	99.6
	<i>N (gewichtet)</i>	6'869	2'245	451	9'565
	N (ungewichtet)	6'271	3'165	877	10'313

Frage: 'Haben Sie schon Heroin genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Alter

Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007

Kokain		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
	ja	4.4	1.7	2.8
	nein	95.6	98.3	97.2
	<i>N (gewichtet)</i>	7'428	11'251	18'678
	N (ungewichtet)	6'138	12'560	18'698

Fragen: 'Haben Sie schon Kokain genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozentage

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Kokaingebrauch, nach Alter

Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007

Kokain		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
	ja	6.1	2.2	3.8
	nein	93.9	97.8	96.2
	<i>N (gewichtet)</i>	3'724	5'390	9'114
	N (ungewichtet)	2'868	5'518	8'386

Fragen: 'Haben Sie schon Kokain genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozentage

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Kokaingebrauch, nach Alter

Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007

Kokain		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
	ja	2.7	1.2	1.8
	nein	97.3	98.8	98.2
	<i>N (gewichtet)</i>	3'704	5'860	9'564
	N (ungewichtet)	3'270	7'042	10'312

Fragen: 'Haben Sie schon Kokain genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozentage

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007

Kokain		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
	ja	2.4	4.0	2.0	2.8
	nein	97.6	96.0	98.0	97.2
	<i>N (gewichtet)</i>	13'433	4'394	852	18'678
	N (ungewichtet)	11'445	5'715	1'538	18'698

Frage: 'Haben Sie schon Kokain genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007

Kokain		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
	ja	3.2	5.7	(3.0)	3.8
	nein	96.8	94.3	97.0	96.2
	<i>N (gewichtet)</i>	6'564	2'149	401	9'114
	N (ungewichtet)	5'175	2'550	661	8'386

Frage: 'Haben Sie schon Kokain genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007

Kokain		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
	ja	1.6	2.4	(1.0)	1.8
	nein	98.4	97.6	99.0	98.2
	<i>N (gewichtet)</i>	6'869	2'245	451	9'564
	N (ungewichtet)	6'270	3'165	877	10'312

Frage: 'Haben Sie schon Kokain genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Gebrauch von Methadon, nach Alter Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007

Methadon		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
	ja	(0.4)	(0.2)	0.2
	nein	99.6	99.8	99.8
	<i>N (gewichtet)</i>	7'428	11'251	18'679
	N (ungewichtet)	6'138	12'561	18'699

Frage: 'Haben Sie schon Methadon genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Gebrauch von Methadon, nach Alter Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007

Methadon		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
	ja	(0.6)	(0.3)	(0.4)
	nein	99.4	99.7	99.6
	<i>N (gewichtet)</i>	3'724	5'390	9'114
	N (ungewichtet)	2'868	5'518	8'386

Frage: 'Haben Sie schon Methadon genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Gebrauch von Methadon, nach Alter Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007

Methadon		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
	ja	-	-	(0.1)
	nein	99.9	99.9	99.9
	<i>N (gewichtet)</i>	3'704	5'861	9'565
	N (ungewichtet)	3'270	7'043	10'313

Frage: 'Haben Sie schon Methadon genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von Methadon, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007

Methadon		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
	ja	(0.2)	(0.3)	-	0.2
	nein	99.8	99.7	99.8	99.8
	<i>N (gewichtet)</i>	13'433	4'394	852	18'679
	N (ungewichtet)	11'446	5'715	1'538	18'699

Frage: 'Haben Sie schon Methadon genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von Methadon, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007

Methadon		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
	ja	(0.4)	(0.5)	-	0.4
	nein	99.6	99.5	99.6	99.6
	<i>N (gewichtet)</i>	6'564	2'149	401	9'114
	N (ungewichtet)	5'175	2'550	661	8'386

Frage: 'Haben Sie schon Methadon genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von Methadon, nach Sprachregion
Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007

Methadon		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
	ja	-	-	-	(0.1)
	nein	99.9	99.8	100.0	99.9
	<i>N (gewichtet)</i>	6'869	2'245	451	9'565
	N (ungewichtet)	6'271	3'165	877	10'313

Frage: 'Haben Sie schon Methadon genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von Ecstasy, nach Alter
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007

Ecstasy		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
	ja	3.6	0.6	1.8
	nein	96.4	99.4	98.2
	<i>N (gewichtet)</i>	<i>7'427</i>	<i>11'251</i>	<i>18'678</i>
	N (ungewichtet)	6'137	12'561	18'698

Frage: 'Haben Sie schon Ecstasy genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Gebrauch von Ecstasy, nach Alter
Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007

Ecstasy		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
	ja	5.0	0.8	2.5
	nein	95.0	99.2	97.5
	<i>N (gewichtet)</i>	<i>3'724</i>	<i>5'390</i>	<i>9'114</i>
	N (ungewichtet)	2'868	5'518	8'386

Frage: 'Haben Sie schon Ecstasy genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Gebrauch von Ecstasy, nach Alter
Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007

Ecstasy		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
	ja	2.3	0.5	1.2
	nein	97.7	99.5	98.8
	<i>N (gewichtet)</i>	<i>3'703</i>	<i>5'861</i>	<i>9'564</i>
	N (ungewichtet)	3'269	7'043	10'312

Frage: 'Haben Sie schon Ecstasy genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Gebrauch von Ecstasy, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007

Ecstasy		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
	ja	1.7	2.3	(0.6)	1.8
	nein	98.3	97.7	99.4	98.2
	<i>N (gewichtet)</i>	13'433	4'393	852	18'678
	N (ungewichtet)	11'446	5'714	1'538	18'698

Frage: 'Haben Sie schon Ecstasy genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Gebrauch von Ecstasy, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007

Ecstasy		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
	ja	2.3	3.5	-	2.5
	nein	97.7	96.5	99.0	97.5
	<i>N (gewichtet)</i>	6'564	2'149	401	9'114
	N (ungewichtet)	5'175	2'550	661	8'386

Frage: 'Haben Sie schon Ecstasy genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von Ecstasy, nach Sprachregion
Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007

Ecstasy		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
	ja	1.2	1.2	-	1.2
	nein	98.8	98.8	99.7	98.8
	<i>N (gewichtet)</i>	6'869	2'244	451	9'564
	N (ungewichtet)	6'271	3'164	877	10'312

Frage: 'Haben Sie schon Ecstasy genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007

andere illegale Drogen		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
	ja	2.8	1.5	2.0
	nein	97.2	98.5	98.0
	<i>N (gewichtet)</i>	<i>7'427</i>	<i>11'255</i>	<i>18'682</i>
	N (ungewichtet)	6'137	12'562	18'699

Frage: 'Haben Sie schon andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007

andere illegale Drogen		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
	ja	4.0	2.1	2.9
	nein	96.0	97.9	97.1
	<i>N (gewichtet)</i>	<i>3'724</i>	<i>5'394</i>	<i>9'118</i>
	N (ungewichtet)	2'868	5'519	8'387

Frage: 'Haben Sie schon andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007

andere illegale Drogen		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
	ja	1.6	1.0	1.2
	nein	98.4	99.0	98.8
	<i>N (gewichtet)</i>	<i>3'703</i>	<i>5'861</i>	<i>9'564</i>
	N (ungewichtet)	3'269	7'043	10'312

Frage: 'Haben Sie schon andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, 2007

andere illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
	ja	2.1	2.2	(0.7)	2.0
	nein	97.9	97.8	99.3	98.0
	<i>N (gewichtet)</i>	13'437	4'393	852	18'682
	N (ungewichtet)	11'447	5'714	1'538	18'699

Frage: 'Haben Sie schon andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, 2007

andere illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
	ja	2.9	3.3	-	2.9
	nein	97.1	96.7	99.0	97.1
	<i>N (gewichtet)</i>	6'568	2'149	401	9'118
	N (ungewichtet)	5'176	2'550	661	8'387

Frage: 'Haben Sie schon andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Frauen, Lebenszeitprävalenz, 2007

andere illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
	ja	1.3	1.2	-	1.2
	nein	98.7	98.8	99.7	98.8
	<i>N (gewichtet)</i>	6'869	2'244	451	9'564
	N (ungewichtet)	6'271	3'164	877	10'312

Frage: 'Haben Sie schon andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde nur in der Altersgruppe der 15 bis 69-Jährigen gestellt. Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, wurden unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozent
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<10 werden keine Werte berichtet.