

act-info - SAMBAD

Ambulante Suchthilfe

Ergebnisse der Erhebung 2019



Etienne Maffli

Lausanne, Februar 2021

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Klientinnen und Klienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebogen dieser Erhebung auszufüllen. Wir danken ebenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Logistik- und Erfassungsarbeiten geleistet haben. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes. An dieser Stelle seien auch Edith Bacher für die Layoutarbeiten und Marina Delgrande Jordan für ihre wertvolle Zusammenarbeit in der Entwicklung der Analysesyntaxen gedankt.

Auskunft: Etienne Maffli, Tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
E-Mail emaffli@suchtschweiz.ch

Bearbeitung: Etienne Maffli
Sucht Schweiz

Vertrieb: Forschung, Sucht Schweiz, Av. Louis-Ruchonnet 14,
1003 Lausanne, Tel. 021 321 29 66, Fax 021 321 29 40,
E-Mail cgmel@suchtschweiz.ch

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: Sucht Schweiz

Copyright: © Sucht Schweiz, Lausanne 2021

Zitierhinweis: Maffli, E. (2021). *act-info* – SAMBAD: Ambulante Suchthilfe:
Ergebnisse der Erhebung 2019. Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---|
| act-info – addiction care and therapy information..... | 7 |
| act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)..... | 7 |
| Hinweise zu den Tabellen..... | 8 |

EINTRITT

| | |
|--------|---|
| T1 | Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019) |
| T2 | Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019) |
| T3 | Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019) |
| T4 | Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019) |
| T5 | Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019) |
| T6 | Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019) |
| T7 | Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019) |
| T8 | Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019) |
| T9 | Hauptsächliche zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019) |
| T10 | Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2019) |
| T11 | Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor Eintritt und Typ der früheren Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019) |
| T12 | Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach Hauptproblem (2019) |
| T13 | Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2019) |
| T14 | Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2019) |
| T15.1a | Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2019), Männer |
| T15.1b | Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2019), Frauen |
| T15.1c | Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2019), Männer und Frauen |

- T15.2a Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2019), Männer
- T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2019), Frauen
- T15.2c Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2019), Männer und Frauen
- T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2019), Männer
- T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2019), Frauen
- T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2019), Männer und Frauen
- T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2019), Männer
- T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2019), Frauen
- T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2019), Männer und Frauen
- T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2019)
- T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 12 Monaten vor Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)
- T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)
- T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Männer
- T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Frauen
- T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Männer und Frauen
- T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2019), Männer
- T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2019), Frauen
- T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2019), Männer und Frauen
- T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)
- T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)
- T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)
- T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)

- T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Männer
- T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Frauen
- T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Männer und Frauen
- T24a Psychische Probleme im Leben (2019), Männer
- T24b Psychische Probleme im Leben (2019), Frauen
- T24c Psychische Probleme im Leben (2019), Männer und Frauen
- T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2019)
- T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2019)

AUSTRITT

- T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
- T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
- T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
- T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
- T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
- T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
- T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
- T32c Todesursachen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
- T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
- T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (2019)
- T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)
- T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)
- T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)
- T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)
- T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz (nur Selbstbetroffene) (2019)

TRENDS

- G1 Hauptproblem Alkohol bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019
- G2 Hauptproblem Opioide bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019
- G3 Hauptproblem Kokain oder Derivate bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019
- G4 Hauptproblem andere Stimulantien bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019
- G5 Hauptproblem Cannabis bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019
- G6 Hauptproblem Hypnotika/Sedativa bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019
- G7 Hauptproblem Glücksspiel bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019

act-info - addiction care and therapy information

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik des ambulanten Bereichs der psychosozialen Suchthilfe)
- Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Substitution (nationale Substitutionsstatistik)

Diese fünf Statistiken verfügen seit 2004 über harmonisierte und optimierte Instrumente. Die gemeinsamen Kerndaten werden in eine zentrale Datenbank zusammengefügt und ermöglichen somit ebenfalls bereichsübergreifende Analysen. Durch die Übernahme der europäischen Standards (Treatment Demand Indicator) wird zudem eine internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert. Die Jahresehebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden seit dem Berichtsjahr 2018 alle von Sucht Schweiz in Lausanne realisiert.

act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)

Seit 2004 werden die Instrumente des act-info-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe eingesetzt und haben damit die früheren Fragebogen, welche seit 1994 Verwendung fanden, ersetzt. Nach mehreren Jahren Anwendung fand eine Revision der Instrumente statt und die revidierten Fragebogen wurden am 1. Januar 2013 eingeführt. Dieser Prozess wurde mit der Revision der europäischen Normen abgestimmt. Allerdings konnten nicht alle Einrichtungen die revidierten Fragebogen in ihre Systeme implementieren. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, steht im ambulanten Bereich auch eine gekürzte Version zur Auswahl. Dies erklärt zum Teil die relativ hohe Anzahl fehlender Angaben bei manchen Fragen.

Die Statistik act-info SAMBAD bietet einen Überblick über die Klientinnen und Klienten der ambulanten Suchthilfe in der Schweiz. Die Daten werden zu Beginn und bei der Beendigung der Beratung bzw. Behandlung erfasst. Die bei Eintritt erhobenen Angaben informieren insbesondere über die sozio-demographischen Charakteristika der Klientinnen und Klienten, über ihre bisherigen Behandlungserfahrungen sowie über ihr Konsumverhalten und psychosoziale Probleme vor der Aufnahme in die aktuelle Behandlung. Die bei Austritt erhobenen Informationen betreffen in erster Linie die Umstände der Behandlungsbeendigung und die soziodemographischen Charakteristika der Klientinnen und Klienten zu diesem Zeitpunkt.

Im Jahre 2019 beteiligten sich 64 Einrichtungen des Bereichs der ambulanten psychosozialen Suchthilfe am act-info-Monitoring. Es handelt sich hauptsächlich um spezialisierte Alkohol- und /oder Drogenberatungsstellen, sowie um verschiedene polyvalente Dienste, die neben anderen Leistungen auch Hilfe bei Suchtproblemen anbieten. Einrichtungen, welche nicht am act-info-Monitoring teilnehmen, sind im Rahmen einer umfassenden Erhebung zur Einschätzung der gesamten Behandlungsnachfrage in der Suchthilfe befragt worden. Die Ergebnisse dieser

Befragung werden im Gesamtbericht *act-info* (Jahresbericht 2019) berichtet, welcher ebenfalls Anfang 2021 publiziert wird.

Hinweise zu den Tabellen

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben des laufenden *act-info*-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe enthält allgemein zwei Arten von Tabellen:

- Bei Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien oder bei in eindeutigen Kategorien re-kodierten Antworten (z.B. "Zivilstand" oder "Alter") werden die Prozentwerte der entsprechenden Antwortkategorien angegeben.
- Bei Fragen ohne vorgegebene Antwortkategorien, die eine numerische Angabe voraussetzen (z.B. "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"), werden in der Tabelle Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Dispersionsmasse (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) angegeben.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der Klientinnen und Klienten, die beim Eintritt **Alkohol**, **Opiate** (insbesondere Heroin), **Kokain** (und Derivate) oder **Cannabis** als Hauptproblem angegeben haben, separat dargestellt. Auch die **Angehörigen**, die sich wegen Problemen einer Drittperson beraten lassen, werden als gesonderte Gruppe behandelt und deren Angaben bezüglich Soziodemographie getrennt analysiert. Mit Ausnahme der Themen, die sich direkt auf die Konsummuster oder auf die Formen des Suchtverhaltens beziehen, werden die Resultate für (die wenigen) Personen, die andere Substanzen (z.B. Stimulanzien oder flüchtige Lösungsmittel) oder ein suchtähnliches, nicht substanzgebundenes Verhalten (z.B. pathologisches Spielen) als Hauptproblem genannt haben, nicht getrennt aufgeführt. Diese Personen werden aber in die Analysen aufgenommen, die sich auf die Gesamtzahl der Betreuungen beziehen und deren Ergebnisse jeweils im rechten Block der Tabelle aufgeführt sind. Alle Analysen werden für Frauen und Männer getrennt sowie für beide Geschlechter zusammen durchgeführt (Spalte "Total", welche gegebenenfalls die wenigen Personen enthält, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht bekannt ist).

Nur gültige Antworten werden für die Analysen berücksichtigt. Das heisst, dass Antworten, die als "nicht bekannt" angegeben worden sind oder fehlende Angaben (missings) von den Analysen ausgeschlossen worden sind. Die Anzahl **N** der gültigen Antworten weist auf die genaue Anzahl der Fälle hin, die für die Berechnung der jeweiligen Prozentwerte oder andere Parameter berücksichtigt wurden. Diese Anzahl wird für jede betrachtete Gruppe oder Untergruppe angegeben. Darunter wird auch die Anzahl der jeweils fehlenden Angaben angegeben. Ergebnisse mit einem hohen Anteil an fehlenden Angaben sollten besonders vorsichtig interpretiert werden.

Die Fussnoten unterhalb der Tabellen informieren über mögliche Besonderheiten der Referenzgruppen sowie über den jeweiligen Fragetyp. Falls mehrere Antworten möglich sind (wie z.B. bei Tabelle T19 "weitere Suchtprobleme"), lassen sich die angegebenen Prozentwerte nicht zu 100% aufaddieren.

Im letzten Teil werden die Trends 2013-2019 als Grafiken dargestellt. Diese umfassen die Aspekte der Behandlungsnachfrage, der Geschlechtsverteilung und der Altersstruktur für die wichtigsten Hauptprobleme (Alkohol, Opiode, Kokain oder Derivate, andere Stimulantien, Cannabis, Hypnotika und Sedativa sowie Glücksspiel).

T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem | | | | | | | | | | | | Angehörige | | | alle Eintritte | | | |
|---------------------------|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Geschlecht* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Männer | | | 69.3 | | | 70.5 | | | 86.7 | | | 80.1 | | | 23.8 | | | 63.9 | 4 120 |
| Frauen | | | 30.7 | | | 29.5 | | | 13.3 | | | 19.9 | | | 76.2 | | | 36.1 | 2 332 |
| Geschl. unbekannt | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | 0 |
| N** | 1 931 | 857 | 2 788 | 141 | 59 | 200 | 364 | 56 | 420 | 927 | 230 | 1 157 | 257 | 825 | 1 082 | 4 120 | 2 332 | 6 452 | 6 452 |
| Alter (in Jahren)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bis 14 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 9.6 | 5.4 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 133 |
| 15-19 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 8.9 | 3.6 | 62.0 | 57.8 | 61.2 | 3.2 | 2.1 | 2.3 | 17.7 | 10.0 | 15.0 | 962 |
| 20-24 | 3.3 | 2.0 | 2.9 | 5.7 | 8.5 | 6.5 | 13.7 | 19.6 | 14.5 | 12.3 | 14.8 | 12.8 | 5.6 | 4.4 | 4.7 | 7.4 | 5.8 | 6.8 | 440 |
| 25-29 | 7.5 | 4.3 | 6.5 | 10.6 | 16.9 | 12.5 | 22.0 | 25.0 | 22.4 | 7.4 | 4.3 | 6.8 | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 9.2 | 6.7 | 8.3 | 536 |
| 30-34 | 10.4 | 7.5 | 9.5 | 14.2 | 13.6 | 14.0 | 19.2 | 16.1 | 18.8 | 5.0 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 8.5 | 7.7 | 9.8 | 8.3 | 9.3 | 598 |
| 35-39 | 12.7 | 11.1 | 12.2 | 12.8 | 13.6 | 13.0 | 18.7 | 14.3 | 18.1 | 3.9 | 2.6 | 3.6 | 7.2 | 11.2 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 665 |
| 40-44 | 12.6 | 11.7 | 12.3 | 17.7 | 15.3 | 17.0 | 11.0 | 5.4 | 10.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 8.4 | 12.8 | 11.7 | 9.6 | 10.1 | 9.8 | 628 |
| 45-49 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 14.2 | 8.5 | 12.5 | 6.0 | 3.6 | 5.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 14.0 | 17.1 | 16.3 | 9.3 | 12.1 | 10.3 | 662 |
| 50-54 | 13.0 | 16.1 | 14.0 | 14.9 | 15.3 | 15.0 | 4.9 | 5.4 | 5.0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 17.2 | 15.2 | 15.7 | 8.7 | 12.8 | 10.2 | 655 |
| 55-59 | 10.9 | 13.7 | 11.7 | 4.3 | 0.0 | 3.0 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 12.0 | 9.4 | 10.0 | 6.6 | 9.1 | 7.5 | 482 |
| 60-64 | 6.3 | 7.1 | 6.6 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 8.4 | 5.9 | 6.5 | 4.0 | 5.4 | 4.5 | 289 |
| 65-69 | 4.9 | 5.7 | 5.2 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 4.8 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 3.9 | 3.2 | 207 |
| 70-74 | 2.1 | 4.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 109 |
| 75 und mehr | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 67 |
| N** | 1 931 | 856 | 2 787 | 141 | 59 | 200 | 364 | 56 | 420 | 927 | 230 | 1 157 | 250 | 815 | 1 065 | 4 112 | 2 321 | 6 433 | 6 433 |
| fehlende Angaben | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 8 | 11 | 19 | 19 |
| Alter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 45.6 | 48.9 | 46.6 | 40.2 | 37.7 | 39.5 | 33.9 | 31.3 | 33.5 | 21.5 | 20.8 | 21.4 | 46.1 | 45.4 | 45.6 | 37.4 | 42.4 | 39.2 | |
| Standardabweichung | 13.2 | 13.1 | 13.3 | 10.9 | 11.6 | 11.1 | 9.0 | 9.8 | 9.2 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 16.4 | 13.4 | 14.1 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | |
| 1. Quartil | 35.8 | 39.6 | 36.9 | 31.3 | 29.0 | 30.6 | 27.2 | 24.2 | 26.8 | 16.6 | 16.0 | 16.4 | 35.7 | 36.4 | 36.1 | 23.3 | 30.4 | 25.7 | |
| Medianwert | 45.8 | 49.5 | 46.9 | 41.1 | 39.4 | 40.3 | 32.6 | 29.4 | 32.3 | 17.8 | 17.5 | 17.8 | 49.3 | 46.2 | 46.8 | 36.6 | 43.7 | 39.1 | |
| 3. Quartil | 55.2 | 57.5 | 55.9 | 49.4 | 45.9 | 48.5 | 39.47 | 35.9 | 39.3 | 23.2 | 21.8 | 22.8 | 57.6 | 53.9 | 54.5 | 49.6 | 53.9 | 51.3 | |
| N** | 1 931 | 856 | 2 787 | 141 | 59 | 200 | 364 | 56 | 420 | 927 | 230 | 1 157 | 256 | 818 | 1 074 | 4 118 | 2 324 | 6 442 | |
| fehlende Angaben | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 10 | |

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem | | | | | | | | | | | | Angehörige | | | alle Eintritte | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Zivilstand* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ledig | 45.8 | 32.4 | 41.7 | 68.5 | 54.0 | 64.4 | 74.6 | 77.8 | 75.1 | 89.6 | 88.1 | 89.3 | 28.4 | 27.9 | 28.0 | 60.8 | 41.4 | 53.8 | 3 220 |
| verheiratet | 32.2 | 30.7 | 31.7 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 7.4 | 13.5 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 52.2 | 50.7 | 51.0 | 23.5 | 32.6 | 26.8 | 1 600 |
| getrennt | 3.1 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 1.9 | 3.2 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 4.5 | 4.0 | 2.6 | 4.1 | 3.1 | 187 |
| geschieden | 17.0 | 27.0 | 20.0 | 11.0 | 30.0 | 16.4 | 6.6 | 13.0 | 7.5 | 2.3 | 3.8 | 2.6 | 14.7 | 13.9 | 14.1 | 11.1 | 18.0 | 13.6 | 814 |
| verwitwet | 1.5 | 5.1 | 2.6 | 3.1 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 3.1 | 2.1 | 127 |
| reg. Partnerschaft | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 33 |
| N** | 1 816 | 808 | 2 624 | 127 | 50 | 177 | 347 | 54 | 401 | 863 | 210 | 1 073 | 232 | 750 | 982 | 3 840 | 2 141 | 5 981 | 5 981 |
| fehlende Angaben | - | 49 | 164 | 14 | 9 | 23 | 17 | 2 | 19 | 64 | 20 | 84 | 25 | 75 | 100 | 280 | 191 | 471 | 471 |
| Staatsangehörigkeit* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schweiz/FL | 80.1 | 83.7 | 81.2 | 67.4 | 76.8 | 70.2 | 73.2 | 78.6 | 74.0 | 80.4 | 86.3 | 81.6 | 84.4 | 86.9 | 86.3 | 79.3 | 85.6 | 81.6 | 4 916 |
| EU | 13.1 | 11.5 | 12.6 | 24.2 | 16.1 | 21.8 | 16.6 | 17.9 | 16.8 | 10.8 | 7.3 | 10.1 | 13.9 | 9.4 | 10.4 | 13.3 | 9.9 | 12.0 | 726 |
| andere | 6.7 | 4.8 | 6.1 | 8.3 | 7.1 | 8.0 | 10.1 | 3.6 | 9.2 | 8.8 | 6.4 | 8.3 | 1.7 | 3.8 | 3.3 | 7.4 | 4.5 | 6.4 | 384 |
| N** | 1 767 | 798 | 2 565 | 132 | 56 | 188 | 355 | 56 | 411 | 873 | 219 | 1 092 | 237 | 770 | 1 007 | 3 829 | 2 197 | 6 026 | 6 026 |
| fehlende Angaben | 164 | 59 | 223 | 9 | 3 | 12 | 9 | 0 | 9 | 54 | 11 | 65 | 20 | 55 | 75 | 291 | 135 | 426 | 426 |

* Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem | | | | | | | | | | | | Angehörige | | | alle Eintritte | | | N | | | |
|---|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | % | % | % |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | | | | |
| Urbanitätsgrad* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grossstadtzentren | 10.4 | 8.1 | 9.7 | 3.0 | 0.0 | 2.1 | 3.4 | 0.0 | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 14.4 | 10.3 | 11.3 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 418 | | | |
| Umland der Grossstadtzentren | 20.8 | 21.4 | 21.0 | 12.6 | 12.1 | 12.4 | 20.7 | 10.9 | 19.4 | 12.7 | 8.8 | 11.9 | 17.7 | 16.4 | 16.7 | 17.3 | 16.2 | 16.9 | 1 067 | | | |
| Mittelzentren | 12.6 | 14.7 | 13.3 | 14.1 | 12.1 | 13.5 | 19.0 | 14.5 | 18.4 | 22.4 | 19.0 | 21.8 | 15.6 | 23.0 | 21.3 | 16.4 | 18.9 | 17.3 | 1 090 | | | |
| Kleinzentren | 29.3 | 29.5 | 29.4 | 46.7 | 41.4 | 45.1 | 36.6 | 50.9 | 38.5 | 34.5 | 33.6 | 34.4 | 26.3 | 25.8 | 25.9 | 32.2 | 30.6 | 31.6 | 1 994 | | | |
| rural | 26.9 | 26.3 | 26.7 | 23.7 | 34.5 | 26.9 | 20.4 | 23.6 | 20.8 | 29.2 | 37.2 | 30.7 | 25.9 | 24.5 | 24.9 | 27.5 | 27.7 | 27.6 | 1 740 | | | |
| N** | 1 902 | 841 | 2 743 | 135 | 58 | 193 | 358 | 55 | 413 | 909 | 226 | 1 135 | 243 | 787 | 1 030 | 4 039 | 2 270 | 6 309 | 6 309 | | | |
| fehlende Angaben | 29 | 16 | 45 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 18 | 4 | 22 | 14 | 38 | 52 | 81 | 62 | 143 | 143 | | | |
| MitbewohnerInnen (letzte 30 Tage)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| allein | 38.5 | 35.0 | 37.4 | 34.8 | 40.5 | 36.4 | 33.7 | 28.8 | 33.0 | 12.1 | 16.3 | 12.9 | 14.3 | 11.5 | 12.0 | 28.7 | 26.2 | 27.9 | 1 415 | | | |
| mit Herkunftsfamilie | 7.2 | 2.8 | 5.8 | 13.4 | 9.5 | 12.3 | 20.6 | 9.6 | 19.1 | 66.1 | 57.1 | 64.3 | 12.1 | 5.7 | 7.0 | 26.4 | 14.5 | 22.5 | 1 143 | | | |
| mit PartnerIn und/oder Kind(ern) | 43.5 | 53.4 | 46.6 | 26.8 | 38.1 | 29.9 | 33.0 | 40.4 | 34.1 | 8.8 | 10.7 | 9.1 | 70.3 | 80.5 | 78.4 | 33.1 | 49.9 | 38.6 | 1 963 | | | |
| mit Freunden/anderen Personen | 4.0 | 2.3 | 3.4 | 7.1 | 4.8 | 6.5 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 4.2 | 2.8 | 3.7 | 188 | | | |
| Haft | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 9 | | | |
| therap. Einrichtung/Wohnheim | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 7.1 | 2.4 | 5.8 | 2.2 | 3.8 | 2.5 | 3.1 | 4.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 123 | | | |
| Spital/Klinik | 2.0 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 67 | | | |
| anderes | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 8.0 | 0.0 | 5.8 | 2.9 | 5.8 | 3.3 | 6.0 | 7.7 | 6.4 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 3.7 | 2.8 | 3.4 | 172 | | | |
| N** | 1 636 | 751 | 2 387 | 112 | 42 | 154 | 315 | 52 | 367 | 811 | 196 | 1 007 | 91 | 349 | 440 | 3 411 | 1 669 | 5 080 | 5 080 | | | |
| fehlende Angaben | 295 | 106 | 401 | 29 | 17 | 46 | 49 | 4 | 53 | 116 | 34 | 150 | 166 | 476 | 642 | 709 | 663 | 1 372 | 1 372 | | | |
| Wohnsituation (letzte 30 Tage)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| stabile Wohnsituation | 92.3 | 92.8 | 92.4 | 84.8 | 79.5 | 83.3 | 91.4 | 82.4 | 90.1 | 92.3 | 91.6 | 92.2 | 96.5 | 97.4 | 97.2 | 92.3 | 93.2 | 92.6 | 4 941 | | | |
| instabile Wohnsituation | 3.8 | 2.4 | 3.4 | 5.4 | 15.9 | 8.3 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 3.0 | 4.0 | 3.2 | 3.5 | 2.3 | 2.6 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 192 | | | |
| Haft | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 9 | | | |
| therap. Einricht./Heim/Spital/anderes | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 8.9 | 2.3 | 7.1 | 2.2 | 11.8 | 3.6 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 194 | | | |
| N** | 1 726 | 787 | 2 513 | 112 | 44 | 156 | 314 | 51 | 365 | 857 | 202 | 1 059 | 114 | 391 | 505 | 3 576 | 1 760 | 5 336 | 5 336 | | | |
| fehlende Angaben | 205 | 70 | 275 | 29 | 15 | 44 | 50 | 5 | 55 | 70 | 28 | 98 | 143 | 434 | 577 | 544 | 572 | 1 116 | 1 116 | | | |

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem | | | | | | | | | | | | Angehörige | | | alle Eintritte | | | |
|---|--------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioid | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Partnerbeziehung* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| keine Partnerbeziehung, alleinst. zeitweilige Beziehung(en) | 40.2 | 40.5 | 40.3 | 61.5 | 37.0 | 54.3 | 47.1 | 20.8 | 43.6 | 71.0 | 61.1 | 68.9 | 19.2 | 20.5 | 20.2 | 49.8 | 38.7 | 45.8 | 1 510 |
| zeitweilige Beziehung(en) | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 7.4 | 3.3 | 3.2 | 0.0 | 2.8 | 3.4 | 7.9 | 4.3 | 2.6 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 67 |
| festе Beziehung, getrennt lebend | 14.2 | 9.8 | 12.8 | 12.3 | 18.5 | 14.1 | 15.3 | 33.3 | 17.7 | 16.5 | 19.8 | 17.2 | 12.8 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 13.2 | 13.5 | 444 |
| festе Beziehung, zusammen leb. | 44.1 | 48.5 | 45.5 | 24.6 | 37.0 | 28.3 | 34.4 | 45.8 | 35.9 | 9.1 | 11.1 | 9.5 | 65.4 | 64.8 | 64.9 | 34.6 | 46.0 | 38.7 | 1 277 |
| N** | 1 064 | 499 | 1 563 | 65 | 27 | 92 | 157 | 24 | 181 | 473 | 126 | 599 | 78 | 332 | 410 | 2 105 | 1 193 | 3 298 | 3 298 |
| fehlende Angaben | 867 | 358 | 1 225 | 76 | 32 | 108 | 207 | 32 | 239 | 454 | 104 | 558 | 179 | 493 | 672 | 2 015 | 1 139 | 3 154 | 3 154 |
| Anzahl eigener Kinder* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| keine | 42.3 | 35.8 | 40.1 | 55.2 | 52.2 | 54.3 | 61.3 | 55.2 | 60.4 | 92.6 | 92.8 | 92.6 | 45.2 | 30.3 | 33.5 | 61.1 | 45.9 | 55.6 | 1 994 |
| 1 Kind | 21.3 | 21.8 | 21.4 | 24.1 | 17.4 | 22.2 | 17.2 | 27.6 | 18.8 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 10.6 | 17.4 | 15.9 | 14.4 | 16.7 | 15.2 | 547 |
| 2 Kinder | 25.3 | 30.3 | 26.9 | 19.0 | 26.1 | 21.0 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 33.7 | 33.5 | 33.5 | 17.1 | 24.8 | 19.9 | 714 |
| 3 Kinder oder mehr | 11.2 | 12.1 | 11.5 | 1.7 | 4.3 | 2.5 | 7.4 | 3.4 | 6.8 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 10.6 | 18.8 | 17.0 | 7.4 | 12.6 | 9.3 | 333 |
| N** | 1 048 | 519 | 1 567 | 58 | 23 | 81 | 163 | 29 | 192 | 592 | 152 | 744 | 104 | 373 | 477 | 2 275 | 1 313 | 3 588 | 3 588 |
| fehlende Angaben | 883 | 338 | 1 221 | 83 | 36 | 119 | 201 | 27 | 228 | 335 | 78 | 413 | 153 | 452 | 605 | 1 845 | 1 019 | 2 864 | 2 864 |
| Anzahl Kinder im Haushalt* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| keine | 71.8 | 64.0 | 69.2 | 83.0 | 83.3 | 83.1 | 79.9 | 75.0 | 79.1 | 80.7 | 81.1 | 80.8 | 61.9 | 43.7 | 47.5 | 75.0 | 62.4 | 70.2 | 2 122 |
| 1 Kind | 12.1 | 18.6 | 14.2 | 14.9 | 11.1 | 13.8 | 6.7 | 12.5 | 7.6 | 5.1 | 4.1 | 4.9 | 17.5 | 23.4 | 22.1 | 10.0 | 16.7 | 12.5 | 378 |
| 2 Kinder | 11.9 | 13.8 | 12.5 | 2.1 | 5.6 | 3.1 | 7.5 | 12.5 | 8.2 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 18.6 | 22.8 | 21.9 | 11.0 | 15.0 | 12.5 | 379 |
| 3 Kinder oder mehr | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 5.1 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 2.1 | 10.2 | 8.5 | 4.0 | 5.9 | 4.7 | 143 |
| N** | 884 | 436 | 1 320 | 47 | 18 | 65 | 134 | 24 | 158 | 455 | 122 | 577 | 97 | 364 | 461 | 1 878 | 1 144 | 3 022 | 3 022 |
| fehlende Angaben | 1 047 | 421 | 1 468 | 94 | 41 | 135 | 230 | 32 | 262 | 472 | 108 | 580 | 160 | 461 | 621 | 2 242 | 1 188 | 3 430 | 3 430 |

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem | | | | | | | | | | | | Angehörige | | | alle Eintritte | | | N | | | |
|---|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | % | % | % |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | | | |
| Höchste abgeschlossene Ausbildung* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| keine oder teilobligatorische Ausbildung | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 6.7 | 5.1 | 6.3 | 2.0 | 6.4 | 2.6 | 14.9 | 20.7 | 16.0 | 6.0 | 2.0 | 2.9 | 7.7 | 6.2 | 7.2 | 354 | | | |
| obligatorische Schule | 10.4 | 12.6 | 11.0 | 24.8 | 33.3 | 27.1 | 15.4 | 38.3 | 18.5 | 57.5 | 53.9 | 56.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 24.1 | 18.5 | 22.2 | 1 091 | | | |
| Übergangsbildung | 2.8 | 5.1 | 3.5 | 3.8 | 5.1 | 4.2 | 1.4 | 4.3 | 1.8 | 3.7 | 4.7 | 3.9 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 2.9 | 4.2 | 3.4 | 166 | | | |
| Allgemeinausbildung ohne Maturität | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 34 | | | |
| berufl. Grundausbildung oder Berufslehre | 54.4 | 54.3 | 54.4 | 58.1 | 41.0 | 53.5 | 63.1 | 42.6 | 60.3 | 18.0 | 13.5 | 17.1 | 36.4 | 47.2 | 44.7 | 43.7 | 44.0 | 43.8 | 2 153 | | | |
| Maturität oder Lehrkräfte-Seminar | 4.7 | 3.4 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2.8 | 4.8 | 2.1 | 4.4 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 4.0 | 9.2 | 8.0 | 4.1 | 5.9 | 4.7 | 231 | | | |
| höhere Berufsbildung | 12.1 | 10.9 | 11.7 | 1.0 | 5.1 | 2.1 | 7.2 | 4.3 | 6.8 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 22.5 | 13.4 | 15.5 | 8.3 | 9.3 | 8.6 | 424 | | | |
| Fachhochschule oder Universität | 12.1 | 10.3 | 11.6 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 4.8 | 2.1 | 4.4 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 22.5 | 17.5 | 18.6 | 8.3 | 10.7 | 9.1 | 449 | | | |
| Doktorat oder Habilitation | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 11 | | | |
| N** | 1 486 | 652 | 2 138 | 105 | 39 | 144 | 293 | 47 | 340 | 805 | 193 | 998 | 151 | 509 | 660 | 3 240 | 1 673 | 4 913 | 4 913 | | | |
| fehlende Angaben | 445 | 205 | 650 | 36 | 20 | 56 | 71 | 9 | 80 | 122 | 37 | 159 | 106 | 316 | 422 | 880 | 659 | 1 539 | 1 539 | | | |
| Berufliche Stellung* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nicht erwerbstätig | 17.9 | 25.4 | 20.1 | 18.0 | 35.5 | 22.5 | 16.5 | 32.4 | 18.6 | 23.0 | 18.2 | 22.1 | 9.1 | 23.5 | 20.0 | 19.0 | 25.9 | 20.8 | 594 | | | |
| Lehrling/Lehrtochter, Praktik. | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 6.7 | 0.0 | 5.0 | 5.2 | 2.7 | 4.9 | 30.6 | 25.0 | 29.6 | 9.1 | 2.9 | 4.4 | 9.0 | 5.8 | 8.1 | 231 | | | |
| HilfsarbeiterIn, Aushilfe | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 5.4 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.0 | 2.9 | 2.2 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 88 | | | |
| angelernete(r) ArbeiterIn | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 9.0 | 3.2 | 7.5 | 4.0 | 8.1 | 4.6 | 1.2 | 3.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 131 | | | |
| gelernte(r) ArbeiterIn | 12.1 | 7.4 | 10.7 | 19.1 | 12.9 | 17.5 | 20.2 | 8.1 | 18.6 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 0.0 | 2.9 | 2.2 | 12.1 | 7.0 | 10.7 | 306 | | | |
| VorarbeiterIn | 2.0 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 37 | | | |
| einfache(r) Angestellte(r) | 24.9 | 37.7 | 28.7 | 23.6 | 16.1 | 21.7 | 27.4 | 32.4 | 28.1 | 10.9 | 11.4 | 11.0 | 18.2 | 35.3 | 31.1 | 21.4 | 32.0 | 24.2 | 690 | | | |
| mittl. Angestellte(r)/ mittl. Kader | 14.8 | 11.2 | 13.8 | 12.4 | 12.9 | 12.5 | 10.1 | 8.1 | 9.8 | 4.4 | 1.1 | 3.9 | 27.3 | 17.6 | 20.0 | 11.5 | 9.6 | 11.0 | 314 | | | |
| leit. Angestellte(r)/ höheres Kader | 5.4 | 1.7 | 4.3 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 5.9 | 4.4 | 3.4 | 1.4 | 2.8 | 81 | | | |
| selbständig | 9.8 | 6.4 | 8.8 | 2.2 | 0.0 | 1.7 | 9.3 | 0.0 | 8.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 36.4 | 8.8 | 15.6 | 7.7 | 5.2 | 7.0 | 200 | | | |
| SchülerIn/StudentIn | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 12.9 | 5.0 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 15.8 | 26.1 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 4.3 | 5.1 | 146 | | | |
| andere Stellung | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 31 | | | |
| N** | 1 112 | 472 | 1 584 | 89 | 31 | 120 | 248 | 37 | 285 | 405 | 88 | 493 | 11 | 34 | 45 | 2 087 | 762 | 2 849 | 2 849 | | | |
| fehlende Angaben | 819 | 385 | 1 204 | 52 | 28 | 80 | 116 | 19 | 135 | 522 | 142 | 664 | 246 | 791 | 1 037 | 2 033 | 1 570 | 3 603 | 3 603 | | | |

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem | | | | | | | | | | | | Angehörige | | | alle Eintritte | | | |
|--|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Hauptquelle des Lebensunterhaltes (letzte 30 Tage)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerbseinkommen | 57.0 | 42.1 | 52.3 | 33.9 | 25.0 | 31.3 | 58.0 | 50.0 | 56.9 | 24.8 | 17.8 | 23.5 | 75.7 | 68.3 | 70.0 | 47.1 | 43.4 | 45.9 | 2 470 |
| Ersparnisse | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 4.0 | 0.0 | 2.8 | 3.0 | 0.0 | 2.6 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 106 |
| Rente (AHV/IV u.a.) | 15.0 | 24.9 | 18.0 | 19.4 | 21.2 | 19.9 | 7.9 | 21.2 | 9.7 | 3.1 | 5.0 | 3.5 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 11.0 | 18.1 | 13.3 | 716 |
| Sozialhilfe/Fürsorge | 14.2 | 12.4 | 13.6 | 31.5 | 42.3 | 34.7 | 13.3 | 19.2 | 14.1 | 12.4 | 13.9 | 12.6 | 6.1 | 2.1 | 3.1 | 13.7 | 11.5 | 12.9 | 696 |
| Arbeitslosenversicherung | 4.4 | 2.8 | 3.9 | 3.2 | 0.0 | 2.3 | 7.3 | 0.0 | 6.3 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 4.0 | 2.0 | 3.4 | 182 |
| durch PartnerIn | 1.4 | 9.7 | 4.0 | 3.2 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 3.8 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | 10.1 | 7.8 | 1.7 | 7.9 | 3.7 | 198 |
| durch Eltern/Angehörige | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.0 | 7.7 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 5.2 | 53.1 | 57.4 | 54.0 | 7.0 | 5.9 | 6.1 | 18.1 | 13.2 | 16.5 | 887 |
| dealen/Kleinhandel mit Drogen | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 7 |
| andere illegale Einkünfte | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 3 |
| Prostitution | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 10 |
| Taggeldversicherung | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 55 |
| anderes | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 46 |
| N** | 1 738 | 784 | 2 522 | 124 | 52 | 176 | 331 | 52 | 383 | 858 | 202 | 1 060 | 115 | 375 | 490 | 3 631 | 1 745 | 5 376 | 5 376 |
| fehlende Angaben | 193 | 73 | 266 | 17 | 7 | 24 | 33 | 4 | 37 | 69 | 28 | 97 | 142 | 450 | 592 | 489 | 587 | 1 076 | 1 076 |
| Hauptsächlicher Erwerbstatus (letzte 30 Tage)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vollzeitarbeit (ab 70%) | 51.2 | 27.7 | 44.2 | 26.4 | 21.6 | 25.0 | 54.3 | 35.3 | 51.8 | 14.1 | 12.6 | 13.8 | 79.5 | 49.4 | 56.0 | 40.3 | 29.7 | 37.0 | 1 901 |
| Teilzeitarbeit | 6.1 | 22.4 | 11.0 | 7.4 | 9.8 | 8.1 | 4.7 | 15.7 | 6.2 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 1.1 | 29.0 | 22.9 | 5.1 | 19.1 | 9.5 | 486 |
| Gelegenheitsjobs | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 2.5 | 0.0 | 1.7 | 2.4 | 3.9 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 51 |
| in Ausbildung | 3.1 | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 3.9 | 4.7 | 3.6 | 11.8 | 4.6 | 60.4 | 60.9 | 60.5 | 5.7 | 7.7 | 7.3 | 20.7 | 15.5 | 19.1 | 979 |
| arbeitslos und aktive Stellensuche | 10.7 | 8.3 | 10.0 | 12.4 | 7.8 | 11.0 | 15.1 | 9.8 | 14.4 | 8.1 | 4.3 | 7.3 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 10.0 | 5.8 | 8.7 | 448 |
| arbeitslos und keine aktive Stellensuche | 7.1 | 10.2 | 8.0 | 22.3 | 25.5 | 23.3 | 11.3 | 7.8 | 10.8 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 374 |
| Rentner/Rentnerin | 7.7 | 12.9 | 9.2 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 9.1 | 7.1 | 7.5 | 4.5 | 8.6 | 5.8 | 297 |
| Arbeitsunfähigkeit | 5.5 | 6.7 | 5.9 | 9.9 | 13.7 | 11.0 | 4.5 | 11.8 | 5.4 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 1.3 | 4.4 | 5.8 | 4.8 | 247 |
| Hausfrau/-mann | 0.3 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 40 |
| anderes | 7.0 | 5.7 | 6.7 | 9.1 | 13.7 | 10.5 | 3.6 | 2.0 | 3.4 | 5.7 | 9.2 | 6.4 | 3.4 | 1.6 | 2.0 | 6.4 | 5.4 | 6.1 | 312 |
| N** | 1 676 | 714 | 2 390 | 121 | 51 | 172 | 337 | 51 | 388 | 857 | 207 | 1 064 | 88 | 310 | 398 | 3 535 | 1 600 | 5 135 | 5 135 |
| fehlende Angaben | 255 | 143 | 398 | 20 | 8 | 28 | 27 | 5 | 32 | 70 | 23 | 93 | 169 | 515 | 684 | 585 | 732 | 1 317 | 1 317 |

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem | | | | | | | | | | | | Angehörige | | | alle Eintritte | | | |
|---|--------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Netto Monatseinkommen (letzte 6 Monate)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kein Einkommen | 45.3 | 55.3 | 48.0 | 61.2 | 81.3 | 66.2 | 49.4 | 44.4 | 48.9 | 58.6 | 76.1 | 62.3 | 80.0 | 83.1 | 82.4 | 54.8 | 67.7 | 58.6 | 692 |
| weniger als 1000 Fr. | 4.4 | 2.0 | 3.7 | 0.0 | 12.5 | 3.1 | 3.8 | 0.0 | 3.4 | 23.6 | 10.9 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 4.1 | 6.8 | 80 |
| 1001 bis 2000 Fr. | 3.4 | 7.2 | 4.4 | 8.2 | 6.3 | 7.7 | 5.1 | 11.1 | 5.7 | 2.9 | 6.5 | 3.6 | 4.0 | 1.3 | 2.0 | 3.6 | 5.5 | 4.1 | 49 |
| 2001 bis 3000 Fr. | 5.6 | 10.5 | 6.9 | 14.3 | 0.0 | 10.8 | 6.3 | 22.2 | 8.0 | 0.6 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 4.5 | 6.1 | 5.0 | 59 |
| 3001 bis 4000 Fr. | 8.8 | 12.5 | 9.8 | 6.1 | 0.0 | 4.6 | 11.4 | 22.2 | 12.5 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 82 |
| 4001 bis 5000 Fr. | 12.7 | 5.9 | 10.8 | 6.1 | 0.0 | 4.6 | 11.4 | 0.0 | 10.2 | 6.3 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 2.6 | 2.9 | 9.2 | 4.1 | 7.7 | 91 |
| 5001 bis 6000 Fr. | 9.5 | 2.0 | 7.5 | 4.1 | 0.0 | 3.1 | 3.8 | 0.0 | 3.4 | 2.9 | 0.0 | 2.3 | 8.0 | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 2.0 | 5.2 | 62 |
| 6001 bis 8000 Fr. | 5.8 | 2.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 4.5 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.9 | 2.9 | 3.7 | 1.7 | 3.1 | 37 |
| 8001 bis 10 000 Fr. | 2.4 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 16 |
| 10001 bis 15 000 Fr. | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 11 |
| über 15 000 Fr. | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2 |
| N** | 411 | 152 | 563 | 49 | 16 | 65 | 79 | 9 | 88 | 174 | 46 | 220 | 25 | 77 | 102 | 837 | 344 | 1 181 | 1 181 |
| <i>fehlende Angaben</i> | <i>1 520</i> | <i>705</i> | <i>2 225</i> | <i>92</i> | <i>43</i> | <i>135</i> | <i>285</i> | <i>47</i> | <i>332</i> | <i>753</i> | <i>184</i> | <i>937</i> | <i>232</i> | <i>748</i> | <i>980</i> | <i>3 283</i> | <i>1 988</i> | <i>5 271</i> | <i>5 271</i> |
| Schulden* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| keine Schulden | 67.9 | 72.5 | 69.3 | 39.3 | 35.0 | 38.3 | 40.4 | 40.0 | 40.4 | 79.6 | 79.5 | 79.6 | 92.1 | 93.6 | 93.3 | 67.2 | 74.9 | 69.6 | 1 609 |
| bis 5000 Fr. | 3.6 | 5.0 | 4.0 | 4.9 | 0.0 | 3.7 | 11.3 | 10.0 | 11.2 | 5.6 | 4.5 | 5.3 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 5.4 | 4.4 | 5.1 | 117 |
| 5001 bis 10 000 Fr. | 5.3 | 4.0 | 4.9 | 8.2 | 15.0 | 9.9 | 7.8 | 10.0 | 8.1 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 5.1 | 4.8 | 5.0 | 116 |
| 10 001 bis 25 000 Fr. | 4.3 | 2.6 | 3.8 | 6.6 | 10.0 | 7.4 | 11.3 | 0.0 | 9.9 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 4.5 | 2.9 | 4.0 | 93 |
| 25 001 bis 50 000 Fr. | 3.8 | 2.3 | 3.4 | 6.6 | 0.0 | 4.9 | 6.4 | 10.0 | 6.8 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 0.8 | 1.2 | 3.5 | 2.3 | 3.1 | 72 |
| 50 001 bis 100 000 Fr. | 9.8 | 10.9 | 10.1 | 21.3 | 35.0 | 24.7 | 10.6 | 10.0 | 10.6 | 5.6 | 8.0 | 6.1 | 2.6 | 0.0 | 0.6 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 201 |
| über 100 000 Fr. | 3.3 | 1.3 | 2.7 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 5.7 | 0.0 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 2.8 | 0.8 | 2.2 | 50 |
| Höhe nicht bekannt | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 11.5 | 5.0 | 9.9 | 6.4 | 20.0 | 8.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.5 | 2.3 | 53 |
| N** | 676 | 302 | 978 | 61 | 20 | 81 | 141 | 20 | 161 | 431 | 112 | 543 | 38 | 125 | 163 | 1 583 | 728 | 2 311 | 2 311 |
| <i>fehlende Angaben</i> | <i>1 255</i> | <i>555</i> | <i>1 810</i> | <i>80</i> | <i>39</i> | <i>119</i> | <i>223</i> | <i>36</i> | <i>259</i> | <i>496</i> | <i>118</i> | <i>614</i> | <i>219</i> | <i>700</i> | <i>919</i> | <i>2 537</i> | <i>1 604</i> | <i>4 141</i> | <i>4 141</i> |

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem | | | | | | | | | | | | alle Selbstbetroffenen | | | |
|---|--------------------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|------------------------|------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Frühere Hafterfahrungen* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| keine | 90.7 | 96.1 | 92.3 | 36.7 | 75.0 | 44.7 | 69.6 | 100.0 | 72.4 | 92.8 | 100.0 | 94.0 | 86.9 | 95.6 | 89.2 | 935 |
| Strafhaft | 4.4 | 2.5 | 3.8 | 26.7 | 25.0 | 26.3 | 14.5 | 0.0 | 13.2 | 4.6 | 0.0 | 3.8 | 6.2 | 2.9 | 5.3 | 56 |
| Untersuchungshaft | 3.6 | 0.5 | 2.7 | 16.7 | 0.0 | 13.2 | 10.1 | 0.0 | 9.2 | 2.0 | 0.0 | 1.6 | 4.3 | 0.4 | 3.2 | 34 |
| Straf- und Untersuchungshaft | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 20.0 | 0.0 | 15.8 | 5.8 | 0.0 | 5.3 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 23 |
| N** | 474 | 203 | 677 | 30 | 8 | 38 | 69 | 7 | 76 | 152 | 31 | 183 | 773 | 275 | 1 048 | 1 048 |
| fehlende Angaben | 1 457 | 654 | 2 111 | 111 | 51 | 162 | 295 | 49 | 344 | 775 | 199 | 974 | 3 090 | 1 232 | 4 322 | 4 322 |
| Gesamtdauer der Hafterfahrungen*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <1 Monat | 28.0 | 20.0 | 26.7 | 22.2 | 100.0 | 36.4 | 38.5 | - | 38.5 | 14.3 | - | 14.3 | 26.3 | 50.0 | 29.2 | 19 |
| 1 bis 2 Monate | 4.0 | 20.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | - | 7.7 | 0.0 | - | 0.0 | 3.5 | 12.5 | 4.6 | 3 |
| >2 bis 6 Monate | 32.0 | 20.0 | 30.0 | 33.3 | 0.0 | 27.3 | 7.7 | - | 7.7 | 28.6 | - | 28.6 | 28.1 | 12.5 | 26.2 | 17 |
| >6 bis 12 Monate | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 11.1 | 0.0 | 9.1 | 15.4 | - | 15.4 | 0.0 | - | 0.0 | 8.8 | 12.5 | 9.2 | 6 |
| mehr als 1 Jahr | 28.0 | 20.0 | 26.7 | 33.3 | 0.0 | 27.3 | 30.8 | - | 30.8 | 57.1 | - | 57.1 | 33.3 | 12.5 | 30.8 | 20 |
| N** | 25 | 5 | 30 | 9 | 2 | 11 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 57 | 8 | 65 | 65 |
| fehlende Angaben | 19 | 3 | 22 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 44 | 4 | 48 | 48 |

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) Hafterfahrung(en) haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T9 Hauptsächlich zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem | | | | | | | | | | | | Angehörige | | | alle Eintritte | | | N |
|--|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Hauptsächlich zuweisende Instanz* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei | 13.0 | 6.7 | 11.0 | 4.9 | 2.0 | 4.0 | 12.4 | 7.5 | 11.7 | 48.9 | 46.7 | 48.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 19.5 | 8.1 | 15.4 | 916 |
| Arztpraxis | 9.8 | 11.1 | 10.2 | 9.8 | 5.9 | 8.6 | 5.1 | 3.8 | 4.9 | 2.3 | 5.6 | 2.9 | 4.1 | 3.0 | 3.2 | 6.6 | 7.4 | 6.9 | 408 |
| andere auf Suchtprobl. spez. Einrichtung | 5.2 | 6.0 | 5.4 | 8.1 | 15.7 | 10.3 | 5.1 | 7.5 | 5.5 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 3.1 | 2.8 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 247 |
| andere medizinische oder soziale Dienste | 17.9 | 19.7 | 18.5 | 16.3 | 17.6 | 16.7 | 12.1 | 28.3 | 14.3 | 9.5 | 7.0 | 9.0 | 6.8 | 4.6 | 5.1 | 14.3 | 12.8 | 13.7 | 816 |
| ausbildende o. erzieherische Einrichtung | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 7.9 | 3.9 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 130 |
| ArbeitgeberIn | 3.3 | 1.5 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 1.0 | 2.0 | 120 |
| Eigeninitiative, Familie, Freunde usw. | 48.6 | 52.3 | 49.7 | 57.7 | 51.0 | 55.7 | 62.2 | 47.2 | 60.2 | 31.5 | 28.5 | 30.9 | 81.9 | 86.0 | 85.1 | 49.1 | 61.7 | 53.7 | 3 193 |
| anderes | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 119 |
| N** | 1 766 | 803 | 2 569 | 123 | 51 | 174 | 331 | 53 | 384 | 885 | 214 | 1 099 | 221 | 738 | 959 | 3 801 | 2 148 | 5 949 | 5 949 |
| fehlende Angaben | 165 | 54 | 219 | 18 | 8 | 26 | 33 | 3 | 36 | 42 | 16 | 58 | 36 | 87 | 123 | 319 | 184 | 503 | 503 |

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genauere Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T10 Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem | | | | | | | | | | | | alle Selbstbetroffenen | | | |
|---|--------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------------------|------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Gerichtliche Massnahme* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| keine Massnahme | 91.0 | 94.1 | 91.9 | 95.5 | 94.1 | 95.1 | 95.0 | 93.8 | 94.8 | 75.7 | 81.2 | 76.7 | 89.5 | 92.8 | 90.4 | 2 474 |
| Einstellung / Absehen von Strafe / Verwarnung (Art 19a Z2 BetmG) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 4.3 | 7.1 | 4.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 23 |
| Massnahme liegt vor | 9.0 | 5.9 | 8.1 | 4.5 | 5.9 | 4.9 | 4.5 | 6.3 | 4.8 | 20.0 | 11.8 | 18.5 | 9.7 | 6.4 | 8.8 | 241 |
| N** | 1 126 | 476 | 1 602 | 89 | 34 | 123 | 220 | 32 | 252 | 370 | 85 | 455 | 2 018 | 720 | 2 738 | 2 738 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 805 | 381 | 1 186 | 52 | 25 | 77 | 144 | 24 | 168 | 557 | 145 | 702 | 1 845 | 787 | 2 632 | 2 632 |
| Art der gerichtlichen Massnahme*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ärztl. beaufsichtigte Betreuung (Art 19a Z2 BetmG) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| stationäre therapeutische Massnahme (Art 59 StGB) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 1 |
| stationäre Suchtbehandlung (Art 60 StGB) | 1.9 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.4 | 2 |
| ambulante Behandlung | 40.4 | 50.0 | 42.6 | 0.0 | - | 0.0 | 80.0 | - | 80.0 | 58.0 | 75.0 | 60.3 | 50.4 | 57.1 | 51.8 | 73 |
| Einweisung in Einrichtung für junge Erwachs. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 1 |
| in Erwartung eines Urteils | 3.8 | 0.0 | 2.9 | 100.0 | - | 100.0 | 20.0 | - | 20.0 | 4.0 | 0.0 | 3.4 | 5.3 | 0.0 | 4.3 | 6 |
| anderes | 57.7 | 50.0 | 55.9 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 46.0 | 25.0 | 43.1 | 48.7 | 42.9 | 47.5 | 67 |
| N** | 52 | 16 | 68 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 50 | 8 | 58 | 113 | 28 | 141 | 141 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 49 | 12 | 61 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 40 | 8 | 48 | 99 | 24 | 123 | 123 |

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, bei denen eine gerichtliche Massnahme vorliegt. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt und Typ der früheren Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem | | | | | | | | | | | | Angehörige | | | alle Eintritte | | | N |
|---|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Frühere Behandlungserfahrungen* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nein | 45.8 | 42.8 | 44.9 | 18.9 | 18.2 | 18.7 | 49.1 | 43.2 | 48.3 | 78.4 | 74.3 | 77.6 | 79.2 | 79.7 | 79.6 | 56.3 | 56.5 | 56.4 | 2 620 |
| ja | 54.2 | 57.2 | 55.1 | 81.1 | 81.8 | 81.3 | 50.9 | 56.8 | 51.7 | 21.6 | 25.7 | 22.4 | 20.8 | 20.3 | 20.4 | 43.7 | 43.5 | 43.6 | 2 028 |
| N** | 1 538 | 682 | 2 220 | 106 | 44 | 150 | 281 | 44 | 325 | 755 | 179 | 934 | 72 | 290 | 362 | 3 153 | 1 495 | 4 648 | 4 648 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 393 | 175 | 568 | 35 | 15 | 50 | 83 | 12 | 95 | 172 | 51 | 223 | 185 | 535 | 720 | 967 | 837 | 1 804 | 1 804 |
| Typ der früheren Behandlungen*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| heroingestützte Behandlung | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.6 | 8.3 | 5.0 | 2.6 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 17 |
| Substitution (Methadon, Subutex®) | 5.2 | 4.3 | 4.9 | 76.8 | 66.7 | 73.8 | 9.1 | 41.7 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 4.1 | 9.7 | 8.2 | 9.2 | 127 |
| weitere medikamentöse Behandlung | 7.3 | 5.0 | 6.5 | 16.1 | 12.5 | 15.0 | 9.1 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 3.4 | 2.7 | 6.8 | 4.6 | 6.1 | 84 |
| ambulante Beratung/Therapie | 74.2 | 70.9 | 73.1 | 53.6 | 41.7 | 50.0 | 80.5 | 83.3 | 80.9 | 90.7 | 79.4 | 88.0 | 73.3 | 87.9 | 84.9 | 75.8 | 74.4 | 75.3 | 1 044 |
| Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik | 1.6 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 1.3 | 3.9 | 0.0 | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 22 |
| stationäre Therapie | 49.7 | 55.8 | 51.7 | 32.1 | 37.5 | 33.8 | 45.5 | 50.0 | 46.1 | 15.7 | 26.5 | 18.3 | 33.3 | 15.5 | 19.2 | 41.8 | 45.6 | 43.1 | 597 |
| Entzug | 39.8 | 43.9 | 41.1 | 39.3 | 33.3 | 37.5 | 36.4 | 66.7 | 40.4 | 8.3 | 0.0 | 6.3 | 13.3 | 15.5 | 15.1 | 33.1 | 32.8 | 33.0 | 457 |
| Selbsthilfegruppe | 6.0 | 7.6 | 6.5 | 1.8 | 0.0 | 1.3 | 9.1 | 16.7 | 10.1 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 5.2 | 4.1 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 73 |
| andere | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 2.2 | 0.9 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | 3.4 | 2.7 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 27 |
| N** | 563 | 278 | 841 | 56 | 24 | 80 | 77 | 12 | 89 | 108 | 34 | 142 | 15 | 58 | 73 | 910 | 476 | 1 386 | 1 386 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 274 | 115 | 389 | 30 | 12 | 42 | 67 | 13 | 80 | 56 | 13 | 69 | 0 | 3 | 3 | 479 | 185 | 664 | 664 |

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) frühere Behandlungserfahrung(en) haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

T12 Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach Hauptproblem (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem | | | | | | | | | | | | alle Selbstbetroffenen | | | |
|--|--------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nein | 97.6 | 98.2 | 97.8 | 40.9 | 32.1 | 38.3 | 96.1 | 89.3 | 95.1 | 99.8 | 99.3 | 99.7 | 96.4 | 96.1 | 96.3 | 3 002 |
| ja | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 59.1 | 67.9 | 61.7 | 3.9 | 10.7 | 4.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 116 |
| N** | 1 091 | 510 | 1 601 | 66 | 28 | 94 | 155 | 28 | 183 | 592 | 152 | 744 | 2 199 | 919 | 3 118 | 3 118 |
| fehlende Angaben | 840 | 347 | 1 187 | 75 | 31 | 106 | 209 | 28 | 237 | 335 | 78 | 413 | 1 664 | 588 | 2 252 | 2 252 |
| Typ der Substitutionsbehandlung/HegeBe*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heroin | 27.8 | 11.1 | 22.2 | 41.0 | 47.4 | 43.1 | 16.7 | 33.3 | 22.2 | 0.0 | - | 0.0 | 33.8 | 38.2 | 35.2 | 37 |
| Methadon | 50.0 | 77.8 | 59.3 | 35.9 | 47.4 | 39.7 | 50.0 | 33.3 | 44.4 | 0.0 | - | 0.0 | 39.4 | 50.0 | 42.9 | 45 |
| andere Opiate | 22.2 | 11.1 | 18.5 | 23.1 | 5.3 | 17.2 | 16.7 | 33.3 | 22.2 | 100.0 | - | 100.0 | 23.9 | 11.8 | 20.0 | 21 |
| andere Substanzen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | - | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 1.9 | 2 |
| N** | 18 | 9 | 27 | 39 | 19 | 58 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 71 | 34 | 105 | 105 |
| fehlende Angaben | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 11 |
| Je in einer Substitutionsbehandlung* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nie | 95.4 | 95.7 | 95.5 | 30.3 | 30.0 | 30.2 | 92.4 | 72.7 | 89.6 | 98.7 | 100.0 | 98.9 | 92.4 | 92.1 | 92.3 | 2 648 |
| ja | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 69.7 | 70.0 | 69.8 | 7.6 | 27.3 | 10.4 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 221 |
| N** | 1 139 | 506 | 1 645 | 99 | 40 | 139 | 198 | 33 | 231 | 374 | 96 | 470 | 2 056 | 813 | 2 869 | 2 869 |
| fehlende Angaben | 792 | 351 | 1 143 | 42 | 19 | 61 | 166 | 23 | 189 | 553 | 134 | 687 | 1 807 | 694 | 2 501 | 2 501 |
| Alter bei erster Substitutionsbehandlung**** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 32.2 | 34.2 | 32.7 | 29.2 | 27.2 | 28.6 | 26.3 | 28.8 | 27.5 | 21.5 | - | 21.5 | 28.7 | 29.6 | 29.0 | |
| Standardabweichung | 9.4 | 7.6 | 8.9 | 7.9 | 9.1 | 8.2 | 11.3 | 3.0 | 7.8 | 6.6 | - | 6.6 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | |
| 1. Quartil | 24.0 | 32.0 | 24.0 | 24.0 | 20.0 | 23.0 | 19.5 | 26.5 | 21.5 | 16.5 | - | 16.5 | 23.0 | 23.5 | 23.0 | |
| Medianwert | 30.5 | 37.0 | 32.0 | 28.0 | 27.0 | 28.0 | 21.5 | 29.0 | 26.5 | 20.5 | - | 20.5 | 27.0 | 30.0 | 28.0 | |
| 3. Quartil | 37.0 | 40.0 | 39.0 | 36.0 | 32.0 | 35.0 | 33.0 | 31.0 | 31.0 | 26.5 | - | 26.5 | 34.5 | 33.5 | 34.5 | |
| N** | 16 | 5 | 21 | 32 | 13 | 45 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 64 | 24 | 88 | |

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung bei Antritt angeben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die je in einer Substitutionsbehandlung waren. Altersangaben

T13 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2019)

| alle Selbstbetroffenen | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproblem* | Männer | Frauen | Total | | | Männer | Frauen | Total | |
| | % | % | % | N | | % | % | % | N |
| Alkohol | 50.1 | 56.9 | 52.0 | 2 788 | Alkohol | 50.1 | 56.9 | 52.0 | 2 788 |
| Heroin | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 160 | | | | | |
| Methadon | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 13 | | | | | |
| Buprenorphin | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5 | Opioide | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 200 |
| Fentanyl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | | | |
| andere Opioide | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 22 | | | | | |
| Kokain-Pulver | 9.0 | 3.5 | 7.5 | 401 | | | | | |
| Crack-Kokain | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 16 | Kokain oder Derivate | 9.4 | 3.7 | 7.8 | 420 |
| anderer Kokain-Typ | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 3 | | | | | |
| Amphetamine | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 43 | | | | | |
| Metamphetamine | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 5 | | | | | |
| MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 19 | andere Stimulanzien | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 75 |
| synthetische Cathinone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | | | | | |
| andere Stimulanzien | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 7 | | | | | |
| Barbiturate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | | | | | |
| Benzodiazepine | 0.9 | 1.9 | 1.2 | 62 | Hypnotika/Sedativa | 1.1 | 2.5 | 1.5 | 78 |
| GHB/GBL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6 | | | | | |
| andere Schlaf- und Beruhigungsmittel | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 9 | | | | | |
| LSD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | | | | | |
| Ketamin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | Halluzinogene | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5 |
| andere Halluzinogene | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | | | | | |
| Cannabis | 24.0 | 15.3 | 21.6 | 1 157 | Cannabis | 24.0 | 15.3 | 21.6 | 1 157 |
| Tabak | 2.1 | 5.0 | 2.9 | 156 | Tabak | 2.1 | 5.0 | 2.9 | 156 |
| flüchtige Stoffe | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2 | | | | | |
| andere Substanz(en) | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 19 | andere Substanz | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 21 |
| Glücksspielsucht | 3.1 | 2.1 | 2.8 | 149 | | | | | |
| Computer-bzw. Internetsucht | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 70 | suchtähnliche Verhaltensweisen | 7.8 | 10.8 | 8.7 | 464 |
| Essstörungen | 0.3 | 5.6 | 1.8 | 96 | | | | | |
| andere suchtähnliche Verhaltensweisen | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 149 | | | | | |
| N** | 3 858 | 1 506 | 5 364 | 5 364 | N** | 3 858 | 1 506 | 5 364 | 5 364 |
| fehlende Angaben | 5 | 1 | 6 | 6 | | 5 | 1 | 6 | 6 |

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T14 Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2019)

| alle Selbstbetroffenen | | | |
|--|--------------|------------|--------------|
| | Männer | Frauen | Total |
| | % | % | % |
| Störung durch multiplen Substanzgebrauch gemäss ICD-10* | | | |
| ja | 6.8 | 5.5 | 6.5 |
| nein | 93.2 | 94.5 | 93.5 |
| N* | 1 874 | 690 | 2 564 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 1 989 | 817 | 2 806 |
| Häufigste Substanzkombinationen*** | | | |
| Kok/Alk | 20.0 | 4.0 | 16.8 |
| Tab/Alk | 7.0 | 20.0 | 9.6 |
| Can/Alk | 9.0 | 8.0 | 8.8 |
| Can/Kok/Alk | 7.0 | 0.0 | 5.6 |
| Tab/Can/Alk | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Kok/Op | 3.0 | 4.0 | 3.2 |
| Med/Alk | 4.0 | 0.0 | 3.2 |
| Tab/Kok/Alk | 3.0 | 4.0 | 3.2 |
| Kok/Op/Alk | 3.0 | 0.0 | 2.4 |
| Can/Op/Alk | 3.0 | 0.0 | 2.4 |
| Can/Kok | 2.0 | 4.0 | 2.4 |
| Can/Stim | 1.0 | 8.0 | 2.4 |
| Can/Stim/Kok/Alk | 2.0 | 4.0 | 2.4 |
| Tab/Can/Kok/Alk | 2.0 | 4.0 | 2.4 |
| Stim/Kok/Alk | 1.0 | 4.0 | 1.6 |
| Med/Kok/Op | 2.0 | 0.0 | 1.6 |
| Med/Stim | 0.0 | 8.0 | 1.6 |
| Can/Kok/Op | 2.0 | 0.0 | 1.6 |
| Can/Med/Kok/Op/Alk | 2.0 | 0.0 | 1.6 |
| Tab/Can | 2.0 | 0.0 | 1.6 |
| Andere Kombinationen | 21.0 | 24.0 | 21.6 |
| N** | 100 | 25 | 125 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 28 | 13 | 41 |

* Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen mit multiplern Substanzgebrauch. Spaltenprozenze; Nur eine Kategorie möglich

T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2019), Männer

| Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------|-----------|----------------------|
| | Alkohol | Opioide | Kokain und Derivate | andere Stimulanzien | Hypnotika/ Sedativa | Halluzinogene | Cannabis | Tabak | andere Substanzen |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen* | | | | | | | | | |
| täglich | 44.6 | 40.7 | 16.8 | 6.7 | 60.0 | 0.0 | 34.3 | 85.3 | 100.0 |
| 4-6 Tage pro Woche | 12.7 | 8.8 | 14.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 2.7 | 0.0 |
| 2-3 Tage pro Woche | 12.8 | 11.0 | 26.4 | 22.2 | 10.0 | 0.0 | 16.4 | 2.7 | 0.0 |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 8.0 | 13.2 | 23.6 | 26.7 | 6.7 | 33.3 | 17.8 | 4.0 | 0.0 |
| kein Konsum | 21.8 | 26.4 | 18.9 | 42.2 | 23.3 | 66.7 | 23.0 | 5.3 | 0.0 |
| N** | 1 593 | 91 | 280 | 45 | 30 | 3 | 799 | 75 | 1 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 338 | 50 | 84 | 6 | 11 | 1 | 128 | 6 | 16 |

T 15.1b Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2019), Frauen

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|----------|
| Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen* | | | | | | | | | |
| täglich | 42.7 | 35.1 | 8.5 | 25.0 | 66.7 | - | 40.3 | 84.3 | 100.0 |
| 4-6 Tage pro Woche | 13.5 | 5.4 | 17.0 | 20.0 | 0.0 | - | 6.3 | 4.3 | 0.0 |
| 2-3 Tage pro Woche | 13.5 | 13.5 | 27.7 | 15.0 | 10.0 | - | 13.6 | 1.4 | 0.0 |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 9.3 | 13.5 | 19.1 | 20.0 | 6.7 | - | 17.3 | 5.7 | 0.0 |
| kein Konsum | 21.0 | 32.4 | 27.7 | 20.0 | 16.7 | - | 22.5 | 4.3 | 0.0 |
| N** | 710 | 37 | 47 | 20 | 30 | 0 | 191 | 70 | 1 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 147 | 22 | 9 | 4 | 7 | 1 | 39 | 5 | 3 |

T 15.1c Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2019), Männer und Frauen

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|----------|
| Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen* | | | | | | | | | |
| täglich | 44.0 | 39.1 | 15.6 | 12.3 | 63.3 | 0.0 | 35.5 | 84.8 | 100.0 |
| 4-6 Tage pro Woche | 13.0 | 7.8 | 14.7 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 3.4 | 0.0 |
| 2-3 Tage pro Woche | 13.0 | 11.7 | 26.6 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 15.9 | 2.1 | 0.0 |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 8.4 | 13.3 | 22.9 | 24.6 | 6.7 | 33.3 | 17.7 | 4.8 | 0.0 |
| kein Konsum | 21.6 | 28.1 | 20.2 | 35.4 | 20.0 | 66.7 | 22.9 | 4.8 | 0.0 |
| N** | 2 303 | 128 | 327 | 65 | 60 | 3 | 990 | 145 | 2 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 485 | 72 | 93 | 10 | 18 | 2 | 167 | 11 | 19 |

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.2a Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2019), Männer

| Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|
| | Glücksspielsucht | Computer-bzw. Internetsucht | Essstörungen | andere suchtähnliche Verhaltensweisen |
| Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%) | | | | |
| täglich | 16.3 | 61.2 | 55.6 | 66.0 |
| 4-6 Tage pro Woche | 8.1 | 14.3 | 0.0 | 6.2 |
| 2-3 Tage pro Woche | 17.4 | 8.2 | 33.3 | 12.4 |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 17.4 | 8.2 | 0.0 | 7.2 |
| nie | 40.7 | 8.2 | 11.1 | 8.2 |
| N** | 86 | 49 | 9 | 97 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 32 | 14 | 2 | 12 |

T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2019), Frauen

| | | | | |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%) | | | | |
| täglich | 10.5 | 33.3 | 57.5 | 47.1 |
| 4-6 Tage pro Woche | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 5.9 |
| 2-3 Tage pro Woche | 10.5 | 16.7 | 18.8 | 14.7 |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 26.3 | 0.0 | 7.5 | 20.6 |
| nie | 52.6 | 50.0 | 3.8 | 11.8 |
| N** | 19 | 6 | 80 | 34 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 12 | 1 | 5 | 6 |

T15.2c Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2019), Männer und Frauen

| | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|------------|
| Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%) | | | | |
| täglich | 15.2 | 58.2 | 57.3 | 61.1 |
| 4-6 Tage pro Woche | 6.7 | 12.7 | 11.2 | 6.1 |
| 2-3 Tage pro Woche | 16.2 | 9.1 | 20.2 | 13.0 |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 19.0 | 7.3 | 6.7 | 10.7 |
| nie | 42.9 | 12.7 | 4.5 | 9.2 |
| N** | 105 | 55 | 89 | 131 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 44 | 15 | 7 | 18 |

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2019), Männer

| Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|
| Männer | Alkohol | Opioide | Kokain und Derivate | andere Stimulanzien | Hypnotika/Sedativa | Halluzinogene | Cannabis | Tabak | andere Substanzen |
| Alter beim Erstkonsum | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 16.1 | 24.2 | 21.0 | 19.9 | 29.2 | 18.0 | 15.2 | 15.6 | 20.2 |
| Standardabweichung | 4.1 | 9.6 | 6.3 | 6.7 | 14.7 | | 2.3 | 2.7 | 3.3 |
| 1. Quartil | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 |
| Medianwert | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 18.5 | 25.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 |
| 3. Quartil | 17.0 | 28.0 | 23.0 | 20.0 | 35.5 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 23.0 |
| N* | 1 010 | 75 | 222 | 34 | 20 | 1 | 621 | 49 | 5 |
| fehlende Angaben | 921 | 66 | 142 | 17 | 21 | 3 | 306 | 32 | 12 |
| Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 22.6 | 27.0 | 24.7 | 19.5 | 28.9 | 19.0 | 16.3 | 17.9 | 20.3 |
| Standardabweichung | 8.7 | 10.6 | 7.0 | 4.3 | 10.3 | | 2.8 | 6.5 | 2.5 |
| 1. Quartil | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 15.0 | 14.0 | 18.0 |
| Medianwert | 20.0 | 23.0 | 24.0 | 19.0 | 27.0 | 19.0 | 16.0 | 16.5 | 20.0 |
| 3. Quartil | 25.0 | 30.0 | 28.0 | 22.0 | 35.0 | 19.0 | 17.0 | 19.0 | 23.0 |
| N* | 717 | 44 | 103 | 21 | 11 | 1 | 375 | 40 | 3 |
| fehlende Angaben | 1 214 | 97 | 261 | 30 | 30 | 3 | 552 | 41 | 14 |
| Alter beim Beginn des auffälligen Konsums | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 31.6 | 26.7 | 26.1 | 22.3 | 34.2 | 20.0 | 17.3 | 21.4 | 32.1 |
| Standardabweichung | 12.8 | 10.0 | 7.6 | 7.2 | 14.4 | | 4.4 | 11.1 | 13.5 |
| 1. Quartil | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 24.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 |
| Medianwert | 30.0 | 24.0 | 25.0 | 21.0 | 30.5 | 20.0 | 16.0 | 19.0 | 31.0 |
| 3. Quartil | 40.0 | 31.0 | 30.0 | 25.0 | 42.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 46.0 |
| N* | 1 084 | 75 | 223 | 34 | 22 | 1 | 558 | 41 | 7 |
| fehlende Angaben | 847 | 66 | 141 | 17 | 19 | 3 | 369 | 40 | 10 |
| Latenzzeit (in Jahren)** | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 26.4 | 5.8 | 11.2 | 4.6 | 21.8 | 2.2 | 4.7 | 13.6 | 14.8 |
| Standardabweichung | 13.4 | 6.4 | 8.5 | 5.5 | 29.4 | | 6.4 | 15.9 | 18.1 |
| 1. Quartil | 16.2 | 2.2 | 4.4 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 0.7 |
| Medianwert | 25.1 | 3.6 | 10.0 | 1.9 | 8.7 | 2.2 | 2.3 | 4.8 | 10.0 |
| 3. Quartil | 35.6 | 5.6 | 15.9 | 4.7 | 55.4 | 2.2 | 4.8 | 20.5 | 28.8 |
| N* | 415 | 13 | 90 | 9 | 3 | 1 | 410 | 33 | 4 |
| fehlende Angaben | 290 | 7 | 48 | 8 | 3 | 1 | 182 | 18 | 6 |

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2019), Frauen

| Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|
| Frauen | Alkohol | Opioide | Kokain und Derivate | andere Stimulanzien | Hypnotika/Sedativa | Halluzinogene | Cannabis | Tabak | andere Substanzen |
| Alter beim Erstkonsum | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 18.0 | 21.7 | 20.9 | 17.4 | 31.5 | - | 15.0 | 16.1 | 13.0 |
| Standardabweichung | 6.2 | 7.8 | 5.7 | 5.5 | 12.8 | - | 2.1 | 3.5 | - |
| 1. Quartil | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 21.5 | - | 14.0 | 14.0 | - |
| Medianwert | 16.0 | 20.0 | 19.0 | 15.5 | 29.0 | - | 15.0 | 16.0 | 13.0 |
| 3. Quartil | 19.0 | 22.0 | 25.0 | 19.0 | 37.5 | - | 16.0 | 17.5 | - |
| N* | 432 | 33 | 42 | 14 | 16 | 0 | 144 | 56 | 1 |
| fehlende Angaben | 425 | 26 | 14 | 10 | 21 | 1 | 86 | 19 | 3 |
| Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 27.0 | 20.8 | 23.4 | 19.1 | 36.7 | - | 15.8 | 18.5 | - |
| Standardabweichung | 10.2 | 5.4 | 6.0 | 8.7 | 14.4 | - | 2.4 | 4.7 | - |
| 1. Quartil | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 14.0 | 30.0 | - | 14.0 | 15.0 | - |
| Medianwert | 25.0 | 20.5 | 23.0 | 15.0 | 30.5 | - | 15.0 | 18.0 | - |
| 3. Quartil | 33.0 | 21.0 | 27.0 | 22.5 | 54.0 | - | 16.0 | 20.0 | - |
| N* | 321 | 18 | 19 | 8 | 6 | 0 | 85 | 46 | 0 |
| fehlende Angaben | 536 | 41 | 37 | 16 | 31 | 1 | 145 | 29 | 4 |
| Alter beim Beginn des auffälligen Konsums | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 35.5 | 23.1 | 22.8 | 21.4 | 34.5 | - | 16.7 | 21.5 | 17.0 |
| Standardabweichung | 13.2 | 8.4 | 6.3 | 10.5 | 12.6 | - | 4.0 | 9.0 | - |
| 1. Quartil | 25.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 26.0 | - | 15.0 | 15.0 | - |
| Medianwert | 35.0 | 21.0 | 21.0 | 17.0 | 30.0 | - | 16.0 | 18.0 | 17.0 |
| 3. Quartil | 44.0 | 23.0 | 25.0 | 19.0 | 42.0 | - | 17.0 | 26.0 | - |
| N* | 498 | 30 | 42 | 13 | 22 | 0 | 132 | 49 | 1 |
| fehlende Angaben | 359 | 29 | 14 | 11 | 15 | 1 | 98 | 26 | 3 |
| Latenzzeit (in Jahren)** | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 27.6 | 8.4 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | - | 4.2 | 22.3 | 5.1 |
| Standardabweichung | 13.7 | 11.5 | 3.2 | 5.0 | 5.5 | - | 6.8 | 17.8 | - |
| 1. Quartil | 17.3 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | - | 1.0 | 4.1 | - |
| Medianwert | 27.1 | 4.4 | 4.3 | 2.7 | 3.2 | - | 1.6 | 19.8 | 5.1 |
| 3. Quartil | 37.9 | 16.4 | 6.6 | 7.9 | 8.5 | - | 3.6 | 39.0 | - |
| N* | 173 | 4 | 14 | 6 | 4 | 0 | 88 | 36 | 1 |
| fehlende Angaben | 119 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 45 | 15 | 1 |

* Genauere Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2019), Männer und Frauen

| Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| Männer & Frauen | Alkohol | Opioide | Kokain und Derivate | andere Stimulanzien | Hypnotika/Sedativa | Halluzinogene | Cannabis | Tabak | andere Substanzen |
| Alter beim Erstkonsum | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 16.7 | 23.4 | 21.0 | 19.2 | 30.2 | 18.0 | 15.1 | 15.9 | 19.0 |
| Standardabweichung | 4.9 | 9.1 | 6.2 | 6.4 | 13.7 | - | 2.2 | 3.1 | 4.2 |
| 1. Quartil | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 20.0 | - | 14.0 | 14.0 | 16.0 |
| Medianwert | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 25.5 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 19.0 |
| 3. Quartil | 18.0 | 26.0 | 23.0 | 20.0 | 35.5 | - | 16.0 | 18.0 | 23.0 |
| N* | 1 442 | 108 | 264 | 48 | 36 | 1 | 765 | 105 | 6 |
| fehlende Angaben | 1 346 | 92 | 156 | 27 | 42 | 4 | 392 | 51 | 15 |
| Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 23.9 | 25.2 | 24.5 | 19.4 | 31.6 | 19.0 | 16.2 | 18.2 | 20.3 |
| Standardabweichung | 9.4 | 9.8 | 6.9 | 5.7 | 12.0 | - | 2.7 | 5.6 | 2.5 |
| 1. Quartil | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 15.0 | 23.0 | - | 15.0 | 15.0 | 18.0 |
| Medianwert | 20.0 | 21.0 | 23.5 | 18.0 | 30.0 | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 20.0 |
| 3. Quartil | 28.0 | 29.0 | 28.0 | 22.0 | 35.0 | - | 16.0 | 20.0 | 23.0 |
| N* | 1 038 | 62 | 122 | 29 | 17 | 1 | 460 | 86 | 3 |
| fehlende Angaben | 1 750 | 138 | 298 | 46 | 61 | 4 | 697 | 70 | 18 |
| Alter beim Beginn des auffälligen Konsums | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 32.8 | 25.7 | 25.6 | 22.0 | 34.4 | 20.0 | 17.2 | 21.5 | 30.3 |
| Standardabweichung | 13.0 | 9.7 | 7.5 | 8.1 | 13.3 | - | 4.3 | 10.0 | 13.6 |
| 1. Quartil | 22.0 | 19.0 | 20.0 | 17.0 | 25.0 | - | 15.0 | 15.0 | 17.5 |
| Medianwert | 30.0 | 23.0 | 25.0 | 19.0 | 30.0 | 20.0 | 16.0 | 19.0 | 27.0 |
| 3. Quartil | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 42.0 | - | 17.0 | 25.0 | 45.0 |
| N* | 1 582 | 105 | 265 | 47 | 44 | 1 | 690 | 90 | 8 |
| fehlende Angaben | 1 206 | 95 | 155 | 28 | 34 | 4 | 467 | 66 | 13 |
| Latenzzeit (in Jahren)** | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 26.7 | 6.5 | 10.3 | 4.7 | 12.3 | 2.2 | 4.6 | 18.1 | 12.8 |
| Standardabweichung | 13.5 | 7.5 | 8.3 | 5.1 | 19.5 | - | 6.4 | 17.4 | 16.2 |
| 1. Quartil | 16.6 | 1.7 | 3.7 | 1.1 | 1.2 | - | 1.2 | 2.4 | 1.0 |
| Medianwert | 25.6 | 3.6 | 8.8 | 1.9 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 5.1 |
| 3. Quartil | 36.3 | 6.1 | 14.0 | 7.9 | 13.4 | - | 4.6 | 29.8 | 19.0 |
| N* | 588 | 17 | 104 | 15 | 7 | 1 | 498 | 69 | 5 |
| fehlende Angaben | 409 | 11 | 53 | 11 | 7 | 2 | 227 | 33 | 7 |

* Genauere Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2019), Männer

| Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--------------|--|
| Männer | Glücksspielsucht | Computer-bzw. Internetsucht | Essstörungen | andere suchtmännliche Verhaltensweisen |
| Alter beim ersten Auftreten | | | | |
| Mittelwert | 22.1 | 21.4 | 10.0 | 15.4 |
| Standardabweichung | 6.2 | 14.7 | 5.4 | 9.3 |
| 1. Quartil | 18.0 | 14.0 | 4.0 | 12.0 |
| Medianwert | 20.0 | 15.0 | 12.0 | 13.0 |
| 3. Quartil | 25.0 | 29.0 | 14.0 | 16.0 |
| N* | 49 | 17 | 7 | 53 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 69 | 46 | 4 | 56 |
| Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens | | | | |
| Mittelwert | 27.3 | 16.1 | 15.3 | 16.9 |
| Standardabweichung | 8.8 | 4.0 | 4.1 | 9.5 |
| 1. Quartil | 21.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 |
| Medianwert | 25.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 |
| 3. Quartil | 32.0 | 16.0 | 20.0 | 16.0 |
| N* | 22 | 7 | 7 | 51 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 96 | 56 | 4 | 58 |
| Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens | | | | |
| Mittelwert | 28.0 | 22.9 | 15.6 | 19.7 |
| Standardabweichung | 8.5 | 14.1 | 4.0 | 10.9 |
| 1. Quartil | 20.5 | 15.0 | 12.0 | 14.0 |
| Medianwert | 27.0 | 16.5 | 14.0 | 15.0 |
| 3. Quartil | 33.0 | 32.0 | 20.0 | 20.0 |
| N* | 60 | 22 | 7 | 63 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 58 | 41 | 4 | 46 |
| Latenzzeit (in Jahren)** | | | | |
| Mittelwert | 11.3 | 5.7 | 3.9 | 6.3 |
| Standardabweichung | 9.3 | 4.2 | 2.9 | 7.7 |
| 1. Quartil | 3.9 | 2.8 | 1.7 | 2.0 |
| Medianwert | 8.5 | 4.9 | 3.6 | 3.3 |
| 3. Quartil | 17.6 | 6.7 | 6.1 | 7.9 |
| N* | 37 | 13 | 4 | 37 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 32 | 24 | 2 | 29 |

* Genau Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2019), Frauen

| Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--------------|--|
| Frauen | Glücksspielsucht | Computer-bzw. Internetsucht | Essstörungen | andere suchtmännliche Verhaltensweisen |
| Alter beim ersten Auftreten | | | | |
| Mittelwert | 22.8 | 42.0 | 15.5 | 21.2 |
| Standardabweichung | 11.2 | 29.7 | 5.2 | 11.6 |
| 1. Quartil | 18.0 | 21.0 | 14.0 | 15.0 |
| Medianwert | 19.5 | 42.0 | 15.5 | 16.0 |
| 3. Quartil | 26.5 | 63.0 | 17.0 | 28.0 |
| N* | 8 | 2 | 52 | 17 |
| fehlende Angaben | 23 | 5 | 33 | 23 |
| Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens | | | | |
| Mittelwert | 26.4 | 42.5 | 19.3 | 21.3 |
| Standardabweichung | 6.3 | 29.0 | 8.3 | 10.4 |
| 1. Quartil | 21.0 | 22.0 | 15.0 | 14.0 |
| Medianwert | 26.0 | 42.5 | 16.0 | 18.5 |
| 3. Quartil | 30.0 | 63.0 | 20.0 | 25.0 |
| N* | 5 | 2 | 47 | 18 |
| fehlende Angaben | 26 | 5 | 38 | 22 |
| Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens | | | | |
| Mittelwert | 32.4 | 42.5 | 20.4 | 23.7 |
| Standardabweichung | 15.3 | 29.0 | 8.6 | 12.4 |
| 1. Quartil | 23.0 | 22.0 | 16.0 | 15.0 |
| Medianwert | 27.0 | 42.5 | 17.0 | 20.0 |
| 3. Quartil | 46.0 | 63.0 | 23.5 | 28.0 |
| N* | 11 | 2 | 56 | 23 |
| fehlende Angaben | 20 | 5 | 29 | 17 |
| Latenzzeit (in Jahren)** | | | | |
| Mittelwert | 18.0 | 2.1 | 6.8 | 6.4 |
| Standardabweichung | 21.7 | 2.7 | 9.3 | 6.2 |
| 1. Quartil | 6.0 | 0.2 | 1.0 | 1.7 |
| Medianwert | 8.9 | 2.1 | 3.4 | 3.8 |
| 3. Quartil | 29.9 | 4.0 | 8.4 | 10.2 |
| N* | 4 | 2 | 30 | 11 |
| fehlende Angaben | 14 | 0 | 17 | 11 |

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2019), Männer und Frauen

| Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Männer und Frauen | Glücksspielsucht | Computer-bzw. Internetsucht | Essstörungen | andere suchtähnliche Verhaltensweisen |
| Alter beim ersten Auftreten | | | | |
| Mittelwert | 22.2 | 23.6 | 14.8 | 16.8 |
| Standardabweichung | 7.0 | 16.9 | 5.5 | 10.1 |
| 1. Quartil | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 |
| Medianwert | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
| 3. Quartil | 25.0 | 30.0 | 17.0 | 18.0 |
| N* | 57 | 19 | 59 | 70 |
| fehlende Angaben | 92 | 51 | 37 | 79 |
| Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens | | | | |
| Mittelwert | 27.1 | 22.0 | 18.8 | 18.1 |
| Standardabweichung | 8.3 | 15.9 | 7.9 | 9.9 |
| 1. Quartil | 21.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 |
| Medianwert | 25.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 |
| 3. Quartil | 32.0 | 22.0 | 20.0 | 20.0 |
| N* | 27 | 9 | 54 | 69 |
| fehlende Angaben | 122 | 61 | 42 | 80 |
| Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens | | | | |
| Mittelwert | 28.6 | 24.5 | 19.8 | 20.7 |
| Standardabweichung | 9.8 | 15.7 | 8.4 | 11.4 |
| 1. Quartil | 21.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
| Medianwert | 27.0 | 17.0 | 17.0 | 15.5 |
| 3. Quartil | 33.0 | 33.0 | 23.0 | 23.0 |
| N* | 71 | 24 | 63 | 86 |
| fehlende Angaben | 78 | 46 | 33 | 63 |
| Latenzzeit (in Jahren)** | | | | |
| Mittelwert | 11.9 | 5.2 | 6.4 | 6.3 |
| Standardabweichung | 10.8 | 4.2 | 8.8 | 7.3 |
| 1. Quartil | 3.9 | 2.4 | 1.0 | 1.9 |
| Medianwert | 8.5 | 4.0 | 3.4 | 3.3 |
| 3. Quartil | 17.6 | 6.7 | 7.5 | 8.2 |
| N* | 41 | 15 | 34 | 48 |
| fehlende Angaben | 46 | 24 | 19 | 40 |

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2019)

| Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | Heroin | | | Kokain | | | Amphetamine | | | Cannabis | | | Benzodiazepine | | |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Einnahmeart* | | | | | | | | | | | | | | | |
| injizieren | 13.1 | 7.7 | 11.5 | 3.4 | 9.3 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| rauchen/inhalieren | 57.4 | 53.8 | 56.3 | 11.0 | 7.0 | 10.5 | 16.7 | 18.2 | 17.2 | 98.3 | 97.3 | 98.1 | 3.4 | 4.3 | 3.8 |
| essen/trinken | 4.9 | 11.5 | 6.9 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 33.3 | 27.3 | 31.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 96.6 | 91.3 | 94.2 |
| sniffen | 24.6 | 26.9 | 25.3 | 82.5 | 81.4 | 82.4 | 50.0 | 36.4 | 44.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 4.3 | 1.9 |
| anderes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 18.2 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N** | 61 | 26 | 87 | 263 | 43 | 306 | 18 | 11 | 29 | 759 | 186 | 945 | 29 | 23 | 52 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 51 | 22 | 73 | 85 | 10 | 95 | 10 | 4 | 14 | 168 | 44 | 212 | 4 | 6 | 10 |

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 12 Monaten vor dem Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem | | | | | | | | | | | | alle Selbstbetroffenen | | | |
|---|--------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Injektion im Leben* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ja | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 30.4 | 23.7 | 28.5 | 6.7 | 19.5 | 8.7 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 154 |
| nie | 94.8 | 95.0 | 94.9 | 63.0 | 63.2 | 63.1 | 91.5 | 78.0 | 89.4 | 96.3 | 96.1 | 96.3 | 94.1 | 94.0 | 94.0 | 3 696 |
| möchte nicht antworten | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 13.2 | 8.5 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 80 |
| N** | 1 394 | 616 | 2 010 | 92 | 38 | 130 | 224 | 41 | 265 | 736 | 178 | 914 | 2 822 | 1 108 | 3 930 | 3 930 |
| fehlende Angaben | 537 | 241 | 778 | 49 | 21 | 70 | 140 | 15 | 155 | 191 | 52 | 243 | 1 041 | 399 | 1 440 | 1 440 |
| Injektion in den letzten 12 Monaten* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ja | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 16.1 | 26.3 | 18.7 | 11.8 | 45.5 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 6.2 | 4.5 | 33 |
| nein | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 83.9 | 73.7 | 81.3 | 88.2 | 54.5 | 82.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.1 | 93.8 | 95.5 | 707 |
| N** | 234 | 96 | 330 | 56 | 19 | 75 | 51 | 11 | 62 | 119 | 37 | 156 | 545 | 195 | 740 | 740 |
| fehlende Angaben | 1 697 | 761 | 2 458 | 85 | 40 | 125 | 313 | 45 | 358 | 808 | 193 | 1 001 | 3 318 | 1 312 | 4 630 | 4 630 |
| Injektion in den letzten 30 Tagen* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ja | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 12.5 | 21.1 | 14.9 | 8.3 | 22.2 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.2 | 3.0 | 21 |
| nein | 98.6 | 97.9 | 98.4 | 87.5 | 78.9 | 85.1 | 91.7 | 77.8 | 89.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.5 | 95.8 | 97.0 | 688 |
| N** | 220 | 95 | 315 | 48 | 19 | 67 | 48 | 9 | 57 | 116 | 36 | 152 | 518 | 191 | 709 | 709 |
| fehlende Angaben | 1 711 | 762 | 2 473 | 93 | 40 | 133 | 316 | 47 | 363 | 811 | 194 | 1 005 | 3 345 | 1 316 | 4 661 | 4 661 |
| Austausch von Injektionsmaterial im Leben*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ja | 42.9 | 60.0 | 47.4 | 8.3 | 0.0 | 6.7 | 28.6 | 75.0 | 45.5 | 33.3 | - | 33.3 | 28.2 | 50.0 | 33.3 | 17 |
| nein | 57.1 | 40.0 | 52.6 | 83.3 | 100.0 | 86.7 | 71.4 | 25.0 | 54.5 | 66.7 | - | 66.7 | 69.2 | 50.0 | 64.7 | 33 |
| möchte nicht antworten | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 2.0 | 1 |
| N** | 14 | 5 | 19 | 12 | 3 | 15 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 3 | 39 | 12 | 51 | 51 |
| fehlende Angaben | 35 | 17 | 52 | 16 | 6 | 22 | 8 | 4 | 12 | 4 | 3 | 7 | 72 | 30 | 102 | 102 |
| Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 12 Monaten**** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ja | 0.0 | 9.1 | 3.4 | 20.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.9 | 5.3 | 3.7 | 2 |
| nein | 100.0 | 90.9 | 96.6 | 80.0 | 100.0 | 88.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100.0 | 97.1 | 94.7 | 96.3 | 52 |
| N** | 18 | 11 | 29 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 35 | 19 | 54 | 54 |
| fehlende Angaben | 31 | 11 | 42 | 23 | 5 | 28 | 11 | 5 | 16 | 5 | 2 | 7 | 76 | 23 | 99 | 99 |
| Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 30 Tagen***** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| nein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| N** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fehlende Angaben | 49 | 22 | 71 | 28 | 9 | 37 | 15 | 8 | 23 | 7 | 3 | 10 | 111 | 42 | 153 | 153 |

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Leben injiziert haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 12 Monaten injiziert haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

***** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 30 Tagen injiziert haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem | | | | | | | | | | | | alle Selbstbetroffenen | | | |
|--|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Alter bei der ersten Injektion* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bis 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 4.0 | 16.7 | 0.0 | 10.0 | 33.3 | 0.0 | 25.0 | 3.4 | 4.5 | 3.7 | 3 |
| 15-16 | 3.8 | 10.0 | 5.6 | 22.2 | 14.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.0 | 8.5 | 13.6 | 9.9 | 8 |
| 17-18 | 34.6 | 30.0 | 33.3 | 27.8 | 14.3 | 24.0 | 33.3 | 50.0 | 40.0 | 33.3 | 0.0 | 25.0 | 30.5 | 27.3 | 29.6 | 24 |
| 19-20 | 7.7 | 10.0 | 8.3 | 22.2 | 28.6 | 24.0 | 33.3 | 25.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 18.2 | 16.0 | 13 |
| 21-25 | 26.9 | 30.0 | 27.8 | 11.1 | 14.3 | 12.0 | 16.7 | 25.0 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | 25.0 | 25.4 | 22.7 | 24.7 | 20 |
| 26-30 | 15.4 | 10.0 | 13.9 | 5.6 | 14.3 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 9.1 | 8.6 | 7 |
| 30-39 | 7.7 | 10.0 | 8.3 | 11.1 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 4.5 | 6.2 | 5 |
| ab 40 | 3.8 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.2 | 1 |
| N** | 26 | 10 | 36 | 18 | 7 | 25 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 59 | 22 | 81 | 81 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 24 | 12 | 36 | 10 | 2 | 12 | 9 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 53 | 20 | 73 | 73 |

* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Laufe ihres Lebens injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Männer

Männer

| | Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|-----------|----------------------|
| | Alkohol | Opioide | Kokain oder Derivate | andere Stimulanzen | Hypnotika Sedativa | Halluzinogene | Cannabis | Tabak | andere Substanzen |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Weitere Suchtprobleme* | | | | | | | | | |
| Alkohol | - | 26.3 | 29.3 | 14.0 | 30.8 | 0.0 | 11.6 | 12.8 | 17.6 |
| Heroin | 1.0 | 4.4 | 3.4 | 4.0 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.9 |
| Methadon | 0.2 | 8.0 | 0.3 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 |
| Buprenorphin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fentanyl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Opioide | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 2.0 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 5.9 |
| Kokain-Pulver | 5.9 | 27.7 | 2.0 | 20.0 | 15.4 | 33.3 | 7.3 | 0.0 | 5.9 |
| Crack-Kokain | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| anderer Kokain-Typ | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Amphetamine | 1.1 | 5.1 | 4.2 | 6.0 | 2.6 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| Metamphetamine | 0.1 | 2.9 | 1.4 | 10.0 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 5.9 |
| MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy) | 0.9 | 3.6 | 6.2 | 8.0 | 0.0 | 33.3 | 3.4 | 1.3 | 5.9 |
| synthetische Cathinone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Stimulanzen | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| Barbiturate | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Benzodiazepine | 1.1 | 15.3 | 3.1 | 2.0 | 2.6 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 0.0 |
| GHB/GBL | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Schlaf- und Beruhigungsmittel | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LSD | 0.3 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 5.9 |
| Ketamin | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| andere Halluzinogene | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 0.0 |
| flüchtige Stoffe | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Cannabis | 7.4 | 27.0 | 23.1 | 18.0 | 15.4 | 0.0 | - | 17.9 | 5.9 |
| Tabak | 14.4 | 16.1 | 17.7 | 10.0 | 15.4 | 0.0 | 12.8 | - | 0.0 |
| andere Substanz(en) | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 2.0 | 5.1 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.0 |
| Glücksspielsucht | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| Computer-bzw. Internetsucht | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 5.1 | 5.9 |
| Essstörungen | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| andere suchtähnliche Verhaltensweisen | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| kein weiteres Suchtproblem | 78.6 | 41.6 | 52.7 | 66.0 | 43.6 | 66.7 | 78.5 | 74.4 | 52.9 |
| N** | 1 789 | 137 | 355 | 50 | 39 | 3 | 895 | 78 | 17 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 142 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 32 | 3 | 0 |

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Frauen
Frauen

| | Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------|-----------|----------------------|
| | Alkohol | Opioide | Kokain oder Derivate | andere Stimulanzien | Hypnotika/Seda- tiva | Halluzinogene | Cannabis | Tabak | andere Substanzen |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Weitere Suchtprobleme* | | | | | | | | | |
| Alkohol | - | 16.1 | 16.7 | 21.7 | 20.0 | 0.0 | 9.9 | 12.2 | 0.0 |
| Heroin | 1.1 | 1.8 | 5.6 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 25.0 |
| Methadon | 0.4 | 8.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 0.0 |
| Buprenorphin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fentanyl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Opiode | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kokain-Pulver | 2.9 | 21.4 | 3.7 | 21.7 | 14.3 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 50.0 |
| Crack-Kokain | 0.0 | 3.6 | 1.9 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| anderer Kokain-Typ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Amphetamine | 1.0 | 5.4 | 5.6 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 6.3 | 1.4 | 0.0 |
| Metamphetamine | 0.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy) | 0.4 | 1.8 | 3.7 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 25.0 |
| synthetische Cathinone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Stimulanzien | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| Barbiturate | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Benzodiazepine | 2.4 | 10.7 | 7.4 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 0.0 |
| GHB/GBL | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Schlaf- und Beruhigungsmittel | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LSD | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 25.0 |
| Ketamin | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 25.0 |
| andere Halluzinogene | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 100.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| flüchtige Stoffe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| Cannabis | 4.0 | 12.5 | 24.1 | 21.7 | 8.6 | 0.0 | - | 9.5 | 25.0 |
| Tabak | 10.9 | 12.5 | 18.5 | 13.0 | 14.3 | 0.0 | 12.1 | - | 25.0 |
| andere Substanz(en) | 0.5 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glücksspielsucht | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Computer-bzw. Internetsucht | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| Essstörungen | 1.1 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 0.0 |
| andere suchtähnliche Verhaltensweisen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| kein weiteres Suchtproblem | 84.3 | 51.8 | 61.1 | 65.2 | 54.3 | 0.0 | 79.4 | 78.4 | 50.0 |
| N** | 795 | 56 | 54 | 23 | 35 | 1 | 223 | 74 | 4 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 62 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Männer und Frauen

Männer und Frauen

| | Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|--------------|------------|----------------------|
| | Alkohol | Opioide | Kokain oder Derivate | andere Stimulanzien | Hypnotika/Seda- tiva | Halluzinogene | Cannabis | Tabak | andere Substanzen |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Weitere Suchtprobleme* | | | | | | | | | |
| Alkohol | - | 23.3 | 27.6 | 16.4 | 25.7 | 0.0 | 11.3 | 12.5 | 14.3 |
| Heroin | 1.0 | 3.6 | 3.7 | 2.7 | 4.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 9.5 |
| Methadon | 0.2 | 8.3 | 0.5 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 9.5 |
| Buprenorphin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fentanyl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Opioide | 0.2 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 2.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 4.8 |
| Kokain-Pulver | 5.0 | 25.9 | 2.2 | 20.5 | 14.9 | 25.0 | 6.9 | 0.0 | 14.3 |
| Crack-Kokain | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| anderer Kokain-Typ | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Amphetamine | 1.1 | 5.2 | 4.4 | 4.1 | 2.7 | 0.0 | 4.0 | 0.7 | 0.0 |
| Metamphetamine | 0.2 | 3.1 | 1.2 | 6.8 | 2.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.8 |
| MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy) | 0.7 | 3.1 | 5.9 | 9.6 | 0.0 | 25.0 | 3.9 | 0.7 | 9.5 |
| synthetische Cathinone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Stimulanzien | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.8 |
| Barbiturate | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Benzodiazepine | 1.5 | 14.0 | 3.7 | 2.7 | 1.4 | 0.0 | 1.9 | 2.6 | 0.0 |
| GHB/GBL | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Schlaf- und Beruhigungsmittel | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LSD | 0.3 | 0.5 | 2.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 9.5 |
| Ketamin | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.8 |
| andere Halluzinogene | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 2.7 | 0.0 | 25.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 |
| flüchtige Stoffe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| Cannabis | 6.3 | 22.8 | 23.2 | 19.2 | 12.2 | 0.0 | - | 13.8 | 9.5 |
| Tabak | 13.4 | 15.0 | 17.8 | 11.0 | 14.9 | 0.0 | 12.7 | - | 4.8 |
| andere Substanz(en) | 0.3 | 2.6 | 1.0 | 1.4 | 4.1 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 |
| Glücksspielsucht | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| Computer-bzw. Internetsucht | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.6 | 4.8 |
| Essstörungen | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.0 |
| andere suchtähnliche Verhaltensweisen | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| kein weiteres Suchtproblem | 80.4 | 44.6 | 53.8 | 65.8 | 48.6 | 50.0 | 78.7 | 76.3 | 52.4 |
| N** | 2 584 | 193 | 409 | 73 | 74 | 4 | 1 118 | 152 | 21 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 204 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 39 | 4 | 0 |

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2019), Männer

Männer

| | Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|
| | Glücksspielsucht | Computer-bzw. Internetsucht | Essstörungen | andere suchtähnliche Verhaltensweisen |
| | % | % | % | % |
| Weitere Suchtprobleme* | | | | |
| Alkohol | 3.5 | 3.2 | 10.0 | 1.0 |
| Heroin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Methadon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Buprenorphin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fentanyl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Opioide | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kokain-Pulver | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| Crack-Kokain | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| anderer Kokain-Typ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Amphetamine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Metamphetamine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| synthetische Cathinone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Stimulanzien | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Barbiturate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Benzodiazepine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GHB/GBL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Schlaf- und Beruhigungsmittel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LSD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ketamin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Halluzinogene | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| flüchtige Stoffe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cannabis | 1.8 | 4.8 | 10.0 | 0.0 |
| Tabak | 3.5 | 4.8 | 0.0 | 1.0 |
| andere Substanz(en) | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| Glücksspielsucht | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Computer-bzw. Internetsucht | 5.3 | - | 10.0 | 6.7 |
| Essstörungen | 0.0 | 1.6 | - | 0.0 |
| andere suchtähnliche Verhaltensweisen | 0.0 | 1.6 | 0.0 | - |
| kein weiteres Suchtproblem | 87.7 | 87.1 | 90.0 | 91.3 |
| N** | 114 | 62 | 10 | 104 |
| <i>fehlende Angaben</i> | <i>4</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>5</i> |

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2019), Frauen

Frauen

| | Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|
| | Glücksspielsucht | Computer-bzw. Internetsucht | Essstörungen | andere suchtähnliche Verhaltensweisen |
| | % | % | % | % |
| Weitere Suchtprobleme* | | | | |
| Alkohol | 10.7 | 14.3 | 4.9 | 0.0 |
| Heroin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Methadon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Buprenorphin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fentanyl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Opiode | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kokain-Pulver | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
| Crack-Kokain | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| anderer Kokain-Typ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Amphetamine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Metamphetamine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| synthetische Cathinone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Stimulanzien | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Barbiturate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Benzodiazepine | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GHB/GBL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Schlaf- und Beruhigungsmittel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LSD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ketamin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Halluzinogene | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| flüchtige Stoffe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cannabis | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
| Tabak | 3.6 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| andere Substanz(en) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| Glücksspielsucht | - | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| Computer-bzw. Internetsucht | 3.6 | - | 0.0 | 0.0 |
| Essstörungen | 0.0 | 0.0 | - | 2.8 |
| andere suchtähnliche Verhaltensweisen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| kein weiteres Suchtproblem | 78.6 | 85.7 | 93.9 | 91.7 |
| N** | 28 | 7 | 82 | 36 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 3 | 0 | 3 | 4 |

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2019), Männer und Frauen

Männer und Frauen

| | Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|
| | Glücksspielsucht | Computer-bzw. Internetsucht | Essstörungen | andere suchtähnliche Verhaltensweisen |
| | % | % | % | % |
| Weitere Suchtprobleme* | | | | |
| Alkohol | 4.9 | 4.3 | 5.4 | 0.7 |
| Heroin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Methadon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Buprenorphin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fentanyl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Opioide | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kokain-Pulver | 2.1 | 0.0 | 2.2 | 1.4 |
| Crack-Kokain | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| anderer Kokain-Typ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Amphetamine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Metamphetamine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| synthetische Cathinone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Stimulanzien | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Barbiturate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Benzodiazepine | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GHB/GBL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Schlaf- und Beruhigungsmittel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LSD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ketamin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| andere Halluzinogene | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
| flüchtige Stoffe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cannabis | 1.4 | 4.3 | 3.3 | 0.0 |
| Tabak | 3.5 | 5.8 | 0.0 | 0.7 |
| andere Substanz(en) | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.7 |
| Glücksspielsucht | - | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Computer-bzw. Internetsucht | 4.9 | - | 1.1 | 5.0 |
| Essstörungen | 0.0 | 1.4 | - | 0.7 |
| andere suchtähnliche Verhaltensweisen | 0.0 | 1.4 | 0.0 | - |
| kein weiteres Suchtproblem | 85.9 | 87.0 | 93.5 | 91.4 |
| N** | 142 | 69 | 92 | 140 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 7 | 1 | 4 | 9 |

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem | | | | | | | | | | | | | | | alle Hauptprobleme | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|---------------|----------|-----------|-----------------|-----------|------------|---------------------------|----------|-----------|---------------------------------|----------|-----------|--------------------|-----------|------------|------------|--------|-------|---|
| | Männer | | | Frauen | | | Total | | | Männer | | | Frauen | | | Total | | | Männer | Frauen | Total | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | | | |
| Alkohol* | Opiode | | | Kokain | | | Cannabis | | | Hypnotika/Sedativa | | | suchtähnliches Verhalten | | | | | | | | | |
| täglich | 22.7 | 66.7 | 32.1 | 22.2 | 14.3 | 21.6 | 11.0 | 10.5 | 10.9 | 0.0 | 25.0 | 8.3 | 0.0 | 20.0 | 8.3 | 15.6 | 25.0 | 17.4 | 48 | | | |
| 4-6 Tage pro Woche | 13.6 | 0.0 | 10.7 | 21.0 | 14.3 | 20.5 | 6.6 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 16.7 | 13.4 | 1.9 | 11.2 | 31 | | | |
| 2-3 Tage pro Woche | 27.3 | 16.7 | 25.0 | 24.7 | 57.1 | 27.3 | 27.5 | 15.8 | 25.5 | 25.0 | 0.0 | 16.7 | 28.6 | 40.0 | 33.3 | 26.8 | 21.2 | 25.7 | 71 | | | |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 18.2 | 0.0 | 14.3 | 19.8 | 0.0 | 18.2 | 30.8 | 52.6 | 34.5 | 25.0 | 50.0 | 33.3 | 28.6 | 40.0 | 33.3 | 25.9 | 34.6 | 27.5 | 76 | | | |
| kein Konsum | 18.2 | 16.7 | 17.9 | 12.3 | 14.3 | 12.5 | 24.2 | 21.1 | 23.6 | 50.0 | 25.0 | 41.7 | 14.3 | 0.0 | 8.3 | 18.3 | 17.3 | 18.1 | 50 | | | |
| N** | 22 | 6 | 28 | 81 | 7 | 88 | 91 | 19 | 110 | 8 | 4 | 12 | 7 | 5 | 12 | 224 | 52 | 276 | 276 | | | |
| fehlende Angaben | 119 | 53 | 172 | 283 | 49 | 332 | 836 | 211 | 1 047 | 33 | 33 | 66 | 294 | 158 | 452 | 3 896 | 2 280 | 6 176 | 6 176 | | | |
| Opiode* | Alkohol | | | Kokain | | | Cannabis | | | Hypnotika/Sedativa | | | suchtähnliches Verhalten | | | | | | | | | |
| täglich | 23.1 | 12.5 | 19.0 | 33.3 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 26.9 | 8.3 | 21.1 | 8 | | | |
| 4-6 Tage pro Woche | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | |
| 2-3 Tage pro Woche | 0.0 | 25.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 100.0 | 100.0 | - | - | - | 0.0 | 25.0 | 7.9 | 3 | | | |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 7.7 | 0.0 | 4.8 | 11.1 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 7.7 | 0.0 | 5.3 | 2 | | | |
| kein Konsum | 69.2 | 62.5 | 66.7 | 55.6 | 100.0 | 63.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 65.4 | 66.7 | 65.8 | 25 | | | |
| N** | 13 | 8 | 21 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 38 | 38 | | | |
| fehlende Angaben | 1 918 | 849 | 2 767 | 355 | 54 | 409 | 925 | 229 | 1 154 | 41 | 36 | 77 | 301 | 163 | 464 | 4 094 | 2 320 | 6 414 | 6 414 | | | |
| Kokain* | Alkohol | | | Opiode | | | Cannabis | | | Hypnotika/Sedativa | | | suchtähnliches Verhalten | | | | | | | | | |
| täglich | 8.4 | 0.0 | 7.0 | 16.7 | 0.0 | 12.5 | 1.9 | 8.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 2.4 | 5.8 | 13 | | | |
| 4-6 Tage pro Woche | 2.4 | 0.0 | 2.0 | 4.2 | 12.5 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 5 | | | |
| 2-3 Tage pro Woche | 9.6 | 23.5 | 12.0 | 20.8 | 25.0 | 21.9 | 5.6 | 0.0 | 4.5 | 40.0 | 0.0 | 33.3 | 60.0 | 0.0 | 42.9 | 13.8 | 14.3 | 13.9 | 31 | | | |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 31.3 | 11.8 | 28.0 | 33.3 | 50.0 | 37.5 | 27.8 | 50.0 | 31.8 | 20.0 | 0.0 | 16.7 | 40.0 | 50.0 | 42.9 | 30.9 | 33.3 | 31.4 | 70 | | | |
| kein Konsum | 48.2 | 64.7 | 51.0 | 25.0 | 12.5 | 21.9 | 64.8 | 41.7 | 60.6 | 20.0 | 100.0 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | 14.3 | 46.4 | 47.6 | 46.6 | 104 | | | |
| N** | 83 | 17 | 100 | 24 | 8 | 32 | 54 | 12 | 66 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 181 | 42 | 223 | 223 | | | |
| fehlende Angaben | 1 848 | 840 | 2 688 | 117 | 51 | 168 | 873 | 218 | 1 091 | 36 | 36 | 72 | 296 | 161 | 457 | 3 939 | 2 290 | 6 229 | 6 229 | | | |
| Cannabis* | Alkohol | | | Opiode | | | Kokain | | | Hypnotika/Sedativa | | | suchtähnliches Verhalten | | | | | | | | | |
| täglich | 36.7 | 29.0 | 35.1 | 53.6 | 80.0 | 57.6 | 43.9 | 70.0 | 47.4 | 60.0 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 33.3 | 41.6 | 41.9 | 41.7 | 128 | | | |
| 4-6 Tage pro Woche | 4.2 | 12.9 | 6.0 | 10.7 | 0.0 | 9.1 | 10.6 | 0.0 | 9.2 | 20.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 21 | | | |
| 2-3 Tage pro Woche | 18.3 | 16.1 | 17.9 | 10.7 | 20.0 | 12.1 | 9.1 | 20.0 | 10.5 | 0.0 | 33.3 | 12.5 | 0.0 | 50.0 | 16.7 | 13.5 | 17.7 | 14.3 | 44 | | | |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 8.3 | 16.1 | 9.9 | 3.6 | 0.0 | 3.0 | 16.7 | 10.0 | 15.8 | 0.0 | 33.3 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 33.3 | 10.2 | 19.4 | 12.1 | 37 | | | |
| kein Konsum | 32.5 | 25.8 | 31.1 | 21.4 | 0.0 | 18.2 | 19.7 | 0.0 | 17.1 | 20.0 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0.0 | 16.7 | 27.8 | 14.5 | 25.1 | 77 | | | |
| N** | 120 | 31 | 151 | 28 | 5 | 33 | 66 | 10 | 76 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 245 | 62 | 307 | 307 | | | |
| fehlende Angaben | 1 811 | 826 | 2 637 | 113 | 54 | 167 | 298 | 46 | 344 | 36 | 34 | 70 | 297 | 161 | 458 | 3 875 | 2 270 | 6 145 | 6 145 | | | |

*Als weiteres Problem. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem | | | | | | | | | | | | | | | alle Hauptprobleme | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|----------|----------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|---|
| | Männer | | | Frauen | | | Total | | | Männer | | | Frauen | | | Total | | | Männer | Frauen | Total | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | | | | |
| andere Stimulanzien* | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | suchtähnliches Verhalten | | | | | | | | | |
| täglich | 5.6 | 0.0 | 3.8 | 16.7 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 7.1 | 9.3 | - | - | - | 7.5 | 3.8 | 6.5 | 6 | | | |
| 4-6 Tage pro Woche | 5.6 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 2.3 | - | - | - | 3.0 | 0.0 | 2.2 | 2 | | | |
| 2-3 Tage pro Woche | 11.1 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 33.3 | 11.1 | 15.4 | 100.0 | 21.4 | 3.4 | 0.0 | 2.3 | - | - | - | 9.0 | 7.7 | 8.6 | 8 | | | |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 27.8 | 12.5 | 23.1 | 50.0 | 0.0 | 33.3 | 23.1 | 0.0 | 21.4 | 13.8 | 21.4 | 16.3 | - | - | - | 22.4 | 15.4 | 20.4 | 19 | | | |
| kein Konsum | 50.0 | 87.5 | 61.5 | 33.3 | 66.7 | 44.4 | 61.5 | 0.0 | 57.1 | 69.0 | 71.4 | 69.8 | - | - | - | 58.2 | 73.1 | 62.4 | 58 | | | |
| N** | 18 | 8 | 26 | 6 | 3 | 9 | 13 | 1 | 14 | 29 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 67 | 26 | 93 | 93 | | | |
| fehlende Angaben | 1 913 | 849 | 2 762 | 135 | 56 | 191 | 351 | 55 | 406 | 898 | 216 | 1 114 | 301 | 163 | 464 | 4 053 | 2 306 | 6 359 | 6 359 | | | |
| Hypnotika/Sedativa* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| täglich | 100.0 | - | 100.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 0.0 | 20.0 | 1 | | | |
| 4-6 Tage pro Woche | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 1 | | | |
| 2-3 Tage pro Woche | 0.0 | - | 0.0 | 66.7 | - | 66.7 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 40.0 | 2 | | | |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | |
| kein Konsum | 0.0 | - | 0.0 | 33.3 | - | 33.3 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 0.0 | 20.0 | 1 | | | |
| N** | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | | | |
| fehlende Angaben | 1 930 | 857 | 2 787 | 138 | 59 | 197 | 364 | 55 | 419 | 927 | 230 | 1 157 | 301 | 163 | 464 | 4 116 | 2 331 | 6 447 | 6 447 | | | |
| Halluzinogene* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| täglich | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 3.7 | 0.0 | 2.6 | 1 | | | |
| 4-6 Tage pro Woche | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 5.9 | - | - | - | 3.7 | 0.0 | 2.6 | 1 | | | |
| 2-3 Tage pro Woche | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 3.7 | 0.0 | 2.6 | 1 | | | |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 16.7 | 0.0 | 12.5 | - | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 100.0 | 33.3 | 9.1 | 33.3 | 17.6 | - | - | - | 14.8 | 25.0 | 17.9 | 7 | | | |
| kein Konsum | 83.3 | 100.0 | 87.5 | - | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 44.4 | 81.8 | 66.7 | 76.5 | - | - | - | 74.1 | 75.0 | 74.4 | 29 | | | |
| N** | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 39 | 39 | | | |
| fehlende Angaben | 1 925 | 855 | 2 780 | 141 | 58 | 199 | 356 | 55 | 411 | 916 | 224 | 1 140 | 301 | 163 | 464 | 4 093 | 2 320 | 6 413 | 6 413 | | | |
| andere Substanzen* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| täglich | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 25.0 | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 33.3 | 2 | | | |
| 4-6 Tage pro Woche | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | |
| 2-3 Tage pro Woche | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 100.0 | 50.0 | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 33.3 | 2 | | | |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 100.0 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 25.0 | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 33.3 | 2 | | | |
| kein Konsum | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | |
| N** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | | | |
| fehlende Angaben | 1 930 | 857 | 2 787 | 141 | 59 | 200 | 364 | 56 | 420 | 924 | 229 | 1 153 | 301 | 163 | 464 | 4 116 | 2 330 | 6 446 | 6 446 | | | |

*Als weiteres Problem. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem | | | | | | | | | | | | alle Selbstbetroffenen | | | N |
|---|--------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | | |
| Häufigkeit des Alkoholkonsums* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nie | 8.7 | 7.8 | 8.4 | 11.3 | 17.6 | 12.9 | 15.0 | 13.6 | 14.8 | 13.1 | 29.4 | 16.2 | 13.7 | 15.0 | 14.1 | 370 |
| 1-mal pro Monat oder weniger | 3.1 | 6.0 | 4.0 | 15.1 | 29.4 | 18.6 | 11.0 | 13.6 | 11.4 | 27.9 | 28.4 | 28.0 | 10.9 | 12.9 | 11.5 | 302 |
| 2-4-mal pro Monat | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 30.2 | 11.8 | 25.7 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 41.2 | 29.4 | 39.0 | 17.7 | 12.5 | 16.2 | 427 |
| 2-3-mal pro Woche | 16.2 | 17.3 | 16.5 | 18.9 | 29.4 | 21.4 | 24.4 | 36.4 | 26.2 | 13.1 | 5.9 | 11.8 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 423 |
| 4-mal oder mehr pro Woche | 65.7 | 63.0 | 64.9 | 24.5 | 11.8 | 21.4 | 26.8 | 13.6 | 24.8 | 4.6 | 6.9 | 5.0 | 41.6 | 43.5 | 42.1 | 1 108 |
| N** | 1 056 | 486 | 1 542 | 53 | 17 | 70 | 127 | 22 | 149 | 434 | 102 | 536 | 1 878 | 752 | 2 630 | 2 630 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 875 | 371 | 1 246 | 88 | 42 | 130 | 237 | 34 | 271 | 493 | 128 | 621 | 1 985 | 755 | 2 740 | 2 740 |
| Anzahl Standarddrinks pro Tag*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 oder 2 | 5.5 | 8.6 | 6.5 | 46.7 | 30.8 | 43.1 | 39.6 | 44.4 | 40.3 | 45.3 | 54.5 | 46.8 | 21.3 | 22.0 | 21.5 | 459 |
| 3 oder 4 | 18.0 | 20.6 | 18.8 | 28.9 | 38.5 | 31.0 | 24.8 | 50.0 | 28.6 | 36.3 | 28.8 | 35.0 | 23.6 | 23.4 | 23.5 | 501 |
| 5 oder 6 | 24.3 | 25.8 | 24.8 | 6.7 | 15.4 | 8.6 | 14.9 | 0.0 | 12.6 | 10.8 | 12.1 | 11.0 | 19.6 | 20.9 | 20.0 | 426 |
| 7 bis 9 | 21.1 | 24.1 | 22.1 | 4.4 | 0.0 | 3.4 | 12.9 | 5.6 | 11.8 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 14.8 | 18.3 | 15.8 | 337 |
| 10 oder mehr | 31.1 | 20.9 | 27.8 | 13.3 | 15.4 | 13.8 | 7.9 | 0.0 | 6.7 | 3.2 | 0.0 | 2.7 | 20.7 | 15.5 | 19.2 | 409 |
| N** | 913 | 431 | 1 344 | 45 | 13 | 58 | 101 | 18 | 119 | 342 | 66 | 408 | 1 524 | 608 | 2 132 | 2 132 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 1 018 | 426 | 1 444 | 96 | 46 | 142 | 263 | 38 | 301 | 585 | 164 | 749 | 2 339 | 899 | 3 238 | 3 238 |
| Häufigkeit des starken Alkoholkonsums*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nie | 11.3 | 13.3 | 11.9 | 43.5 | 46.7 | 44.3 | 32.4 | 42.1 | 33.8 | 50.3 | 67.0 | 53.6 | 27.8 | 31.1 | 28.7 | 677 |
| weniger als 1-mal pro Monat | 8.4 | 12.2 | 9.6 | 23.9 | 26.7 | 24.6 | 20.7 | 21.1 | 20.8 | 32.3 | 23.9 | 30.7 | 16.0 | 15.5 | 15.8 | 373 |
| 1-mal pro Monat | 12.5 | 16.5 | 13.8 | 8.7 | 6.7 | 8.2 | 14.4 | 5.3 | 13.1 | 11.0 | 4.5 | 9.8 | 11.8 | 12.2 | 11.9 | 280 |
| 1-mal pro Woche | 28.8 | 21.7 | 26.6 | 13.0 | 20.0 | 14.8 | 22.5 | 31.6 | 23.8 | 5.0 | 2.3 | 4.4 | 20.2 | 17.1 | 19.3 | 455 |
| fast jeden Tag | 39.0 | 36.2 | 38.1 | 10.9 | 0.0 | 8.2 | 9.9 | 0.0 | 8.5 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 570 |
| N** | 966 | 442 | 1 408 | 46 | 15 | 61 | 111 | 19 | 130 | 362 | 88 | 450 | 1 676 | 679 | 2 355 | 2 355 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 965 | 415 | 1 380 | 95 | 44 | 139 | 253 | 37 | 290 | 565 | 142 | 707 | 2 187 | 828 | 3 015 | 3 015 |

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Alkoholkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem | | | | | | | | | | | | alle Selbstbetroffenen | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Häufigkeit des Tabakkonsums* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nie | 36.9 | 46.4 | 39.9 | 22.2 | 15.8 | 20.3 | 18.2 | 22.7 | 18.9 | 24.1 | 26.7 | 24.6 | 33.1 | 42.0 | 35.7 | 840 |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 0.9 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 4.9 | 8.6 | 5.7 | 1.9 | 3.0 | 2.3 | 53 |
| 2-3 Tage pro Woche | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 4.9 | 9.5 | 5.9 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 49 |
| 4-6 Tage pro Woche | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 5.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.9 | 3.0 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 33 |
| einmal täglich | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 5.3 | 3.1 | 1.7 | 0.0 | 1.4 | 4.2 | 3.4 | 4.1 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 52 |
| mehrmals täglich | 58.6 | 49.3 | 55.7 | 75.6 | 73.7 | 75.0 | 78.5 | 77.3 | 78.3 | 58.3 | 50.9 | 56.7 | 58.7 | 50.6 | 56.3 | 1 323 |
| N** | 818 | 375 | 1 193 | 45 | 19 | 64 | 121 | 22 | 143 | 448 | 116 | 564 | 1 652 | 698 | 2 350 | 2 350 |
| fehlende Angaben | 1 113 | 482 | 1 595 | 96 | 40 | 136 | 243 | 34 | 277 | 479 | 114 | 593 | 2 211 | 809 | 3 020 | 3 020 |
| Anzahl Zigaretten pro Tag*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 bis 10 | 16.6 | 20.8 | 17.7 | 22.9 | 37.5 | 27.5 | 25.0 | 7.1 | 22.5 | 66.4 | 66.7 | 66.5 | 34.6 | 35.1 | 34.8 | 480 |
| 11 bis 20 | 48.2 | 53.9 | 49.8 | 57.1 | 43.8 | 52.9 | 50.0 | 64.3 | 52.0 | 26.1 | 23.1 | 25.5 | 40.9 | 42.5 | 41.3 | 571 |
| 21 bis 30 | 24.8 | 16.3 | 22.5 | 14.3 | 12.5 | 13.7 | 21.6 | 21.4 | 21.6 | 6.5 | 10.3 | 7.3 | 17.8 | 15.0 | 17.0 | 235 |
| 31 und mehr | 10.4 | 9.0 | 10.0 | 5.7 | 6.3 | 5.9 | 3.4 | 7.1 | 3.9 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 95 |
| N** | 471 | 178 | 649 | 35 | 16 | 51 | 88 | 14 | 102 | 307 | 78 | 385 | 1 014 | 367 | 1 381 | 1 381 |
| fehlende Angaben | 45 | 23 | 68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 33 | 7 | 40 | 91 | 38 | 129 | 129 |

* Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Männer

| | Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|
| | Alkohol | Opioide | Kokain und Derivate | andere Stimulanzien | Hypnotika/Sedativa | Halluzinogene | Cannabis | Tabak | andere Substanzen |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Konsumziel* | | | | | | | | | |
| definitive Abstinenz | 28.6 | 82.5 | 72.2 | 37.5 | 80.0 | 0.0 | 39.8 | 50.0 | 70.0 |
| zeitlich begrenzte Abstinenz | 23.2 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 10.0 | 100.0 | 13.8 | 5.6 | 0.0 |
| kontrollierter Konsum | 34.9 | 5.0 | 10.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 22.2 | 0.0 |
| keine Beschränkung beabsichtigt | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.6 | 10.0 |
| bis jetzt nicht festgelegt | 11.2 | 7.5 | 10.3 | 37.5 | 10.0 | 0.0 | 20.3 | 16.7 | 10.0 |
| anderes | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 10.0 |
| N** | 573 | 40 | 97 | 8 | 10 | 1 | 123 | 18 | 10 |
| fehlende Angaben | 1 358 | 101 | 267 | 43 | 31 | 3 | 804 | 63 | 7 |

T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Frauen

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| Konsumziel* | | | | | | | | | |
| definitive Abstinenz | 33.3 | 58.3 | 90.9 | 50.0 | 33.3 | - | 51.9 | 54.5 | 100.0 |
| zeitlich begrenzte Abstinenz | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 7.4 | 9.1 | 0.0 |
| kontrollierter Konsum | 37.4 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | - | 25.9 | 27.3 | 0.0 |
| keine Beschränkung beabsichtigt | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
| bis jetzt nicht festgelegt | 7.8 | 8.3 | 9.1 | 50.0 | 33.3 | - | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| anderes | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 9.1 | 0.0 |
| N** | 243 | 12 | 11 | 2 | 6 | 0 | 27 | 11 | 1 |
| fehlende Angaben | 614 | 47 | 45 | 22 | 31 | 1 | 203 | 64 | 3 |

T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Männer und Frauen

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|
| Konsumziel* | | | | | | | | | |
| definitive Abstinenz | 30.0 | 76.9 | 74.1 | 40.0 | 62.5 | 0.0 | 42.0 | 51.7 | 72.7 |
| zeitlich begrenzte Abstinenz | 21.9 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 6.3 | 100.0 | 12.7 | 6.9 | 0.0 |
| kontrollierter Konsum | 35.7 | 11.5 | 9.3 | 20.0 | 12.5 | 0.0 | 20.7 | 24.1 | 0.0 |
| keine Beschränkung beabsichtigt | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 3.4 | 9.1 |
| bis jetzt nicht festgelegt | 10.2 | 7.7 | 10.2 | 40.0 | 18.8 | 0.0 | 18.7 | 10.3 | 9.1 |
| anderes | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.4 | 9.1 |
| N** | 816 | 52 | 108 | 10 | 16 | 1 | 150 | 29 | 11 |
| fehlende Angaben | 1 972 | 148 | 312 | 65 | 62 | 4 | 1 007 | 127 | 10 |

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24a Psychische Probleme im Leben (2019), Männer

Männer

| | Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------|-----------|----------------------|---|
| | Alkohol | Opioide | Kokain und Derivate | andere Stimulanzien | Hypnotika/Seda- tiva | Halluzinogene | Cannabis | Tabak | andere Substanzen | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Psychische Probleme* | | | | | | | | | | |
| Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld | 25.2 | 22.0 | 39.7 | 12.5 | 27.3 | 0.0 | 18.4 | 27.8 | 16.7 | |
| schwere Angst- und Spannungszustände | 22.9 | 29.3 | 28.8 | 12.5 | 54.5 | 50.0 | 20.2 | 16.7 | 33.3 | |
| Schwierigk. mit Verständnis/Gedächtn. | 8.3 | 14.6 | 11.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 9.6 | 5.6 | 16.7 | |
| Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität | 8.5 | 17.1 | 17.8 | 12.5 | 9.1 | 0.0 | 12.3 | 11.1 | 16.7 | |
| Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale | 0.5 | 14.6 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
| akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör. | 9.2 | 7.3 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 8.3 | |
| Halluzinationen | 1.7 | 7.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 8.3 | |
| Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren | 8.3 | 7.3 | 16.4 | 0.0 | 36.4 | 0.0 | 6.1 | 16.7 | 0.0 | |
| psych. Probleme mit verschrieb. Medik. | 22.4 | 24.4 | 19.2 | 25.0 | 45.5 | 0.0 | 14.0 | 27.8 | 33.3 | |
| ernsthafte Suizidgedanken | 8.5 | 9.8 | 9.6 | 25.0 | 27.3 | 0.0 | 7.0 | 16.7 | 8.3 | |
| Suizidversuche | 2.1 | 7.3 | 5.5 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | |
| andere(s) psychische(s) Problem(e) | 4.0 | 4.9 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | |
| keine | 43.2 | 51.2 | 39.7 | 37.5 | 9.1 | 50.0 | 57.9 | 44.4 | 25.0 | |
| N** | 424 | 41 | 73 | 8 | 11 | 2 | 114 | 18 | 12 | |
| <i>fehlende Angaben</i> | <i>1 507</i> | <i>100</i> | <i>291</i> | <i>43</i> | <i>30</i> | <i>2</i> | <i>813</i> | <i>63</i> | <i>5</i> | |

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24b Psychische Probleme im Leben (2019), Frauen

Frauen

| | Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|
| | Alkohol | Opioide | Kokain und Derivate | andere Stimulanzien | Hypnotika/Sedativa | Halluzinogene | Cannabis | Tabak | andere Substanzen |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Psychische Probleme* | | | | | | | | | |
| Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld | 44.6 | 38.5 | 81.8 | 100.0 | 50.0 | - | 29.6 | 50.0 | 33.3 |
| schwere Angst- und Spannungszustände | 29.9 | 46.2 | 45.5 | 50.0 | 83.3 | - | 25.9 | 50.0 | 66.7 |
| Schwierigk. mit Verständnis/Gedäch. | 13.6 | 7.7 | 9.1 | 50.0 | 16.7 | - | 7.4 | 20.0 | 33.3 |
| Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität | 12.5 | 7.7 | 18.2 | 50.0 | 16.7 | - | 11.1 | 20.0 | 33.3 |
| Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale | 1.6 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | - | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör. | 8.2 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 7.4 | 10.0 | 0.0 |
| Halluzinationen | 3.3 | 15.4 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | - | 3.7 | 20.0 | 33.3 |
| Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren | 10.9 | 15.4 | 9.1 | 0.0 | 16.7 | - | 7.4 | 0.0 | 0.0 |
| psych. Probleme mit verschrieb. Medik. | 37.0 | 46.2 | 36.4 | 50.0 | 33.3 | - | 25.9 | 70.0 | 33.3 |
| ernsthafte Suizidgedanken | 10.9 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | - | 7.4 | 40.0 | 0.0 |
| Suizidversuche | 3.8 | 7.7 | 9.1 | 0.0 | 33.3 | - | 3.7 | 10.0 | 0.0 |
| andere(s) psychische(s) Problem(e) | 5.4 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
| keine | 26.6 | 38.5 | 9.1 | 0.0 | 16.7 | - | 40.7 | 10.0 | 33.3 |
| N** | 184 | 13 | 11 | 2 | 6 | 0 | 27 | 10 | 3 |
| <i>fehlende Angaben</i> | <i>673</i> | <i>46</i> | <i>45</i> | <i>22</i> | <i>31</i> | <i>1</i> | <i>203</i> | <i>65</i> | <i>1</i> |

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24c Psychische Probleme im Leben (2019), Männer und Frauen

Männer & Frauen

| | Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|--------------|------------|----------------------|
| | Alkohol | Opioide | Kokain und Derivate | andere Stimulanzien | Hypnotika/Seda- tiva | Halluzinogene | Cannabis | Tabak | andere Substanzen |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Psychische Probleme* | | | | | | | | | |
| Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld | 31.1 | 25.9 | 45.2 | 30.0 | 35.3 | 0.0 | 20.6 | 35.7 | 20.0 |
| schwere Angst- und Spannungszustände | 25.0 | 33.3 | 31.0 | 20.0 | 64.7 | 50.0 | 21.3 | 28.6 | 40.0 |
| Schwierigk. mit Verständnis/Gedäch. | 9.9 | 13.0 | 10.7 | 10.0 | 11.8 | 0.0 | 9.2 | 10.7 | 20.0 |
| Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität | 9.7 | 14.8 | 17.9 | 20.0 | 11.8 | 0.0 | 12.1 | 14.3 | 20.0 |
| Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale | 0.8 | 13.0 | 4.8 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör. | 8.9 | 7.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.6 | 6.7 |
| Halluzinationen | 2.1 | 9.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 7.1 | 13.3 |
| Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren | 9.0 | 9.3 | 15.5 | 0.0 | 29.4 | 0.0 | 6.4 | 10.7 | 0.0 |
| psych. Probleme mit verschrieb. Medik. | 26.8 | 29.6 | 21.4 | 30.0 | 41.2 | 0.0 | 16.3 | 42.9 | 33.3 |
| ernsthafte Suizidgedanken | 9.2 | 9.3 | 8.3 | 20.0 | 29.4 | 0.0 | 7.1 | 25.0 | 6.7 |
| Suizidversuche | 2.6 | 7.4 | 6.0 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 2.8 | 3.6 | 0.0 |
| andere(s) psychische(s) Problem(e) | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| keine | 38.2 | 48.1 | 35.7 | 30.0 | 11.8 | 50.0 | 54.6 | 32.1 | 26.7 |
| N** | 608 | 54 | 84 | 10 | 17 | 2 | 141 | 28 | 15 |
| <i>fehlende Angaben</i> | <i>2 180</i> | <i>146</i> | <i>336</i> | <i>65</i> | <i>61</i> | <i>3</i> | <i>1 016</i> | <i>128</i> | <i>6</i> |

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2019)

| Angehörige | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | Männer | Frauen | Total | N |
| | % | % | % | |
| Beziehung zur Drittperson* | | | | |
| Mutter/Vater | 37.9 | 37.6 | 37.7 | 406 |
| Tochter/Sohn | 14.8 | 10.7 | 11.7 | 126 |
| Schwester/Bruder | 6.3 | 5.0 | 5.3 | 57 |
| Ehe-/LebenspartnerIn | 28.5 | 39.8 | 37.1 | 400 |
| andere(r) Angehörige(r)/Verwandte(r) | 1.2 | 2.7 | 2.3 | 25 |
| KollegIn/FreundIn | 4.7 | 1.2 | 2.0 | 22 |
| ArbeitgeberIn/LehrerIn | 2.3 | 0.6 | 1.0 | 11 |
| VormundIn/BeistandIn | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| anderes | 4.3 | 2.3 | 2.8 | 30 |
| N** | 256 | 822 | 1 078 | 1 078 |
| <i>fehlende Angaben</i> | 1 | 3 | 4 | 4 |

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2019)

| Angehörige | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| | Total | |
| | % | N |
| Hauptproblem der Drittperson* | | |
| Alkohol | 55.1 | 331 |
| Heroin | 1.2 | 7 |
| Methadon | 0.0 | 0 |
| Buprenorphin | 0.0 | 0 |
| Fentanyl | 0.0 | 0 |
| andere Opioide | 0.3 | 2 |
| Kokain-Pulver | 9.7 | 58 |
| Crack-Kokain | 0.3 | 2 |
| anderer Kokain-Typ | 0.0 | 0 |
| Amphetamine | 1.2 | 7 |
| Metamphetamine | 0.2 | 1 |
| MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy) | 0.7 | 4 |
| synthetische Cathinone | 0.0 | 0 |
| andere Stimulanzien | 0.2 | 1 |
| Barbiturate | 0.0 | 0 |
| Benzodiazepine | 0.2 | 1 |
| GHB/GBL | 0.2 | 1 |
| andere Schlaf- und Beruhigungsmittel | 0.2 | 1 |
| LSD | 0.2 | 1 |
| Ketamin | 0.0 | 0 |
| andere Halluzinogene | 0.0 | 0 |
| flüchtige Stoffe | 0.2 | 1 |
| Cannabis | 20.5 | 123 |
| Tabak | 0.3 | 2 |
| andere Substanz(en) | 1.0 | 6 |
| Glücksspielsucht | 1.8 | 11 |
| Computer-bzw. Internetsucht | 5.2 | 31 |
| Essstörungen | 0.2 | 1 |
| andere suchtähnliche Verhaltensweisen | 1.5 | 9 |
| N** | 601 | 601 |
| <i>fehlende Angaben</i> | <i>481</i> | <i>481</i> |

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹ | | | | | | | | | | | | Angehörige | | | alle Austritte | | | |
|---------------------------|---|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opiode | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Geschlecht* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Männer | | | 69.9 | | | 74.5 | | | 85.2 | | | 82.7 | | | 24.2 | | | 65.4 | 4 084 |
| Frauen | | | 30.1 | | | 25.5 | | | 14.8 | | | 17.3 | | | 75.8 | | | 34.6 | 2 160 |
| Geschlecht nicht bekannt | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | 0 |
| N** | 1 957 | 843 | 2 800 | 149 | 51 | 200 | 310 | 54 | 364 | 910 | 191 | 1 101 | 242 | 758 | 1 000 | 4 084 | 2 160 | 6 244 | 6 244 |
| Alter (in Jahren)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bis 14 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 7.9 | 3.5 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 75 |
| 15-19 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 9.3 | 2.7 | 59.2 | 59.7 | 59.3 | 3.0 | 2.1 | 2.3 | 16.3 | 8.9 | 13.8 | 857 |
| 20-24 | 3.5 | 2.1 | 3.1 | 4.7 | 5.9 | 5.0 | 11.3 | 13.0 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 12.4 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 7.1 | 5.1 | 6.4 | 400 |
| 25-29 | 7.5 | 4.3 | 6.5 | 6.7 | 7.8 | 7.0 | 18.7 | 22.2 | 19.2 | 8.7 | 4.7 | 8.0 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 9.2 | 6.2 | 8.2 | 511 |
| 30-34 | 9.6 | 6.9 | 8.8 | 15.4 | 21.6 | 17.0 | 20.3 | 18.5 | 20.1 | 5.9 | 4.7 | 5.7 | 5.9 | 8.2 | 7.7 | 9.8 | 8.1 | 9.2 | 575 |
| 35-39 | 11.3 | 10.9 | 11.2 | 14.8 | 13.7 | 14.5 | 21.9 | 16.7 | 21.2 | 4.9 | 5.8 | 5.1 | 7.2 | 10.8 | 9.9 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 650 |
| 40-44 | 11.0 | 9.6 | 10.6 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 11.9 | 7.4 | 11.3 | 2.4 | 1.6 | 2.3 | 7.6 | 11.7 | 10.7 | 8.8 | 9.4 | 9.0 | 562 |
| 45-49 | 12.9 | 11.5 | 12.5 | 16.8 | 2.0 | 13.0 | 5.5 | 1.9 | 4.9 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 13.9 | 17.6 | 16.7 | 9.4 | 11.6 | 10.2 | 633 |
| 50-54 | 14.7 | 16.7 | 15.3 | 11.4 | 19.6 | 13.5 | 5.8 | 9.3 | 6.3 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 16.9 | 16.5 | 16.6 | 9.9 | 14.1 | 11.4 | 708 |
| 55-59 | 12.3 | 15.1 | 13.1 | 10.7 | 11.8 | 11.0 | 2.3 | 0.0 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 13.9 | 8.6 | 9.9 | 7.7 | 10.4 | 8.6 | 538 |
| 60-64 | 7.7 | 9.0 | 8.1 | 2.7 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 7.6 | 5.2 | 5.8 | 4.7 | 5.9 | 5.1 | 319 |
| 65-69 | 4.4 | 5.8 | 4.9 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 6.8 | 3.7 | 4.4 | 2.9 | 4.1 | 3.3 | 207 |
| 70 -74 | 2.3 | 4.4 | 2.9 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 1.8 | 113 |
| 75 und mehr | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 83 |
| N** | 1 956 | 843 | 2 799 | 149 | 51 | 200 | 310 | 54 | 364 | 910 | 191 | 1 101 | 237 | 752 | 989 | 4 077 | 2 154 | 6 231 | 6 231 |
| fehlende Angaben | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 7 | 6 | 13 | 13 |
| Alter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 46.7 | 49.7 | 47.6 | 42.8 | 41.0 | 42.4 | 35.3 | 32.9 | 34.9 | 22.5 | 21.9 | 22.4 | 47.4 | 45.6 | 46.1 | 38.8 | 43.8 | 40.5 | |
| Standardabweichung | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 11.5 | 12.0 | 11.6 | 9.3 | 10.3 | 9.5 | 9.0 | 9.4 | 9.0 | 16.3 | 13.5 | 14.3 | 16.0 | 15.7 | 16.1 | |
| 1. Quartil | 36.3 | 39.6 | 37.5 | 33.8 | 31.4 | 33.4 | 28.1 | 25.2 | 28.0 | 17.0 | 16.4 | 16.9 | 37.0 | 36.4 | 36.6 | 25.2 | 32.2 | 27.6 | |
| Medianwert | 47.5 | 51.2 | 48.5 | 42.6 | 39.8 | 41.9 | 34.4 | 31.5 | 34.0 | 18.2 | 18.0 | 18.2 | 50.0 | 46.7 | 47.3 | 38.0 | 45.3 | 40.3 | |
| 3. Quartil | 56.3 | 58.3 | 56.9 | 50.9 | 51.9 | 51.1 | 40.0 | 37.2 | 40.0 | 25.4 | 22.9 | 24.9 | 57.1 | 53.9 | 54.8 | 51.2 | 55.0 | 52.9 | |
| N** | 1 956 | 843 | 2 799 | 149 | 51 | 200 | 310 | 54 | 364 | 910 | 191 | 1 101 | 241 | 754 | 995 | 4 081 | 2 156 | 6 237 | |
| fehlende Angaben | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 7 | 6 | 13 | |

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹ | | | | | | | | | | | | Angehörige | | | alle Austritte | | | |
|------------------------------|---|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Zivilstand* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ledig | 42.7 | 31.3 | 39.1 | 67.7 | 85.0 | 71.8 | 67.8 | 70.8 | 68.2 | 93.0 | 87.0 | 91.8 | 25.8 | 26.4 | 26.3 | 60.5 | 42.4 | 54.2 | 1 842 |
| verheiratet | 34.4 | 28.5 | 32.5 | 15.4 | 0.0 | 11.8 | 17.1 | 12.5 | 16.5 | 4.0 | 5.3 | 4.2 | 45.2 | 51.3 | 50.0 | 23.6 | 30.3 | 25.9 | 881 |
| getrennt | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 3.4 | 4.2 | 3.5 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 108 |
| geschieden | 18.6 | 28.5 | 21.7 | 12.3 | 10.0 | 11.8 | 11.0 | 12.5 | 11.2 | 1.8 | 4.6 | 2.3 | 22.6 | 14.2 | 16.0 | 12.3 | 19.1 | 14.7 | 498 |
| verwitwet | 0.5 | 7.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.9 | 3.5 | 0.5 | 4.2 | 1.8 | 60 |
| reg. Partnerschaft | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 10 |
| N** | 1 071 | 498 | 1 569 | 65 | 20 | 85 | 146 | 24 | 170 | 556 | 131 | 687 | 93 | 337 | 430 | 2 221 | 1 178 | 3 399 | 3 399 |
| fehlende Angaben | 886 | 345 | 1 231 | 84 | 31 | 115 | 164 | 30 | 194 | 354 | 60 | 414 | 149 | 421 | 570 | 1 863 | 982 | 2 845 | 2 845 |
| Urbanitätsgrad* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grossstadtzentren | 14.3 | 12.6 | 13.7 | 1.5 | 0.0 | 1.1 | 4.6 | 0.0 | 3.9 | 1.0 | 2.1 | 1.2 | 20.3 | 17.7 | 18.4 | 8.8 | 10.7 | 9.5 | 361 |
| Umland der Grossstadtzentren | 16.5 | 14.9 | 16.0 | 6.2 | 12.5 | 7.9 | 13.8 | 7.7 | 12.9 | 4.8 | 5.6 | 5.0 | 4.9 | 0.5 | 1.6 | 10.9 | 7.8 | 9.8 | 374 |
| Mittelzentren | 15.9 | 21.1 | 17.5 | 23.1 | 8.3 | 19.1 | 25.0 | 23.1 | 24.7 | 25.8 | 26.6 | 25.9 | 23.6 | 31.6 | 29.7 | 20.7 | 25.3 | 22.3 | 849 |
| Kleinzentren | 27.5 | 27.7 | 27.6 | 52.3 | 41.7 | 49.4 | 34.9 | 30.8 | 34.3 | 34.1 | 30.8 | 33.5 | 21.1 | 23.9 | 23.2 | 30.5 | 28.4 | 29.8 | 1 134 |
| rural | 25.8 | 23.7 | 25.2 | 16.9 | 37.5 | 22.5 | 21.7 | 38.5 | 24.2 | 34.3 | 35.0 | 34.4 | 30.1 | 26.2 | 27.1 | 29.0 | 27.7 | 28.5 | 1 086 |
| N** | 1 220 | 549 | 1 769 | 65 | 24 | 89 | 152 | 26 | 178 | 598 | 143 | 741 | 123 | 389 | 512 | 2 482 | 1 322 | 3 804 | 3 804 |
| fehlende Angaben | 737 | 294 | 1 031 | 84 | 27 | 111 | 158 | 28 | 186 | 312 | 48 | 360 | 119 | 369 | 488 | 1 602 | 838 | 2 440 | 2 440 |

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹ | | | | | | | | | | | | Angehörige | | | alle Austritte | | | |
|---------------------------------------|---|------------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| MitbewohnerInnen* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| allein | 38.9 | 42.5 | 40.0 | 40.2 | 36.7 | 39.3 | 34.7 | 36.7 | 35.0 | 11.6 | 13.6 | 12.0 | 12.1 | 18.0 | 16.7 | 29.4 | 30.8 | 29.9 | 1 182 |
| mit Herkunftsfamilie | 6.1 | 2.6 | 5.0 | 13.4 | 23.3 | 16.1 | 15.0 | 13.3 | 14.8 | 69.0 | 52.3 | 66.2 | 14.3 | 5.8 | 7.7 | 25.8 | 12.7 | 21.4 | 848 |
| mit PartnerIn und/oder Kind(ern) | 47.9 | 49.8 | 48.5 | 20.7 | 33.3 | 24.1 | 36.4 | 46.7 | 37.9 | 9.3 | 13.6 | 10.0 | 69.2 | 72.2 | 71.5 | 35.9 | 48.8 | 40.1 | 1 588 |
| mit Freunden/anderen Personen | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 4.9 | 3.3 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 3.4 | 1.7 | 3.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 101 |
| Haft | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 5 |
| therap. Einrichtung/Wohnheim | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 7.3 | 0.0 | 5.4 | 5.2 | 0.0 | 4.4 | 3.6 | 5.3 | 3.9 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 3.1 | 1.8 | 2.7 | 105 |
| Spital/Klinik | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6 |
| anderes | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 9.8 | 3.3 | 8.0 | 4.0 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 12.1 | 5.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 121 |
| N** | 1 289 | 588 | 1 877 | 82 | 30 | 112 | 173 | 30 | 203 | 646 | 132 | 778 | 91 | 327 | 418 | 2 647 | 1 309 | 3 956 | 3 956 |
| fehlende Angaben | 668 | 255 | 923 | 67 | 21 | 88 | 137 | 24 | 161 | 264 | 59 | 323 | 151 | 431 | 582 | 1 437 | 851 | 2 288 | 2 288 |
| Wohnsituation* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| stabile Wohnsituation | 94.9 | 96.9 | 95.5 | 77.4 | 96.8 | 82.6 | 90.5 | 92.9 | 90.8 | 93.9 | 90.4 | 93.3 | 97.3 | 96.3 | 96.5 | 93.8 | 95.7 | 94.5 | 3 915 |
| instabile Wohnsituation | 2.9 | 1.5 | 2.5 | 11.9 | 3.2 | 9.6 | 5.0 | 3.6 | 4.8 | 2.7 | 5.2 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 130 |
| Haft | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 7 |
| therap. Einricht./Heim/Spital/anderes | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 8.3 | 0.0 | 6.1 | 4.5 | 3.6 | 4.3 | 3.1 | 4.4 | 3.4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | 1.5 | 2.2 | 93 |
| N** | 1 373 | 619 | 1 992 | 84 | 31 | 115 | 179 | 28 | 207 | 667 | 135 | 802 | 110 | 349 | 459 | 2 780 | 1 365 | 4 145 | 4 145 |
| fehlende Angaben | 584 | 224 | 808 | 65 | 20 | 85 | 131 | 26 | 157 | 243 | 56 | 299 | 132 | 409 | 541 | 1 304 | 795 | 2 099 | 2 099 |
| Partnerbeziehung* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| keine Partnerbeziehung, alleinstehend | 36.7 | 44.5 | 39.2 | 59.2 | 52.9 | 57.6 | 40.0 | 23.5 | 37.8 | 74.3 | 57.8 | 71.2 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 47.4 | 38.9 | 44.3 | 1 181 |
| zeitweilige Beziehung(en) | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 6.1 | 0.0 | 4.5 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 2.9 | 11.1 | 4.4 | 1.4 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 3.8 | 100 |
| feste Beziehung, getrennt lebend | 10.8 | 9.1 | 10.3 | 4.1 | 5.9 | 4.5 | 20.0 | 23.5 | 20.5 | 13.0 | 20.0 | 14.3 | 9.5 | 12.7 | 12.0 | 11.3 | 11.9 | 11.5 | 307 |
| feste Beziehung, zus. lebend | 48.9 | 43.5 | 47.2 | 30.6 | 41.2 | 33.3 | 33.6 | 47.1 | 35.4 | 9.9 | 11.1 | 10.1 | 67.6 | 62.3 | 63.4 | 37.9 | 44.9 | 40.4 | 1 075 |
| N** | 869 | 416 | 1 285 | 49 | 17 | 66 | 110 | 17 | 127 | 385 | 90 | 475 | 74 | 284 | 358 | 1 711 | 952 | 2 663 | 2 663 |
| fehlende Angaben | 1 088 | 427 | 1 515 | 100 | 34 | 134 | 200 | 37 | 237 | 525 | 101 | 626 | 168 | 474 | 642 | 2 373 | 1 208 | 3 581 | 3 581 |

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹ | | | | | | | | | | | | Angehörige | | | alle Austritte | | | |
|---|---|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Hauptquelle des Lebensunterhaltes* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerbseinkommen | 60.4 | 47.7 | 56.3 | 39.3 | 27.8 | 36.5 | 54.8 | 37.5 | 52.0 | 24.1 | 22.8 | 23.9 | 71.7 | 72.1 | 72.0 | 48.9 | 51.2 | 49.7 | 1 646 |
| Ersparnisse | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 5.4 | 0.0 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 36 |
| Rente (AHV/IV u.a.) | 14.7 | 25.2 | 18.1 | 19.6 | 16.7 | 18.9 | 11.3 | 16.7 | 12.2 | 3.2 | 4.4 | 3.4 | 11.5 | 8.9 | 9.5 | 11.5 | 17.5 | 13.6 | 451 |
| Sozialhilfe/Fürsorge | 15.0 | 12.4 | 14.2 | 28.6 | 44.4 | 32.4 | 16.9 | 29.2 | 18.9 | 10.5 | 7.9 | 10.0 | 0.9 | 3.3 | 2.8 | 12.9 | 8.7 | 11.4 | 378 |
| Arbeitslosenversicherung | 3.3 | 2.3 | 3.0 | 1.8 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | 1.6 | 2.4 | 79 |
| durch PartnerIn | 1.2 | 7.4 | 3.2 | 1.8 | 5.6 | 2.7 | 2.4 | 0.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 8.6 | 6.8 | 1.4 | 6.6 | 3.2 | 107 |
| durch Eltern/Angehörige | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 5.6 | 2.7 | 4.8 | 8.3 | 5.4 | 57.0 | 61.4 | 57.8 | 10.6 | 5.6 | 6.8 | 19.9 | 12.4 | 17.2 | 570 |
| dealen/Kleinhandel mit Drogen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2 |
| andere illegale Einkünfte | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Prostitution | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3 |
| Taggeldversicherung | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 9 |
| anderes | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 30 |
| N** | 1 021 | 484 | 1 505 | 56 | 18 | 74 | 124 | 24 | 148 | 535 | 114 | 649 | 113 | 359 | 472 | 2 133 | 1 179 | 3 312 | 3 312 |
| fehlende Angaben | 936 | 359 | 1 295 | 93 | 33 | 126 | 186 | 30 | 216 | 375 | 77 | 452 | 129 | 399 | 528 | 1 951 | 981 | 2 932 | 2 932 |
| Hauptsächlicher Erwerbstatus* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vollzeitarbeit (ab 70%) | 58.7 | 34.9 | 51.3 | 33.3 | 25.0 | 31.5 | 56.1 | 47.4 | 54.9 | 15.0 | 9.8 | 14.0 | 71.4 | 51.5 | 56.1 | 44.9 | 36.5 | 42.0 | 1 251 |
| Teilzeitarbeit | 5.3 | 23.4 | 11.0 | 3.5 | 12.5 | 5.5 | 3.5 | 10.5 | 4.5 | 0.6 | 6.3 | 1.6 | 7.7 | 28.6 | 23.7 | 3.9 | 21.4 | 9.9 | 295 |
| Gelegenheitsjobs | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 5.3 | 0.0 | 4.1 | 1.8 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 27.0 |
| in Ausbildung | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 0.0 | 6.3 | 1.4 | 2.6 | 21.1 | 5.3 | 67.9 | 70.5 | 68.4 | 5.5 | 7.6 | 7.1 | 23.1 | 16.0 | 20.7 | 615 |
| arbeitslos und aktive Stellensuche | 8.0 | 3.8 | 6.7 | 8.8 | 0.0 | 6.8 | 14.0 | 10.5 | 13.5 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 2.2 | 0.7 | 1.0 | 6.3 | 2.7 | 5.0 | 150 |
| arbeitslos, keine aktive Stellensuche | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 15.8 | 31.3 | 19.2 | 6.1 | 5.3 | 6.0 | 2.8 | 0.9 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 4.3 | 3.1 | 3.9 | 116 |
| Rentner/Rentnerin | 8.4 | 16.0 | 10.8 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 1.8 | 0.0 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 11.0 | 6.6 | 7.7 | 5.4 | 9.8 | 7.0 | 207 |
| Arbeitsunfähigkeit | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 12.3 | 0.0 | 9.6 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 129 |
| Hausfrau/-mann | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 13.0 |
| anderes | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 15.8 | 18.8 | 16.4 | 9.6 | 0.0 | 8.3 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 6.5 | 4.6 | 5.8 | 174 |
| N** | 916 | 418 | 1 334 | 57 | 16 | 73 | 114 | 19 | 133 | 508 | 112 | 620 | 91 | 301 | 392 | 1 948 | 1 029 | 2 977 | 2 977 |
| fehlende Angaben | 1 041 | 425 | 1 466 | 92 | 35 | 127 | 196 | 35 | 231 | 402 | 79 | 481 | 151 | 457 | 608 | 2 136 | 1 131 | 3 267 | 3 267 |

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2019)

| Berufliche Stellung* | Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹ | | | | | | | | | | | | Angehörige | | | alle Austritte | | | |
|---------------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| nicht erwerbstätig | 28.1 | 32.9 | 29.5 | 53.1 | 36.4 | 48.8 | 37.5 | 57.1 | 39.4 | 17.9 | 24.1 | 18.9 | 27.3 | 18.8 | 20.9 | 27.3 | 30.3 | 28.1 | 327 |
| Lehrling/Lehrtochter, Praktikum | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 3.1 | 0.0 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 32.5 | 27.6 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 3.7 | 7.2 | 84 |
| HilfsarbeiterIn, Aushilfe | 3.0 | 2.3 | 2.8 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1.9 | 2.8 | 32 |
| angelernte(r) ArbeiterIn | 4.0 | 5.6 | 4.5 | 6.3 | 9.1 | 7.0 | 7.8 | 14.3 | 8.5 | 3.3 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 5.0 | 4.4 | 51 |
| gelernte(r) ArbeiterIn | 14.7 | 6.5 | 12.3 | 18.8 | 9.1 | 16.3 | 12.5 | 0.0 | 11.3 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 9.1 | 3.1 | 4.7 | 13.1 | 6.8 | 11.4 | 132 |
| VorarbeiterIn | 2.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 1.5 | 18 |
| einfache(r) Angestellte(r) | 18.3 | 28.2 | 21.3 | 3.1 | 9.1 | 4.7 | 18.8 | 14.3 | 18.3 | 11.3 | 6.9 | 10.6 | 0.0 | 31.3 | 23.3 | 15.4 | 25.4 | 18.2 | 211 |
| mittlere Angestellte® / Kader | 13.1 | 10.2 | 12.3 | 6.3 | 18.2 | 9.3 | 9.4 | 14.3 | 9.9 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 18.2 | 21.9 | 20.9 | 10.0 | 11.8 | 10.5 | 122 |
| leitende/r Angestellte(r)/Kader | 3.8 | 1.9 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 18.2 | 6.3 | 9.3 | 3.0 | 1.9 | 2.7 | 31 |
| selbständig | 8.4 | 9.7 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 5.6 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 27.3 | 9.4 | 14.0 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 83 |
| SchülerIn/StudentIn | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 9.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 31.0 | 20.6 | 0.0 | 6.3 | 4.7 | 5.4 | 4.6 | 5.2 | 60 |
| andere Stellung | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 11 |
| N** | 502 | 216 | 718 | 32 | 11 | 43 | 64 | 7 | 71 | 151 | 29 | 180 | 11 | 32 | 43 | 839 | 323 | 1 162 | 1 162 |
| fehlende Angaben | 1 455 | 627 | 2 082 | 117 | 40 | 157 | 246 | 47 | 293 | 759 | 162 | 921 | 231 | 726 | 957 | 3 245 | 1 837 | 5 082 | 5 082 |

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2019)

| Hauptgrund der Beendigung* | Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹ | | | | | | | | | | | | Angehörige | | | alle Austritte | | | |
|----------------------------------|---|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| planm. Beendigung ohne Übertritt | 51.1 | 52.3 | 51.5 | 22.8 | 29.4 | 24.5 | 32.7 | 38.9 | 33.6 | 62.5 | 69.1 | 63.6 | 68.6 | 71.7 | 71.0 | 52.5 | 60.9 | 55.4 | 3 453 |
| planm. Beendigung mit Übertritt | 9.5 | 11.5 | 10.1 | 16.8 | 7.8 | 14.5 | 9.4 | 7.4 | 9.1 | 6.4 | 1.6 | 5.5 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 8.3 | 7.0 | 7.9 | 491 |
| Wohnortwechsel | 1.6 | 2.7 | 1.9 | 4.7 | 5.9 | 5.0 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 107 |
| Hospitalisierung | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 50 |
| Inhaftierung | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 9 |
| Kontaktverlust | 26.9 | 21.7 | 25.3 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 42.4 | 42.6 | 42.4 | 20.1 | 20.9 | 20.3 | 19.8 | 18.2 | 18.6 | 26.3 | 20.8 | 24.4 | 1 521 |
| expliziter Abbruch | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 11.4 | 13.7 | 12.0 | 6.5 | 3.7 | 6.1 | 7.3 | 5.2 | 6.9 | 3.3 | 4.4 | 4.1 | 7.2 | 5.5 | 6.6 | 411 |
| Tod | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 73 |
| anderer Grund | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 3.4 | 5.9 | 4.0 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.5 | 2.4 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 116 |
| N** | 1 951 | 840 | 2 791 | 149 | 51 | 200 | 309 | 54 | 363 | 909 | 191 | 1 100 | 242 | 757 | 999 | 4 075 | 2 156 | 6 231 | 6 231 |
| fehlende Angaben | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 13 |

T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2019)

| Planmässige Beendigung mit Übertritt*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| stationäre Therapie | 39.3 | 42.2 | 40.3 | 10.0 | 0.0 | 8.3 | 26.3 | 0.0 | 22.7 | 32.1 | 0.0 | 31.0 | 25.0 | 0.0 | 7.1 | 33.0 | 32.6 | 32.9 | 98 |
| Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik | 0.8 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 7.1 | 0.5 | 3.4 | 1.3 | 4 |
| ambulante Behandlung | 41.8 | 39.1 | 40.9 | 60.0 | 25.0 | 54.2 | 52.6 | 100.0 | 59.1 | 60.7 | 100.0 | 62.1 | 25.0 | 60.0 | 50.0 | 48.8 | 44.9 | 47.7 | 142 |
| Aussenwohngruppe | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1 |
| andere Stelle/Institution | 17.2 | 15.6 | 16.7 | 30.0 | 75.0 | 37.5 | 21.1 | 0.0 | 18.2 | 7.1 | 0.0 | 6.9 | 50.0 | 30.0 | 35.7 | 17.2 | 19.1 | 17.8 | 53 |
| N** | 122 | 64 | 186 | 20 | 4 | 24 | 19 | 3 | 22 | 28 | 1 | 29 | 4 | 10 | 14 | 209 | 89 | 298 | 298 |
| fehlende Angaben | 63 | 33 | 96 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1 | 11 | 30 | 2 | 32 | 2 | 6 | 8 | 131 | 62 | 193 | 193 |

T32c Todesursachen nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2019)

| Todesursache**** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Suizid | 15.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 66.7 | 25.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 10.3 | 36.4 | 17.5 | 7 |
| Unfall | 0.0 | 16.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 2.5 | 1 |
| Krankheit | 75.0 | 83.3 | 76.9 | 60.0 | 33.3 | 50.0 | 100.0 | - | 100.0 | 0.0 | - | 0.0 | 100.0 | - | 100.0 | 72.4 | 54.5 | 67.5 | 27 |
| Überdosis bzw. Vergiftung | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 100.0 | - | 100.0 | 0.0 | - | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 2.5 | 1 |
| andere Todesursache | 10.0 | 0.0 | 7.7 | 40.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 13.8 | 0.0 | 10.0 | 4 |
| N** | 20 | 6 | 26 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 | 11 | 40 | 40 |
| fehlende Angaben | 9 | 6 | 15 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 10 | 33 | 33 |

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in eine andere Einrichtung übergetreten sind. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die während der Behandlung gestorben sind. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹ | | | | | | | | | | | | Angehörige | | | alle Austritte | | | |
|----------------------------------|---|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | |
| Dauer der Behandlung (%)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Woche oder weniger | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 2.7 | 5.9 | 3.5 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 4.7 | 3.1 | 4.5 | 15.4 | 12.3 | 13.0 | 6.7 | 8.7 | 7.4 | 461 |
| > 1 Woche bis 1 Monat | 5.1 | 4.3 | 4.9 | 3.4 | 0.0 | 2.5 | 3.9 | 1.9 | 3.6 | 11.8 | 12.0 | 11.8 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 6.4 | 4.6 | 5.8 | 360 |
| > 1 Monat bis 2 Monate | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 6.1 | 0.0 | 5.2 | 9.9 | 10.5 | 10.0 | 5.0 | 4.2 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 5.2 | 322 |
| > 2 bis 3 Monate | 3.3 | 4.2 | 3.6 | 2.0 | 3.9 | 2.5 | 6.1 | 3.7 | 5.8 | 7.3 | 6.3 | 7.1 | 6.6 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 293 |
| > 3 bis 6 Monate | 12.7 | 10.3 | 12.0 | 6.7 | 11.8 | 8.0 | 17.1 | 14.8 | 16.8 | 15.1 | 14.7 | 15.0 | 14.5 | 19.6 | 18.3 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 867 |
| > 6 Monate bis 1 Jahr | 24.2 | 26.0 | 24.7 | 16.8 | 21.6 | 18.0 | 33.2 | 38.9 | 34.1 | 28.2 | 27.7 | 28.2 | 36.5 | 33.4 | 34.2 | 27.7 | 30.0 | 28.5 | 1 775 |
| > 1 Jahr bis 2 Jahre | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 15.4 | 21.6 | 17.0 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 14.8 | 17.3 | 15.3 | 11.6 | 14.0 | 13.4 | 18.9 | 19.0 | 18.9 | 1 179 |
| > 2 bis 3 Jahre | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 6.0 | 3.9 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 2.9 | 5.2 | 4.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 400 |
| > 3 bis 5 Jahre | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 25.5 | 13.7 | 22.5 | 3.5 | 7.4 | 4.1 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 2.0 | 6.0 | 5.4 | 5.8 | 360 |
| > 5 bis 10 Jahre | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 10.7 | 11.8 | 11.0 | 1.9 | 5.6 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 154 |
| mehr als 10 Jahre | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 6.7 | 3.9 | 6.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 56 |
| N** | 1 957 | 843 | 2 800 | 149 | 51 | 200 | 310 | 54 | 364 | 910 | 191 | 1 101 | 241 | 757 | 998 | 4 075 | 2 152 | 6 227 | 6 227 |
| fehlende Angaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 17 | 17 |
| Dauer in Wochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 75.2 | 75.5 | 75.3 | 171.9 | 131.3 | 161.5 | 58.1 | 74.7 | 60.6 | 40.1 | 39.2 | 39.9 | 39.7 | 40.7 | 40.4 | 64.1 | 59.7 | 62.5 | |
| Standardabweichung | 105.0 | 106.6 | 105.5 | 236.2 | 182.6 | 224.0 | 98.5 | 81.0 | 96.2 | 54.5 | 42.4 | 52.6 | 66.7 | 55.0 | 58.0 | 100.5 | 88.7 | 96.6 | |
| 1. Quartil | 16.9 | 17.9 | 17.0 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 16.9 | 26.6 | 17.9 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 8.4 | 12.3 | 11.3 | 13.4 | 14.1 | 13.7 | |
| Medianwert | 43.0 | 42.7 | 43.0 | 98.3 | 60.6 | 86.8 | 37.2 | 45.9 | 38.6 | 25.0 | 28.0 | 26.0 | 25.7 | 27.4 | 26.8 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | |
| 3. Quartil | 90.4 | 90.0 | 90.2 | 210.5 | 180.4 | 201.0 | 62.0 | 87.6 | 64.0 | 48.3 | 56.6 | 49.0 | 45.0 | 47.9 | 46.7 | 72.6 | 68.7 | 71.4 | |
| N** | 1 957 | 843 | 2 800 | 149 | 51 | 200 | 310 | 54 | 364 | 910 | 191 | 1 101 | 241 | 757 | 998 | 4 075 | 2 152 | 6 227 | |
| fehlende Angaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 17 | |

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹ | | | | | | | | | | | | alle Selbstbetroffenen | | | |
|---|---|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Substitution während der Behandlung* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nein | 98.7 | 99.2 | 98.9 | 58.1 | 68.4 | 60.5 | 95.4 | 100.0 | 96.0 | 99.6 | 100.0 | 99.7 | 97.5 | 98.5 | 97.8 | 2 862 |
| ja | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 41.9 | 31.6 | 39.5 | 4.6 | 0.0 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 64 |
| N** | 1 087 | 488 | 1 575 | 62 | 19 | 81 | 130 | 21 | 151 | 533 | 121 | 654 | 2 103 | 823 | 2 926 | 2 926 |
| fehlende Angaben | 870 | 355 | 1 225 | 87 | 32 | 119 | 180 | 33 | 213 | 377 | 70 | 447 | 1 737 | 574 | 2 311 | 2 311 |
| Typ der Substitution*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heroin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 16.7 | 6.5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 2.0 | 9.1 | 3.3 | 2 |
| Methadon | 61.5 | 100.0 | 70.6 | 72.0 | 50.0 | 67.7 | 100.0 | - | 100.0 | 50.0 | - | 50.0 | 72.0 | 72.7 | 72.1 | 44 |
| andere Opiate | 38.5 | 0.0 | 29.4 | 24.0 | 33.3 | 25.8 | 0.0 | - | 0.0 | 50.0 | - | 50.0 | 24.0 | 18.2 | 23.0 | 14 |
| andere Substanzen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.6 | 1 |
| N** | 13 | 4 | 17 | 25 | 6 | 31 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 50 | 11 | 61 | 61 |
| fehlende Angaben | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Substitution nach der Behandlung* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nein | 99.2 | 99.4 | 99.3 | 69.1 | 77.8 | 71.2 | 96.6 | 100.0 | 97.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.4 | 99.1 | 98.6 | 2 744 |
| ja | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 30.9 | 22.2 | 28.8 | 3.4 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 39 |
| N** | 1 049 | 464 | 1 513 | 55 | 18 | 73 | 118 | 21 | 139 | 519 | 114 | 633 | 2 005 | 778 | 2 783 | 2 783 |
| fehlende Angaben | 908 | 379 | 1 287 | 94 | 33 | 127 | 192 | 33 | 225 | 391 | 77 | 468 | 1 835 | 619 | 2 454 | 2 454 |
| Typ der Substitution*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| heroingestützte Behandlung | 12.5 | 0.0 | 9.1 | 5.9 | 25.0 | 9.5 | 25.0 | . | 25.0 | - | - | - | 9.4 | 14.3 | 10.3 | 4 |
| Substitution | 87.5 | 100.0 | 90.9 | 94.1 | 75.0 | 90.5 | 75.0 | . | 75.0 | - | - | - | 90.6 | 85.7 | 89.7 | 35 |
| N** | 8 | 3 | 11 | 17 | 4 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 39 | 39 |
| fehlende Angaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹ | | | | | | | | | | | | alle Selbstbetroffenen | | | |
|--|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|------------------------|------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opiode | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Nachsorge vorgesehen und vorbereitet* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nein | 91.7 | 85.6 | 90.0 | 90.7 | 85.7 | 89.5 | 89.7 | 85.7 | 89.3 | 95.6 | 100.0 | 96.4 | 92.5 | 88.8 | 91.6 | 1 259 |
| ja | 8.3 | 14.4 | 10.0 | 9.3 | 14.3 | 10.5 | 10.3 | 14.3 | 10.7 | 4.4 | 0.0 | 3.6 | 7.5 | 11.2 | 8.4 | 116 |
| N** | 637 | 243 | 880 | 43 | 14 | 57 | 68 | 7 | 75 | 182 | 40 | 222 | 1 035 | 340 | 1 375 | 1 375 |
| fehlende Angaben | 1 320 | 600 | 1 920 | 106 | 37 | 143 | 242 | 47 | 289 | 728 | 151 | 879 | 2 805 | 1 057 | 3 862 | 3 862 |
| Typ der vorgesehenen Nachsorge*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| institutionseigene Aussenwohngruppe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| institutionseigene Nachsorgestelle | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.4 | 2.9 | 1.9 | 2 |
| fremde Aussenwohngruppe | 6.3 | 0.0 | 3.8 | 25.0 | 0.0 | 16.7 | 14.3 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | - | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 4.8 | 5 |
| fremde Nachsorgestelle | 14.6 | 21.9 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 25.0 | 16.7 | - | 16.7 | 14.3 | 20.0 | 16.2 | 17 |
| Alkoholberatungsstelle | 10.4 | 15.6 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 100.0 | 37.5 | 0.0 | - | 0.0 | 11.4 | 17.1 | 13.3 | 14 |
| Drogenberatungsstelle | 4.2 | 0.0 | 2.5 | 75.0 | 100.0 | 83.3 | 28.6 | 100.0 | 37.5 | 0.0 | - | 0.0 | 11.4 | 8.6 | 10.5 | 11 |
| andere Beratungsstelle | 12.5 | 21.9 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | - | 50.0 | 14.3 | 20.0 | 16.2 | 17 |
| Selbsthilfegruppe | 8.3 | 6.3 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | - | 0.0 | 8.6 | 5.7 | 7.6 | 8 |
| Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| andere | 43.8 | 31.3 | 38.8 | 25.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | - | 33.3 | 37.1 | 28.6 | 34.3 | 36 |
| N** | 48 | 32 | 80 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 70 | 35 | 105 | 105 |
| fehlende Angaben | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 11 | 11 |

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, für die eine Nachsorge vorgesehen ist. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹ | | | | | | | | | | | | alle Selbstbetroffenen | | | |
|--------------------------------------|---|------------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|--------------|--------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Suchtprobleme bei Austritt* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alkohol | 71.5 | 75.6 | 72.8 | 22.7 | 13.3 | 20.0 | 24.3 | 30.0 | 25.0 | 11.8 | 6.6 | 11.0 | 43.1 | 50.1 | 45.0 | 1 570 |
| Heroin | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 48.0 | 63.3 | 52.4 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 79 |
| Methadon | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 9.3 | 3.3 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 15 |
| Buprenorphin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2 |
| Fentanyl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| andere Opioide | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 4.0 | 13.3 | 6.7 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 17 |
| Kokain-Pulver | 4.8 | 1.0 | 3.6 | 20.0 | 16.7 | 19.0 | 66.3 | 50.0 | 64.2 | 3.9 | 1.7 | 3.6 | 9.8 | 3.2 | 8.0 | 278 |
| Crack-Kokain | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 3.3 | 1.9 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 14 |
| anderer Kokain-Typ | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 5 |
| Amphetamine | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | 1.9 | 3.5 | 6.7 | 3.9 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 45 |
| Metamphetamine | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 8 |
| MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy) | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2.7 | 0.0 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 23 |
| synthetische Cathinone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2 |
| andere Stimulanzien | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 7 |
| Barbiturate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1 |
| Benzodiazepine | 1.1 | 2.6 | 1.5 | 14.7 | 3.3 | 11.4 | 2.0 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 2.0 | 68 |
| GHB/GBL | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 3 |
| andere Schlaf- und Beruhigungsmittel | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 6.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 14 |
| LSD | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.7 | 0.0 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 10 |
| Ketamin | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3 |
| andere Halluzinogene | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| flüchtige Stoffe | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 5 |
| Cannabis | 6.2 | 3.1 | 5.2 | 20.0 | 16.7 | 19.0 | 13.4 | 16.7 | 13.8 | 64.0 | 52.9 | 62.2 | 21.8 | 10.7 | 18.8 | 654 |
| Tabak | 10.9 | 10.4 | 10.7 | 18.7 | 16.7 | 18.1 | 9.9 | 6.7 | 9.5 | 11.9 | 9.9 | 11.6 | 12.1 | 12.5 | 12.2 | 425 |
| andere Substanz(en) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 13 |
| Glücksspielsucht | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.4 | 2.0 | 69 |
| Computer- bzw. Internetsucht | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 38 |
| Essstörungen | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.2 | 1.6 | 56 |
| andere suchtmäßige Verhaltensweisen | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 68 |
| keine | 26.1 | 22.3 | 24.9 | 22.7 | 13.3 | 20.0 | 21.8 | 23.3 | 22.0 | 32.2 | 45.5 | 34.3 | 27.5 | 25.3 | 26.9 | 939 |
| N** | 1 286 | 587 | 1 873 | 75 | 30 | 105 | 202 | 30 | 232 | 636 | 121 | 757 | 2 528 | 959 | 3 487 | 3 487 |
| fehlende Angaben | 671 | 256 | 927 | 74 | 21 | 95 | 108 | 24 | 132 | 274 | 70 | 344 | 1 312 | 438 | 1 750 | 1 750 |

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹ | | | | | | | | | | | | alle Selbstbetroffenen | | | |
|---|---|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Häufigkeit der Rückfälle* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| keine | 52.3 | 38.4 | 48.3 | 25.9 | 28.6 | 26.5 | 36.4 | 33.3 | 36.1 | 67.4 | 62.5 | 66.7 | 52.3 | 41.2 | 49.5 | 384 |
| einmal | 7.5 | 11.3 | 8.6 | 14.8 | 0.0 | 11.8 | 18.2 | 66.7 | 22.2 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 8.5 | 11.1 | 9.1 | 71 |
| zweimal | 6.7 | 8.8 | 7.3 | 7.4 | 14.3 | 8.8 | 15.2 | 0.0 | 13.9 | 4.2 | 12.5 | 5.4 | 6.6 | 9.0 | 7.2 | 56 |
| drei- oder viermal | 10.6 | 16.4 | 12.2 | 18.5 | 0.0 | 14.7 | 12.1 | 0.0 | 11.1 | 8.4 | 6.3 | 8.1 | 10.7 | 15.1 | 11.9 | 92 |
| fünfmal oder mehr | 22.9 | 25.2 | 23.6 | 33.3 | 57.1 | 38.2 | 18.2 | 0.0 | 16.7 | 14.7 | 12.5 | 14.4 | 21.8 | 23.6 | 22.3 | 173 |
| N** | 388 | 159 | 547 | 27 | 7 | 34 | 33 | 3 | 36 | 95 | 16 | 111 | 577 | 199 | 776 | 776 |
| fehlende Angaben | 1 569 | 684 | 2 253 | 122 | 44 | 166 | 277 | 51 | 328 | 815 | 175 | 990 | 3 263 | 1 198 | 4 461 | 4 461 |
| Substanzen/Verhalten bei Rückfall*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alkohol | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 44.4 | 20.0 | 39.1 | 40.0 | 0.0 | 36.4 | 43.3 | 16.7 | 38.9 | 80.7 | 85.7 | 82.2 | 309 |
| Opioide | 2.8 | 1.1 | 2.2 | 61.1 | 80.0 | 65.2 | 10.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 4.5 | 6.6 | 25 |
| Kokain oder Derivate | 2.8 | 1.1 | 2.2 | 50.0 | 20.0 | 43.5 | 95.0 | 50.0 | 90.9 | 6.7 | 33.3 | 11.1 | 14.0 | 4.5 | 11.2 | 42 |
| andere Stimulanzien | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 5.6 | 0.0 | 4.3 | 5.0 | 50.0 | 9.1 | 3.3 | 0.0 | 2.8 | 1.5 | 2.7 | 1.9 | 7 |
| Hypnotika/Sedativa | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 11.1 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 8 |
| Halluzinogene | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1 |
| flüchtige Stoffe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1 |
| Cannabis | 10.6 | 3.2 | 8.1 | 22.2 | 0.0 | 17.4 | 15.0 | 0.0 | 13.6 | 83.3 | 100.0 | 86.1 | 20.5 | 8.0 | 16.8 | 63 |
| Tabak | 4.4 | 5.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 2.8 | 4.2 | 5.4 | 4.5 | 17 |
| andere Substanz(en) | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 1 |
| Glücksspielsucht | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 5.6 | 3.0 | 0.9 | 2.4 | 9 |
| Computer-bzw. Internetsucht | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 5.6 | 2.3 | 0.9 | 1.9 | 7 |
| Essstörungen | 0.0 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 4 |
| andere suchtähnliche Verhaltensweise(n) | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1 |
| N** | 180 | 93 | 273 | 18 | 5 | 23 | 20 | 2 | 22 | 30 | 6 | 36 | 264 | 112 | 376 | 376 |
| fehlende Angaben | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 16 | 16 |

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten proTag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹ | | | | | | | | | | | | alle Selbstbetroffenen | | | |
|-------------------------------------|---|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Häufigkeit des Tabakkonsums* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nie | 41.5 | 53.2 | 45.2 | 30.0 | 40.0 | 32.0 | 12.5 | 0.0 | 12.1 | 18.1 | 26.7 | 19.4 | 35.6 | 48.7 | 39.2 | 280 |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 8 |
| 2 bis 3 Tage pro Woche | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 5 |
| 4 bis 6 Tage pro Woche | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 10 |
| einmal täglich | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 3.0 | 3.6 | 6.7 | 4.1 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 14 |
| mehrmals täglich | 53.5 | 44.9 | 50.8 | 70.0 | 60.0 | 68.0 | 81.3 | 100.0 | 81.8 | 72.3 | 66.7 | 71.4 | 58.0 | 49.2 | 55.6 | 397 |
| N** | 342 | 158 | 500 | 20 | 5 | 25 | 32 | 1 | 33 | 83 | 15 | 98 | 519 | 195 | 714 | 714 |
| fehlende Angaben | 1 615 | 685 | 2 300 | 129 | 46 | 175 | 278 | 53 | 331 | 827 | 176 | 1 003 | 3 321 | 1 202 | 4 523 | 4 523 |
| Anzahl Zigaretten proTag*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 bis 10 Zigaretten pro Tag | 26.0 | 33.9 | 28.0 | 8.3 | 0.0 | 6.7 | 16.7 | 100.0 | 20.0 | 50.9 | 60.0 | 52.2 | 30.3 | 36.6 | 31.7 | 117 |
| 11-20 Zigaretten pro Tag | 46.2 | 50.8 | 47.4 | 83.3 | 100.0 | 86.7 | 50.0 | 0.0 | 48.0 | 38.6 | 40.0 | 38.8 | 45.3 | 51.2 | 46.6 | 172 |
| 21-30 Zigaretten pro Tag | 22.0 | 11.9 | 19.4 | 8.3 | 0.0 | 6.7 | 20.8 | 0.0 | 20.0 | 7.0 | 0.0 | 6.0 | 18.5 | 9.8 | 16.5 | 61 |
| 31 und mehr Zigaretten pro Tag | 5.8 | 3.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 12.0 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 5.9 | 2.4 | 5.1 | 19 |
| N** | 173 | 59 | 232 | 12 | 3 | 15 | 24 | 1 | 25 | 57 | 10 | 67 | 287 | 82 | 369 | 369 |
| fehlende Angaben | 27 | 15 | 42 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 1 | 12 | 47 | 18 | 65 | 65 |

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich


T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz¹ (nur Selbstbetroffene) (2019)

| | Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz | | | | | | | | | | | | alle Selbstbetroffenen | | | |
|---------------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | Alkohol | | | Opioide | | | Kokain und Derivate | | | Cannabis | | | Männer | Frauen | Total | N |
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Konsumziel* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| definitive Abstinenz | 33.8 | 34.9 | 34.1 | 78.3 | 66.7 | 75.9 | 62.8 | 100.0 | 65.2 | 49.5 | 61.1 | 51.2 | 39.4 | 41.2 | 39.9 | 358 |
| zeitlich begrenzte Abstinenz | 11.6 | 8.1 | 10.5 | 4.3 | 0.0 | 3.4 | 9.3 | 0.0 | 8.7 | 6.3 | 0.0 | 5.4 | 9.8 | 6.4 | 8.9 | 80 |
| kontrollierter Konsum | 34.0 | 43.5 | 36.8 | 8.7 | 0.0 | 6.9 | 7.0 | 0.0 | 6.5 | 23.4 | 22.2 | 23.3 | 30.4 | 38.2 | 32.4 | 291 |
| keine Beschränkung beabsichtigt | 6.8 | 2.7 | 5.6 | 0.0 | 16.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 3.9 | 5.6 | 2.6 | 4.8 | 43 |
| bis jetzt nicht festgelegt | 12.9 | 9.7 | 12.0 | 8.7 | 16.7 | 10.3 | 20.9 | 0.0 | 19.6 | 16.2 | 16.7 | 16.3 | 13.7 | 10.3 | 12.8 | 115 |
| andere | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 11 |
| N** | 441 | 186 | 627 | 23 | 6 | 29 | 43 | 3 | 46 | 111 | 18 | 129 | 665 | 233 | 898 | 898 |
| fehlende Angaben | 1 516 | 657 | 2 173 | 126 | 45 | 171 | 267 | 51 | 318 | 799 | 173 | 972 | 3 175 | 1 164 | 4 339 | 4 339 |
| Prognose* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sehr gute Prognose | 17.6 | 13.7 | 16.5 | 18.5 | 8.3 | 15.4 | 17.8 | 20.0 | 18.0 | 18.3 | 21.7 | 18.9 | 18.0 | 14.5 | 17.1 | 154 |
| gute Prognose | 45.1 | 46.3 | 45.4 | 44.4 | 41.7 | 43.6 | 46.7 | 80.0 | 50.0 | 56.7 | 47.8 | 55.1 | 46.9 | 48.3 | 47.3 | 426 |
| eher ungünstige Prognose | 25.0 | 29.1 | 26.2 | 25.9 | 25.0 | 25.6 | 26.7 | 0.0 | 24.0 | 20.2 | 30.4 | 22.0 | 24.6 | 26.5 | 25.1 | 226 |
| ungünstige Prognose | 12.3 | 10.9 | 11.9 | 11.1 | 25.0 | 15.4 | 8.9 | 0.0 | 8.0 | 4.8 | 0.0 | 3.9 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 95 |
| N** | 448 | 175 | 623 | 27 | 12 | 39 | 45 | 5 | 50 | 104 | 23 | 127 | 667 | 234 | 901 | 901 |
| fehlende Angaben | 1 509 | 668 | 2 177 | 122 | 39 | 161 | 265 | 49 | 314 | 806 | 168 | 974 | 3 173 | 1 163 | 4 336 | 4 336 |




¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich


** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

G1 Hauptproblem Alkohol bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019





Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität




G2 Hauptproblem Opiode bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019






Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität




G3 Hauptproblem Kokain oder Derivate bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019






Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität




G4 Hauptproblem andere Stimulanzen bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019





Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität




G5 Hauptproblem Cannabis bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019






Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität




G6 Hauptproblem Hypnotika/Sedativa bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019



Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität



G7 Hauptproblem Glücksspiel bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019



Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität

